
PRO SCIENTIA
SALUTE
POPULIQUE
LIBRARY OF
THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN
Purchased
1911
Septemb 1899
R W Gibson Invt

Vollständiger

Blütenkalender

der

deutschen Phanerogamen-Flora.

Unter Zugrundelegung von Dr. Kittel's Taschenbuch
der Flora Deutschlands,
nebst Angabe der
Klassen und Ordnungen nach Linné, der Jussieu'schen Pflanzenfamilien,
der richtigen Aussprache
und der wichtigsten Synonymen und Trivialnamen,

bearbeitet und herausgegeben
von

Eduard Reiche,
Lehrer in Eismannsdorf, Sekretär des landwirtschaftlichen Vereins Stumsdorf.

Zweiter Band.
Juli bis Dezember.

Hannover.
Hahn'sche Hofbuchhandlung.
1872.

.B47
v.2

Druck von August Grimpe in Hannover.

ARY
K-
BOTANICAL
GARDEN.

Vorwort.

Anschließend an das Vorwort zum 1. Bande des Blütenkalenders, zeigt der Verfasser noch einmal und ganz besonders darauf hin, daß der Blütenkalender durchaus nicht als alleiniges Hilfsmittel zum Bestimmen der Pflanzen gelten soll. Das vorliegende Werk soll vielmehr das Auffinden und richtige Bestimmen einer aufgefundenen Pflanze erleichtern, was mit Hilfe jedes Werkes über die deutsche Flora, mit Ausnahme nur weniger, schwieriger Gattungen, selbst dem Anfänger nicht zu schwer fallen dürfte. Daher sind auch in dem, dem 2. Bande angehängten Register alle in dem Blütenkalender und einigen Lokalfloren vorkommenden Synonymen und Trivialnamen aufgenommen, um das Werk für jede Flora nutzbar zu machen.

Ueber die in dem Nachtrage zum 2. Bande vorkommenden Pflanzen ist zu bemerken, daß die meisten derselben der angrenzenden Flora von Istrien und der Schweiz angehören; nur wenige derselben sind Kulturpflanzen oder verwilderte Gartenflüchtlinge oder mit fremdem Samen eingeschleppte Gäste.

Schließlich empfiehlt der Verfasser den Blütenkalender nochmals einer freundlichen Aufnahme und soliden Beurtheilung und wird, so Gott will, bei einer notwendig werdenden neuen Auflage alle ihm zugehenden Winke und wohlgemeinten Ratschläge gern und freudig benutzen!

Eismannsdorf bei Halle a. S., am 1. September 1872.

Eduard Beiche.

AUG 5 1911

Inhalt des zweiten Bandes.

Juli. §. 478 — 522.

§. 478. Pflanzen, welche im **Juli** in Wäldern blühen: 1.*)
§. 479. In Hainen: 28.
§. 480. In Nadelwäldern: 32.
§. 481. In Gebüschen, Hecken, Zäunen u. dergl.: 33.
§. 482. An und auf Mauern, Lehmwänden, Ruinen, Dächern und dergl: 47.
§. 483. In Gärten (Baum- und Grasgärten, Gartenland): 51.
§. 484. An Wegen, Straßen, Ackerrändern, auf Rainen u. dergl.: 57.
§. 485. In und um Dörfer, Städte, menschliche Wohnungen und dergl.: 72.
§. 486. Auf Schutt, wüsten Dorfplätzen u. dergl.: 74.
§. 487. Auf Düngerhaufen, an Dungstätten u. dergl.: 79.
§. 488. Auf Aeckern: 80.
§. 489. An fast allen Orten: 103.
§. 490. Auf fettem Boden: 104.
§. 491. Auf Sandboden: 104.
§. 492. Auf kalkhaltigem Boden: 110.
§. 493. Auf Lehmboden: 117.
§. 494. Auf Mergelboden: 118.
§. 495. Auf Thonboden: 118.
§. 496. Auf steinigem Boden: 119.
§. 497. An Abhängen: 123.
§. 498. In Weinbergen: 126.
§. 499. Auf Anhöhen und Hügeln: 128.
§. 500. Auf Bergen: 138.
§. 501. In Gebirgen: 146.
§. 502. An und auf Felsen: 164.
§. 503. In den Alpen und Voralpen: 169.
§. 504. Auf Heiden: 219.
§. 505. An trocknen Stellen: 220.
§. 506. Auf Aengern: 221.
§. 507. Auf Grasplätzen u. Triften: 221.
§. 508. Auf Weiden: 227.
§. 509. Auf Wiesen: 230.
§. 510. An feuchten und sumpfigen Orten: 248.
§. 511. An schattigen Orten: 255.
§. 512. An Quellen und quelligen Orten: 255.
§. 513. Auf Moraft- u. Morboden: 256.
§. 514. Auf Torfboden: 257.
§. 515. Auf Schlamm: 258.
§. 516. Auf überschwemmten Stellen: 258.
§. 517. An und in Gräben, Bächen, Flüssen u. s. w.: 259.
§. 518. In und an stehenden Gewässern (Seen, Teichen, Lachen) u. s. w: 272.

*) Bedeutet die Seitenzal.

§. 519. An salzhaltigen Orten des Binnenlandes: 278.
§. 520. Am Meeresstrande: 279.
§. 521. Kulturpflanzen: 284.
§. 522. Schmarotzer: 289.

August. §. 523—568.

§. 523. Pflanzen, welche im **August** in Wäldern blühen: 292.
§. 524. In Hainen: 301.
§. 525. In Nadelwäldern: 303.
§. 526. In Gebüschen, Hecken, Zäunen u. dergl.: 303.
§. 527. In Gärten (Baum- und Grasgärten, Gartenland): 309.
§. 528. An Wegen, Straßen, Dämmen, Ackerrändern u. dergl.: 311.
§. 529. An und auf Mauern, Lehmwänden, Ruinen, Dächern und dergl.: 318.
§. 530. In und um Dörfer, Städte, menschliche Wohnungen u. dergl. 320.
§. 531. Auf Schutt, unbebauten Stellen, wüsten Dorfplätzen u. dergl.: 322.
§. 532. Auf Düngerhaufen, an Dungstätten u. dergl.: 326.
§. 533. Auf Aeckern: 327.
§. 534. An fast allen Orten: 336.
§. 535. Auf fettem Boden: 336.
§. 536. Auf Sandboden: 336.
§. 537. Auf Kalkboden: 340.
§. 538. Auf Lehmboden: 343.
§. 539. Auf Mergelboden: 344.
§. 540. Auf Thonboden: 344.
§. 541. Auf steinigem Boden: 345.
§. 542. In Erdgruben: 347.
§. 543. An Abhängen: 347.
§. 544. In Weinbergen: 349.
§. 545. Auf Anhöhen und Hügeln: 350.
§. 546. Auf Bergen: 356.
§. 547. In Gebirgen: 360.
§. 548. Auf und an Felsen: 368.
§. 549. In den Alpen und Voralpen: 370.
§. 550. Auf Heiden: 389.
§. 551. An trocknen Stellen: 390.
§. 552. Auf Grasplätzen und Triften: 390.
§. 553. Auf Aengern: 393.
§. 554. Auf Weiden: 393.
§. 555. Auf Wiesen: 396.
§. 556. An feuchten, sumpfigen Orten: 406.
§. 557. An schattigen Orten: 410.
§. 558. An Quellen und quelligen Orten: 410.
§. 559. Auf Moraft- u. Morboden: 411.
§. 560. Auf Torfboden: 411.
§. 561. Auf Schlamm: 412.
§. 562. Auf überschwemmten Stellen: 413.
§. 563. An und in Gräben, Bächen, Flüssen u. dergl.: 413.
§. 564. An und in stehenden Gewässern (Seen, Teichen u. s. w.): 421.
§. 565. An salzhaltigen Orten des Binnenlandes: 424.
§. 566. Am Meeresstrande: 426.
§. 567. Kulturpflanzen: 428.
§. 568. Schmarotzer: 430.

September. §. 569—612.

§. 569. Pflanzen, welche im **September** in Wäldern blühen: 431.
§. 570. In Hainen: 434.
§. 571. In Nadelwäldern: 434.
§. 572. In Gebüschen, Hecken, Zäunen u. dergl.: 435.
§. 573. In Gärten (Baum- und Grasgärten, auf Gartenland): 436.
§. 574. An Wegen, Straßen, Ackerrändern, auf Dämmen u. dergl.: 438.
§. 575. An und auf Mauern, Lehmwänden, Dächern, Ruinen ꝛc.: 441.
§. 576. In und um Dörfer, Städte menschliche Wohnungen: 442.

§. 577. Auf Schutt, unbebauten Stellen, wüsten Dorfplätzen u. dergl.: 413.
§. 578. Auf Düngerhaufen, an Mistgruben u. s. w.: 441.
§. 579. Auf Aeckern: 415.
§. 580. An fast allen Orten: 450.
§. 581. Auf fettem Boden: 450.
§. 582. Auf Sandboden: 450.
§. 583. Auf Kalkboden: 451.
§. 584. Auf Lehmboden: 453.
§. 585. Auf Mergelboden: 453.
§. 586. Auf Thonboden: 453.
§. 587. Auf steinigem Boden: 453.
§. 588. An Abhängen: 454.
§. 589. In Weinbergen: 455.
§. 590. Auf Anhöhen und Hügeln: 455.
§. 591. Auf Bergen: 457.
§. 592. In Gebirgen: 458.
§. 593. Auf und an Felsen: 459.
§. 594. In den Alpen und Voralpen: 460.
§. 595. Auf Heiden: 463.
§. 596. Auf sonnigen, trocknen Plätzen: 463.
§. 597. Auf Aengern: 463.
§. 598. Auf Grasplätzen und Triften: 463.
§. 599. Auf Weiden: 465.
§. 600. Auf Wiesen: 466.
§. 601. An feuchten, sumpfigen Orten: 469.
§. 602. An schattigen Orten: 470.
§. 603. An Quellen und quelligen Orten: 470.
§. 604. Auf Moraft- und Morboden: 170.
§. 605. Auf Torfboden: 470.
§. 606. Auf überschwemmt gewesenen Stellen: 470.
§. 607. An und in Gräben, Bächen, Flüssen: 471.
§. 608. An und in stehenden Gewässern (Teichen, Seen): 474.
§. 609. An salzhaltigen Orten des Binnenlandes: 475.
§. 610. Am Meeresstrande: 476.
§. 611. Kulturpflanzen: 477.
§. 612. Schmarotzer: 478.

October. §. 613—646.

§. 613. Pflanzen, welche im **October** in Wäldern blühen: 478.
§. 614. In Hainen: 478.
§. 615. In Gebüschen, Hecken, Zäunen u. dergl.: 479.
§. 616. In Gärten (Baum- und Grasgärten, Gartenland): 479.
§. 617. An Wegen, Straßen, Rainen, Ackerrändern, Dämmen u. dergl.: 480.
§. 618. An und auf Mauern, Lehmwänden, Dächern, Ruinen und dergl.: 481.
§. 619. In und um Dörfer, Städte, menschliche Wohnungen: 481.
§. 620. Auf Schutt, unbebauten Stellen, wüsten Dorfplätzen: 481.
§. 621. Auf Aeckern: 482.
§. 622. Auf fettem, schwerem Boden: 483.
§. 623. Auf Sandboden: 483.
§. 624. Auf Kalkboden: 483.
§. 625. Auf Lehmboden: 484.
§. 626. Auf Mergelboden: 484.
§. 627. Auf Thonboden: 484.
§. 628. Auf steinigem Boden: 484.
§. 629. In Weinbergen: 484.
§. 630. Auf Anhöhen und Hügeln: 484.
§. 631. In Gebirgen: 485.
§. 632. Auf und an Felsen: 485.
§. 633. In den Alpen und Voralpen: 485.
§. 634. An sonnigen, trocknen Stellen: 486.
§. 635. Auf Grasplätzen und Triften: 486.
§. 636. Auf Aengern: 486.
§. 637. Auf Weiden: 486.
§. 638. Auf Wiesen: 486.
§. 639. An feuchten, sumpfigen Orten: 487.

§. 640. An Quellen und quelligen Orten: 487.
§. 641. Auf Torfboden: 187.
§. 642. An und in Gräben, Bächen, Flüssen: 187.
§. 643. An und in stehenden Gewässern (Seen, Teichen): 188.
§. 644. An salzhaltigen Orten des Binnenlandes: 188.
§. 645. Am Meeresufer: 488.
§. 646. Kulturpflanzen: 188.

November.

§. 647 bis 660. Pflanzen, welche im **November** blühen: 489.

Dezember.

§. 661 bis 664. Pflanzen, welche im **Dezember** blühen: 491.

Verbesserungen: 492.
Nachträge: 493.
Register: 509.

Juli.

A. In Wäldern: §. 478.

—. II., 1; Rachenblümler: Veronīca officinālis L.; ſ. Nr. 997.
—. III., 1; Baldrianpfl.: Valeriāna officinālis L.; ſ. Nr. 998.
—. „ Halbgras: Cypērus flavēscens L.; ſ. Nr. 1143.
—. „ „ Scirpus sylvatĭcus L.; ſ. Nr. 367.
—. III., 2; Grаspfl.: Calamagrōstis sylvatĭca DC.; ſ. Nr. 1144.
—. III., 2; Grаspfl.: Pipthatĕrum paradōxum P. B.; ſ. Nr. 999.
—. III., 2; Grаspfl.: Holcus lanātus L.; ſ. Nr. 371.
—. „ „ Bromus gigantĕus L.; ſ. Nr. 1000.
—. „ „ Festūca heterophўlla Hänke; ſ. Nr. 1001.
—. III., 2; Grаspfl.: Poa nemorālis L.; ſ. Nr. 1002.
—. „ „ Brachypodĭum sylvatĭcum R. et Sch.; ſ. Nr. 1003.
—. III., 2; Grаspfl.: Elўmus europaeus L.; ſ. Nr. 1004.
—. IV., 1; Krapppfl.: Galĭum sylvēstre Poll.; ſ. Nr. 1005.
—. „ „ G. mollūgo L.; ſ. Nr. 1006.
—. „ Araliенpfl.: Cornus suecĭca L.; ſ. Nr. 1007.
2052. „ Kardenpfl.: Scabiōsa transsylvanĭca L. Sieben-bürgeniſche Skabioſe. Zerſtreut-behart; Blr. fiederſpalt.; Hüllblchn. eilanzettl., ſtachelſp.; Spreublchn. längl., mit purpurner Borſte auslauf.; Hüllchen mit 8 gleichen, kurzen Zähnen; ☉ und ♃; 7 bis 9; Kr.
—. V., 1; Schlüſſelblümler: Lysimachĭa thyrsiflōra L.; ſ. Nr. 1145.
2053. V., 1; Nachtſchattenpfl.: Atrōpa belladōnna L. Gemeine Tollkirſche (ſchöne Dame, Wolfswut, Teufelskirſche, Walker-, Wind-, Wolfs-, Schwindel-, Teufels-, Irr-, Wät-, Schlaf- oder Tollbeere, Wut-, Sau- oder Wolfskirſche, Nachtſchatten, Mäuſe- oder Rattenpfeffer, Hirſchweichſel,

Schönmädchen, Bockswurz, Saukraut, Wolfsauge). St. ästig; Bltr. eif., ſtiel=herablauf., zu 2 beiſammen; Bl. violetbraun; Beere ſchwarz; 4; 7 bis 8; ☿; ♃.*)

—. V., 1; Enzianpfl.: Erythraea centaurĭum Rich.; ſ. Nr. 1009.

—. V., 1; Glockenblümler: Campanŭla patŭla L.; ſ. Nr. 1010.

—. " " Phyteuma nigrum Schmidt; ſ. Nr. 1011.

2054. V., 2; Doldenpfl.: Trinĭa kitaibelĭi M. B. Kitaibel's Trinie. Zweihäuſig; St. aufr., gabeläſtig; Bltr. grau=grün, untere dopp.=fiedertheil., Fiederchen lineal.; Hülle fehlend; Hüllchen 4= bis 5blättr.; Bl. weiß; ♂; 7 bis 8; Mä., Oe.

—. V., 2; Doldenpfl.: Aegopodĭum podagrarĭa L.; ſ. Nr. 1012.

2055. V., 2; Doldenpfl.: Bupleurum affĭne Sadler. Steifes Haſenöhrchen. St. aufr., ſteif; Aeſte aufr., faſt angedr.; Bltr. lineal., umfaſſ., lang=zugeſp., 3nervig, am Rande ſchärflich; Hüllbltchn. lineal=borſtig; Blütenſt. kürzer, als die Fr.; Bl. gelb; ☉; 7 bis 8; Oe.

2056. V., 2; Doldenpfl.: Athamänta sibirĭca L. (Libanōtis sib. Koch, L. montāna var. sibirĭca P. M. E.). Sibiriſche Hirſchwurz. St. kant., gefurcht; Bltr. einfach=gefied., Fiedern ſtark eingeſchn.=gezähnt; Hülle zuweilen verkümmert; Bl. weiß oder rötlich; 4; 7 bis 8; Pr., Pſ.

2057. V., 2; Doldenpfl.: Selīnum carvifolĭa L. (Angelĭca carv. Spr., Mylĭnum carvif. Gaud.). Kümmelblättrige Silje. St. gefurcht, ſcharfkant.; untere Bltr. 3fach=gefied.; Dolden gedrungen; Bl. weiß; Griff. faſt von Fruchtlänge; 4; 7 bis 8.

2058. V., 2; Doldenpfl.: Pastināca satīva A. Gemeine Paſtinak (Gänſekreſſe). St. kantig=gefurcht; Bltr. gefied., oberſ. glänzend, unterſ. weichharig; Bl. gelb; ♂; 7 bis 8; ♆.

2059. V., 2; Doldenpfl.: Laserpitĭum pruthenĭcum L. Preußiſches Laſerkraut. St. kant.=gefurcht, unterw. ſteifharig; Bltchn. fiederſpalt., lanzettl.=zipf.; Bl. weiß; Hüllbltchn. durchſcheinend=berand.; äußere Samenflügel breiter; Scheibe niedergedr.; 4; 7 bis 8.

—. VI., 1; Lilienpfl.: Lilĭum martăgon L.; ſ. Nr. 1013.

*) Dem Triumvir Markus Antonius ſchon ſollen durch Belladonna Truppen vergiftet worden ſein. — In Italien gebrauchte man die Beeren als Schminke, daher bella donna!

—. X., 1; Heidepfl.: Pyrŏla secūnda L.; ſ. Nr. 386.
—. „ „ P. rotundifolĭa L.; ſ. Nr. 1015.
—. X., 2; Nelkenblütler: Dianthus supērbus L.; ſ. Nr. 1016.
—. X., 3; „ Stellarĭa graminĕa L.; ſ. Nr. 388.
2060. XI., 2; Roſenpfl.: Agrimonĭa pilōsa Ledeb. Beharter Odermennig. St. ſchlank, ſteifharig; Bltr. unterbr.-gefied., Bltchn. rhombiſch-verk.-eif. oder rhomb.-lanzettl., unterſ. an den Nerven zerſtreut-ſteifharig, übrigens außer den Drüſen kahl; Traube locker; Bl. goldgelb; Fruchtkelch verk.-kegelf., der ganzen Länge nach gefurcht, Stacheln an der Baſis nach oben gerichtet, dicht-zuneigend; 4; 7; Pr.
—. XII., 2; Roſenpfl.: Mespĭlus germanĭca L.; ſ. Nr. 1018.
—. „ „ Spiraea filipendŭla L.; ſ. Nr. 1019.
—. XII., 3; „ Tormentĭlla erēcta L.; ſ. Nr. 1082.
—. „ „ Rubus idaeus L.; ſ. Nr. 396.
—. „ „ Rosa arvēnsis L.; ſ. Nr. 1020.
2061. XIII., 1; Linde: Tilĭa parvifolĭa Ehrh. (T. ulmifolĭa Scop., T. microphȳlla Vent., T. europaea var. c. L.). Kleinblättrige Linde (Winter-, Spät- oder Steinlinde). Bltr. beiderſ. kahl, unterſ. meergrün; Bl. blaßgelb oder weiß; ♄; 7; ↕; ♋; ⚓.
Varirt: T. microphȳlla Vent. (Bltr. klein, Blütenſt. 7- bis 13blüt.), T. acuminăta Rchb. (Bltr. mit ſehr verläng. Spitze; Blütenſt. 3- bis 8blüt.), T. intermedĭa DC. (T. vulgāris Hayne; Bltr. größer, unterſ. in den Adern winkeln blaſſer gebärtet; Blattſt. der oberen Bltr. kaum von halber Blattlänge; Fruchtk. behart).
2062. XIII., 2; Gichtroſenpfl.: Cimicifŭga foetĭda L. syst. nat. (Actaea cimicifŭga L. spec. plant.). Stinkendes Wanzenkraut (Wanzentod, Wanzentödter). St. aufr., walzenf.; Bltr. wechſelſt., geſtielt, groß, dopp.-3zäl.-gefied., kahl, glänz., klebrig; Bl. in ſchlanken, nickenden Aehren, grünlichweiß; 4; 7 bis 9; Pr., Mä.*)
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Ranuncŭlus acris L.; ſ. Nr. 399.
—. „ „ R. lanuginōsus L.; ſ. Nr. 1023.
2063. XIV., 1; Lippenblümler: Melīssa calamīntha L. (Calamīntha officinālis Mnch.). Berg-Meliſſe (Baſilienquendel). Bltr. ſtumpf; Bl. purpurn; Nüſſe rundl.; St. kurzharig; Kelchſchlund ſchwach-behart; Narbe der Unterl. aufligend; 4; 7 bis 8; Main, Rh., Kr.

*) *C. racemosa Barton. (Actaea racem. L.), in Nordamerika einheimiſch, iſt in einem Erlengebüſch bei Guteborn unweit Ruhland in der Lauſitz ſeit Jahren verwildert!

—. XIV., 1; Lippenblümler: Dracocephălum ruyschiāna L.; ſ. Nr. 1025.
2064. XIV., 1; Lippenblümler: Chaitūrus marrubiāstrum Rchb. (Leonūrus marrub. L., Ch. leonuroīdes Ehrh., L. chaitūrus Willd.). Andornartiger Katzenſchwanz. Bltr. unterſ. zalr.-weißdrüſig, untere rundl.-eiſ., obere lanzettl.; Bl. klein, hellroſenrot, weiß-punkt.; 4; 7 bis 9.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Stachys sylvatĭca L.; ſ. Nr. 1026.
—. „ „ Betonĭca officinālis L.; ſ. Nr. 1027.
2065. XIV., 2; Rachenblümler: Pediculāris foliōsa L. Beblättertes Läuſekraut. Bltr. gefied.; K. eckig, auf den Kanten zott., 5zähn.; Zähne ganzrand.; Helm zott., faſt grade, meiſt kürzer als die Unterl.; Bl. ſchwefelgelb; Stbf. oben dicht-gebärtet; 4; 7 bis 8; †.
2066. XIV., 2; Rachenblümler: Melampўrum pratēnse L. (M. vulgātum Pers., M. commutātum Tausch). Wieſen-Wachtelweizen. Deckbltr. lanzettl., obere an der Baſis jederſ. mit 1 oder mehren lanzettl., pfrieml. Zähnen; K. meiſt viel kürzer, als die Blkr., pfrieml.- und auffteig.-zurückgekr.-ſpitz-gezähnt; Bl. blaßgelbl. oder weißl., ſelten gefleckt; ☉; 7 bis 8.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Digitālis ambigŭa Murr.; ſ. Nr. 1024.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Hespĕris runcināta W. et K.; ſ. Nr. 404.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum nodōsum L.; ſ. Nr. 405.
—. „ „ G. columbīnum L.; ſ. Nr. 675.
—. XVII., 2; Erdrauchpfl.: Corydălis claviculāta Pers.; ſ. Nr. 1029.
—. XVII., 3; Bitterling: Polygăla chamaebūxus L.; ſ. Nr. 1030.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Genīsta germanĭca L.; ſ. Nr. 437.
—. „ „ Trifolĭum rubens L.; ſ. Nr. 1031.
—. „ „ T. pratēnse L.; ſ. Nr. 1032.
—. „ „ T. medĭum L.; ſ. Nr. 1033.
—. „ „ Astragălus glycyphўllos L.; ſ. Nr. 1035.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Lathўrus sylvēstris L.; ſ. Nr. 1036.
2067. „ „ L. heterophўllus L. Verſchiedenblättrige Kichererbſe. Untere Bltr. 1parig, obere 2- bis 3parig; Nabel kaum 1/3 des Samens umgebend; Blattſtielflügel faſt von Stengelbreite; Schiffchen gewunden; Hülſe netzaderig; Same körnigrauh; Bl. purpurrot; 4; 7 bis 8; Pr., Th., Harz, Schl., Bö. u. ſ. w.

Varirt: unijūgus Koch (Bltr. sämmtl. 1parig).

2068. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hypericum perforātum L. Gemeines Hartheu (durchlöchertes H., St. Johanniskraut, Liebes-, Hexen-, Stund-, Konrads- oder Bockskraut, Johannisblut, Fleuchteufel, unseres Herrgotts Wundkraut). St. aufr., 2kant.; Bltr. durchscheinend punkt.; Kelchbltr. lanzettl., sehr spitz, von dopp. Fruchtknotenlänge; ♃; 7 bis 8; ♄ (früher).

Varirt: H. veronēnse Schrk. (Bltr. lineal-längl.; Rispe eif.; Bl. kleiner; Felsen- und Mauernform).

2069. XVIII., 2; Hartheupfl.: H. quadrangŭlum Fr. (H. dubĭum Leers, H. delfinēnse Vill.). Vierkantiges H. (Waldhopf). St. schwach-4kant.; Kelchbltr. ellipt., stumpf, etwa von Fruchtknotenlänge; Bl. gelb; ♃; 7 bis 8.

—. XVIII., 2; Hartheupfl.: H. montānum L.; s. Nr. 1037.

2070. " " H. hirsūtum L. Rauhhariges H. (St. Konrads- oder St. Zäzilienkraut). St. nebst den kurzgestielten Bltrn. weichharig; Kelchbltr. lanzettl., spitz; Samen sammetartig; Bl. gelb; ♃; 7 bis 8.

—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum sylvatĭcum Lmk.; s. Nr. 1038.

2071. XIX., 1; Korbblütler: H. tridentātum Fr. (H. laevigātum Willd., H. rigĭdum Hartm., H. affĭne Tausch). Dreizähniges Habichtskraut. St. fast hohl; untere Bltr. gestielt, die übrigen sitz., lanzettl.; Doldentraube fast blattlos, mit verläng., borstenf., grauflock., kurzharigen Köpfchenstielchen; abgeblühte Köpfchen in der Mitte eingeschnürt; Hüllschuppen grade, blaßrandig; Bl. gelb; ♃; 7 bis 8.

2072. XIX., 1; Korbblütler: Lactūca murālis Less. (Prenānthes mur. L., Chondrĭlla mur. Lmk., Mycēlis mur. Rchb., Cicerbĭta mur. Wallr., Phoenixŏpus mur. Koch). Mauerlattich. Bltr. gestielt, leierf.-fiederspalt.; Blattzipf. winkelig; Blütenstand locker-risp.; Bl. gelb; ☉ (♃?); 7 bis 8.

—. XIX., 1; Korbblütler: L. quercīna L.; s. Nr. 1039.

2073. " " Serratŭla tinctorĭa L. Färberscharte (Färberdistel, Gilbkraut, Herrenschmuck). Bltr. geschärft-gesägt, ungetheilt, leierf. oder fiederspalt.; Bl. purpurrot; St. oben ästig; Aeste verzweigt, mehrköpf.; Hüllbltchn. gefärbt; ♃; 7 bis 8; ⚓.

2074. XIX., 1; Korbblütler: Cardŭus deflorātus L. Waldistel. Bltr. halb-herablauf., etwas meergrün oder fast gleichfarbig, gezähnt-gesägt; Köpfchen einzeln, nickend, purpurn; ♃; 7 bis 9.

Varirt: C. crassifolĭus Willd. (Hüllbltchn. ſpitz; Stbltr. ungetheilt), C. cirsoïdes Vill. (Hüllbltchn. dornig-ſpitzig; Stglbltr. halb-fiederſpalt.), C. alpēstris W. et K. (Hüllbltchn. etwas ſtachelſp., Stglbltr. halb-fiederſpalt.).

—. XIX., 2; Korbblütler: *Senecĭo vernālis W. et K.; ſ. Nr. 1040.

2075. XIX., 2; Korbblütler: S. jacobaea L. Jakobs-Kreuzkraut. Obere Bltr. mit vieltheil. Aehrchen umfaſſ., fiedertheil., Fiedern gezähnt oder faſt fiederſpalt., vorn breiter, 2- bis 3zähn. oder 2ſpalt.; Zweige des Blütenſtandes aufr.-ſtehend; Randachänen kahl; Bl. goldgelb; 4; 7 bis 8.

2076. XIX., 2; Korbblütler: Carpesĭum abrotanoïdes L. Stabkrautartige Kragenblume. Köpfchen blattachſelſt., kurz-geſtielt, genähert, einſeitswendig; Stützbltr. klein, ſtumpf; Bl. blaßgelb; ☉ und ♁; 7 bis 8; Kr.*)

2077. XIX., 2; Korbblütler: Solidāgo virga-aurĕa L. Gemeine Goldrute (St. Petersſtab, gülden oder heidniſch Wundkraut, Federkraut, Mägdehülle). St. einfach, oben einfach- oder riſpig-traubig; Trauben aufr.; Bl. gelb; 4; 7 bis 9; ↕.

—. XXI., 1; Giftmilcher: Euphorbĭa stricta Sm.; ſ. Nr. 1041.

—. „ Aronpfl.: Arum maculātum L.; ſ. Nr. 423.

—. „ „ Calla palūstris L.; ſ. Nr. 1146.

—. XXII., 3; Zauberpfl.: Osyris alba L.; ſ. Nr. 1044.

a. An Waldrändern:

—. II., 1; Lippenblümler: Salvĭa pratēnsis L.; ſ. Nr. 1101.

—. III., 1; Baldrianpfl.: Valeriāna officinālis L.; ſ. Nr. 998.

—. III., 2; Graspfl.: Calamagrōstis montāna Host; ſ. Nr. 1102.

—. III., 2; Graspfl.: Melĭca ciliāta L.; ſ. Nr. 1103.

—. „ „ Dactylis glomerāta L.; ſ. Nr. 1104.

2078. „ „ Brachypodĭum pinnātum P. B. (Bromus pinnātus L., Festūca pinnāta Mnch., Tritĭcum pinnātum Mnch. hass.). Gefiederte Zwenke (gefiederte Lolchtreſpe). Wrzſtock kriech.; Bltr. ſteif; Aehrchengrannen nicht von Spelzenlänge; Aehre aufr. oder ſichelf. gebogen; 4; 7 bis 9.

2079. IV., 1; Kardenpfl.: Dipsăcus pilōsus L. (Cephalarĭa pilōsa Gren.). Bcharte Karde. St. ſtachelig und ſteifharig; Bltr. geſtielt, an der Spitze des Blattſt. geöhrt; Deckbltchn. verk.-eif., gradſpitz.; Bl. weißlich; ♂; 7 bis 9; ✕.

2080. IV., 1; Kardenpfl.: Scabiōsa columbarĭa L. (Asteroce-

*) Iſt wol nur kleinköpfige Form von C. cernuum L.!

phălus columb. Wallr.). Tauben-Skabioſe (Sternkopf, Apoſtemkraut, Teufelsbiß). St. kahl; Fr. 8furchig; Bl. blau oder bläulichrot; Hüllchen weißborſtig, 8falt., mehrnervig; 4: 7 bis 9.

—. IV., 1; Krapppfl.: Galĭum sylvēstre Poll.; ſ. Nr. 1005.
—. „ „ G. mollūgo L.; ſ. Nr. 1006.
—. „ „ G. verum L.; ſ. Nr. 1105.
2081. „ „ G. boreāle L. Nordiſches Labkraut. St. aufr., ſteif, 4kant.; Bltr. 4ſtänd., lanzettl., 3nervig, nicht ſtachelſp.; Bl. weiß; Fr. kahl oder mit haligen Härchen; 4; 7 bis 8.

Varirt: intermedĭum Koch, G. hyssopifolĭum Hoffm. (G. rubioīdes Poll.; Fr. kahl).

—. IV., 1; Roſenpfl.: Alchemīlla vulgāris L.; ſ. Nr. 416.
2082. V., 1; Rachenblümler: Verbāscum nigrum L. Schwarzes Wollkraut (Königskerze, Hildebrand). St. oberw. ſcharfkant.; untere Bltr. an der Baſis herzf., obere eif.-längl., faſt ſitz.; Traube verläng.; Bl. gelb; ☌; 7 bis 8.

Varirt: V. schottiānum Schrad. (Bltr. auch oberſ., aber wenig filz.), V. lanātum Schrad. (Bltr. buchtig- und dopp.-gekerbt), V. orientāle M. B. (Aeſte walzenf.).

—. V., 1; Nachtſchattenpfl.: Atrŏpa belladōnna L.; ſ. Nr. 2053.
—. „ Borretſchpfl.: Echĭum vulgāre L.; ſ. Nr. 1108.
—. „ Glockenblümler: Campanŭla trachelĭum L.; ſ. Nr. 1109
—. „ „ C. cervarĭa L.; ſ. Nr. 1110.
2083. V., 2; Doldenpfl.: Athamānta libanōtis L. (Seseli liban. Koch, Libanōtis montāna All., L. vulgāris DC.). Kreuzblättrige Hirſchwurz (Bergheilwurz). Bltr. dopp.- bis 3fach-gefied.; unterſte Bltchnpare an der Mittelrippe kreuzſtänd.; Bl. weiß; Fr. kurzharig; 4; 7 bis 8.

Varirt: A. glabra (Fr. kahl; ſo in den ſüdl. A.).

—. V., 2; Doldenpfl.: Anthrīscus cerefolĭum Hoffm.; ſ. Nr. 456.
—. V., 2; Doldenpfl.: Chaerophўllum bulbōsum L.; ſ. Nr. 1106.
—. V., 2; Doldenpfl.: Ch. cicutarĭa Vill.; ſ. Nr. 1107.
2084. V., 3; Geisblattpfl.: Sambūcus ebŭlus L. (S. humĭlis Lmk., Ebŭlum humĭle Pont.). Zwergholunder (Eppich, Heiland, Heilender). St. krautig, klein-warzig; Bltr. gefied.; Nebenbltr. blattig, eif., geſägt; Hauptäſte des Ebenſtraußes 3zäl.; Bl. rötlichweiß; Fr. ſchwarz, grünl. oder weiß; 4; 7; +.
2085. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: Epilobĭum angustifolĭum L. (E. spicātum Lmk., Chamaenerĭon angust. Scop.).

Schmalblättriger Schotenweiderich (weidenblättriges Weidenröschen, Feuer-, Brand- oder St. Antoniuskraut, Waſſerviole). Bltr. lanzettl., aderig; Bl. purpurrot; 4; 7 bis 8.

—. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus carthusianōrum L.; ſ. Nr. 459.

2086. X., 2; Nelkenblütler: D. seguierĭi Vill. (D. sylvatĭcus Hoppe). Seguier's Nelke (Waldnelke). St. kahl; Blattſch. ſo lang, als das Blatt breit; Bl. 2 oder büſchelig, rot; Kelchdeckſchuppen grün, eif. oder eilanzettl., ſtumpf, gegrannt; Blbltrplatte bartlos; 4; 7 bis 8; Sa., K. S., Th., Bö., Bay., Kr., Ty.

—. X., 2; Nelkenblütler: D. deltoīdes L.; ſ. Nr. 1111.

—. X., 3; „ Silēne otītes Sm.; ſ. Nr. 461.

—. „ „ S. nutans L.; ſ. Nr. 1112.

—. „ „ Melandrĭum pratēnse Roehl.; ſ. Nr. 1113.

—. X., 3; Nelkenblütler: Stellarĭa nemŏrum L.; ſ. Nr. 387.

—. X., 5; „ Lychnis flos cucŭli L.; ſ. Nr. 462.

—. „ „ Cerastĭum vulgātum L. spec.; ſ. Nr. 463.

—. XI., 2; Roſenpfl.: Agrimonĭa eupatorĭa L.; ſ. Nr. 1114.

—. „ „ A. procēra Wallr.; ſ. Nr. 1115.

—. XII., 3; „ Potentĭlla argentĕa L.; ſ. Nr. 464.

—. „ „ P. chrysāntha Trev.; ſ. Nr. 1116.

—. „ „ Rubus idaeus L.; ſ. Nr. 396.

—. „ „ R. fruticōsus L.; ſ. Nr. 1119.

—. „ „ R. caesĭus L.; ſ. Nr. 443.

—. „ „ Rosa arvēnsis L.; ſ. Nr. 1020.

—. XIII., 1; Sonnenröslein: Helianthĕmum vulgāre Gaertn.; ſ. Nr. 1120.

—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Clemătis recta L.; ſ. Nr. 1121.

—. „ „ Ranuncŭlus bulbōsus L.; ſ. Nr. 465.

2087. XIV., 1; Lippenblümler: Origănum vulgāre L. Gemeiner Doſt (Wohlgemut, Dorant, Müllerkraut, wilder Meiran). Bltr. eif., ſpitz, faſt kahl; K. 5zähn.; Bl. purpurrot oder weiß; 4; 7 bis 8; Z.

Varirt: O. obtusifolĭum Kitt. hb. (Bltr. ſtumpf, faſt ganzrand.; Doldentraube lockerer), O. compăctum (Bltr. faſt ſitz.), O. umbrōsum (Blattſt. faſt von halber Blattlänge), O. lanuginōsum Kitt. hb. (Bltr. an der Baſis herzf., ſtumpf, wogig-gezähnt, zottig; Deckbltr. filzig).

2088. XIV., 1; Lippenblümler: Thymus serpyllum L. Feld-

Timian (Feldquendel). St. niederliegend; Bltr. lineal. oder rundl.-ellipt., flach; Blütenquirle kopf. oder traubig; Oberl. der Kr. ausgerand., eif., faſt 4eck.; ♄; 7 bis 9; ⅄.

Varirt: Th. commūnis (Th. serpyll. L. flor. suec.; St. und Aeſte ringsum weichharig; Bltr. faſt ſitz., langgewimp.), Th. angustifolĭus Schreb. (St. und Aeſte weichharig; Bltr. verk.-lineallängl., an der Baſis langgewimp.; Stbgf. meiſt vorragend), Th. glabrātus Wimm. (weichharig; Bltr. verk.-eif., kahl; K. kahl; Form höherer Gebirge), Th. simplex (St. meiſt einfach, weichharig; Bltr. eif., kahl; Raſenplatzform), Th. diffūsus K. hb. (Bltr. eif. bis rundl.-eif., kahl; Marsfeld bei München), Th. chamaedrys Fr. (St. ſcharf-4kant., auf den Kanten weichharig; Blattſt. kurz, gewimp.: Th. sylvēstris Schreb., oder lang, umgewimp.: Th. citriodōrus Schreb.), Th. lanuginōsus Schk. (St. wollig; Bltr. verk.-eif.; Form ſonniger, waldiger Hügel), Th. montānus W. et K. (St. auf den 4 Kanten weichharig; Bltr. eif., beiderſ. etwas ſpitzl., kahl; K. kahl, mit zalr. Oeldrüſen; Mä., Oe.), Th. pannonĭcus All. (St. walzenf., rauhharig; Bltr. lineal. oder ellipt.; K. rauhharig; ſüdl. Kalkform von Th. angustifolĭus; Ty., Oe., Mä., Bö.).

2089. XIV., 1; Lippenblümler: Nepĕta nuda L. Nacktes Katzenkraut (Katzenminze). Bltr. längl., beiderſ. kahl; Kelchzähne lineal., ſpitzl.; Bl. weiß; Nüſſe knotig, rauh, an der Spitze behart; 2; 7; Schl., Th., Harz, Bö., Mä., Oe., Kr.

Varirt: N. nuda Jacq. (Bl. klein, weiß), N. pannonĭca Jacq. (Bl. größer, blau bis blaßviolet, Unterl. gefleckt).

—. XIV., 1; Lippenblümler: Lamĭum album L.; ſ. Nr. 169.

—. " " Phlomĭtis tuberōsa Rchb.; ſſ. Nr. 1122.

2090. XIV., 1; Lippenblümler: Teucrĭum scorodonĭa L. Salbeiblättriger Gamander. Bltr. herz-eif., oft herzf.-längl., gekerbt-geſägt, runzelig; Traube end- und blattachſelſt.; K. 2lipp., Oberl. ungetheilt, Unterl. 4zähn.; Bl. grünlichweiß; 2; 7 bis 8; Weſtdeutſchl.

—. XIV., 2; Rachenblümler: Melampўrum cristātum L.; ſ. Nr. 1123.

2091. XIV., 2; Rachenblümler: M. nemorōsum L. (M. nemŏrum L.). Blauer-Wachtelweizen (Hain-W., Johannisblume, Tauben- oder Hundsweizen, Brand, Tag und Nacht). Deckbltr. herzf.-lanzettl., gezähnt, oberſte ſchopfig; K. rauh-

harig; Blkr. goldgelb, Röhre roſtbraun; Deckblr. meiſt azurblau; ⊙; 7.

—. XIV., 2; Rachenblümler: M. pratēnse L.; ſ. Nr. 2066.

—. XV., 2: Kreuzblütler: Turrītis glabra L.: ſ. Nr. 466.

2092. XVI., 5; Pappelroſenpfl.: Lavatēra thuringiăca L. (Malva thuring. Vis.). Thüringenſche Lavatere (ungariſcher Eibiſch). St. aufr., ſternharig-filz.; untere Blr. eckig-gelappt, obere 3lapp.; Bl. blaßroſa; 2; 7 bis 8; Sa., Th., Schl., Bö., Mä., Oe.

—. XVII., 3; Bitterling: Polygăla vulgāris L.; ſ. Nr. 467.

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Genīsta tinctorĭa L.; ſ. Nr. 1124.

—. „ „ G. germanĭca L.; ſ. Nr. 437.

—. „ „ Cytīsus sagittālis Koch; ſ. Nr. 445.

—. „ „ Medicāgo lupulīna L.; ſ. Nr. 468.

—. „ „ Trifolĭum hybrĭdum L.; ſ. Nr. 469.

—. „ „ T. agrarĭum L.; ſ. Nr. 1084.

—. „ „ Astragălus glycyphyllos L.; ſ. Nr. 1035.

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Ervum tetraspērmum L.; ſ. Nr. 1125.

2093. „ „ Lathyrus platyphyllus Retz. (L. intermedĭus Wallr.). Flachblättrige Platterbſe. Blr. 1parig; Flügel der Blattſt. faſt eben ſo breit, als die des Stengels; Bl. roſenrot, Flügel an der Spitze violet, Schiffchen ſchmutziggelb; 2; 7 bis 8.

—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperīcum hirsūtum L.; ſ. Nr. 2070.

—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum pilosēlla L.; ſ. Nr. 1181.

—. „ „ H. murōrum L.; ſ. Nr. 447.

2094. „ „ H. rigĭdum Hartm. (H. affine Tausch, H. laevigātum Willd.). Starres Habichtskraut. St. ſteif, oberw. äſtig; Blr. eilanzettl. bis lineal.-lanzettl., obere ſitz.; Blchn. des Hauptkelchs bleichrandig, getrocknet nicht ſchwärzlich werdend; Bl. gelb; 2; 7 bis 8.

2095. XIX., 1; Korbblütler: H. umbellātum L. Doldiges H. St. ſteif, oberw. äſtig, oberſte Aeſte faſt doldig; Blr. lanzettl. oder lineal., gezähnt, ſelten ganzrand., obere faſt ſitz.; Blchn. des Hauptk. faſt kahl, etwas ſpitz, an der Spitze zurückgekr., die innerſten breiter, ganz ſtumpf; 2; 7 bis 9.

Varirt: a. kahle Formen: polyanthĕmum Froel. (Aeſte mehrköpf.), monocephălum (1köpf.), integrifolĭum Froel. (Blr. entfernt-ſchwach-gezähnt), coronopifolĭum Bernh. (Blr. ſchmal-lineal., faſt fiederſpalt.-gezähnt), carpathĭcum Roch. (Blr. lineal., ſehr lang, gezähnt, wogig), lepto-

caulon Wallr. (St. schwach, an der Basis niederliegend), racemōsum W. K. (Bltr. lanzettl., gezähnelt, gewimp., unters. 3nervig; Blütenstand traubig; Alpenform); b. scharfe, rauhharige Formen: linearifolĭum Froel. (St. nebst den schmallineal. Bltrn. lang-rauhharig), serotīnum Host (Bltr. breit-lanzettl., spitz-gezähnt, nebst dem St. rauhharig), lanceolātum Vill. (Bltr. eilanzettl., in der Mitte gezähnelt, unters. blaugrün, untere gestielt; Süddeutschl.).

2096. XIX., 1; Korbblütler: Chondrīlla juncĕa L. (Hieracĭum juncĕum Bh.). Binsenartiger Krümling (Knorpelsalat, Sonnenwirbel, gelber Wegwart). Untere Bltr. schrotsägef., obere lineal-lanzettl.; Aeste rutenf.; Achänen 5zähn.; Bl. meist goldgelb; 4; 7 bis 9; ×.

Varirt: Ch. rigens Rchb. (Ch. latifolĭa Koch; grundst. Bltr. strichelharig, stengelst. lanzettl., etwas gewimp.), Ch. acanthophўlla Borkh. (Aeste weiter abstehend.; Bl. beiderseits goldgelb; Stbltr. borstig-gewimp.), Ch. glabra Kitt. (Stgl-bltr. kahl; Stralbl. safrangelb).

—. XIX., 1; Korbblütler: Hypochoeris radicāta L.; s. Nr. 1126.

—. „ „ Scorzonēra purpurĕa L.; s. Nr. 1127.

—. „ „ Lampsăna communis L.; s. Nr. 1128.

2097. „ „ Cirsĭum acaule All. (Cardŭus acaulis L.). Stengellose Kratzdistel (Wegdistel). St. fehlend oder sehr kurz; Bltr. kahl, lanzettl.-buchtig-fiederspalt., Zipf. eif., fast 3spalt., dornig-gewimp.; Blütenköpfchen 1 oder zu 2 bis 3 auf der Wrz. sitz.; Bl. rot, selten weiß; 4; 7 bis 9.

Varirt: caulēscens Pers. (Cnicus dubĭus Willd.; St. hand- bis fußhoch, ganz beblättert).

2098. XIX., 1; Korbblütler: C. setōsum M. B. Borstige K. Bltr. sämmtlich flach, ganzrand. oder etwas gezähnt; Hüllbltchn. schmutzig-rötlich, etwas graufilz.; Bl. lila oder weiß; 4; 7 bis 8; Schl., Bö., Mä., Oe.

2099. XIX., 1; Korbblütler: Cardŭus crīspus L. Krause Distel (Wolfsdistel). Bltr. unters. wollig-filz.; Köpfchen gehäuft; Blütenst. kurz, dornig; Bl. purpurn; Fr. längsstreif., auf den Streifen quer-gefältelt; ♂; 7 bis 8; ×.

—. XIX., 2; Korbblütler: Senecĭo sylvatĭcus L.; s. Nr. 1080.

2100. „ „ S. erucaefolĭus Huds. (L.; S. tenuifolĭus Jacq. et Sm.). Raukenblättriger Baldgreis. Wrz. kriech.; Bltr. fiederspalt., Fiedern lineal., gezähnt und fiederspalt., an der Basis mit kleinen, ganzrand. Aehrchen; Achänen sämmtl. mit gleichf. Federkelch; Bl. blaßgelb; Pfl. grauharig; 4; 7 bis 8.

Varirt: S. tenuifolĭus Jacp. (Fiederlappen der oberen Stbltr. an der Spitze 2spalt., sonst kaum gezähnt, schmallineal., kurz-zugesp.)., S. anthoraefolĭus Presl. (Fiederlappen lineal, spitz, 3spalt., sperrig; Deckbltchn. angedr.), S. napifolĭus Schrad. (Fiederlappen fiederspalt., eingeschn., auch gezähnt, langgesp.).

—. XIX., 2; Korbblütler: Pyrĕthrum corymbōsum Willd. s. Nr. 1129.

—. XIX., 2; Korbblütler: Leucanthĕmum vulgāre Lmk.; s. Nr. 1130.

2101. XIX., 2; Korbblütler: Achillēa millefolĭum L. Schafgarbe (Grensing, Releke, Tausendblatt, Schafrippe, Feldgarbe, Rippel-, Garben- oder Sichelkraut, Gotteshand, Neunkraft, Lämmerschwanz, Fasanenkraut, Margareten- oder Hergottsrückenkraut, Jungfernaugenbraunen). Stbltr. dopp.-fiederspalt., Fiederchen 2- bis 3spalt., auch gefied.-5spalt.; Bl. weiß oder rot; 4; 7 bis 10; ×; ☼.

Varirt: A. setacĕa W. et K. (Bergform; stark-zottig; Blattzipf. lineal., langzugesp.), A. lanāta Koch (St., Bltr. und Ebenstrauß wollig-zott.), A. alpēstris W. et Gr. (Bltchn. des Hauptk. schwarzrand.).

—. XIX., 2; Korbblütler: Solidāgo virga-aurĕa L.; s. Nr. 2077.

—. „ „ Bellis perēnnis L.; s. Nr. 2.

—. XIX., 3; „ Centaurēa scabiōsa L.; s. Nr. 1131.

—. XXI., 1; Giftmilcher: Euphorbĭa salicifolĭa Host; s. Nr. 473.

—. XXI., 1; Giftmilcher: E. virgāta W. et K.; s. Nr. 474.

—. XXI., 4; Nesselpfl.: Urtīca urens L.; s. Nr. 1234.

2102. „ „ U. dioĭca L. Gemeine Brennessel (große Br., zweihäusige N.). Rispe länger, als der Blattst.; Bl. 2häus.; Wrz. kriech.; je 2 Rispen blattachselst.; 4; 7 bis 8; ×.*)

2103. XXII., 5; Nesselpfl.: Humŭlus lupŭlus L. Gemeiner Hopfen (Strobili). St. windend; Bltr. 3- bis 5lapp., an der Basis herzf.; Bl. 2häusig; 4; 7 bis 8; ♀; ♂; ☼; †.**)

*) Ein Bastard zwischen U. dioica L. und U. urens L. ist die in Steiermark bei Weichselstätten aufgefundene U. oblongata Koch.

**) Plinius nannte den Hopfen Lupus salictarius. Der Hopfen als Bierwürze soll erst während der Kreuzzüge, nach Linné im Gefolge der Gothen, eingeführt worden sein. Im 14. Jahrh. war der Hopfenbau schon sehr weit in Deutschland verbreitet und blühte im 15. und 16. Jahrh. vorzüglich in Bayern und Böhmen. Das Wort Hopfen soll von Haupt oder vom altdeutschen Hop (Schopf) abstammen. Das Wort Humle wird zuerst in den Hauskuren der hl. Hildegardis († 1180) erwähnt.

b. In ſchattigen Wäldern:

—. II., 1; Nachtkerzenpfl.: Circaea alpīna L.; ſ. Nr. 1062.
—. III., 1; Schwertelpfl.: Gladiŏlus palūstris Gaud.; ſ. Nr. 368.
—. III., 2; Graspfl.: Bromus asper Murr.; ſ. Nr. 1063.
—. „ „ Tritĭcum canīnum L.; ſ. Nr. 1047.
—. V., 3; Terebintenpfl.: *Rhus toxicodēndron L.; ſ. Nr. 1064.
—. VI., 1; Semede: Luzŭla albĭda Desv.; ſ. Nr. 1065.
—. VI., 3; Knöterichpfl.: Rumex conglomerātus Murr.; ſ. Nr. 1052.
—. VI., 3; Knöterichpfl.: R. sanguinĕus L.; ſ. Nr. 1014.
2104. „ „ R. obtusifolĭus L. Stumpfblättriger Ampfer (Grindwurz). Untere Bltr. herz-eif., ſtumpf, mittl. herzf.-längl., ſpitz, obere lanzettl.; Blütenquirle blattlos; innere Zipf. der Fruchthülle eif., 3eck., am Grunde mit pfrieml. Zähnen; 4; 7 bis 8; früher 5. Varirt: R. sylvēstris Wallr. (kahl).
—. VII., 1; Schlüſſelblümler: Trientālis europaea L.; ſ. Nr. 383.
—. X., 1; Heidepfl.: Chimaphīla umbellāta Nutt.; ſ. Nr. 1066.
—. „ „ Pyrŏla medĭa Sw.; ſ. Nr. 1067.
—. XII., 3; Roſenpfl.: Potentīlla reptans L.; ſ. Nr. 1301.
—. „ „ Tormentīlla reptans L.; ſ. Nr. 1068.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Scrophulārĭa nodōsa L.; ſ. Nr. 1069.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Cardamīne impatĭens L.; ſ. Nr. 421.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum sylvatĭcum L.; ſ. Nr. 422.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Vicĭa dumetōrum L.; ſ. Nr. 1070.
—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperīcum montānum L.; ſ. Nr. 1037.
—. XX., 1; Orchidee: Neottĭa nidus avis Rich.; ſ. Nr. 1071.
2105. „ „ Epipogĭum gmelīni Rich. (E. aphўllum Bl. et Fing., Orchis aphўlla Schmidt, Satyrĭum epip. L.). Blattloſer Aufbart (Widerbart). Blattlos; St. mit ſcheidigen Schuppen; Traube armblüt.; Bl. hängend, gelbl.; Sporn fleiſchrot; Pfl. farblos; 4; 7 bis 8; Bö., Schl., Harz, Ha., Br., Th., W., Rh., Brd., Po., Pr. u. ſ. w., jedoch ſelten.

c. In lichten Wäldern:

2106. II., 1; Lippenblümler: Salvĭa glutinōsa L. Klebriger Salbei. St. oberw. drüſig-zott., klebrig; Bltr. herz-ſpießf., obere lang-zugeſp.; Bl. gelb, braun-punkt.; 4; 7 bis 9.

—. IV., 1; Krapppfl.: Galium boreale L.; ſ. Nr. 2081.
2107. V., 1; Rachenblümler: Verbascum thapsus L. (V. schradēri G. Mey.). Schrader's Königskerze (Wollkraut, Oſter-, Bären- oder Fackelkraut, Himmels-, Johannis- oder Oſterkerze, Himmelsbrand, Katzenpfote, Königsbrand, Unholdenkerze). Bltr. von Blatt zu Blatt laufend; Stbf. weißwollig, die beiden längeren kahl, 4mal länger als ihr Staubb.; Bl. gelb; ♂; 7 bis 9; ↕; ⅄.
—. V., 1; Borretſchpfl.: Myosōtis versicŏlor Rchb.; ſ. Nr. 440.
—. „ Glockenblümler: Campanŭla persicifolĭa L.; ſ. Nr. 1072.
—. V., 2; Doldenpfl.: Torĭlis anthrīscus Gärtn.; ſ. Nr. 1073.
—. VI., 3; Knöterichpfl.: Rumex acetōsa L.; ſ. Nr. 1074.
—. VIII., 1; Heidepfl.: Callūna vulgāris Salisb.; ſ. Nr. 1075.
—. „ Nachtkerzenpfl.: Epilobĭum angustifolĭum L.; ſ. Nr. 2085.
—. X., 1; Heidepfl.: Pyrŏla minor L.; ſ. Nr. 1076.
—. „ „ P. rotundifolĭa L.; ſ. Nr. 1015.
—. XII., 3; Roſenpfl.: Geum urbānum L.; ſ. Nr. 1077.
—. „ „ Rubus idaeus L.; ſ. Nr. 396.
—. „ „ R. corylifolĭus Sm.; ſ. Nr. 1078.
—. „ „ R. caesĭus L.; ſ. Nr. 443.
2108. XIV., 1; Lippenblümler: Melissa clinopodĭum Benth. (Clinopodĭum vulgāre L., Calamīntha clinopod. Spenn.). Gemeiner Wirbeldoſt (Wirbel- oder Weichborſt). St. aufr., zott.; Bltr. eif.; Quirle reichblüt.; Bl. purpurn, bis roſenrot; 2↓; 7 bis 9.*)
2109. XIV., 1; Lippenblümler: Galeōpsis pubēscens Bess. (G. walterīna Schldl.). Weichhariger Daun. St. mit aufr.-abſteh. Aeſten und abwärts-angedr., weichen Haren, unter den Gelenken ſteifharig, ſchwach angeſchwollen; Bltr. breit-eif., zugeſp., untere faſt herzf.; Bl. purpurrot, Röhre weißl, oberw. bräunlichgelb; ☉; 7 bis 9.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Cytĭsus sagittālis Koch; ſ. Nr. 445.
—. „ „ Lathyrus pisiformis L.; ſ. Nr. 1099.
2110. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum sabīnum Seb. et Muram. Oelgrünes Habichtskraut. Grasgrün; Bltr. verk.-eif. oder lanzettl., ſpitz, die äußerſten ſtumpf, unterſ. graufilz.; Doldentraube gelappt, dicht, ſteif-äſtig; Köpfchen walzenf.; innere Hüllbltchn. langzugeſp.; Bl. gelb; 2↓; 7; Süddeutſchl.

*) Die Blätter dieſer Pflanze geben einen, mit dem chineſiſchen in Feinheit des Geruchs und Geſchmacks wetteifernden Thee!

—. XIX., 1: Korbblütler: H. murōrum L.; ſ. Nr. 447.
—. „ „ H. rigĭdum Hoffm.; ſ. Nr. 2094.
2111. „ „ Hypochoeris maculāta L. (Achyrophŏrus maculātus Scop.). Gefleckte Ferkelkraut (Hachelkopf, Saukraut). St. 1- bis 3köpf., meiſt 1blättr., rauhharig; Blthn. des Hauptkelchs ganzrand.; Bl. gelb; grundſt. Bltr. oft braungefleckt; 4; 7 bis 8.
—. XIX., 1; Korbblütler: Leontŏdon vulgāris Kitt.; ſ. Nr. 1079.
—. XIX., 2; „ Senecĭo sylvatĭcus L.; ſ. Nr. 1080.

d. In feuchten Wäldern:

—. II., 1; Rachenblümler: Veronĭca serpyllifolĭa L.; ſ. Nr. 424.
—. II., 1; Nachtkerzenpfl.: Circaea alpīna L.; ſ. Nr. 1062.
—. III., 1; Schwertelpfl.: Gladiŏlus imbricātus L.; ſ. Nr. 1045.
—. III., 2; Graspfl.: Festūca sylvatĭca Vill.; ſ. Nr. 1164.
—. „ „ F. drymeïa M. et K.; ſ. Nr. 1165.
—. „ „ Poa sudetĭca Haenke; ſ. Nr. 1046.
2112. „ „ Molinĭa coerulĕa Mnch. (Aira coerul. L. sp. pl., Melĭca coer. L. mant., Mol. variabĭlis Wib., Enodĭum caerulĕum Gaud.). Blaue Molinie (Blaugras, Pfeifengras). Halm ſteif-aufr., an der Baſis mit 1 bis 2 Knoten; Riſpe etwas zſgezogen; unteres Blütenſcheidchen 3nervig, unbegrannt; 4; 7 bis 9.
—. III., 2; Graspfl.: Tritĭcum canīnum L.; ſ. Nr. 1047.
—. IV., 1; Roſenpfl.: Alchemīlla vulgāris L.; ſ. Nr. 416.
—. V., 1; Schlüſſelblümler: Lysimachĭa nummularĭa L.; ſ. Nr. 1008.
—. V., 1; Schlüſſelblümler: L. nemŏrum L.; ſ. Nr. 1048.
—. „ Glockenblümler: Phyteuma spicātum L.; ſ. Nr. 1049.
2113. „ „ Wahlenbergĭa hederacĕa Rchb. (Campanŭla heder. L.). Efeublättrige Wahlenbergie. St. fadenf., äſtig, liegend; Bltr. herzf.-rundl., eckig-5lapp., geſtielt; Bl. einzeln, langgeſtielt, hellblau; 4; 7 bis 8; Dl., Rh., Spaa, Pfalz.
—. V., 1; Veilchenpfl.: Viŏla persicifolĭa Schk.; ſ. Nr. 426.
2114. „ Schnabelpfl.: Impatĭens noli tangĕre L. Gemeines Springkraut (wilde Balſamine, Rührmichnichtan, Ungeduld, Kapuzinerzipfel, Judenhütlein, Wolfskraut, Hirſchmelde). St. ſaftig, an den Gelenken geſchwollen; Blütenſt. 3- bis 4blüt.; Bl. hängend, zitrongelb; Sporn mit hakenf. Spitze; ☉; 7 bis 8.
2115. V., 2; Doldenpfl.: Angelĭca sylvēstris L. (Selīnum sylvēstre Crtz.). Gemeine Waldwurz (Waldangelika,

Waldbruſtwurz, wilde Engelwurz). St. gefurcht; Bltr. 3-fach-gefied.; Blattſt. kant.; Blattſch. ſehr groß, bauchig; Bl. weiß; ♂ bis 4; 7 bis 9.

Varirt: A. montāna Schleich. (Fiederbltchn. herablaufend), A. nidus Kitt. hb. (Hüllchen breit, von dopp. Döldchenlänge).

2116. VI., 1; Semede: Juncus acutiflōrus Ehrh. (J. sylvatĭcus Reich., J. subnodulōsus Schrk.). Spitzkelchige Seme (Waldbinſe, Hirſchgras). Blütenhüllbltr. zugeſp.-begrannt, innere länger, an der Spitze zurückgebogen, alle kürzer als die eif., zugeſp.-geſchnäbelte Kapſ.; 4; 7 bis 8.

—. VI., 1; Semede: J. uliginōsus Roth; ſ. Nr. 1050.

—. „ Lilienpfl.: Lilĭum bulbifĕrum L.; ſ. Nr. 1051.

—. VI., 3; Knöterichpfl.: Rumex conglomerātus Murr.; ſ. Nr. 1052.

2117. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygŏnum hydropīper L. Waſſerpfeffer (ſcharfer Knöterich, Heidewegtritt, Waſſerblut, Flohknöterich, Pfauenkrautſpiegel, Haden, Heidel, Schmerzen). Bltr. lanzettl.; Tuten lang- oder kurz-gewimp.; Bl. drüſig-punkt., grün oder rötl.; ☉; 7 bis 9; †.

Varirt: P. vulgāris (Rhizom ſchief; Tuten faſt kahl, kurz-ſteif-gewimp.; K. drüſig-ſcharf), P. mite Schrk. (P. laxiflōrum Weihe, P. dubĭum Stein, P. braunĭi Bl. et Fing.; Tuten rauhharig, lang-gewimp.; Bl. drüſenlos).

2118. VIII., 1; Knöterichpfl.: P. minus Huds. (P. persicarĭa b. angustifolĭum L., P. pusillum Lam., P. strictum All.). Kleiner Knöterich. Bltr. aus abgerund. Baſis faſt gleich-breit, vorn allmälg-verſchmäl.; Tuten lang-gewimp.; Bl. purpurn oder weiß; ☉; 7 bis 10.*)

—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: Epilobĭum hirsūtum L.; ſ. Nr. 1053.

2119. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: E. parviflōrum Schreb. (E. hirsūtum var. b. L., E. pubēscens Roth, E. molle Lam., Chamaenerĭon parvifl. Schreb.). Kleinblütiger Schotenweiderich. St. zott. oder weichharig; Bltr. ſitz., nicht umfaſſ. und herablaufend; Bl. hellviolet; 4; 7 bis 8.

2120. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: E. montānum L. Berg-Sch. Bltr. eif.-lanzettl., ungleich-gezähnt-geſägt, untere kurz-ge-

*) Es ſcheint dieſe Pflanze blos magere Waldform von P. hydropiper L. zu ſein, zwiſchen welcher und dieſer P. mite Schrk. und P. laxiflorum Weihe die Uebergänge bilden!

ſtielt; Blütenſt. vor der Bl. nickend, nachher aufr.; Bl. roſenrot oder weiß; 4; 7 bis 8.

Varirt: E. collīnum Gmel. (Bltr. eif., geſtielt, zuweilen wechſelſt.), E. lanceolātum Seb. et Maur. (Bltr. längl.-lanzettl.), E. durieui Gay (St. ligend, wurzelnd; Kelchlappen ſpitz), E. hypericifolīum Tausch (Bltr. klein, ganzrand.).

2121. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: E. virgātum Fr. summ. veg. (E. chodorrhīzum Fr.). Rutenförmiger Sch. St. unten geſtreift-kant., daſelbſt mit 2 erhab. Linien; Bltr. lanzettl.; Bl. rot; 4; 7 bis 8; Norddeutſchl.

—. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus supērbus L.; ſ. Nr. 1016.

—. X., 3; „ Melandrĭum sylvēstre Roehl.; ſ. Nr. 428.

—. X., 3; Nelkenblütler: Stellarĭa glauca With.; ſ. Nr. 1054.

—. XII., 2; Roſenpfl.: Spiraea ulmarĭa L.; ſ. Nr. 1055.

2122. XIV., 1; Lippenblümler: Scutellarĭa galericulāta L. Gemeines Helmkraut (Schildträger, Schild- oder Fieberkraut). Bltr. entfernt-gekerbt-geſägt; K. kahl oder rauhharig; Bl. kornblau, außen behart; 4; 7 bis 8.

2123. XIV., 1; Lippenblümler: Sc. hastifolĭa L. Spontonblättriges H. Bltr. an der Baſis beiderſ. 1- bis 2zähn.; K. drüſig-weichharig; Bl. außen drüſenharig, veilchenblau; 4; 7 bis 8.

2124. XIV., 1; Lippenblümler: Galeōpsis versicŏlor Curtis (G. cannabĭna Roth, G. tetrăhit b. L.). Bunter Daun (Hanfneſſel). Bltr. längl.-eif., zugeſp.; Kronröhre von dopp. Kelchlänge; Bl. groß, gelb; Mittellappen der Unterl. ſtumpf-4kant., vorn abgerundet; ☉; 7 bis 8; ✕.

—. XIV., 2; Rachenblümler: Pediculāris sceptrum carolīnum L.; ſ. Nr. 1056.

2125. XIV., 2; Rachenblümler: P. comōsa L. Schopfblütiges Läuſekraut. K. 5ſpalt., die breiten Lappen ganzrand., auf den Kanten weichharig; Helm 2zähn.; Wrz. roſenkranzförmig; Bl. ſchwefelgelb; 4; 7; †; Ty., Kr.*)

—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum palūstre L.; ſ. Nr. 1057.

—. „ G. robertiānum L.; ſ. Nr. 431.

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolĭum spadicĕum L.; ſ. Nr. 1058.

—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperĭcum montānum L.; ſ. Nr. 1037.

—. XIX., 1; Korbblütler: Cirsĭum palūstre Scop.; ſ. Nr. 1059.

*) Eine rieſige Form iſt P. friederici augusti Tomm. mit Kelchlappen, die länger, als breit ſind!

2126. XIX., 2; Korbblütler: Senecĭo doria L. Hoher Baldgreis. Wrz. äſtig; St. kahl; Bltr. dicklich, kahl, meergrün, ſtengelſt. ſitz., halb-umfaſſ., faſt etwas herablauf.; Hülle kreiſelf.; Deckbltchn. nebſt den Hüllbltchn. weichharig; Bl. goldgelb; Fr. faſt kahl; 2; 7 bis 8; Oe., Franken.
—. XX., 1; Orchidee: Spiranthes aestivālis Rich.; ſ. Nr. 1060.
—. „ „ Listēra ovāta R. Br.; ſ. Nr. 1061.
—. XXI., 1; Aronpfl.: Arum maculātum L.; ſ. Nr. 423.

e. An feuchten, ſchattigen Stellen:

—. II., 1; Nachtkerzenpfl.: Circaea alpīna L.; ſ. Nr. 1062.
2127. „ „ C. lutetiāna L. (C. vulgāris Mnch.). Gemeines Hexenkraut (St. Stefanskraut). St. aufr.; Bltr. eif., mit herzf. Baſis; Fruchtk. 2fächr.; Fr. verk.-eif.; Bl. rötl., dann weiß; 2; 7 bis 8; ♯.

f. An ſandigen, naſſen Waldſtellen:

—. V., 1; Schlüſſelblümler: Lysimachĭa nemŏrum L.; ſ. Nr. 1048.

g. In ſumpfigen Waldungen:

—. X., 3; Nelkenblütler: Stellarĭa nemŏrum L.; ſ. Nr. 387.
2128. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperīcum tetraptĕrum Fr. (H. quadrangulāre Sm. und faſt aller Aut.). Vierflügeliges Hartheu. St. aufr., geflüg.-4kant.; Bltr. eif., dichtdurchſcheinend-punkt.; Kbltr. lanzettl., zugeſp., etwa von Fruchtknotenlänge; Bl. gelb; 2; 7 bis 8.*)
—. XIX., 1; Korbblütler: Crepis paludōsa Mnch.; ſ. Nr. 1081.

h. Auf Morboden:

—. XIV., 2; Rachenblümler: Pediculāris sceptrum carolīnum L.; ſ. Nr. 1056.
—. XX., 1; Orchidee: Malāxis monophȳllos Sw.; ſ. Nr. 1142.

i. An Gräben:

2129. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: Epilobĭum roseum Schr. (Retz.; Chamaenerĭon ros. Schreb.). Roſenroter Schotenweiderich (Weidenröschen). St. ſehr äſtig, reichblüt., 2- oder 4liniig; Bltr. zieml. lang-geſtielt, längl., an beiden Enden ſpitz; Bl. klein, blaßroſenrot; 2; 7 bis 8.

*) Dieſe Pflanze iſt das ächte H. quadrangulum L.: caule quadrato, calycibus subulatis; Linné aber vermiſchte das H. dubium Leers, welcher beide Arten ſchon längſt vortrefflich unterſchieden hat, damit, wenn er zuerſt in der observ. ſagt: caulis obsolete quadratus, dann aber hinzuſetzt: foliola calycis subulata. (Kitt., pag. 906.)

k. An Bächen:

2130. V., 2; Doldenpfl.: Chaerophyllum hirsūtum L. (Myrrhis hirsūta All.). Rauhhariger Kälberkropf (Roßkümmel). Bltr. dopp.-3zäl.; Bltchn. 2- bis 3- oder fiederspalt.; Krbltr. gewimp., weiß; Griff. aufr.-absteh., viel länger als die Scheibe; Fruchtsäulchen nur an der Spitze 2spalt.; 4; 7 bis 8.

l. Zwischen Moos:

—. X., 1; Heidepfl.: Monēses uniflōra Rchb.; s. Nr. 1175.

m. In trocknen Wäldern:

—. XII., 3; Rosenpfl.: Potentilla rupēstris L.; s. Nr. 434.
—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Trifolium alpēstre L.; s. Nr. 1083.
—. „ „ T. montānum L.; s. Nr. 485.
—. „ „ T. agrarium L.; s. Nr. 1084.
—. „ „ Ervum cassubicum Peterm.; s. Nr. 1085.
—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Lathyrus niger Wimm.; s. Nr. 1086.
—. XX., 1; Orchidee: Cephalanthēra rubra Rich.; s. Nr. 1087.

n. Auf trocknen Waldplätzen:

2131. V., 1; Rachenblümler: Verbascum phoenicēum L. Violetes Wollkraut (Königskerze, Kerze ohne Licht). Untere Bltr. rosettenf., gestielt, eif. oder längl., gekerbt; Blütenst. viel länger, als die Deckblr.; Bl. dunkelviolet, selten weiß; ♂ bis 4; 7 bis 8; ‡.

o. Auf sonnigen, trocknen Waldstellen:

—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Trifolium lupināster L.; s. Nr. 1098.

p. Auf sandigen Stellen in lichten Waldungen:

—. V., 1; Glockenblümler: Jasiōne perēnnis Lmk.; s. Nr. 1096.

q. An steinigen Stellen in lichten Waldungen:

—. XII., 3; Rosenpfl.: Potentilla recta L.; s. Nr. 439.
—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Cytisus nigricans L.; s. Nr. 1092.

r. In sandigen Wäldern:

—. V., 5; Leinpfl.: Linum perēnne L.; s. Nr. 1094.
—. X., 3; Nelkenblütler: Arenaria graminifolia Schrad.; s. Nr. 1095.

s. In sandigen, lichten Wäldern:

—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Genista germanica L.; s. Nr. 437.

t. In sonnigen Wäldern:

—. III., 2; Graspfl.: Aira flexuōsa Schrk.; s. Nr. 1097.

2132. V., 2; Doldenpfl.: Peucedănum cervarĭa Cuss. (Athamāntha cervar. L., Selīnum cervar. Crtz.). Starrer Harſtrang (Hirſchauge, -kraut, -morelle, -peterſilie, Augenwurz, Bergpeterſilie). Bltr. 3fach-gefied., Bltchn. meergrün, eif., faſt dornig-geſägt; Hülle zurückgebog.; Bl. weiß, auch rötl.; ♃; 7 bis 9; ☰.

u. In trocknen, ſteinigen Waldungen:

—. X., 3; Nelkenblütler: Silēne nemorālis W. et K.; ſ. Nr. 1088.

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Cytĭsus austriăcus L.; ſ. Nr. 1093.

—. " " Trifolĭum alpēstre L.; ſ. Nr. 1083.

—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperīcum pulchrum L.; ſ. Nr. 1089.

v. In ſteinigen Waldgegenden:

—. VI., 1; Lilienpfl.: Antherĭcum ramōsum L.; ſ. Nr. 1090.

—. XIV., 2; Rachenblümler: Anitrrhīnum majus L.; ſ. Nr. 1091.

w. In ſteinigen, rauhen Wäldern:

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Cytĭsus austriăcus L.; ſ. Nr. 1093.

x. An Meilerſtellen:

—. V., 1; Schnabelpfl.: Impatĭens noli tangĕre L.; ſ. Nr. 2114.

—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: Epilobĭum angustifolĭum L.; ſ. Nr. 2085.

z. Auf Waldblößen:

—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: Epilobĭum angustifolĭum L.; ſ. Nr. 2085.

2133. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus armerĭa L. Rauhe Nelke. St. und Bltr. weichharig; Blattſch. von Blattbreitenlänge; Kelchſchuppen krautig, rauhharig; Bl. rot, punkt.; ♂; 7 bis 8.

a¹. In Waldſchluchten:

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Lathўrus pisifōrmis L.; ſ. Nr. 1099.

b¹. Auf feuchten Waldäckern:

2134. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperīcum humifūsum L. Niederliegendes Hartheu. St. niederlig., fadenf., faſt 2kant.; Kelchbltr. längl., ſtumpf, kurz-ſtachelſp., ganzrand., oft mit einigen feinen Zähnen, von dopp. Fruchtknotenlänge; Bl. gelb; ☉ und ♂; 7 bis 9.

Varirt: glandulōsum Wallr. (Kelchbltr. am Rande drüſig-geſägt), pumīlum Klett et Richt. (H. humifūsum b. liottārdi Vill.; aufr., armblüt., niedrig, zuweilen mit 4 Kelch- und 4 Blbltrn.).

c¹. Auf Mergel- und Thonboden:

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolīum ochroleucum L.; ſ. Nr. 1140.

d¹. Auf graſigen Waldplätzen:

—. XVII., 3; Bitterling: Polygāla vulgāris L.; ſ. Nr. 467.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolīum montānum L.; ſ. Nr. 485.
—. „ „ T. agrarĭum L.; ſ. Nr. 1084.

e¹. Auf Waldtriften:

—. V., 1; Glockenblümler: Jasīone perēnnis Lmk.; ſ. Nr. 1096.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum pyrenaĭcum L.; ſ. Nr. 477.
—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperīcum quadrangŭlum Fr.; ſ. Nr. 2069.

f¹. Auf Waldwieſen:

—. III., 2; Graspfl.: Holcus mollis L.; ſ. Nr. 1132.
—. „ „ Bromus gigantĕus L.; ſ. Nr. 1000.
—. „ „ Festūca duriuscŭla L. sp.; ſ. Nr. 1133.
—. „ „ Molinĭa coerulĕa Mnch.; ſ. Nr. 2112.
—. IV., 1; Roſenpfl.: Alchemilla vulgāris L.; ſ. Nr. 416.
—. V., 1; Glockenblümler: Phyteuma spicātum L.; ſ. Nr. 1049.

2135. V., 2; Doldenpfl.: Cnidĭum venōsum Koch (Seselĭ venos. Hoffm., Selīnum sylvēstre L.). Aderige Brenndolde (Brennſat). Bltr. dopp.-gefied.; obere Blattſch. ſtraff-anliegend; Hüllchen vielblättr., pfriemf., kahl, von Döldchenlänge; Bl. weiß; 4; 7 bis 8.

—. V., 2; Doldenpfl.: Laserpitĭum pruthenĭcum L.; ſ. Nr. 2059.
—. V., 2; Doldenpfl.: Chaerophȳllum aromatĭcum L.; ſ. Nr. 1135.

2136. VI., 1; Semede: Juncus atrātus Krock. (J. melānthos Rchb., J. heptangŭlus Peterm.). Schwarzblütige Seme. Blütenhüllbltr. glänzendſchwarz, ſo lang als die Kapſ.; Bltr. fein-gerillt, nicht glatt, ſchwach-7ſtreif., mit ſchwach ausgeprägten Querwänden; 4; 7 bis 8.

—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Ranuncŭlus polyanthĕmos L.; ſ. Nr. 476.

—. XIV., 2; Rachenblümler: Melampyrum pratēnse L.; ſ. Nr. 2066.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum sanguinĕum L.; ſ. Nr. 486.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: G. pyrenaĭcum L.; ſ. Nr. 477.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolĭum ochroleucum L.; ſ. Nr. 1140.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: T. spadicĕum L.; ſ. Nr. 1058.
—. XIX., 1; Korbblütler: Serratŭla tinctorĭa L.; ſ. Nr. 2073.
—. „ „ Scorzonēra humĭlis L.; ſ. Nr. 479.
—. XIX., 2; „ Cinerarĭa campēstris Retz.; ſ. Nr. 1136.
—. XX., 1; Orchidee: Anacämptis pyramidālis Rich.; ſ. Nr. 481.
—. XX., 1; Orchidee: Nigritēlla globōsa Rchb.; ſ. Nr. 1137.
—. „ „ Leucōrchis albĭda Lindl.; ſ. Nr. 483.
—. „ „ Cephalanthēra rubra Rich.; ſ. Nr. 1087.
. „ „ Epipāctis palūstris Sw.; ſ. Nr. 1138.

g¹. Auf feuchten, naſſen Waldwieſen:

—. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygŏnum bistōrta L.; ſ. Nr. 1139.

h¹. Auf ſumpfigen Stellen der Waldwieſen:

2137. V., 2; Doldenpfl.: Hydrocotўle vulgāris L. Gemeiner Waſſernabel (Venusnabel, Waſſerſchüſſel). St. fadenf., kriech., wurzelnd; Bltr. ſchildf., kreisrund; Bl. klein, weiß oder rötlich; 4; 7 bis 8; ☥.

i¹. Auf trocknen Wieſen der Waldgegenden:

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolĭum alpēstre L.; ſ. Nr. 1083.

k¹. Auf Gebirgswaldwieſen:

—. V., 2; Doldenpfl.: Myrrhis odorāta Scop.; ſ. Nr. 490.

l¹. An feuchten Stellen der Vorwälder:

—. XII., 2; Roſenpfl.: Spiraea salicifolĭa L.; ſ. Nr. 1100.

m¹. In Wäldern der ſüddeutſchen Kalkalpen und Hochebenen:

—. XIX., 1; Korbblütler: Aposĕris foetĭda Less.; ſ. Nr. 491.

n¹. In Bergwäldern:

—. V., 1; Schlüſſelblümler: Lysimachĭa thyrsiflōra L.; ſ. Nr. 1145.
—. XII., 3; Roſenpfl.: Fragarĭa elatĭor Ehrh.; ſ. Nr. 26.

2138. XIV., 2; Rachenblümler: Euphrasĭa lutĕa L. (Odontītes lutĕa Rchb.). Gelber Augentroſt. Bltr. lineal-lanzettl.; Stbf. länger, als die bärtig-gewimp. Bltr.; Staubb. kahl, frei; Bl. gelb; ☉; 7 bis 9.

—. XVII., 4; Hülſenpfl.; Trifolĭum montānum L.; ſ. Nr. 485.

—. „ „ T. rubens L.; ſ. Nr. 1031.

—. „ „ Ervum sylvatĭcum Peterm.; ſ. Nr. 1148.

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: E. pisifōrme Peterm.; ſ. Nr. 1149.

—. XX., 1; Orchidee: Listēra cordāta R. Br.; ſ. Nr. 1152.

2139. „ „ Epipactis latifolĭa Sw. (Serapĭas latif. L., W., S. helleborīne a. latifolĭa L., Ep. helleborīne Crtz. z. Th.). Breitblättrige Sumpfwurz (Rattenſchwanz). Bltr. länger als die Zwiſchenglieder; unteres Glied der Lippe faſt auf der ganzen rundl. Innenſeite die Honigdrüſe tragend; Lippenplatte ſpitz.; Bl. verſchiedenfarbig; 4; 7 bis 8.

Varirt: E. viridiflōra Rchb. (Bltr. breiteif. bis lanzettl.; äußere Kelchbltr. graugrün, an der Spitze blaß-purpurn; hinteres Lippchenſtück innen dunkelpurpurn, vorderes weiß bis roſenrot, mit rötl. Höcker oder gelbl. Fleck), E. atropurpurĕa-micrāntha (K. nebſt Ovarium bis auf das hellere Baſisſtück des Lippchens dunkelpurpurn), E. microphўlla Ehrh. (kleinblättr.; obere Kelchſtücke alle graugrün, mit bräunl. Spitze; Lippchen roſenrot mit dunkeln Tupfen).

o¹. In feuchten, ſchattigen Bergwäldern:

2140. II., 1; Nachtkerzenpfl.: Circaea intermedĭa Ehrh. (C. alpino-lutetiāna Mey. chl. han.). Mittleres Hexenkraut. Bltr. herz-eif.; Blattſt. rundl., rinnenf.; Blütenſtielchen mit 1 lineal., kleinen Deckbltchn.; Fr. kug.-verk.-eif.; Bl. weiß oder rötl.; 4; 7 bis 8; ∓.

— X., 5; Nelkenblütler: Cerastĭum sylvatĭcum W. et K.; ſ. Nr. 1150.

—. XII., 2; Roſenpfl.: Spiraea arūncus L.; ſ. Nr. 1151.

p¹. In dichten Bergwäldern:

2141. IV., 1; Kardenpfl.: Scabiōsa sylvatĭca L. (Knautĭa sylv. Dub.). Wald-Skabioſe (Waldknautie). St. zieml. kahl, an der Baſis ſteif-zwiebelharig, oberw. von ſehr kurzen, drüſenloſen Haren weich- und von längeren ſteifharig; Bltr. ellipt.-lanzettl., gekerbt; Bl. bläulichrot; Hüllchen

borſtig, 4kant., gezähnt; K. 8- bis 12grannig, mehrborſtig; 4; 7 bis 9*).

Varirt: montāna (ſtark-borſtig; Bltr. behart), vulgāta (St. borſtig; Bltr. behart, lanzettl., ſcharf-ſägezähn.), alpīna (St. zott.; Bltr. lanzettl., ſcharf-ſägezähn., behart, oberſte mit eif. Baſis verwachſen), lancifolĭa (Bltr. ſehr lang, lanzettl., kahl), hastāta (St. borſtig; untere Bltr. verläng.-lanzettl., obere ſtengelſt. behart).

—. X., 1; Rautenpfl.: Dictămnus albus L.; ſ. Nr. 1147.

—. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus supērbus L.; ſ. Nr. 1016.

2142. X., 5; Dickblattpfl.: Sedum telephĭum L. Knollige Fetthenne. Kahl; Wrz. mit rübenf. Knollen; Bltr. zerſtreut, gegenſt. oder zu 3, ungleich-ſtumpf-ſägezähn.; Doldentraube zſgeſetzt, ſcheindoldenartig, Aeſte gegenſt., 3theil.; Bl. grünlichweiß oder lebhaft fleiſchrot; 4; 7 bis 8.

Varirt: S. maxĭmum Sut. (S. teleph. var. d. et e. L.; untere Bltr. mit breiter Baſis ſitz., obere am Grunde kurzherzf.; innere Stbf. der Kronblattbaſis eingefügt), S. purpurĕum Lk. (et Tausch, S. teleph. var. b. purpurĕum L., S. purpurāscens Koch syn. II., S. livĭdum Bernh.; untere Bltr. kurz-geſtielt, obere mit abgerund. Baſis ſitz.; innere Stbf. 1/3 über der Kronblattbaſis eingefügt), S. fabarĭa Koch (S. purpurĕum einiger Aut.; Bltr. mit der ganzrand., keiligen Baſis in den kurzen Blattſt. verſchmäl.; Stbf. wie bei vor.).

q¹. Auf Bergweiden in Wäldern:

—. XX., 1; Orchidee: Epipāctis latifolĭa Sw.; ſ. Nr. 2139.

r¹. In Gebirgswäldern:

—. III., 1; Baldrianpfl.: Valerĭāna montāna L.; ſ. Nr. 1153.

—. III., 2; Graspfl.: Avēna pratēnsis L.; ſ. Nr. 1171.

2143. IV., 1; Krapppfl.: Asperŭla tinctorĭa L. Färber-Meier. Bltr. ſchmal-lineal., untere 6-, obere 4ſtänd.; Deckbltr. rundl.-eif., ſpitz, nicht ſtachelſp.; Blkr. meiſt 3-ſpalt., weiß; Fr. glatt; 4; 7 bis 9; Wrz. färbt rotbraun.**)

—. IV., 1; Krapppfl.: Galĭum aristātum L.; ſ. Nr. 1154.

2144. „ „ G. sylvatĭcum L. Wald-Labkraut. Bltr. längl.-lanzettl., ſtumpf, ſtachelſp., unterſ. meergrün, oben bläulichgrün, zu 6 bis 10, am Rande und Kiele

*) Die Form Knautia dipsacifolia Host hat breit-eif., in den geflügelten Blattſtiel verſchmälerte Blätter; Bö., Bay., Rh.

**) Die A. montana Kit. unterſcheidet ſich nur durch die Flaumhärchen der Krone und iſt daher Mittelform zwiſchen dieſer und A. cynanchica L.!

ſcharf; Bl. weiß; Fr. kahl, etwas runzelig; 4; 7 bis 8; (wird von Unkundigen oft für Asperula odorata L. gehalten!).

—. V., 1; Nachtſchattenpfl.: Atropa belladonna L.; ſ. Nr. 2053.

—. V., 1; Borretſchpfl.: Cynoglossum montanum Lmk.; ſ. Nr. 1155.

—. V., 1; Glockenblümler: Campanula latifolia L.; ſ. Nr. 1156.

—. V., 2; Doldenpfl.: Astrantia major L.; ſ. Nr. 1157.

2145. „ „ Heracleum sibiricum L. Sibiriſcher Bärenklau. Bltr. ſcharf; Dolde nicht ſtralend; Fruchtk. kahl; Fr. herzf.-ausgeſchn.; Krbltr. faſt gleich groß, weiß; 4; 7 bis 8.

2146. V., 2; Doldenpfl.: H. alpinum L. Alpen-B. Bltr. einfach, unterſ. kahl, rundl.-herzf., faſt handf.-5lapp.; Dolde ſtralend; grundſt. Bltr. denen der Feige ähnl.; Bl. weiß; 4; 7 bis 8; Schweiz.

—. V., 2; Doldenpfl.: Laserpitium latifolium L.; ſ. Nr. 1158.

—. VI., 1; Semede: Luzula maxima Desv.; ſ. Nr. 1159.

—. „ Spargelpfl.: Streptopus amplexifolius Pers.; ſ. Nr. 1166.

—. XII., 3; Roſenpfl.: Potentilla rupestris L.; ſ. Nr. 434.

2147. XIV., 1; Lippenblümler: Dracocephalum moldavica L. Moldauer Drachenkopf. Bltr. lanzettl., ſtumpf-tiefgeſägt, an der Spitze ſtumpf, ganzrand.; Quirle blattachſelſtänd.; Bl. violet oder weiß; Staubb. kahl; ☉; 7 bis 8; ♆; De., Mä.

—. XIV., 1; Lippenblümler: Stachys alpina L.; ſ. Nr. 1160.

—. XIV., 2; Rachenblümler: Digitalis purpurascens Roth; ſ. Nr. 1161.

2148. XIV., 2; Rachenblümler: Scrophularia scopolii Hoppe. Skopoli's Braunwurz. Bltr. dopp.-gekerbt, beiderſ. weichharig; K. und Blütenſt. drüſig; Bl. blaugrün; St. ſtumpf-4kant., zott., oben drüſenharig; Wrz. faſerig; 4; 7 bis 8; Schl., Mä., Kä., Kr.

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolium rubens L.; ſ. Nr. 1031.

—. „ „ Ervum pisiforme Peterm.; ſ. Nr. 1149.

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Lathyrus heterophyllus L.; ſ. Nr. 2067.

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: L. niger Wimm.; ſ. Nr. 1086.

—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hypericum pulchrum L.; ſ. Nr. 1089.

2149. XIX., 1; Korbblütler: Prenānthes purpurĕa L. Purpurroter Haſenlattich (dürre Henne). Bltr. mit herzf. Baſis umfaſſ., kahl, unterſ. meergrün; Bl. riſpenſt., purpurn, ſelten weiß; 4; 7 bis 8; Süddeutſchl.

Varirt: P. tenuifolĭa L. (Bltr. lineal-lanzettl., ſchmal; A.).

2150. XIX., 2; Korbblütler: Senecĭo nemorēnsis L. (S. germanĭcus Wallr.). Hain-Baldgreis. Wrzſtock ſchief, ſproſſ.; St. faſt kahl; Bltr. häutig, ellipt.-lanzettl., untere geſtielt erſcheinend, obere ſitz., alle unterſ. von kurzen, geglied. Härchen graulich, am Rande ungleich-ſägezähn., Sägezähne grad-verdickt-ſpitz.; Hüllen klein-drüſig-ſchärfl.; Deckbltchn. wenig, kurz-drüſenwimp.; Hülle noch einmal ſo lang als breit; Stralbl. 5 bis 8; Fr. kahl; 4; 7 bis 8.

Varirt: S. jacquiniānus Rchb. (S. remorēnsis Jacq., S. frondōsus Tausch; ſüdl., dickſtengel., blattreiche, üppige Form; obere Bltr. vollk. mit breiter Baſis ſitz.), S. octoglōssus DC. (S. nemorēnsis Rchb.; 8züngige Form; Doldentraube wenigäſtig, armblättr.; obere Bltr. merklich kleiner werdend), S. fuchsĭi Gmel. (S. saracenĭcus et salicifolĭus Wallr.; Bltr. mit meiſt ungewimp. Spitzchen der Zähne, die unterſten eif., obere ſchmal-lanzettl., alle in einen ſchmal-geflüg., an der Baſis kaum verbreit. Stiel verſchmäl.; S. ovātus Willd.: untere Bltr. eilanzettl., obere längl.-lanzettl.; S. angustifolĭus Spenn.: untere Bltr. rauten-lanzettl., obere längl.-lanzettl., feingeſägt).

—. XX., 1; Orchidee: Corallorrhīza innāta R. Br.; ſ. Nr. 1659.

—. XX., 1; Orchidee: Cephalanthēra ensifolĭa Rich.; ſ. Nr. 1162.

—. XX., 1; Orchidee: C. pallens Rich.; ſ. Nr. 1163.

s¹. In feuchten Gebirgswäldern:

—. II., 1; Nachtkerzenpfl.: Circaea alpīna L.; ſ. Nr. 1062.

—. III., 1; Baldrianpfl.: Valerĭāna phu L.; ſ. Nr. 507.

—. III., 2; Graspfl.: Festūca sylvatĭca Vill.; ſ. Nr. 1164.

—. V., 1; Schlüſſelblümler: Cyclămen europaeum L.; ſ. Nr. 288.

—. V., 1; Schlüſſelblümler: Soldanēlla montāna Willd.; ſ. Nr. 496.

—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: Aconĭtum stoerkeānum Rchb.; ſ. Nr. 1168.

—. XXI., 1; Giftmilcher: Euphorbĭa procēra M. B.; ſ. Nr. 1169.

t¹. In schattigen Gebirgswäldern:

—. II., 1; Nachtkerzenpfl.: Circaea alpīna L.; s. Nr. 1062.
—. XII., 3; Rosenpfl.: Rubus glandulōsus Bell.; s. Nr. 1167.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum lucĭdum L.; s. Nr. 504.

u¹. In schattigen, mosigen Gebirgswaldungen:

2151. IV., 1; Krapppfl.: Galĭum rotundifolĭum L. Rundblättriges Labkraut. St. schlaff; Bltr. oval, kurzstachelsp., am Rande steifhārig-gewimp.; Bl. weiß; Fr. kug., borstig, hakerig; 4; 7 bis 8.
Varirt: G. elliptĭcum Willd. (Bltr. meist elliptisch).

v¹. In steinigen Gebirgswaldungen:

—. XIV., 2; Rachenblümler: Digitālis purpurĕa L.; s. Nr. 1170.

w¹. In hohen Gebirgswäldern:

—. V., 1; Schlüsselblümler: Soldanēlla montāna Willd.; s. Nr. 496.
2152. VI., 3; Zeitlosenpfl.: Verātrum nigrum L. Schwarzer Germer. Zipf. des P. von Blütenstielchenlänge; Kelchlappen ganzrand.; Bl. schwarzpurpurn; 4; 7 bis 8; ☩.

x¹. Auf trocknen Grasstellen in Gebirgswäldern:

—. V., 1; Zauberpfl.: Thesĭum montānum Ehrh.; s. Nr. 1173.

y¹. Auf grasigen Anhöhen in Gebirgswäldern:

—. XIX., 2; Korbblütler: Cinerarĭa spatulaefolĭa Gmel.; s. Nr. 1172.

z¹. An Gebirgswaldrändern:

2153. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: Aconĭtum lycoctŏnum L. (A. teliphŏnum Rchb.). Wolfs-Eisenhut (Wolfssturmhut, -wurz, -kraut, -gift, -tod, Narrenkappe). Sporn fadenf., kreisf.-zsgerollt; Samen falten-runzelig; Bl. gelb; die 2 oberen Blbltr. nebst den verläng.-kegelf. Kapuzen aufr., grade; 4; 7 bis 9; ☩.
Varirt: A. vulparĭa Rchb. (Helm walzenf., unten erweitert; Sporn schneckenf.), A. teliphŏnum Rchb. (Helm verläng.-kegelf.; Sporn schneckenf.), A. myococtŏnum Rchb. (Helm kurz-kegelf., Schnabel abwärts-eingebog.; Sporn gemshornf.-zurückgebogen).
—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Vicĭa dumetōrum L.; s. Nr. 1070.

a². An Waldrändern der Alpen:

—. XIX., 2; Korbblütler: Cinerarĭa alpēstris Hoppe; s. Nr. 1174.

§. 479. **B. In Hainen:**

—. II., 1; Rachenblümler: Veronīca officinālis L.; s. Nr. 997.

—. III., 1; Baldrianpfl.: Valeriāna officinālis L.; s. Nr. 998.

2154. III., 2; Graspfl.: Agrōstis stolonifĕra L. fl. suec. (A. alba Auct. secund. Willd. sp. et pallĭda Schk., A. capillāris Poll., A. stolonifĕra L. var. b.). Gemeines Straußgras (Fiorin-, Flecht-, Wind-, Har- oder Hundsgras, falsche Quecke, Schmeele). Blatthäutchen sehr kurz, abgestutzt; Rispe später nicht ganz zsgezogen; Bltr. flach; 4; 7 bis 8.*)

—. III., 2; Graspfl.: Poa nemorālis L.; s. Nr. 1002.

—. „ „ Tritĭcum canīnum L.; s. Nr. 1047.

—. IV., 1; Krapppfl.: Galĭum sylvēstre Poll.; s. Nr. 1005.

2155. „ „ G. aparīne L. (G. agrēste Wallr.). Kletterndes Labkraut (Klebkraut, Kleber, Zaunreis). Bltr. 6- und 8ständ., stachelsp., 1nervig, am Rande und Kiele rückw.-stachel.-rauh; Bl. weiß; Fr. kug., borstenhakig; ⊙; 7 bis 9; ×.

Varirt: G. vaillantĭi DC. (G. infēstum W. K., G. agrēste a. echinospērmum Wallr.; St. an den Gelenken kahl; Fr. wenig-hakenborstig), G. tenĕrum Schleich. (St. borstenf.; Bltr. verk.-ei- bis verk.-lanzettf.; Fr. hirskorngroß), G. aparīne hispĭda Mnch. (St. über den Gelenken zott.; Fr. stark-hakig).

—. V., 1; Schlüsselblümler: Lysimachĭa nummularĭa L.; s. Nr. 1008.

2156. V., 1; Glockenblümler: Adenophŏra suaveŏlens Fisch. (Campanŭla lilifolĭa L., A. lilifol. Ledeb.). Wohlriechende Drüsenglocke (Schellenblume). Bltr. längl., untere kurz-gestielt, gesägt; Rispe ausgebreitet; Bl. hellblau, wohlriechend; 4; 7; Pr., Pf., Schl., Bö.

—. V., 1; Glockenblümler: Campanŭla patŭla L.; s. Nr. 1010.

—. „ Geisblattpfl.: Lonicēra periclymĕnum L.; s. Nr. 1176.

—. V., 2; Doldenpfl.: Aegopodĭum podagrarĭa L.; s. Nr. 1012.

*) Eine rotgliederige Form ist A. rubra Auct. pl. non Linné. Eine Meeresform mit kriechendem Stengel, steifen, graugrünen Blättern und sehr gedrängter, kurzer Rispe ist A. maritima Lam.!

2157. V., 2; Doldenpfl.: Pimpinēlla magna L. Großer Steinpeterlein (Pimpinelle, Bibernelle). St. beblätt., kant.-gefurcht; Bltchn. kurz-gestielt; Bl. weiß; Wrz. gewürzhaft; 4; 7 bis 8.
—. V., 2; Doldenpfl.: Cnidĭum venōsum Koch; s. Nr. 2135.
—. „ „ Selīnum carvifolĭa L.; s. Nr. 2057.
—. „ „ Anthrīscus cerefolĭum Hoffm.; s. Nr. 456.
—. V., 2; Doldenpfl.: Chaerophȳllum temŭlum L.; s. Nr. 1177.
—. „ „ Ch. aromatĭcum L.; s. Nr. 1135.
—. VI., 1; Semede: Juncus acutiflōrus Ehrh.; s. Nr. 2116.
—. X., 1; Heidepfl.: Pyrŏla rotundifolĭa L.; s. Nr. 1015.
—. X., 3; Nelkenblütler: Silēne inflāta Sm.; s. Nr. 1178.
—. X., 5; „ Cerastĭum vulgātum L. spec.; s. Nr. 463.
—. XI., 2; Rosenpfl.: Agrimonĭa pilōsa Ledeb.; s. Nr. 2060.
—. XII., 3; „ Geum urbānum L.; s. Nr. 1077.
—. „ „ Tormentīlla erēcta L.; s. Nr. 1082.
—. „ „ Fragarĭa elatĭor Ehrh.; s. Nr. 26.
—. „ „ Rubus caesĭus L.; s. Nr. 443.
—. „ „ Rosa arvēnsis L.; s. Nr. 1020.
—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: Aquilegĭa vulgāris L.; s. Nr. 1179.
2158. XIII., 3; „ Clemātis vitālba L. Gemeine Waldrebe (Hexen- oder Teufelszwirn, Brennwurz, Bettlerskraut, Hagseirebe, Rebbinden, Flammen- oder Brandkraut, Altermannsbart, Hexenstrang). St. kletternd; Bltr. gefied.; Kbltr. längl., beiders. filz., gelbgrün, innen und am Rande weiß; ♄; 7 bis 8; ≡.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Ranuncŭlus acris L.; s. Nr. 399.
—. „ „ R. polyanthĕmos L.; s. Nr. 476.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Lamĭum maculātum L.; s. Nr. 190.
—. „ „ L. album L.; s. Nr. 169.
—. „ „ Galeōpsis versicŏlor Curt.; s. Nr. 2124.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Stachys sylvatĭca L.; s. Nr. 1026.
—. „ „ Teucrĭum scorodonĭa L.; s. Nr. 2090.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Digitālis micrāntha Roth; s. Nr. 1180.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Melampȳrum nemorōsum L.; s. Nr. 2091.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum sanguinĕum L.; s. Nr. 486.
—. XVI., 5; Pappelrosenpfl.: Lavatēra thuringiăca L.; s. Nr. 2092.

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Genīsta tinctorĭa L.; ſ. Nr. 1124.
—. „ „ Cytĭsus nigrĭcans L.; ſ. Nr. 1092.
—. „ „ Ervum pisifŏrme Peterm.; ſ. Nr. 1149.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Lathўrus niger Wimm.; ſ. Nr. 1086.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum pilosēlla L.; ſ. Nr. 1181.
—. „ „ H. sylvatĭcum Lamk.; ſ. Nr. 1038.
—. „ „ H. umbellātum L.; ſ. Nr. 2095.
—. „ „ Lactūca murālis Gaertn.; ſ. Nr. 2072.
—. XIX., 2; „ Senecĭo erucaefolĭus Huds.; ſ. Nr. 2100.
—. XXI., 1; Aronpfl.: Arum maculātum L.; ſ. Nr. 423.
—. XXI., 4; Neſſelpfl.: Urtīca urens L.; ſ. Nr. 1234.
2159. XXI., 5; Meldenpfl.: Atrĭplex angustifolĭum Sm. (A. patŭla Auct. plurim.). Schmalblättrige Melde. Blтr. lanzettl., untere gezähnt, faſt ſpießf., übrige lanzettl., auch lineal.; untere Aeſte ſpreizend; Blütenhülle zur Fruchtzeit ſpießrautenf.; ☉; 7 bis 8.

a. In feuchten Hainen:

—. V., 1; Veilchenpfl.: Viŏla persicifolĭa Schk.; ſ. Nr. 426.
2160. V., 2; Doldenpfl.: Peucedānum palūstre Mnch. (Selīnum pal. L., Thysselīnum pal. Hoffm., P. sylvēstre DC.). Sumpf-Harſtrang (Oelſenich). St. gefurcht; Blтr. 3-fach-gefied., Btchn. tief-fiederſpalt.; Bl. weiß oder rötl.; Fr. rotbraun, lanzett-ellipt; ♃; 7 bis 8; ┼.
2161. XII., 2; Roſenpfl.: Spiraea carpinifolĭa Willd. Weißbuchenblättrige Spierſtaude. Blтr. verk.-ei-ellipt., an der Baſis kurz-keilf., ungleich-dopp.-ſägezähn.; Riſpe ſtraußig; Bl. roſenrot; ♄; 7 bis 8; Hamburg; ſonſt verwildert. *)
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum robertiānum L.; ſ. Nr. 431.

b. In feuchten, ſchattigen Hainen:

—. II., 1; Nachtkerzenpfl.: Circaea lutetiāna L.; ſ. Nr. 2127.

c. In lichten Hainen:

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolĭum agrarĭum L.; ſ. Nr. 1084.

d. In graſigen Hainen:

2162. XIX., 3; Korbblütler: Centaurēa nigra L. Schwarze Flockenblume. Blтr. lanzettl.; Anhängſel des Hauptk.

*) Iſt eigentlich nur üppige Form von Sp. salicifolia L.!

aufr., lanzettl., fiederig-franſig; Franſen borſtig, dopp. ſo lang, als die Breite ihres Mittelfeldes, ſämmtl. genähert; Pappus nur unter der Lupe deutl., die Borſten in einen napff. Ring verwachſen; Bl. pfirſichblütrot; 4; 7 bis 9.

Varirt: C. nigra DC. prodr. (Köpfchen ſtrallos), C. nigrēscens DC. prodr. non Willd. (C. nigra, radiāta DC. fl. franc.; Köpfchen ſtralend).

e. In ſteinigen, trocknen Hainen:

—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperīcum pulchrum L.; ſ. Nr. 1089.

f. In bergigen Hainen:

—. XIV., 2; Rachenblümler: Melampȳrum cristātum L.; ſ. Nr. 1123.

g. In Gebirgshainen:

—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: Aconītum lycoctŏnum L.; ſ. Nr. 2153.

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Ervum pisiförme Peterm.; ſ. Nr. 1149.

—. XIX., 1; Korbblütler: Crepis praemōrsa Tausch; ſ. Nr. 512.

2163. XIX., 3; Korbblütler: Centaurēa phrygĭa L. (C. pseudophrygĭa C. A. Mey.). Phrygiſche Flockenblume. Untere Bltr. eif. bis längl.-lanzettl., die übrigen längl.-lanzettl., alle vorn kurz-zugeſp.; äußere Hüllbltchn. lanzettl., in ein pfrieml. Anhängſel auslauf.; Pappus kürzer als die Fr.; Bl. roſenrot; 4; 7 bis 9.

Varirt: C. austriăca Willd. (Anhängſel des Hauptk. pfrieml., zurückgekr., fiederig-gefranſt, die der 3 inneren Reihen rundl., riſſig-gezähnt, über die äußern hinausragend), C. monocephăla (innerſte Hüllbltchn. vor den äußerſten verborgen), C. nervōsa Willd. (Hüllbltchn. ebenſo; Pappus über halb ſo lang, als die Fr.), C. cirrāta Rchb. (innere Hüllbltchn. vorragend; St. einfach, oben 1- bis 3-köpf., flockig). *)

h. Am Rande der Haine:

—. XIV., 1; Lippenblümler: *Leonūrus cardiăca L.; ſ. Nr. 1182.

*) C. cirrata Rchb. ſcheint ein Baſtard von C. phrygia L. und C. nigrescens DC. zu ſein, denn ſie beſitzt die Hüllblättchen der erſteren, den Stengel und die Blätter der letzteren!

§. 480. **C. In Nadelwäldern:**

—. III., 2; Graspfl.: Festūca rubra L.; ſ. Nr. 1184.
—. V., 1; Borretſchpfl.: Onōsma arenarĭum W. et K.; ſ. Nr. 1185.
—. VIII., 1; Preiſelpfl.: Vaccinĭum vitis idaea L.; ſ. Nr. 514.
—. X., 1; Heidepfl.: Pyrŏla rotundifolĭa L.; ſ. Nr. 1015.
—. „ „ P. chlorāntha Sw.; ſ. Nr. 1186.
2164. X., 3; Nelkenblütler: Silēne chlorántha Ehrh. (Cucubălus chlorānthus Willd.). Grünblumige Silene. Kahl; untere Bltr. lineal.-lanzettl.; Aeſte der Traube gegenſt., 1- bis 3blüt.; K. röhrig, ſtumpf-zähn.; Antheren olivengrün; Blblr. zw. grün, gelb und weiß ſpielend; 4; 7 bis 8; Schl., Brd., Pſ., Po., K. S., Th., Mä., Kr.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Cytĭsus sagittālis Koch; ſ. Nr. 445.
—. „ „ Astragălus arenarĭus L.; ſ. Nr. 1187.
—. „ „ Ornithŏpus perpusīllus L.; ſ. Nr. 516.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum pilosélla L.; ſ. Nr. 1181.

a. In ſchattigen Nadelwäldern:

—. X., 1; Heidepfl.: Pyrŏla secūnda L.; ſ. Nr. 386.

b. In ſchattigen, feuchten, moſigen Nadelwäldern:

2165. XIV., 2; Geisblattpfl.: Linnaea boreālis Gron. Nordiſche Linnäe. Stämmchen fadenf., roſtbraun, weit-kriech.; Bltr. gegenſt., rundl.-eif., faſt lederig, kurz-geſtielt; Blütenſt. einzeln, länger als die Bltr.; Bl. weiß, innen blutrot-geſtreift; ♄; 6 bis 7.

c. Auf verweſten Nadeln im Moſe:

2166. XX., 1; Orchidee: Goodyēra repens R. Br. (Satyrĭum rep. L., Neottĭa rep. Sw.). Kriechende Goodiere. St. oben nebſt den Bltrn. behart; untere Bltr. geſtielt, eif., netzaderig; Aehre 4- bis 8blüt.; Bl. einſeitig, klein, weiß, wohlriechend; 4; 7 bis 8.

d. Auf Humus in Nadelwäldern:

—. X., 1; Heidepfl.: Chimaphīla umbellāta Nutt.; ſ. Nr. 1066.

e. In Tannenwäldern:

—. XIV., 1; Braunſchupper: Orobānche neottioīdes Saut.; ſ. Nr. 2990.

f. In Kiefernwaldungen:

—. X., 4; Nelkenblütler: Spergēlla subulata Rchb.; ſ. Nr. 1188.

2167. XI., 5; Dickblattpfl.: Sempervīvum soboliferum Sims. (S. globiferum Auct. et L.). Sproſſende Hauswurz. Bltr. der Roſetten längl.-keilig, ſpitz, ſtengelſt. längl., oberſte eif., ſämmtl. beiderſ. kahl, am Rande gewimp.; Krbltr. und Kelchzipf. aufr., glockig, gelblichweiß; 4; 7 bis 8; ↕; Schl., Bö., K. S., Harz, Brd., Po., Pr., Pf. u. ſ. w.

Varirt: S. arenarium Koch (Blbltr. von 2- bis 3facher Kelchlänge).

D. In Gebüſchen, Hecken, Zäunen u. dergl.: §. 481.

—. II., 1; Rachenblümler: Veronīca officinālis L.; ſ. Nr. 997.
—. „ „ V. latifolia L.; ſ. Nr. 1189.
—. „ Jasminpfl.: Ligūstrum vulgāre L.; ſ. Nr. 1190.
—. „ Lippenblümler: Salvia pratēnsis L.; ſ. Nr. 1101.
—. „ „ S. verticillāta L.; ſ. Nr. 1191.
2168. „ „ S. sylvēstris L. Wald-Salbei. St. reichblättr., nebſt den Bltrn. unterſ. und dem K. grauweichharig; untere Bltr. geſtielt, dopp.-gekerbt, obere kleiner, ſitz.; Deckbltr. farbig; Bl. violet oder roſenrot; 4; 7 bis 8; ⚔.*)

2169. III., 2; Graspfl.: Agrōstis vulgāris With. (A. stolonifera L. fl. suec., A. stolonifera Poll., A. hispida Willd.). Gemeines Straußgras. Bltr. mit ganz kurzen Blatthäutchen; Riſpenzweiglein nach allen Seiten abſteh.; Blütenſcheidchen zugeſp., auf dem Rücken ſtachelharig; 4; 7 bis 8.

Varirt: A. tenella Hoffm. (Spindel ſchlaffer, zarter; Aehrchen kleiner, gelbgrün), A. aristāta May. (äußere Blütenſcheidchen kurz-begrannt), A. vivipāra Koch (Aehrchen auf den Alpen auswachſend).

2170. III., 2; Graspfl.: Calamagrōstis epigeios Roth (Arūndo epig. L., A. calamagrōstis M. B.). Landſchilf (Landreitgras, Schilfrohr). Riſpe geknäult-lapp.; Granne grade, unter oder aus der Rückenmitte hervortretend; 4; 7 bis 8.**)

—. III., 2; Graspfl.: C. sylvatica DC.; ſ. Nr. 1144.
—. „ „ Arrhenathērum avenacēum P. B.; ſ. Nr. 1382.

*) Die Form mit abſtehenden Stengelharen, größeren, gekerbten Blättern und längeren Deckbltrn. iſt S. nemorosa Roth!

**) Eine ziemlich häufig an Bachufern vorkommende Form mit langer, blaugrüner, rotangelaufener Riſpe iſt C. huebneriana Rchb.; die völlig blaugrüne Form iſt C. glauca Rchb.!

—. III., 2; Graspfl.: Bromus arvēnsis L.; ſ. Nr. 1193.
—. „ „ Festūca heterophȳlla Haenke; ſ. Nr. 1001.
—. III., 2; Graspfl.: Brachypodĭum sylvatĭcum R. et Sch.; ſ. Nr. 1003.
—. III., 2; Graspfl.: Br. pinnātum P. B.; ſ. Nr. 2078.
—. „ „ Br. longiflōrus Willd.; ſ. Nr. 3001.
—. „ „ Tritĭcum canīnum L.; ſ. Nr. 1047.
2171. IV., 1; Neſſelpfl.: Parietarĭa officinālis L. (P. erēcta M. et K.). Gebräuchliches Glaskraut (St. Peters-, Rebhühner-, Mauer-, Wand-, Tropf-, Tag- oder Nachtkraut, Tag- und Nachtgleich). St. aufr., einfach; Bltr. längl.-eif., beiderſ. zugeſp.; Blütenh. glock., an den Stbgf-blüten von Länge der Stbgf.; Gabelriſpen knäuelf., an dem Hauptſt. blattachſelſt., geſtielt; 4; 7 bis 8; früher ♃.
2172. IV., 1; Kardenpfl.: Dipsăcus sylvēstris Mill. (D. sylvēster Huds., D. fullōnum var. a. L.). Waldkarde (wilde K., unſerer lieben Frauen Waſchbecken). Bltr. ſitz., kahlrand. oder zerſtreut-ſtachelig, mittl. meiſt ungetheilt; Deckbltr. biegſam, gradſpitz.; Bl. blaßlila; ♂; 7 bis 8; ⚔.*)
—. IV., 1; Kardenpfl.: D. pilōsus L.; ſ. Nr. 2079.
—. „ Krapppfl.: Galĭum sylvēstre Poll.; ſ. Nr. 1005.
—. „ „ G. mollūgo L.; ſ. Nr. 1006.
—. „ „ G. verum L.; ſ. Nr. 1105.
—. „ „ G. aparīne L.; ſ. Nr. 2155.
2173. „ „ *Rubĭa tinctōrum L. Färberröte (Krapp). Bltr. 4- oder 6ſtänd., lanzettl.; Blütenſt. blattachſelſt., 3gabel.; Bl. gelblich; 4; 7 bis 8; ♆; ♃; Vaterland: Orient (?).
—. IV., 1; Aralienpfl.: Cornus suecĭca L.; ſ. Nr. 1007.
—. „ „ C. sanguinĕa L.; ſ. Nr. 1194.
—. V., 1; Schlüſſelblümler: Lysimachĭa nummularĭa L.; ſ. Nr. 1008.
—. V., 1; Nachtſchattenpfl.: Hyoscyămus niger L.; ſ. Nr. 1195.
—. „ „ Physălis alkekĕngi L.; ſ. Nr. 1196.
—. „ „ Solānum dulcamāra L.; ſ. Nr. 1197.
—. „ „ *Lycĭum barbărum L.; ſ. Nr. 1204.
—. „ Borretſchpfl.: Cerīnthe minor L.; ſ. Nr. 1198.
—. „ Windenpfl.: Convolvŭlus sepĭum L.; ſ. Nr. 1199.

*) Von dieſer Pflanze (Labium veneris Plin., d. i. Waſchbecken der Venus) dient die ſtark abgekochte und mit Kandis verſetzte Wurzel den Landleuten als wirkſames Bruſtmittel!

—. V., 1; Sperrkrautpfl.: Polemonĭum coerulĕum L.; s. Nr. 1200.
—. V., 1; Glockenblümler: Adenophŏra suaveŏlens Fisch.; s. Nr. 2156.
—. V., 1; Glockenblümler: Campanŭla patŭla L.; s. Nr. 1010.
—. „ „ C. rapunculoīdes L.; s. Nr. 3002.
—. „ „ C. trachelĭum L.; s. Nr. 1109.
—. „ „ C. cervicarĭa L.; s. Nr. 1110.
—. „ Geisblattpfl.: Lonicēra periclymĕnum L.; s. Nr. 1176.

2174. V., 1; Rebenpfl.: *Ampelōpsis quinquefolĭa R. et Sch. (A. hederacĕa Mchx., Hedĕra quinquef. L., Vitis hederac. Willd., Cissus hed. Pers.). Fünfblättrige Zaunrebe (wilder Wein, Efeuwein, Jungfernrebe, -wein). Bltr. 3- bis 5zäl.; Bl. grünl.; Beere schwarzblau; ♄; 7 bis 8; ‡; Vaterland: Nordamerika.

—. V., 1; Veilchenpfl.: Viŏla tricŏlor L.; s. Nr. 525.

2175. V., 2; Seidenfrüchtler: Vincetoxĭcum officināle Mnch. (Asclepĭas vincet. L., Cynānchum vincet. R. Br. et plurim. Auct., V. album Aschrsn.). Gemeine Schwalbenwurz (Hundswürger, St. Lorenzkraut, Giftwurzel, Schwalbenkraut). Bltr. gegenst., herz-eif., zugesp.; Bl. in blattachselst., gestielten Dolden, weiß; ♃; 7 bis 8; ‡; ⚲.

—. V., 2; Doldenpfl.: Astrantĭa major L.; s. Nr. 1157.
—. „ „ Aegopodĭum podagrarĭa L.: s. Nr. 1012.
—. „ „ Pimpinēlla magna L.; s. Nr. 2157.

2176. „ „ P. saxifrăga L. Gemeiner Steinpeterlein (Bibernell, weißer oder Stein-B., Bockspetersilie, Pfefferwurz, Roßbibernell). St. stielrund, zartrillig, oben fast blattlos, kahl oder an der Basis schwach-feinharig; Bl. weiß; ♃; 7 bis 9; ⚲.
Varirt: P. major, dissectifolĭa et poteriifolĭa Wallr.

—. V., 2; Doldenpfl.: Bupleurum longifolĭum L.; s. Nr. 1201.
—. „ „ B. affīne Sadler; s. Nr. 2055.

2177. „ „ B. gerardi Jacq. Gerard's Hasenöhrchen. St. wiederholt-gabelästig, hin- und hergebog.; Bltr. lineal., zugesp., untere sitz., obere halb-umfass.; Hüllbltchn. meist 5, lineal-pfrieml.; Bl. weiß; ⊙; 7 bis 8; Oe.

2178. V., 2; Doldenpfl.: Aethūsa cynapĭum L. Gartengleiße (Hundspetersilie, Gartenschierling, Kröten-, Katzen- oder Hundspeterlein, Glanz-, stinkende oder tolle Petersilie, faule Grete). Bltr. glänzend, dopp.- bis 3fach-gefied.; Hülle

fehlend; Hüllchen 3blättr., zurückgeschl.; Bl. weiß; ☉; 7 bis 8; ≡.*)

2179. V., 2; Doldenpfl.: Cnidium monnieri Cuss. Französische Brennsat. St. ästig, kant.; Bltr. dopp.-gefied.; Bltchn. tief-fiedertheil., die Nebenadern nicht durchscheinend; Fetzen lineal., kurz-zugesp.; Blattsch. etwas locker; Hüllbltchn. borstenf., scharf, so lang oder länger als das Döldchen; Bl. weiß; ☉; 7 bis 8; Görz.

—. V., 2; Doldenpfl.: Peucedanum alsaticum L.; s. Nr. 1202.

—. „ „ Torilis anthriscus Gaertn.; s. Nr. 1073.

2180. „ „ T. infesta Rchb. (Scandix inf. L., T. neglecta Schult.). Eigentlicher Klettenkerbel (feindlicher K.). Striegelharig; Bltr. dopp.-gefied., Bltchn. eingeschn.-gesägt, Zähne mit einwärtsgebog. Spitze; Hülle fehlend oder 1blättr.; Griff. länger als die kegelf. Scheibe; Fruchtstacheln widerhakig; Bl. weiß; ☉; 7 bis 8.

—. V., 2; Doldenpfl.: Anthriscus cerefolium Hoffm.; s. Nr. 456.

—. V., 2; Doldenpfl.: Chaerophyllum bulbosum L.; s. Nr. 1106.

—. V., 2; Doldenpfl.: Ch. temulum L.; s. Nr. 1177.

—. „ „ Ch. aureum L.; s. Nr. 1203.

2181. „ „ Conium maculatum L. Gefleckter Schierling (Wüterich, Zigeuner-, Toll-, Berst- oder Bangenkraut, Vogeltod, großer oder Blut-Sch., Kälberkern, Scharnpipe, klein Wodendung, Ziegendill, Wut- oder Mauer-Schierling). St. rundl., zart-gerillt, an der Basis rot-gefleckt, kahl; untere Bltr. 3fach-gefied., tief-fiederspalt., mit stielrunden, hohlen Blattst.: Hülle viel-, Hüllchen 3- bis 4blättr.; Bl. weiß; ♂; 7 bis 8; ≡; ⅄.

—. VI., 1; Spargelpfl.: Asparagus officinalis L.; s. Nr. 1205.

—. „ „ A. acutifolius L.; s. Nr. 1206.

—. „ Lilienpfl.: Allium scorodopräsum L.; s. Nr. 1207.

—. VI., 3; Knöterichpfl.: Rumex pratensis M. et K.; s. Nr. 1208.

—. VI., 3; Knöterichpfl.: R. sanguineus L.; s. Nr. 1014.

2182. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygonum persicaria L. Gemeiner Knöterich (Floh-K., Flöhkraut, Rötsch, Rüttig). Bl. 6- bis 8männig; Tüten kahl bis rauhharig, am Rande

*) Die Waldgleiße, A. cynapoides M. B., hat Hüllchen von Döldchenlänge, weiße Blüten und schwach-flügelig-gekielte Früchte; ☉; 6 bis 8; ≡; Bö., De.

gewimp.; Bl. grünlichweiß bis rosenrot; Fr. zsgedr.-3kant., schwarz, glänzend; ⊙; 7 bis 9; ×.

Varirt: vulgāre (Bltr. lanzettl., kahl, am Rande leicht-gewimp.; Blütenst. und K. kahl), scabrum Mnch. (Bltr. unters. weichharig, Aehren unterbrochen, Blütenst. kahl), lapathifolĭum L. (Bltr. eif. bis eilanzettl., kahl, unters. drüsig-rauh; Blütenst. nebst K. drüsig-scharf; Bl. 6männig, meist grünweiß), nodōsum Pers (Gelenke des St. angeschwollen, gefleckt; Bltr. eilanzettl., gewimp.; Bl. rosa oder weiß), prostrātum (St. niedergestr., sperrig-vieläſtig; Bltr. fast sitz., schief-lanzettl.; Aehre eif.; Bl. rot).

2183. VIII., 1; Knöterichpfl.: P. dumetōrum L. Hecken-K. Bltr. glatt; K. häutig-geflüg.; Bl. grün, 8männig; Fr. 3-kant., glänzend, gestrichelt-punkt.; ⊙; 7 bis 9.

—. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus seguiērĭi Vill.; s. Nr. 2086.

2184. „ „ Saponarĭa officinālis L. (Silēne sapon. Fenzl). Seifenwurz (Seifenkraut, Waschkraut, Hundsnelke, Schlüssel- oder Spatzenkraut). Wrzstock weitkriech.; K. walzenf., ungeflüg.; Kronblattschlund mit 2 spitzen Zähnen; Bl. hellfleischfarben; ♃; 7 bis 8; ♄.

2185. X., 2; Nelkenblütler: Vaccarĭa pyramidāta Fl. Wett. (V. parviflōra Mnch., V. vulgāris Host, Gypsophīla vaccar. Sm., Saponarĭa vacc. L.). Piramidenkelchiges Kuhkraut (Erd-, Glied- oder Lidweich, Kaiser- oder Karthäuserblume, Kuhseifenkraut). Wrz. senkr.; Bltr. lanzettl., an der Basis verwachs.; K. 5flüg.; Kronblattbasis ohne Anhängsel; Bl. fleischfarben; ⊙; 7 bis 9; ×.

—. X., 3; Nelkenblütler: Silēne inflāta Sm.; s. Nr. 1178.

—. „ „ Melandrĭum pratēnse Roehl.; s. Nr. 1113.

2186. X., 3; Nelkenblütler: Cucubălus baccifĕrus L. (Silēne baccifĕra Roth, Lychnānthus scandens Gmel.). Beerentragender Hühnerbiß (beerentragender Taubenkropf, Hühnergift, Tuba- oder Vögelspeck). St. schwach, kletternd, weit-ästig; Bltr. längl.-eif., spitz; Bl. end- und blattachselst., grünlichweiß; ♃; 7 bis 8.

—. X., 3; Nelkenblütler: Stellarĭa nemŏrum L.; s. Nr. 387.

—. X., 5; „ Cerastĭum vulgātum L. spec.; s. Nr. 463.

—. X., 5; Dickblattpfl.: Sedum telephĭum L.; s. Nr. 2142.

—. XI., 2; Rosenpfl.: Agrimonĭa eupatorĭa L.; s. Nr. 1114.

—. XII., 2; „ Spiraea salicifolĭa L.; s. Nr. 1100.

—. „ „ Sp. ulmarĭa L.; s. Nr. 1055.

—. XII., 3; „ Geum urbānum L.; s. Nr. 1077.

—. XII., 3; Rosenpfl.: Rubus idaeus L.; s. Nr. 396.
—. „ „ R. fruticōsus L.; s. Nr. 1119.
—. „ „ R. corylifolĭus Sm.; s. Nr. 1078.
—. „ „ R. caesĭus L.; s. Nr. 443.
—. „ „ Rosa pimpinellifolĭa L.; s. Nr. 1211.
—. „ „ R. arvēnsis L.; s. Nr. 1020.
—. „ „ *R. centifolĭa L.; s. Nr. 1212.
—. „ „ R. resinōsa Sternb.; s. Nr. 1213.
—. „ „ R. coriifolĭa Fr.; s. Nr. 1216.
—. XIII., 1; Mohnpfl.: Chelidonĭum majus L.; s. Nr. 534.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Clemātis viticēlla L.; s. Nr. 535.
—. „ „ Cl. vitālba L.; s. Nr. 2158.
—. „ „ Thalictrum angustifolĭumJacq.; s. Nr. 1217.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Ranuncŭlus acris L.; s. Nr. 399.
—. „ „ R. bulbōsus L.; s. Nr. 465.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Origănum vulgāre L.; s. Nr. 2087.
2187. „ „ Mentha rotundifolĭa L. (M. macrostachy̆a Ten., M. rugōsa Lam., M. suaveŏlens Ehrh.). Rundblättrige Minze. Bltr. sitz., rundl.-eif.; Aehren lineal-walzl.; Fruchtkelch kug.-bauchig; Bl. violet oder lila; 4; 7 bis 9.
2188. XIV., 1; Lippenblümler: Melīssa officinālis L. Gebräuchliche Melisse (Zitronen-M., Herzenstrost, Honigblume, Mutter-, Bienen- oder Wanzenkraut). St. aufr., ästig; Bltr. eif., gekerbt-gesägt; Quirle halbirt, einseitswendig; Bl. weiß; 4; 7 bis 8; ♀; ☼; ⚓; Kr.
—. XIV., 1; Lippenblümler: M. clinopodĭum Benth.; s. Nr. 2108.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Nepĕta cataria L.; s. Nr. 1218.
2189. „ „ N. nepetēlla L. Kleine Katzenminze. Bltr. eilanzettl., gekerbt, beiderf. graufilz.; Bl. weiß, rot-punkt.; Fr. körnigrauh, oben kahl; 4; 7 bis 8; Oe.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Lamĭum maculātum L.; s. Nr. 190.
—. XIV., 1; Lippenblümler: L. album L.; s. Nr. 169.
—. „ „ L. purpurĕum L.; s. Nr. 10.
—. „ „ L. incīsum Willd.; s. Nr. 206.
—. „ „ *Leonūrus cardiăca L.; s. Nr. 1182.
2190. XIV., 1; Lippenblümler: Galeōpsis tetrăhit L. Gemeiner Dann (Hanfnessel, Hohlzahn, Katzengesicht). Kronröhre von oder nicht von Kelchlänge; Mittelzipf. der Unterl.

fast 4eckig, flach; Bl. rot oder weißlich; Bltr. rauhharig; ☉; 7 bis 8; ✕.

2191. XIV., 1; Lippenblümler: G. bifida Boenningh. Ausgerandeter D. Mittelzipf. der Unterl. längl., meist ausgerand., später am Rande zurückgerollt; Bl. fleischrot, mit 2 gelbl. Flecken am Schlunde; Bltr. scharf; ☉; 7 bis 8: ✕.

—. XIV., 1; Lippenblümler: G. versicolor Curt.; s. Nr. 2124.

—. „ „ Stachys sylvatica L.; s. Nr. 1026.

—. „ „ Betonica officinalis L.; s. Nr. 1027.

2192. XIV., 1; Lippenblümler: Marrubium vulgare L. Gemeiner Andorn (Berghopfen, Gottvergessen, Mutterkraut, weiße Leuchte). St. weißfilz.; Bltr. rundl.-eif., runzelig, filz.; Quirle fast kug.; Kelchzähne von der Mitte an kahl, an der Spitze hakig-zurückgerollt; Bl. weiß, flockig; 4; 7 bis 8; ♃.*)

—. XIV., 1; Lippenblümler: Ballota nigra L.; s. Nr. 1219.

—. „ „ B. alba L.; s. Nr. 1220.

—. „ „ Teucrium scorodonia L.; s. Nr. 2090.

—. XIV., 2; Rachenblümler: Digitalis lutea L.; s. Nr. 1221.

—. „ „ Scrophularia nodosa L.; s. Nr. 1069.

2193. XIV., 2; Rachenblümler: Linaria vulgaris Desf. (Antirrhinum linaria L.). Gemeines Leinkraut (Frauenflachs, Waldflachs, gelbes Löwenmaul, Marien- oder Krötenflachs, Sperrkraut, Katarinenblume, Hundsnase). Kahl; Blütenst. drüsigflaumig; Bltr. ohne Ordnung gedrängt-gestellt; Bl. gelb; 4; 7 bis 9; †; ♃; ✕.

—. XV., 1; Kreuzblütler: Capsella bursa pastoris Vent.; s. Nr. 3.

—. XV., 1; Kreuzblütler: Lepidium sativum L.; s. Nr. 1223.

—. „ „ L. ruderale L.; s. Nr. 1224.

—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranium pyrenaicum L.; s. Nr. 477.

—. XVI., 2; Schnabelpfl.: G. pusillum L.; s. Nr. 537.

—. „ „ G. dissectum L.; s. Nr. 538.

—. „ „ G. molle L.; s. Nr. 539.

2194. „ „ G. divaricatum Ehrh. Ausge-

*) Diese Arzneipflanze ist überall in Europa, auch in Mittelasien, Mexiko und Brasilien verbreitet. Die Alten gebrauchten den Saft in Verbindung mit Honig und Myrrhe als Heilmittel gegen Lungenschwindsucht!

spreizter Kranichschnabel. St. schlaff, meist niederliegend, absteh.-kurzharig; oberste Bltr. 3spalt., der eine Seitenlappen länger; Krbltr. verk.-herzf., hellrosenrot; Klappen querrunzel., kurzharig; ☉; 7 bis 8; ↕; Bö., K. S., Schl., Brd.; in Sa. und Th. verwildert.

—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Erodium moschātum Ait.; s. Nr. 540.

2195. XVI., 5; Pappelrosenpfl.: Althaea hirsūta L. (Axolŏpha hirs. Alfld.). Rauhhariger Eibisch. St. und Bltr. wagr.-absteh.-behart; untere Bltr. nierenf., 5lapp., mittl. handf., obere tief-3spalt.; Bl. rosenrot; ☉; 7 bis 8.

2196. XVI., 5; Pappelrosenpfl.: A. cannabĭna L. Hanfblättriger E. St. aufr., ästig, nebst den Bltrn. von angedr., kurzen Sternharen schärfl.; untere Bltr. handf.-5theil., mittl. 5fing., obere 3zäl.; Blbltr. verk.-keilf., rosenrot; 2↓; 7 bis 9; De., Kr.

—. XVI., 5; Pappelrosenpfl.: Malva sylvēstris L.; s. Nr. 1225.

—. „ „ Lavatēra thuringiăca L.; s. Nr. 2092.

—. XVII., 2; Erdrauchpfl.: Fumarĭa capreolāta L.; s. Nr. 541.

—. „ „ Corydălis claviculāta Pers.; s. Nr. 1029.

—. XVII., 3; Bitterling: Polygăla vulgāris L.; s. Nr. 467.

2197. XVII., 4; Hülsenpfl.: Melilōtus alba Lamk. (M. vulgāris Willd., M. alba argūta Rchb., M. leucānthus Koch, M. leucāntha major Koch, Trifolĭum melil. officinālis var. b. L.). Weißer Steinklee (Meliloten-klee, Riesen- oder Wunderklee). St. aufr.; Bl. weiß; Hülse stachelsp., netzig-runzelig, kahl; Flügel fast von Schiffchenlänge, viel kürzer als die Fahne; ♂; 7 bis 8.*)

—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Trifolĭum ochroleucum L.; s. Nr. 1140.

—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Ervum tetraspērmum L.; s. Nr. 1125.

—. „ „ E. hirsūtum L.; s. Nr. 1227.

—. „ „ Vicĭa cracca L.; s. Nr. 1228.

—. „ „ V. angustifolĭa Roth; s. Nr. 1230.

—. „ „ Lathўrus platyphўllos Retz.; s. Nr. 2093.

2198. XVII., 4; Hülsenpfl.: L. tuberōsus L. Knollige

*) Diese Pflanze wird bis 2 m. hoch und ward im Jahre 1828 von Greiz aus als weißer amerikanischer Riesenklee (Bockhara-, bucharischer oder Wunderklee) als die beste, die Luzerne ersetzende Kleeart auf magern Boden empfohlen und der Same theuer bezalt. Der Wert ist jedoch sehr gering!

Kichererbse (Erdnüßchen, Ackereichel, Erdmandel, knollige Platterbse, Schweinsbrot, Saukastanie, Erdkraut). Kahl; Wrzstock an den Gelenken mit haselnußgroßen Knollen; Bltr. 1parig; Blütentrauben reichblüt.; Bl. purpurrot; 4; 7 bis 8; ×.

—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hypericum perforātum L.; s. Nr. 2068.

—. XVIII., 2; Hartheupfl.: H. montānum L.; s. Nr. 1037.

—. „ „ H. hirsūtum L.; s. Nr. 2070.

—. XIX., 1; Korbblütler: Lactuca perēnnis L.; s. Nr. 1231.

—. „ „ Helminthia echioīdes Gaertn.; s. Nr. 1232.

—. XIX., 1; Korbblütler: Lampsāna commūnis L.; s. Nr. 1128.

2199. XIX., 1; Korbblütler: Lappa minor DC. (L. glabra var. a. Lmk., Arctium minus Schk.). Kleine Klette Roß- oder Spinnen-K., Bettlersläuse). Hauptk. meist etwas spinnwebig-zott., innere Bltchn. an der Spitze purpurn; Bl. purpurn, selten weiß; ♂ bis 4; 7 bis 8; ⅄.

2200. XIX., 1; Korbblütler: L. major Gaertn. (L. officinālis All., L. glabra var. b. Lmk., Arctium lappa var. a. L.). Große K. Hülle fast immer kahl; Bltchn. des Hauptk. sämmtl. grün, pfrieml. und hakenf., innere zuletzt stralend, nicht hakensp.; Bl. purpurn; 4; 7 bis 8; ×; ⅄.*)

2201. XIX., 1; Korbblütler: L. tomentōsa Lmk. (Arctium lappa var. b. L., Arctium bardāna Willd., A. tomentōsum Schk.). Filzige K. Hauptk. stark-spinnwebig-wollig, innere Bltchn. lineal-lanzettl., stumpfl., mit aufgesetztem, gradem Stachelspitzchen, gefärbt; Bl. purpurn; 4; 7 bis 8; ⅄.

—. XIX., 1; Korbblütler: Carduus crispus L.; s. Nr. 2099.

—. „ „ C. acanthoīdes L.; s. Nr. 1233.

2202. „ „ Onopōrdon acanthium L. Gemeine Krebsdistel (Esels-, Weg-, Frauen-, Krampf- oder Wolldistel, Zellblume). St. etwas wollig, durch die herablauf. Bltr. sehr breit-geflüg.; Bltr. ellipt.-längl., buchtig, spinnwebig-wollig, stachelsp.; Bl. purpurn bis weiß; ♂; 7 bis 9; früher ⅄.**)

---

*) Hierbei ist der Schwindel mit dem vermeintlichen „Klettenwurzelöl" zu erwähnen. Die Klettenwurzeln enthalten durchaus kein Oel, und auch die Destillation bringt kein Produkt hervor, das dem Haarwuchse förderlich wäre!

**) Der ausgepreßte Saft der frischen Blätter dieser Pflanze dient noch jetzt als Hausmittel auf Geschwüre, besonders auf krebsartige. Uebrigens ist diese Distel ein leckeres Futter für Esel. — O. illyricum L. (O. elongatum

—. XIX., 2; Korbblütler: Senecĭo erucaefolĭus Huds.; ſ. Nr. 2100.

2203. XIX., 2; Korbblütler: S. barbareaefolĭus Krock. (S. erratĭcus Bertol.). Geſpreiztäſtiger Baldgreis. Obere Bltr. mit getheilten Oehrchen halb-umfaſſ.; ſeitenſt. Fiedern weit-abſteh., verk.-eif.-längl.; Ebenſtrauß weit-abſteh.; Bl. gelb; ♂; 7 bis 8; Schl., Brd., Po., Pſ., Pr., Rh., Kr., Ty.

2204. XIX., 2; Korbblütler: Carpesĭum cernŭum L. Ueberhängende Kragenblume. Köpfchen gipfelſt., einzeln, langgeſtielt, überhäng.; St. aufr., ſtreifig, äſtig, weichharig bis zott.; Bltr. längl.-lanzettl., ſtumpf, ſtachelſp.; Bl. blaßgelb; ☉ bis ♂; 7 bis 8; Oe., Kr.

2205. XIX., 2; Korbblütler: Artemisĭa vulgāris L. Gemeiner Beifuß (Himmelskehr, -kuh, Johannis- oder Sonnenwendgürtel, Männerkrieg, roter Bock, Jungfer-, Weiber- oder Mutterkraut, wilder Wermut). St. aufr., äſtig, zuletzt riſp.; Bltr. fiederſpalt., mit lanzettl., zugeſp., meiſt eingeſchn. oder geſägten Zipf.; Bl. gelb; 4; 8 bis 9; ♆; ☲.

2206. XIX., 2; Korbblütler: Matricarĭa inodōra L. (Chrysanthĕmum inodōrum L. spec., Pyrĕthrum inod. Sm., Tripleurospērmum inodōrum C. H. Schultz bip.). Geruchloſe Kamille (wilde K., Kuhdill, Hundsauge). Bltr. 2- bis 3fach-fiederſpalt., Zipf. lineal-fädlich; der ächten K. ſehr ähnlich, aber geruchlos oder nur krautig-riechend; ☉; 7 bis 9; ✕.*)

—. XIX., 2; Korbblütler: Achillēa millefolĭum L.; ſ. Nr. 2101.

2207. „ „ Inŭla helenĭum L. Aechter Alant (wahrer A., Bruſt-A., Helenenkraut, großer Heinrich, Odenskopf). Bltr. ungleich-gezähnt, unterſ. filz., ſtengelſt. herzeif., umfaſſ.; Bl. gelb; Köpfchen wenige; äußere Hüllblttchn. eif., innere lineal., ſpaltelſ.; 4; 7 bis 8; ☨; ♆; ☲.**)

—. XIX., 2; Korbblütler: Solidāgo virga-aurĕa L.; ſ. Nr. 2077.

—. „ „ Bellis perēnnis L.; ſ. Nr. 2.

Lmk.) kommt in Krain vor und hat breit-eiförmige, zugeſpitzt-dornige Hüllblättchen.

*) Eine meiſt als Art aufgeführte Form mit ſtärker- und weiter-verästeltem Stengel und kurzen, dicken Blattfetzen iſt M. salina Wallr. (M. maritima L. spec. der Dünen)!

**) Plinius rühmt die Wirkung des Helenium, worunter indeß wol der graue Timian (Thymus incanus Sibth.) zu verſtehen iſt, als Mittel zur Erhaltung der Schönheit der Frauen, da nach der Fabel Helenium aus den Thränen der Helena, der Koryphäe der griechiſchen Schönheit, entſtanden und von der Inſel Helenium, jetzt Makroniſon, am kräftigſten wirken ſoll, wo jedoch Sibthorp dieſe Pflanze nicht fand!

2208. XIX., 4; Korbblütler: *Calendŭla officinālis L. Gebräuchliche Ringelblume (Gold-, Todten-, Stink-, goldene Butterblume, Sonnenwand, Weckbrösele). Bltr. längl.-verk.-eif., vorn verbreit.; Achänen meist kahnf.; Bl. goldgelb; ⊙; 7 bis 10; ‡; ♃; ×; Vaterland: Südeuropa.

—. XX., 1; Orchidee: Cephalanthēra rubra Rich.; s. Nr. 1087.

—. XX., 1; Orchidee: Listēra ovāta R. Br.; s. Nr. 1061.

2209. XX., 5; Osterluzeipfl.: Aristolochĭa clematītis L. Gemeine Osterluzei (Wolfsapfel, Biberwurz). St. einfach, aufr.; Bltr. eif., tief-herzf., kahl; Bl. in Büscheln blattachselst., gelb; ♃; 7 bis 8; ♃.

—. XXI., 1; Giftmilcher: Euphorbĭa salicifolĭa Host; s. Nr. 473.

—. XXI., 4; Nesselpfl.: Urtīca dioĭca L.; s. Nr. 2102.

—. " " U. urens L.; s. Nr. 1234.

—. XXI., 5; Meldenpfl.: Atrĭplex angustifolĭum Sm.; s. Nr. 2159.

2210. XXI., 5; Meldenpfl.: A. hastātum L. (A. laciniātum L. fl. suec., A. triangulāris Willd., A. calothĕca Fr.). Deltablättrige Melde. Untere Bltr. fast 3eck.-pfeilf., tief-buchtig-gezähnt; Blütenh. zur Fruchtzeit herzf.-3eck., eingeschn.-gezähnt, Zähne pfrieml.-zugesp.; ⊙; 7 bis 10.

2211. XXI., 5; Meldenpfl.: A. patŭlum L. (A. latifolĭa Whlbg., A. ruderālis Wallr., A. angustifolĭum Sm.). Ausgebreitete M. Bltr. lanzettl., untere 3eck.-spießf., langzugesp., mittl. trapezoidisch-spießf.; Blütenh. zur Fruchtzeit spieß-rautenf.; ⊙; 7 bis 10.

—. XXI., 9; Kürbispfl.: Bryonĭa alba L.; s. Nr. 1235.

—. " " B. dioĭca L.; s. Nr. 1236.

—. XXII., 5; Nesselpfl.: Humŭlus lupŭlus L.; s. Nr. 2103.

a. An nassen, feuchten Stellen:

2212. II., 1; Rachenblümler: Veronīca longifolĭa L. Langblättriger Ehrenpreis. Lichtgrün; Bltr. herz- oder eilanzettl., ungleich- oder dopp.-, spitz- und scharfsägezähn., an der Basis ganzrand.; Aehre zieml. lockerblüt.; Bl. blau, zuweilen in's Rötliche; Bltr. zu 2 und 4 entgegengesetzt, gekielt; ♃; 7 bis 8; ‡.

Varirt: V. crenulāta Hoffm. (Stglbltr. zu 2, lanzettl., an der Basis kurz-keilig-gestielt, ganzrand. zulaufend; Aehre locker, großblüt.; Blankenburg a. H.), V. medĭa Schrad. (Stglbltr. zu 2 bis 3, lanzettl., langzugesp., an der Basis

ungleichseitig-keilf., ganzrand., in den kurzen Stiel verlauf.), V. spuria L. (V. paniculāta L., V. foliōsa W. et K.; Bltr. unten zu 2, einfach- oder fast dopp.-gesägt, Trauben zieml. locker; Th., Sa., Harz, Bö.), V. alternifolia Lej. (Stglbltr. unten zu 2, gegen-, oben wechselst., lanzettlineal., langgestielt; Aehre weniger locker), V. maritima L. (Bltr. schmal, an der Basis abgerundet, zu 2 bis 4, gegenst., lang-gestielt; Aehre gedrängtblütig), V. longifolia L. (Bltr. scharf-dopp.-gesägt; Traube sehr gedrungen).

—. III., 2; Graspfl.: Aira caespitōsa L.; s. Nr. 1237.

—. V., 1; Borretschpfl.: Symphytum officināle L.; s. Nr. 548.

—. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygŏnum hydropiper L.; s. Nr. 2117.

—. VIII., 1; Knöterichpfl.: P. minus Huds.; s. Nr. 2118.

—. XIV., 1; Lippenblümler: Stachys ambigŭa Sm.; s. Nr. 1238.

2213. XIV., 1; Lippenblümler: Mentha arvēnsis L. Feldminze. Bltr. gestielt; Bl. in blattachselst., entfernt-steh. oder oben genäherten Quirlen; Kzähne 3eck.-eif., so lang als breit; Bl. violet, blaßpurpurn oder lila, meist behart; K. mit gelben Oelpunkten, meist purpurn; 4; 7 bis 9; ×.

Varirt: M. satīva L. (Kelchzähne 3eck.-lanzettl., zugesp.), M. gentīlis L. (M. rubra Sm., M. pratēnsis Sol.; K. glock., mit spitzen, oben beharten Zähnen; Bl. kahl), M. dentāta Roth (Bltr. eif., blasig-wogig; K. und Blütenst. an der Basis kahl), M. parviflōra Schultz (Bl. wenig länger, als die Kzähne; Stbgf. kürzer als die Kr.), M. vulgāris (M. arvēnsis L.; St. rauhharig; Bltr. durchsichtig-punkt.; K. glock., ganz rauhharig).

—. XV., 1; Kreuzblütler: Cochlearia armoracia L.; s. Nr. 1222.

—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranium robertiānum L.; s. Nr. 431.

2214. XVI., 5; Pappelrosenpfl.: Althaea officināls L. Gebräuchliche Eibisch (Ibisch, Althee, Sammtpappel, weiße Pappel). St. aufr., filz.-zott.; Bltr. beiders. dicht-sammetfilz., untere 5-, obere 3lapp.; Bl. rötlich-weiß; 4; 7 bis 8; ☥; ☿; ♃.

—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Lotus corniculātus L.; s. Nr. 1239.

—. „ „ Lathyrus pratēnsis L.; s. Nr. 1240.

—. „ „ L. sylvēstris L.; s. Nr. 1036.

—. „ „ Senecio doria L.; s. Nr. 2126.

b. In feuchtem Gebüsch:

—. V., 1; Veilchenpfl.: Viŏla persicifolĭa Schk.; s. Nr. 426.
—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: Epilobĭum hirsūtum L.; s. Nr. 1053.
—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: E. montānum L.; s. Nr. 2120.
2215. " " E. tetragōnum L. (E. adnātum Griseb., Chamaenerĭon obscūrum Schreb.). Vierkantiges Weidenröschen. St. geflüg.-4kant.; Bltr. lanzettl., mittl. mit jedem der beiden Ränder bis zum nächsten Pare gesondert herablauf.; Bl. klein, rosenrot; 4; 7 bis 8.

Varirt: E. molle (rauhharig und zottig), E. obscūrum Rchb. (Bltr. mattgrün, Fortsätze derselben am St. sich vereinigend und denselben 2leistig machend), E. schmidtiānum Rostkov. (St. minder 4kant.).

2216. X., 3; Nelkenblütler: Stellarĭa longifolĭa Fr. (St. frieseāna Ser.). Langblättriges Vogelkraut. St. oberw. rauh; Bltr. lanzettl.-lineal., am Rande und auf der Mittelrippe rauh; Deckbltr. trockenhäutig; Bl. weiß; 4; 7; Mä., Schl., Pr., Th., Lauenburg.
—. X., 5; Nelkenblütler: Lychnis flos cucŭli L.; s. Nr. 462.
—. " " Malachĭum aquatĭcum Fr.; s. Nr. 1241.
—. XI., 1; Weiderichpfl.: Lythrum salicarĭa L.; s. Nr. 1242.
—. XII., 3; Rosenpfl.: Comărum palūstre L.; s. Nr. 1243.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Barbaraea vulgāris R. Br.; s. Nr. 550.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Cardamĭne impatĭens L.; s. Nr. 421.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Sisymbrĭum strictissĭmum L.; s. Nr. 1246.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum pratēnse L.; s. Nr. 1244.

c. In und unter Weidengebüsch:

2217. IV., 1; Krapppfl.: Galĭum spurĭum L. Bastard-Labkraut. Bltr. zu 4 bis 6, verk.-lanzettl. bis lineal., in den Grund verschmäl., vorn stumpf, nicht stachelsp., obers. glänz., kaum behart, unters. auf den Nerven kahl, am Rande schwach-rückw.-hakerig; Bl. weiß; Fr. nierenf., kahl, feinwarzig; ☉; 7 bis 9.
—. VI., 3; Knöterichpfl.: Rumex obtusifolĭus L.; s. Nr. 2104.
2218. XIV., 1; Lippenblümler: Mentha sylvēstris L. Waldminze (wilde M., Roß-M., Marien- oder Frauenblatt). Bltr. fast sitz.; Aehren lineal-walzl.; Fruchtk. bauchig,

oberw.=eingeſchnürt; Bl. klein, violet oder lila; 4; 7 bis 9; ☽.

Varirt: M. sylvēstris Auct. (Bltr. unterſ. dichtfilz., oberſ. angedr.=weichharig, lanzettl. oder eilängl., ſpitz, kurz=geſtielt), M. velutīna Lej. (Bltr. eif., ſitz., oberſte rundl.=eif.), M. canēscens Roth (M. incana Willd.; St. und die etwas gefalt. Bltr. unterſ. lockerfilz.), M. brittingēri Opitz (Bltr. lanzettl., flach, entfernt=angedr.=ſägezähn., unterſ. lockerfilz., oberſ. ſparſam=angedr.=weichharig), M. nemorōsa Willd. (St. und Unterſeite der längl.=eif., breiten Bltr. angedr.=filz.), M. undulāta Willd. (filz.; Bltr. runzel., eingeſchn.=gezähnt), M. crispāta Schrad. (M. hercynĭca Roehl., Krauſeminze; Bltr. faſt ſitz., ei= oder lanzettf., blaſig=runzelig; ♀, ☽), M. balsamĭna Willd. (Aehre kurz, endl. unterbrochen; Bltr. eif., kurz=geſtielt, nur auf den Blattadern filz.), M. virĭdis L. (grüne M.; St. und die lanzettl., ſpitzen, faſt ſitz., an der Baſis keilf. Bltr. beiderſ. kahl; Blütenſt. und Kelchröhre faſt kahl; ☽).

2219. XIX., 2; Korbblütler: *Solidāgo glabra Desf. Kahle Goldrute. Kahl, aufr.; untere Bltr. lanzettl., obere lineal=lanzettl., ſämmtl. langzugeſp., dicht=gewimp., 3nervig; Blütentrauben einſeitswendig, ſich aufrollend; Bl. gelb; 4; 7 bis 9; Bd. (Vögisheim); Vaterland: Nordamerika.

d. Unter Gebüſch:

2220. V., 1; Glockenblümler: Phyteuma canēscens W. et K. Grauer Teufelskrallen. St. einfach, traubig; Bltr. ſpitz, etwas graulich, ſcharfrand.; Bl. in 1blüt., 2= bis 3=kant. Zymen, eine äſtige Traube und ſelbſt Riſpe bildend, blau oder lila; 4; 7 bis 10; St.

—. V., 2; Doldenpfl.: Torĭlis heterophȳlla Guss.; ſ. Nr. 1245.

—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: Epilobĭum parviflōrum Schreb.; ſ. Nr. 2119.

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Vicĭa tenuifolĭa Roth; ſ. Nr. 1229.

—. „ „ Lathȳrus heterophȳllus L.; ſ. Nr. 2067.

2221. XIX., 1; Korbblütler: Crepis pulchra L. Schöne Grundfeſte. Untere Bltr. ſchrotſägef., mittl. lanzettl.; Riſpe gleich hoch, nackt; Hauptk. ganz kahl; äußere Kbltr. ſehr kurz, eif., angedr.; Bl. gelb; ☉; 7 bis 8; Mittelrhein, Luxemburg.

2222. XIX., 2; Korbblütler: Inŭla salicĭna L. Weidenblättriger Alant. St. faſt kahl, 1= bis mehrköpf., faſt

ebensträußig; Bltr. lanzettl., zugesp., meist ganzrand., fast kahl, obere herzf.-umfass.; Bl. gelb; Köpfe zieml. groß; 4; 7 bis 9.

e. In Gebüsch an fließenden Gewässern:

2223. IV., 1; Krapppfl.: Asperŭla aparīne M. B. (A. rivalis Sibth.). Klebender Waldmeister. Bl. rispig; Blkr. radf., weiß; Fr. körnig; Deckbltr. unbewimp.; Bltr. lanzettl., meist 8ständ., am Rande und Kiele rauh; 4; 7 bis 9; Mä., Schl., Pr.*)

—. V., 1; Schnabelpfl.: Impatĭens noli tangĕre L.; s. Nr. 2114.

—. XV., 2; Kreuzblütler: Erysĭmum hieracifolĭum L.; s. Nr. 551.

—. XV., 2; Kreuzblütler: Sisymbrĭum strictissĭmum L.; s. Nr. 1246.

f. An Gebüschen:

2224. V., 1; Glockenblümler: Campanŭla bononiēnsis L. (C. thaliāna Wallr.). Bologneser Glockenblume. St. aufr., stielrund, weichharig; Bltr. kerbig-gesägt, unters. graufilz., untere herzf., lang-gestielt, obere eif., zugesp., sitz.; Kelchzipf. lanzettl.; Bl. blau; 4; 7 bis 8; Bö., Schl., Th., Sa., Brd., M., Po., Pf., Pr. u. s. w.

g. In trocknen Gebüschen:

—. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus armerĭa L.; s. Nr. 2133.

h. In Gebüschen auf Sandboden:

—. XIV., 2; Rachenblümler: Digitālis ambigŭa Murr.; s. Nr. 1024.

i. An Hecken neben Gärten:

—. V., 2; Meldenpfl.: *Chenopodĭum ambrosioīdes L.; s. Nr. 1247.

—. XXII., 4; Meldenpfl.: *Spinacĭa oleracĕa L.; s. Nr. 556.

—. „ „ *Sp. inērmis Mnch.; s. Nr. 557.

E. An und auf Mauern, Lehmwänden, Ruinen, Dächern und dergl.: §. 482.

—. II., 1; Rachenblümler: Veronīca arvēnsis L.; s. Nr. 64.

—. „ „ V. polita Fr.; s. Nr. 61.

*) Diese Pflanze ist neuerlich bei Frankfurt a. d. O. nicht wieder gefunden worden und deshalb daselbst wol nicht einheimisch, da die von dort stammenden Exemplare eine Blumenkrone mit langer Röhre hatten!

—. II., 1; Lippenblümler: Salvĭa pratēnsis L.; ſ. Nr. 1101.
—. III., 1; Schwertelpfl.: Iris sambucĭna Vahl; ſ. Nr. 605.
—. III., 2; Graspfl.: Bromus sterĭlis L.; ſ. Nr. 1351.
—. „ „ B. inērmis L.; ſ. Nr. 1277.
—. „ „ Poa comprēssa L.; ſ. Nr. 1278.
—. „ „ Koelerĭa cristāta Pers.; ſ. Nr. 608.
—. „ „ Hordĕum murīnum L.; ſ. Nr. 1280.
—. „ „ Lolĭum perēnne L.; ſ. Nr. 1281.
—. IV., 1; Neſſelpfl.: Parietarĭa officinālis L.; ſ. Nr. 2171.
2225. „ „ P. ramiflōra Mnch. (P. diffūsa Koch, P. judaĭca L.?). Ausgebreitetes Wandkraut. St. ausgebreit., äſtig; Bltr. eif.; Blütenh. der ♂ zuletzt verläng., dopp. ſo lang als die Stbf.; Gabelriſpen knäuelf., blattachſelſt.; 4; 7 bis 10; Rh., W., Hn., Ha., K. S., Sa.
—. V., 1; Nachtſchattenpfl.: Hyoscyămus niger L.; ſ. Nr. 1195.
—. V., 1; Nachtſchattenpfl.: *Datūra stramonĭum L.; ſ. Nr. 1253.
—. V., 1; Nachtſchattenpfl.: *Solānum nigrum L.; ſ. Nr. 1254.
—. „ Borretſchpfl.: Echĭum vulgāre L.; ſ. Nr. 1108.
—. „ „ Echinospērmum lappŭla Lehm.; ſ. Nr. 1286.
2226. V., 1; Borretſchpfl.: E. squarrōsum Rchb. Sperrig-äſtiger Igelſame. Dichtzottig, ſchmutzig-dunkelgrün; Aeſte ſperrig-ſteif-abſteh.; Blütenſt. zur Fruchtzeit kurz, abſteh.; Fr. mit an der Baſis faſt freien, widerhak. Stacheln, im Mittelfelde braun-knötig; Bl. blau; ☉ bis ♂; 7 bis 9.
2227. V., 1; Glockenblümler: Campanŭla pyramidālis L. Pyramidenförmige Glockenblume. Blütenäſte kurz, gedrängt, blattachſelſt.; Bltr. knorp.-ſägezähn., grundſt. herz-eif., mittl. eif., obere ellipt.-lanzettl.; Kr. weit-trichterig, faſt halb-5ſpalt., eif.-gelappt, violet bis weiß; Kapſ. an der Baſis aufſpring.; ♂; 7 bis 8; ↕; Kr.
—. V., 1; Glockenblümler: C. rapunculoīdes L.; ſ. Nr. 3002.
—. „ Nebenpfl.: *Ampelōpsis quinquefolĭa R. et Sch.; ſ. Nr. 2174.
2228. V., 2; Meldenpfl.: Chenopodĭum rubrum L. (Orthospŏrum crassifolĭum Mey., Blitum crassif. Rchb., Blitum rubr. Rchb., Agathophўtum rubr. Rchb., Orthospŏrum rubr. P. M. E.). Roter Gänſefuß (Neunſpitzen). St. meiſt rot angelaufen; Bltr. glänz., buchtig-gezähnt, rautenf.-3eck., faſt ſpießf.-3lapp.; Samen auf- und wagrecht; ☉; 7 bis 9.

—. V., 2; Meldenpfl.: Ch. glaucum L.; ſ. Nr. 1292.
2229. „ „ Ch. hybrĭdum L. Stechapfelblättriger G. (unächter oder Baſtard-G., Sautod). Trugdolden riſp.; Bltr. herzf., tief-buchtig-eckig; Samen grubig-punkt.; K. mehlig; ☉; 7 bis 9.
2230. V., 2; Meldenpfl.: Ch. murāle L. Mauer-G. Bltr. rauten-eif., glänz., die keilf. Baſis ganzrand., ſonſt ſpitzig-ſägezähn.; Trugdolde ausgeſpreizt, blattachſelſt.; Samen matt; ☉; 7 bis 8.
2231. V., 2; Meldenpfl.: Ch. album L. Gemeinſter G. (weißer G., gemeine oder Schißmelde). Bltr. rauten-eif., glanzlos; Trauben gipfel- und blattachſelſt., aufr.; Samen glatt, glänz.; Pfl. mehlig-beſtäubt; ☉; 7 bis 9; ✕.
—. V., 2; Meldenpfl.: Ch. botrys L.; ſ. Nr. 1352.
2232. „ „ Ch. vulvarĭa L. (Ch. olĭdum Curt., Ch. foetĭdum Lam.). Stinkender G. (Bocksmelde). Bltr. rauten-eif., graumehlig; Samen glänz., fein-punkt.; Aehren gipfel- und blattachſelſt., unbeblätt.; Pfl. übelriechend; ☉; 7 bis 8.
2233. V., 2; Meldenpfl.: Ch. polyspērmum L. Vielſamiger G. (Fiſchmelde). Bltr. eif., kahl; fruchttrag. Blütenh. abſteh.; Samen glänz., fein-punkt.; St. mit kriſtallenen Drüſen beſetzt; Pfl. ohne beſond. Geruch; ☉; 7 bis 8.
Varirt: vulgāre (polysp. d. Aut., cymōso-racemōsum Koch; St. ligend; Bltr. eif.-ſtumpfl.; Bl. in lockeren, harſtieligen Gabelriſpen oder Skorpionzymen ausgeſperrt), Ch. acutifolĭum Kitt. (spicāto-racemōsum Koch; St. aufr.; Bltr. eif. bis lanzettl., ſpitz; Bl. in mehr oder weniger gedrängten Trauben).
—. V., 2; Doldenpfl.: Chaerophўllum temŭlum L.; ſ. Nr. 1177.
—. V., 2; Doldenpfl.: Aethūsa cynapĭum L.; ſ. Nr. 2178.
—. VI., 3; Knöterichpfl.: Rumex scutātus L.; ſ. Nr. 610.
—. X., 1; Rautenpfl.: Tribŭlus terrēstris L.; ſ. Nr. 1353.
—. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus caryophўllus L.; ſ. Nr. 1354.
2234. X., 2; Nelkenblütler: Gypsophīla murālis L. Mauer-Gipskraut. St. ſteif-aufr., faſt gabel-ſpalt., äſtig-riſp.; Bl. zerſtreut, hellpurpurn, dunkler-geadert: ☉; 7 bis 9; ✕.
Varirt: G. murālis Hayne (Aeſte aufr.-abſteh.; Blbltr. gekerbt), G. serotīna Hayne (Aeſte geſpreizt; Blbltr. ausgerandet).
—. X., 3; Nelkenblütler: Cucubălus baccifĕrus L.; ſ. Nr. 2186.

—. X., 3; Nelkenblütler: Alsine tenuifolia Whlbg.; ſ. Nr. 1355.
—. „ „ Spergularia rubra Presl.; ſ. Nr. 576.
—. X., 5; Dickblattpfl.: Sedum telephium L.; ſ. Nr. 2142.
—. „ „ S. album L.; ſ. Nr. 2572.
—. „ „ S. annuum L.; ſ. Nr. 1356.
—. „ „ S. acre L.; ſ. Nr. 1298.
—. „ „ S. dasyphyllum L.; ſ. Nr. 1357.
2235. „ „ S. reflexum L. Zurückgekrümmte Fetthenne. Bltr. lineal-pfrieml., kurz-ſtachelſp., an der Baſis unter der Anheftungsſtelle mit kurzem, ſtumpfl. Anhängſel; Trugdolde kahl; Kzipfel ſpitz; Bl. gelb; 2; 7 bis 8.

Varirt: S. rupestre L. (Bltr. bläulichgrün oder hechtblau; Form der Felſen und Nadelwälder), S. crassicaule Lk. (Bltr. hellgrün; Form ſteiniger Gebirgswaldungen), S. reflexum DC. (Blbltr. ſternf.-auseinanderſtehend), S. anopetalum DC. (S. rupestre Dill.; Bltr. der Bl. aufr.; fette Kalkform), S. viride Koch (S. reflexum L., Tripmadam; Bltr. lebhaft grün; ‡).

—. XI., 3; Waupfl.: Reseda luteola L.; ſ. Nr. 1299.
—. XI., 5; Dickblattpfl.: Sempervivum sobolifer um Sims.; ſ. Nr. 2167.
2236. X, 5; Dickblattpfl.: S. tectorum L. Dach-Hauslauch (Hauslaub, Haus- oder Dachwurz, Wunderbar, Donnerbart, -blatt, -grün, -bohne, -beſen). Roſettenbltr. plötzl. ſtachelſp., kahl, wimperrand.; Bl. roſenrot; 2; 7; ‡; A.
—. XII., 3; Roſenpfl.: Geum urbanum L.; ſ. Nr. 1077.
—. „ „ Potentilla anserina L.; ſ. Nr. 578.
—. „ „ P. argentea L.; ſ. Nr. 464.
—. „ „ Rubus caesius L.; ſ. Nr. 443.
—. XIII., 1; Mohnpfl.: Chelidonium majus L.; ſ. Nr. 534.
—. „ „ Glaucium luteum Scop.; ſ. Nr. 1502.
—. „ Kappernpfl.: Capparis spinosa L.; ſ. Nr. 1358.
—. „ „ C. ovata Desf.; ſ. Nr. 1359.
2237. XIV., 1; Lippenblümler: Hyssopus officinalis L. Gebräuchlicher Iſop. Bltr. ſchmal-lanzettl., ganzrand.; Bl. quirlig-traubig, einſeitswendig, dunkelblau, ſelten weiß; ♄; 7 bis 8; ♃; ♃; ‡; ♈; De., Kr.*)

*) Der bibliſche Iſop oder Eſop des Salomo iſt nur wegen des ähnlich klingenden Namens und des Wachsthums auf Mauern für den Hiſop der Griechen genommen. Iſop bedeutet heiliges, von den Juden zu Reinigungsſprengungen gebrauchtes Kraut. — Die Pflanze wächſt übrigens nicht in Griechenland weshalb Sprengel den ὔσσωπος des Dioskorides auf ein Origanum bezieht!

—. XIV., 1; Lippenblümler: Nepĕta cataria L.; ſ. Nr. 1218.
—. „ „ N. nepetella L.; ſ. Nr. 2189.
—. „ „ Lamium album L.; ſ. Nr. 169.
—. „ „ *Leonurus cardiaca L.; ſ. Nr. 1182.
2238. „ „ Galeopsis ochroleuca Lmk. (G. grandiflora Roth). Gelblichweißer Daun. Stengelſt. Blr. eif., aſtſtänd. eilanzettl.; Oberl. der Blkr. eingeſchn.-gezähnelt; St. mit weichen, abwärts-angedr. Haren beſetzt; Bl. gelblichweiß; ☉; 7 bis 9; ✕; ♃ (Lieber'ſcher Bruſtthee!).
—. XIV., 1; Lippenblümler: G. tetrahit L.; ſ. Nr. 2190.
—. „ „ Ballota nigra L.; ſ. Nr. 1219.
2239. „ „ Teucrium chamaedrys L. Edel-Gamander (gemeiner G., Frauenbiß, Kalenderkraut). Blr. geſtielt, längl., keilf. in den Blattſt. verlauf.; Quirle 4blüt., traubig; Bl. purpurn oder weiß; 2; 7 bis 9.
Varirt: glabra (Blr. und K. kahl), pubescens (Blr. weich-, K. langharig, desgl. die Kronbaſis), foliosa (Blblr. kaum kleiner als die Stglblr.), bracteata (Blblr. klein, eif., deckblattartig).
—. XIV., 2; Rachenblümler: Antirrhinum majus L.; ſ. Nr. 1091.
—. „ „ Linaria cymbalaria Dill.; ſ. Nr. 1360.
2240. XIV., 2; Rachenblümler: L. striata DC. (Antirrhinum repens et monspessulanum L.). Geſtreiftes Leinkraut (Stalkraut). Kahl; Blr. ſchmal-lanzettl., auch lineal., untere quirlig, obere zerſtreut; Traube locker; Bl. bläulich, violet-geſtreift; Samen eif., 3kant., flügellos; 2; 7 bis 8; Pr. (Danzig), E.*)
—. XIV., 2; Eiſenkrautpfl.: Verbena officinalis L.; ſ. Nr. 1304.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Lepidium sativum L.; ſ. Nr. 1223.
—. „ „ L. ruderale L.; ſ. Nr. 1224.
—. „ „ L. graminifolium L.; ſ. Nr. 1308.
—. XV., 2; „ Erysimum suffruticosum Spr.; ſ. Nr. 589.
—. XV., 2; Kreuzblütler: E. hieracifolium L.; ſ. Nr. 551.
—. „ „ Sisymbrium sophia L.; ſ. Nr. 591.
—. „ „ S. loeselii L.; ſ. Nr. 1312.
—. „ „ S. austriacum Jacq.; ſ. Nr. 613.
—. „ „ S. officinale Scop.; ſ. Nr. 1361.

*) Zwiſchen L. vulgaris Desf. und L. striata DC. iſt auf Helgoland ein Baſtard beobachtet!

—. XV., 2; Kreuzblütler: Diplotāxis tenuifolĭa DC.; ſ. Nr. 1313.
—. XV., 2; Kreuzblütler: D. murālis DC.; ſ. Nr. 1314.
—. „ „ Erucāstrum obtusangŭlum Rchb.; ſ. Nr. 1362.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum pusīllum L.; ſ. Nr. 537.
—. „ „ G. rotundifolĭum L.; ſ. Nr. 560.
—. „ „ G. columbīnum L.; ſ. Nr. 675.
—. „ „ G. dissēctum L.; ſ. Nr. 538.
—. „ „ G. robertiānum L.; ſ. Nr. 431.
—. „ „ G. molle L.; ſ. Nr. 539.
—. „ „ Erodĭum malacoīdes Willd.; ſ. Nr. 1317.
—. XVI., 5; Pappelroſenpfl.: Malva vulgāris Fr.; ſ. Nr. 1318.
—. „ „ M. sylvēstris L.; ſ. Nr. 1225.
—. XVII., 2; Erdrauchpfl.: Fumarĭa murālis Sond.; ſ. Nr. 1363.
—. „ „ Corydălis lutĕa Pers.; ſ. Nr. 1364.
—. „ „ C. ochroleuca Koch; ſ. Nr. 1365.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum pratēnse Tausch; ſ. Nr. 1335.
—. XIX., 1; Korbblütler: H. murōrum L.; ſ. Nr. 447.
—. „ „ Crepis tectōrum L.; ſ. Nr. 1366.
—. „ „ Tragopōgon major Jacq.; ſ. Nr. 1337.
—. XIX., 1; Korbblütler: Podospērmum laciniātum DC.; ſ. Nr. 602.
2241. XIX., 1; Korbblütler: Picris hieracioïdes L. Habichtskrautähnliches Bitterkraut (Bitterich, Bitterling). St. äſtig-ebenſträuß., borſtig-widerhakig-ſteifharig, wie die längl.-lanzettl., buchtig-gezähnten Bltr.; Bl. gelb; 4; 7 bis 9; ×.
—. XIX., 1; Korbblütler: Lampsăna commūnis L.; ſ. Nr. 1128.
—. „ „ Lappa minor DC.; ſ. Nr. 2199.
—. „ „ L. major Gaertn.; ſ. Nr. 2200.
—. „ „ L. tomentōsa Lmk.; ſ. Nr. 2201.
—. „ „ Cirsĭum lanceolātum Scop.; ſ. Nr. 1339.
—. XIX., 1; Korbblütler: Onopōrdon acanthĭum L.; ſ. Nr. 2202.
2242. XIX., 1; Korbblütler: *Silўbum mariānum Gaertn. (Cardŭus mariānus L.). Gemeine Mariendiſtel (Milch-M., Stech- oder Froſchkraut, Heilands-, Silber-, Veh- oder Froſchdiſtel). Untere Bltr. bucht.-eck., gezähnt, dornig, mittl.

umfaſſ., fiederſpalt., alle glänz., kahl, weißaderig; Bl. purpurrot; ☉ und ♂; ♀; ♃; Vaterland: Südeuropa.*)

—. XIX., 2; Korbblütler: Artemisĭa vulgāris L.; ſ. Nr. 2205.

2243. „ „ *Pyrĕthrum parthenĭum Sm. (Tanacētum parth. Schultz bip., Chrysanthĕmum parth. Bernh., Matricarĭa parth. L.). Mutterkraut (M.-Bertramwurz). St. oberw. ebenſträuß.; Bltr. weichharig, gefied., Fiedern ellipt.-längl., ſtumpf, fiederſpalt., Zipf. etwas gezähnt; Stral weiß; ♃; 7 bis 8; ✕; ♃; Vaterland: Südeuropa.**)

2244. XIX., 2; Korbblütler: Achillēa nobĭlis L. Edle Garbe. Stglbltr. dopp.-fiederſpalt., Fiederchen ſchwach-fiederſpalt.-gezähnt; Blattſpindel ſchmal, obere Hälfte gezähnt; Doldentrauben dicht, gewölbt; Bl. weiß; ♃; 7 bis 8; ♆; ♃.

2245. XIX., 2; Korbblütler: Stenactis annŭa Nees. (Aster annŭus L., Inŭla bellidiflōra Wallr., Erigĕron annŭus Pers., St. bellidiflōra A. Br., Pulicarĭa bellidifl. Wallr.). Maßliebenblumiger Schmalſtral (Feinſtral). St. an der Spitze ebenſträuß.; untere Bltr. verk.-eiſ., grob-geſägt, obere lanzettl.; Bltchn. des Hauptk. rauhharig; Stralbl. weiß oder bläulich; ☉ bis ♂; 7 bis 9.

2246. XIX., 5; Korbblütler: Echĭnops sphaerocephălus L. Gemeine Kugeldiſtel (rundköpfige K.). Bltr. fiederſpalt., oberſ. etwas klebrig-weichharig, unterſ. grauwollig-filz.; Bl. weißlich; äußere Hüllſchuppen die inneren um die Hälfte überragend; ♃; 7 bis 8; ♀.

—. XX., 5; Oſterluzeipfl.: Aristolochĭa clematītis L.; ſ. Nr. 2209.

—. XXI., 4; Neſſelpfl.: Urtīca urens L.; ſ. Nr. 1234.

—. „ „ U. pilulifĕra L.; ſ. Nr. 1266.

—. XXI., 5; Meldenpfl.: Atrĭplex patŭlum L.; ſ. Nr. 2211.

2247. „ Amarantpfl.: Amarantus blitum L. (A. adscēndens Loisl., A. virĭdis Poll., Albersĭa blit. Kth., Euxŏbus virid. Moq. Tand.). Gemeiner Amarant. St. ausgebreit., aufſtreb., kahl; Bl. 3männig, grün oder rötlich; Bltr. lang-geſtielt, ausgerand. oder abgeſtutzt, mit

*) Die Samen waren früher offizinell und ſind neuerdings wieder gegen Gelbſucht und Milzleiden empfohlen, wie ſie denn auch jetzt noch als Hausmittel bei Seitenſtechen dienen!

**) Als Perikles zu Athen die Propiläen bauen ließ und ein Arbeiter von der Höhe des Gebäudes herabgeſtürzt ohne Hoffnung lag, erſchien ihm die Minerva im Traume und zeigte ihm dieſe Heilpflanze, die ſeitdem die Jungfräuliche genannt und dann um die Akropolis kultivirt wurde!

weicher Stachelsp.; Deckbltr. nicht von Blütenlänge; ☉; 7 bis 10.

Varirt: A. diffūsus (St. niederligend), A. adscēndens Lois. (St. aufsteig. oder aufr.).

2248. XXI., 5; Amarantpfl.: A. prostrātus Balb. Ligender A. St. sehr ästig; Aeste aufsteig., oben behart; Bltr. kurzgestielt, eif., zugesp., stumpf oder abgestutzt; Bl. wie bei vor.; Deckbltr. fast lineal., spitz, von Blütenlänge; ☉; 7 bis 8; Kr.

§. 483. **F. In Gärten (Baum- und Grasgärten, Gartenland):**

—. II., 1; Rachenblümler: Veronīca latifolĭa L.; s. Nr. 1189.

—. III., 1; Baldrianpfl.: Valeriāna phu L.; s. Nr. 507.

—. III., 2; Graspfl.: Setarĭa verticillāta P. B.; s. Nr. 1249.

2249. „ „ S. virĭdis P. B. (Panĭcum virĭde L., Pennisētum virĭde R. Br.). Grüne Borstenhirse (Borstengras, Fennich). Rispe ährenf., walzl.; Hüllen vorw.-gerichtet-gezähnt-rauh; Blütensch. 5nervig; ☉; 7 bis 8; ✕.

—. III., 2; Graspfl.: Digitarĭa sanguinālis Scop.; s. Nr. 1250.

—. „ „ D. ciliāris Koel.; s. Nr. 1251.

—. IV., 1; Krapppfl.: Galĭum spurĭum L.; s. Nr. 2217.

—. V., 1; Schlüsselblümler: Anagāllis arvēnsis L.; s. Nr. 55.

—. „ Nachtschattenpfl.: *Solanum nigrum L.; s. Nr. 1254.

—. „ „ *Datūra stramonĭum L.; s. Nr. 1253.

—. V., 1; Veilchenpfl.: Viŏla tricŏlor L.; s. Nr. 525.

2250. „ Borretschpfl.: *Borrāgo officinālis L. Gemeiner Borretsch (Gegenstoß, Herzblümelein). St. aufr.; Bltr. eif.; Kr. himmelblau, selten weiß oder rötlich; ☉; 7 bis 8; ☿; (♃); Vaterland: Orient, Südeuropa.*)

—. V., 1; Windenpfl.: Convolvŭlus arvēnsis L.; s. Nr. 1255.

—. „ Glockenblümler: Campanŭla rapunculoīdes L.; s. Nr. 3002.

2251. V., 2; Meldenpfl.: Blitum virgātum L. Rutenförmiger Erdbeerspinat. St. von der Basis an ästig; Bltr. längl.-3eck., fast spießf., tief-gezähnt; Blütenknäuel sämmtl. blattachselst., beblätt.; Fr. scharlachrot; ☉; 7 bis 8; Süddeutschl., Pr.

—. V., 2; Meldenpfl.: Chenopodĭum rubrum L.; s. Nr. 2228.

—. „ „ Ch. hybrĭdum L.; s. Nr. 2229.

*) Diese Pflanze ist ziemlich salpeterhaltig und knistert deshalb beim Verbrennen sehr stark!

—. V., 2; Meldenpfl.: Ch. album L.; ſ. Nr. 2231.
—. „ „ Ch. ambrosioïdes L.; ſ. Nr. 1247.
—. „ „ Ch. vulvaria L.; ſ. Nr. 2232.
—. „ „ Ch. polyspērmum L.; ſ. Nr. 2233.
2252. „ Doldenpfl.: Critămus falcaria Rchb. (Sium falc. L., Fulmaria rivĭni Koch, Cr. agrēstis Bess., F. vulgāris Bernh.). Acker-Sichelmöre (Sichelkraut, Sichelmerk, -dolde, Feldbazillen). Untere Bltr. einfach und 3zäl., mittl. Bltchn. tief-3ſpalt.; Bltchn. ſämmtl. lanzett-lineal., knorp.-ungleich- und ſelbſt dopp.-dichtſägezähn.; Bl. klein, weiß; 4; 7 bis 8; ×.
—. V., 2; Doldenpfl.: Aegopodium podagraria L.; ſ. Nr. 1012.
—. „ „ Aethūsa cynapium L.; ſ. Nr. 2178.
—. „ „ Chaerophȳllum aromatĭcum L.; ſ. Nr. 1135.
—. V., 2; Doldenpfl.: Conium maculātum L.; ſ. Nr. 2181.
2253. VI., 1; Lilienpfl.: *Lilium candĭdum L. Weiße Lilie. St. kahl, glatt, kant.; Bltr. zerſtreut, lanzett-lineal., oberſte eilanzettl.; Bl. aufr.-abſteh., weiß; K glock., innen glatt; 4; 7; ♈; ↕; ♃; Vaterland: Orient.
—. VI., 3; Knöterichpfl.: Rumex pulcher L.; ſ. Nr. 1256.
2254. „ „ R. crispus L. Krauſer Ampfer (Grindwurz, Halbpferd, Schätzchenkraut, Drachen-A., -blut, krauſe Ochſenzunge). Bltr. lanzettl., wellenf., kraus; innere Zipf. der Fruchthülle rundl., faſt herzf., ganzrand.; Bltr. unterſ. mit waſſerhellen Drüschen; 4; 7 bis 8; ×.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygŏnum convolvŭlus L.; ſ. Nr. 1257.
2255. VIII., 1; Knöterichpfl.: P. aviculāre L. Vogel-Knöterich (Knicker, Blutkraut, Tauſendknoten, Hänſel am Weg, Unverleid, Wegetritt). Aeſte beblätt., ausgebreitet, meiſt ligend; Bl. blattachſelſt., grünlich; Tuten 2ſpalt.; Griff. 3; Fr. feinrunzel., glänz.; ☉ bis ♁; 7 bis 10; ×.
Varirt: erēctum Roth (St. aufr.; Form ſchattiger Orte), decūmbens (St. niederligend), vulgāre (Bltr. faſt 2zeil., entfernt, ellipt. bis lanzettl.), crispum (Gelenkglieder genähert; Bltr. gedrängt, eif. bis ellipt., ſtark wellig, fleiſchig), graminifolĭum Wierzb. (Bltr. lang, lineal.), aphȳllum (Bltr. ſehr kurz, nadel-pfriemf., faſt ſitz.).
2256. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: *Oenothēra biēnnis L. Zweijährige Nachtkerze (Rapontika). St. kurz-weichharig; unterſte Bltr. des erſten Jahres ellipt. oder längl.-verk.-eif., ſtumpf, mit einem Spitzchen; Bl. gelb; Krbltr. länger als die Stbgf.; ♁; 7 bis 8; †; ♈; ↕; Vaterland: Virginien.

—. X., 2; Nelkenblütler: Saponaria officinālis L.; ſ. Nr. 2184.
—. X., 3; „ Stellaria media Vill.; ſ. Nr. 4.
—. „ „ Arenaria serpyllifolia L.; ſ. Nr. 1259.
—. „ „ Melandrium dubium Hampe; ſ. Nr. 1258.

2257. X., 3; Nelkenblütler: Silēne noctiflōra L. (Saponaria noctifl. Fenzl, Melandrium noctiflōrum Fr.). Nacht-blühendes Leimkraut. St. nebſt den Blütenſt. und K. klebrig-zott.; Krbltr. tief-2ſpalt., weiß oder blaß-fleiſchrot; ☉; 7 bis 9; ✕.

—. X., 5; Schnabelpfl.: *Oxălis stricta Jacq.; ſ. Nr. 1260.
—. „ „ *O. corniculāta L.; ſ. Nr. 1261.
—. XI., 1; Fettkrautpfl.: Portulāca oleracĕa L.; ſ. Nr. 1269.
—. XI., 2; Roſenpfl.: Agrimonia eupatoria L.; ſ. Nr. 1114.
—. XII., 3; „ Geum urbānum L.; ſ. Nr. 1077.
—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: Nigēlla damascēna L.; ſ. Nr. 559.
—. XIII., 3; „ Ranuncŭlus acris L.; ſ. Nr. 399.
—. „ „ R. bulbōsus L.; ſ. Nr. 465.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Lamium album L.; ſ. Nr. 169.
—. „ „ L. purpurĕum L.; ſ. Nr. 10.
—. „ „ L. amplexicaule L.; ſ. Nr. 214.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Cochlearia armoracia L.; ſ. Nr. 1222.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Thlaspi arvēnse L.; ſ. Nr. 215.
—. „ „ Capsēlla bursa pastōris Vent.; ſ. Nr. 3.
—. XV., 1; Kreuzblütler: *Bunias orientālis L.; ſ. Nr. 1268.

2258. „ „ Senebiēra coronŏpus Poir. (Cochlearia coronop. L., Coronŏpus ruellii All., C. squamātus Aschrsn.). Krähenfußartige Stinkkreſſe (Senebiere, Feldkreſſe, Krähenfuß, Hirſchhorn, Schweinskreſſe). St. niederlig., äſtig; Bltr. tief-fiederſpalt.; Schötchen mit dem piramid. Griff. gekrönt; Bl. weiß; ☉; 7 bis 8.

—. XV., 2; Kreuzblütler: Arăbis thaliāna L.; ſ. Nr. 58.
—. „ „ Sisymbrium sophīa L.; ſ. Nr. 591.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranium rotundifolium L.; ſ. Nr. 560.

2259. XVI., 2; Schnabelpfl.: *G. sibiricum L. Sibiriſcher Kranichſchnabel. Bltr. handf.-5theil., Zipf. rautenf.-längl., ſpitz, grob-eingeſchn.-geſägt; Blütenſt. 1blüt.; Bl. blaßroſenrot; Blbltr. verk.-eif., etwas ausgerand., von Kelchlänge; 4; 7 bis 8; Pr., Brd., Schl., Bd.; Vaterland: Aſien.

—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Erodĭum cicutarĭum l'Herit.; ſ. Nr. 217.
—. XVI., 5; Pappelroſenpfl.: Althaea officinālis L.; ſ. Nr. 2214.
—. XVII., 2; Erdrauchpfl.: Fumarĭa officinālis L.; ſ. Nr. 561.
—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hypericum perforātum L.; ſ. Nr. 2068.
—. XIX., 1; Korbblütler: Sonchus oleracĕus L.; ſ. Nr. 1262.
—. „ „ S. asper Hall.; ſ. Nr. 1263.
—. „ „ Taraxăcum officināle Mnch.; ſ. Nr. 59.
—. XIX., 1; Korbblütler: Lampsăna communis L.; ſ. Nr. 1128.
—. XIX., 2; „ Senecĭo vulgāris L.; ſ. Nr. 218.
—. „ „ Achillēa millefolĭum L.; ſ. Nr. 2101.
—. „ „ *Anthĕmis nobĭlis L.; ſ. Nr. 1264.
—. „ „ Bellis perēnnis L.; ſ. Nr. 2.
—. XIX., 4; „ *Calendŭla officinālis L.; ſ. Nr. 2208.
—. XXI., 1; Giftmilcher: *Euphorbĭa peplus L.; ſ. Nr. 1265.
—. „ „ E. helioscopĭa L.; ſ. Nr. 222.
—. XXI., 4; Neſſelpfl.: Urtīca urens L.; ſ. Nr. 1234.
—. XXI., 5; Meldenpfl.: Atrĭplex hastātum L.; ſ. Nr. 2210.
—. „ „ A. patŭlum L.; ſ. Nr. 2211.
—. „ „ A. angustifolĭum Sm.; ſ. Nr. 2159.
2260. „ „ *A. hortēnse L. Garten-Melde (Zucker-M., roter oder wilder Spinat, Burkhardskraut). Bltr. gleichf., glanzlos, obere längl., 3eck.; Blütenh. zur Fruchtzeit rundl.-eif., ganzrand.; Pfl. bisweilen blutrot; ☉; 7 bis 8; ♆; ✕; Vaterland: Tatarei.
—. XXI., 5; Amarantpfl.: Amarāntus blitum L.; ſ. Nr. 2247.
—. XXII., 8; Neſſelpfl.: Mercuriālis annŭa L.; ſ. Nr. 1267.

G. An Wegen, Straßen, Ackerrändern, auf Rinnen u. dergl.: §. 484.

—. II., 1; Rachenblümler: Veronīca arvēnsis L.; ſ. Nr. 64.
—. „ „ V. agrēstis L.; ſ. Nr. 224.
—. „ „ V. polĭta Fr.; ſ. Nr. 61.
—. „ Lippenblümler: Salvĭa pratēnsis L.; ſ. Nr. 1101.
—. „ „ S. sylvēstris L.; ſ. Nr. 2168.
—. „ „ S. sclarēa L.; ſ. Nr. 1271.
—. „ „ S. aethiŏpis L.; ſ. Nr. 1270.
—. „ „ S. verticillāta L.; ſ. Nr. 1191.
2261. III., 2; Graspfl.: Andropōgon ischaemum L. (A. angustifolĭus Sm.). Gemeines Bartgras (Hühnerfuß-gras). Bltr. lineal.-rinnig; Aehren zu 5 bis 10 fingerig;

Bälge gerillt; Pfl. hie und da purpurn, insbesond. die Aehren purpurviolet; 4; 7 bis 8.

—. III., 2; Graspfl.: Agrōstis vulgāris With.; s. Nr. 2169.
—. „ „ Digitaría glabra R. et S.; s. Nr. 1272.
—. „ „ D. sanguinālis Scop.; s. Nr. 1250.
—. „ „ Avēna flavēscens L.; s. Nr. 1273.
—. „ „ Vulpía sciuroïdes Rchb.; s. Nr. 1274.
—. „ „ Bromus arvēnsis L.; s. Nr. 1193.
—. „ „ B. stenophȳllus Lk.; s. Nr. 1275.
—. „ „ B. erēctus Huds.; s. Nr. 1276.
—. „ „ B. inērmis L.; s. Nr. 1277.
—. „ „ Festūca duriuscŭla L. spec.; s. Nr. 1133.
—. „ „ F. rubra L.; s. Nr. 1184.
—. „ „ Dactȳlis glomerāta L.; s. Nr. 1104.
—. „ „ Poa comprēssa L.; s. Nr. 1278.
—. „ „ P. annŭa L.; s. Nr. 14.
—. „ „ P. bulbōsa L.; s. Nr. 567.
—. „ „ Brachypodíum sylvatĭcum R. et Sch.; s. Nr. 1003.
—. III., 2; Graspfl.: Trictĭcum repens L.; s. Nr. 1279.
—. „ „ Hordĕum murīnum L.; s. Nr. 1280.
—. „ „ Lolĭum perēnne L.; s. Nr. 1281.
—. IV., 1; Wegerichpfl.: Plantāgo medĭa L.; s. Nr. 1282.
—. „ „ P. lanceolāta L.; s. Nr. 1252.
2262. „ „ P. major L. Großer Wegerich (Sauohr, -rüssel, -schnabel, -gras, Schafszunge, Wegbreit, Weg- oder Vergehblatt, Ballenkraut, Glücksmännchen, Wegwarte, Vogelgarbe). Schaft stielrund, schwach-gefurcht; Bltr. gestielt, eif.; Deckbltr. eif., stumpf, gekielt, hautrandig; 4; 7 bis 10. *)
—. IV., 1; Kardenpfl.: Dipsăcus sylvēstris Mill.; s. Nr. 2172.
2263. „ „ D. fullōnum L. z. Th. (D. full. Mill.). Weberkarde (Weber- oder Bubenstral, Leopardenwürger, Gemsenwurzel). Hüllbltchn. wagr.-abstehend.; Deckbltchn. steif, zurückgekr.-spitz.; Bl. lila; ♂ und 4; 7 bis 9; ♆; ⚓; ⚔.
2264. IV., 1; Kardenpfl.: D. lanciniatus L. Schlitzblättrige K. Bltr. borstig-gewimp., untere lapp.-gekerbt, übrige fiederspalt.; Bl. rötl., dann weiß; Spreubltchn. lineal-lan-

*) Diese Pflanze hat dadurch an Interesse gewonnen, daß sie dem Einwanderer nach West überall auf Schritt und Tritt gefolgt ist, so daß die Indianer das Kraut die „Fußtapfen der Weißen" nennen, deren Nähe sie überall vermuten, wo sie dies Kraut sehen!

zettl., grade, pfriemf.-ſpitz, borſtig, etwas länger als die Bl.; ♂; 7 bis 9.

—. IV., 1; Kardenpfl.: Scabiōsa columbaria L.; ſ. Nr. 2080.
—. „ „ Sc. arvēnsis L.; ſ. Nr. 1283.
2265. „ Krapppfl.: Asperŭla cynanchĭca L. Hügel-Meier (Halsbräune-Waldmeiſter). Bltr. ſchmal-lineal., 4ſtänd.; Deckbltr. lanzettl., ſtachelſp.; Blkr. außen rauh, 4ſpalt., innen weiß, außen rötlich; Fr. körnig-rauh; 4; 7 bis 9.
—. IV., 1; Krapppfl.: Galĭum sylvēstre Poll.; ſ. Nr. 1005.
—. „ „ G. mollūgo L.; ſ. Nr. 1006.
—. „ „ G. verum L.; ſ. Nr. 1105.
—. „ „ *Rubĭa tinctōrum L.; ſ. Nr. 2173.
—. „ Roſenpfl.: Alchemīlla alpīna L.; ſ. Nr. 1284.
—. „ „ Poterĭum sanguisōrba L.; ſ. Nr. 569.
—. V., 1; Rachenblümler: Verbascum nigrum L.; ſ. Nr. 2082.
—. „ „ V. blattarĭa L.; ſ. Nr. 1285.
2266. „ „ V. lychnītis L. Lichtnelken-artige Königskerze (mehlige K., Kerzenwollkraut). St. oberw. piramidenf.-riſp.; Bltr. oberſ. kahl, unterſ. ſtaubig-filz., obere ſitz.; Aeſte ſcharfkant.; Bl. gelb; ♂; 7 bis 8; ↕.
2267. V., 1; Rachenblümler: V. moenchĭi Schultz. Mönchs-K. Bltr. oberſ. faſt kahl, unterſ. weißfilz., grund- und ſtengelſt. geſtielt, obere herzf., ſitz.; Bl. klein, weiß; ♂; 7 bis 9.
—. V., 1; Nachtſchattenpfl.: Hyoscyămus niger L.; ſ. Nr. 1195.
—. „ „ *Lycĭum barbărum L.; ſ. Nr. 1204.
—. „ „ *Datūra stramonĭum L.; ſ. Nr. 1253.
—. V., 1; Nachtſchattenpfl.: *Solānum nigrum L.; ſ. Nr. 1254.
2268. „ „ S. miniātum Bernh. Mennig-roter Nachtſchatten. St. nebſt den Aeſten eckig, gezähnt, geſtrichelt-weichharig; Bltr. rauten-eif., faſt kahl; Bl. weiß; Beere rot; ☉; 7 bis 10; ♄.
—. V., 1; Borretſchpfl.: Cerīnthe minor L.; ſ. Nr. 1198.
—. „ „ Echĭum vulgāre L.; ſ. Nr. 1108.
—. „ „ Lithospērmum arvēnse L.; ſ. Nr. 571.
—. „ „ *Borrāgo officinālis L.; ſ. Nr. 2250.
—. „ „ Myosōtis versicŏlor Rchb.; ſ. Nr. 440.
—. „ „ Echinospērmum lappŭla Lehm.; ſ. Nr. 1286.
—. V., 1; Borretſchpfl.: E. squarrōsum Rchb.; ſ. Nr. 2226.
—. „ „ Cynoglōssum officināle L.; ſ. Nr. 1287.
—. „ Windenpfl.: Convolvŭlus arvēnsis L.; ſ. Nr. 1255.

—. V., 1; Glockenblümler: Campánŭla rotundifolĭa L.; ſ. Nr. 1288.
—. V., 1; Glockenblümler: C. rapuncŭlus L.; ſ. Nr. 1289.
—. „ „ C. trachelĭum L.; ſ. Nr. 1109.
—. „ „ Jasiōne montāna L.; ſ. Nr. 1290.
—. „ Veilchenpfl.: Viŏla tricŏlor L.; ſ. Nr. 525.
—. V., 2; Meldenpfl.: Blitum virgātum L.; ſ. Nr. 2251.
—. „ „ Chenopodĭum bonus henrĭcus L.; ſ. Nr. 1291.
—. V., 2; Meldenpfl.: Ch. rubrum L.; ſ. 2228.
—. „ „ Ch. glaucum L.; ſ. Nr. 1292.
—. „ „ Ch. hybrĭdum L.; ſ. Nr. 2229.
—. „ „ Ch. murāle L.; ſ. Nr. 2230.
—. „ „ Ch. album L.; ſ. Nr. 2231.
—. „ „ Ch. vulvarĭa L.; ſ. Nr. 2232.
2269. „ „ Ch. urbĭcum L. Steifer Gänſefuß. Bltr. glänz., 3eck.; Trugdolden in ſteif-aufr., dem St. anligenden, faſt blattloſen Riſpen; ⊙; 7 bis 8.
Varirt: melanospērmum Wallr. (vulgāre; Bltr. längl.-3eck., ſägezähn.), intermedĭum M. et K. (Ch. rhombifolĭum Mühlbg.; Bltr. eif.-3eck., kurz-gezähnt, an der Baſis mit 1 Zahn verſehen).
2270. V., 2; Meldenpfl.: Ch. opulifolĭum Schrad. Schneeballblättriger G. Bltr. rundl.-rautenf., faſt 3lapp., ſehr ſtumpf; Samen glatt, glänz.; Aeſte und die Bltr. unterſ. mehlig-beſtäubt; ⊙; 7 bis 9.
—. V., 2; Seidenpfl.: Vincetoxĭcum officināle Mnch.; ſ. Nr. 2175.
2271. V., 2; Doldenpfl.: Eryngĭum campēstre L. Feld-Mannstreu (Elend, Mordwurz, Schlangengras, Valent-, Donner-, Brach-, Roll-, Kraus-, Stech-, Toll- oder Brackendiſtel, Hundertkopf, Unruhe). Bltr. 3zäl.-dopp.-fiederſpalt., netzaderig; Bl. hellbläulichgrün; St. einfarbig, 3theil.-ſperrig-äſtig; 4; 7 bis 9; ×.
—. V., 2; Doldenpfl.: Petroselīnum satīvum Hoffm.; ſ. Nr. 1293.
—. V., 2; Doldenpfl.: Critămus falcarĭa Rchb.; ſ. Nr. 2252.
—. „ „ Pimpinēlla saxifrăga L.; ſ. Nr. 2176.
—. „ „ Bupleurum gerārdi Jacq.; ſ. Nr. 2177.
—. „ „ B. affīne Sadl.; ſ. Nr. 2055.
—. „ „ Peucedănum cervarĭa Cuss.; ſ. Nr. 2132.
—. V., 2; Doldenpfl.: Pastināca satīva L.; ſ. Nr. 2058.
2272. „ „ Tordylĭum maxĭmum L. Größter

Zirmet. St. rückw.-steifharig; Bltr. gefied.; Fr. auf dem Mittelfelde borstig-steifharig; Bl. weiß; ☉; 7 bis 8; Oe., Kr., Franken, Th. u. s. w.

—. V., 2; Doldenpfl.: Daucus carōta L.; s. Nr. 1294.
—. " " Torīlis anthrīscus Gaertn.; s. Nr. 1073.
—. " " Anthrīscus cerefolĭum Hoffm.; s. Nr. 456.
—. V., 2; Doldenpfl.: Chaerophȳllum bulbosum L.; s. Nr. 1106.
—. V., 2; Doldenpfl.: Conĭum maculātum L.; s. Nr. 2181.
—. V., 5; Bleiwurzpfl.: Armerĭa vulgāris Willd.; s. Nr. 1295.
—. VI., 3; Knöterichpfl.: Rumex pulcher L.; s. Nr. 1256.
—. " " R. crispus L.; s. Nr. 2254.
—. " " R. acetosēlla L.; s. Nr. 1296.
2273. " " R. patientĭa L. Garten-Ampfer*) (englischer Spinat, Geduldskraut). Untere Bltr. eilanzettl., flach, zugesp., oberste lanzettl.; Blattst. rinnenf.; Blütenquirle genähert, blattlos; innere Zipf. der Fruchth. rundl.-herzf., stumpf, ganzrand. oder kaum gezähnelt, ein einziger schwielentragend; 4; 7 bis 8; ♀; Rh., Mä., Oe.
2274. V., 5; Leinpfl.: Linum austriăcum L. Oesterreichscher Lein. St. oben ästig, kahl; Bltr. lineal-lanzettl., langzugesp., 3nervig; Kelchblttchen kahl, innere etwas kürzer als die kug. Kapf.; Blbltr. rundl.-eif., mit den Seitenrändern der ganzen Länge nach sich deckend, mit kurzem, gleichseitig-3eck. Nagel, blau; 4; 7 bis 8; Bay., Oe., Bö., Mä., Kr.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygŏnum aviculāre L.; s. Nr. 2255.
—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: *Oenothēra biēnnis L.; s. Nr. 2256.
—. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus carthusianōrum L.; s. Nr. 459.
2275. X., 2; Nelkenblütler: D. prolĭfer L. (Kohlrauschĭa prolifĕra Kunth fl. berol., Tunĭca prol. Scop.). Sprossende Nelke (Knopfnelke). St. kahl; Bltr. lineal.; Bl. in endst. Köpfchen, rot; die 6 Hüllschuppen durchscheinendhäutig; ☉; 7 bis 9.**)
—. X., 2; Nelkenblütler: Saponarĭa officinālis L.; s. Nr. 2184.
—. " " Vaccarĭa pyramidāta Fl. Wett.; s. Nr. 2185.

*) Oseille der Franzosen!
**) Dianthus velutinus Guss., in Südkrain vorkommend, hat zottige Stengelknoten und rauhe Samen!

—. X., 2; Paronychienpfl.: Scleränthus annŭus L.; ſ. Nr. 574.
—. X., 3; Nelkenblütler: Silēne inflāta Sm.; ſ. Nr. 1178.
—. „ „ S. viscōsa Pers.; ſ. Nr. 1297.
—. „ „ S. nutans L.; ſ. Nr. 1112.
—. „ „ Stellarĭa medĭa Vill.; ſ. Nr. 4.
—. „ „ St. graminĕa L.; ſ. Nr. 388.
—. „ „ Arenarĭa serpyllifolĭa L.; ſ. Nr. 1259.
—. „ „ Spergularĭa rubra Presl.; ſ. Nr. 576.
—. X., 5; Dickblattpfl.: Sedum acre L.; ſ. Nr. 1298.
—. XI., 1; Fettkrautpfl.: Portulāca oleracĕa L.; ſ. Nr. 1269.
—. XI., 2; Roſenpfl.: Agrimonĭa eupatorĭa L.; ſ. Nr. 1114.
—. XI., 3; Waupfl.: Resēda luteŏla L.; ſ. Nr. 1299.
—. „ „ R. lutĕa L.; ſ. Nr. 1372.
—. „ „ R. phyteuma L.; ſ. Nr. 1300.
—. XII., 3; Roſenpfl.: Potentĭlla anserĭna L.; ſ. Nr. 578.
—. „ „ P. reptans L.; ſ. Nr. 1301.
—. „ „ P. argentĕa L.; ſ. Nr. 464.
2276. „ „ P. mixta Nolte. (P. procumbēnti-reptans G. Mey.). Kleines Fingerkraut. St. oberw. äſtig, rankenf.-geſtreckt, an den Gelenken nicht wurzelnd; Blütentheile meiſt 4zäl.; Nebenbltr. blattartig; Bl. gelb; 4; 7 bis 8; S.-H., Brd., Schl., K. S.*)
—. XII., 3; Roſenpfl.: Fragarĭa elatĭor Ehrh.; ſ. Nr. 26.
—. „ „ Rubus fruticōsus L.; ſ. Nr. 1119.
—. „ „ R. caesĭus L.; ſ. Nr. 443.
—. „ „ Rosa pimpinellifolĭa L.; ſ. Nr. 1211.
—. „ „ R. arvēnsis L.; ſ. Nr. 1020.
—. XIII., 1; Mohnpfl.: Chelidonĭum majus L.; ſ. Nr. 534.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Thalĭctrum vulgāre Kitt.; ſ. Nr. 579.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Adōnis autumnālis L.; ſ. Nr. 1302.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Ranuncŭlus bulbōsus L.; ſ. Nr. 465.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Origănum vulgāre L.; ſ. Nr. 2087.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Thymus serpyllum L.; ſ. Nr. 2088.
2277. XIV., 1; Lippenblümler: Prunēlla vulgāris L. Gemeine Prunelle (Antoniuskraut, Gottes- oder Selbſtheil). Bltr. geſtielt, längl.-eif.; längere Stbf. an der

*) Chr. Lehmann (Enumeratio potentillar. 1851) betrachtet dieſe Art als Baſtard von P. reptans L. und Tormentilla reptans L.

Spitze mit dornf. Zahn; Bl. rötlich, violet oder weiß; 4; 7 bis 9; ☽.

—. XIV., 1; Lippenblümler: Nepĕta cataria L.; ſ. Nr. 1218.
—. „ „ N. nepetella L.; ſ. Nr. 2189.
—. „ „ Lamium album L.; ſ. Nr. 169.
—. „ „ *Leonūrus cardiăca L.; ſ. Nr. 1182.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Chaitūrus marrubiāstrum Rchb.; ſ. Nr. 2064.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Galeōpsis ochroleuca Lmk.; ſ. Nr. 2238.
—. XIV., 1; Lippenblümler: G. tetrăhit L.; ſ. Nr. 2190.
—. „ „ G. pubēscens Bess.; ſ. Nr. 2109.
—. „ „ Stachys recta L.; ſ. Nr. 1303.
—. „ „ Marrubium vulgāre L.; ſ. Nr. 2192.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Ballōta nigra L.; ſ. Nr. 1219.
—. „ „ Teucrium chamaedrys L.; ſ. Nr. 2239.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Linaria vulgāris Desf.; ſ. Nr. 2193.
—. XIV., 2; Eiſenkrautpfl.: Verbēna officinālis L.; ſ. Nr. 1304.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Berterŏa incāna DC.; ſ. Nr. 1305.
—. „ „ Alyssum campēstre DC.; ſ. Nr. 580.
—. „ „ Thlapsi arvēnse L.; ſ. Nr. 215.
—. „ „ Ibēris pinnāta L.; ſ. Nr. 1306.
—. „ „ Lepidium satīvum L.; ſ. Nr. 1223.
—. „ „ L. campēstre R. Br.; ſ. Nr. 1307.
—. „ „ L. ruderāle L.; ſ. Nr. 1224.
—. „ „ L. graminifolium L.; ſ. Nr. 1308.
—. „ „ Capsēlla bursa pastōris Vent.; ſ. Nr. 3.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Rapistrum perēnne All.; ſ. Nr. 1309.
—. „ „ Senebiēra coronŏpus Poir.; ſ. Nr. 2258.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Raphănus raphanistrum L.; ſ. Nr. 588.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Erisўmum suffruticōsum Spr.; ſ. Nr. 589.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Sisymbrium sophia L.; ſ. Nr. 591.
—. „ „ S. colūmnae Jacq.; ſ. Nr. 1310.
—. „ „ S. irio L.; ſ. Nr. 1311.
—. „ „ S. loeselii L.; ſ. Nr. 1312.
—. „ „ S. officināle Scop.; ſ. Nr. 1361.

—. XV., 2; Kreuzblütler: Diplotāxis murālis DC.; s. Nr. 1314
—. " " D. tenuifolĭa DC.; s. Nr. 1313.
—. " " Erucāstrum pollichĭi Sch. et Sp.; s. Nr. 1315.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Hirschfeldĭa adprēssa Mnch.; s. Nr. 593.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum pusīllum L.; s. Nr. 537.
—. " " G. rotundifolĭum L.; s. Nr. 560.
—. " " G. columbīnum L.; s. Nr. 675.
—. " " G. dissēctum L.; s. Nr. 538.
—. " " G. molle L.; s. Nr. 539.
—. " " Erodĭum cicutarĭum l'Herit.; s. Nr. 217.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: E. moschātum Ait.; s. Nr. 540.
—. " " E. malacoīdes Willd.; s. Nr. 1317.
—. XVI., 5; Pappelrosenpfl.: Althaea hirsūta L.; s. Nr. 2195.
—. " " A. officinālis L.; s. Nr. 2214.
2278. " " Hibīscus triōnum L. Stundenblume (Ibisch, Wetterröslein, Studentenblume, -rose). St. aufr., ästig, absteh.-rauhharig; Bltr. gestielt, unterste kleiner, fast kreisrund, 3spalt., die folg. bis auf 3/4-3spalt.-gelappt; Bl. einzeln, blatt-achselst., gestielt, gelb, am Grunde mit purpurbraunen Flecken; ⊙; 7 bis 8; Oe., Kr.
—. XVI., 5; Pappelrosenpfl.: Malva vulgāris Fr.; s. Nr. 1318.
—. " " M. boreālis Wallm.; s. Nr. 1319.
—. " " M. sylvēstris L.; s. Nr. 1225.
2279. " " M. alcĕa L. Spitzblättrige Malve (Sigmarswurz, Morgenstern, Wetterrose, Rosenpappel, Siegmundwurzel, Simeonswurz, Studentenrose). St. aufr., angedr.-graugrün-behart; Bl. rosenrot; Theilfr. kahl; ♃; 7 bis 8; ‡.*)
2280. XVI., 5; Pappelrosenpfl.: M. nicaeēnsis All. Nizäische M. St. ligend, aufst., nebst den Bltrn., Blütenst. und K. sternharig-rauh; Bltr. aus herzf. Basis fast kreisf., undeutl.-5- bis 7lapp.; Bl. bleichrosenrot; Fr. feinhöckerig, mit stralenf.-querrunz. Seitenflächen; ⊙; 7 bis 8; Kr.
—. XVI., 5; Pappelrosenpfl.: Lavatēra thuringiăca L.; s. Nr. 2092.
—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Onōnis repens L.; s. Nr. 1320.

---

*) Die Form mit fast nur 3lappigen Blättern und am Gipfel gehäuften Blüten ist M. morenii Pollin et M. fastigiata Cav. — M. excisa Rchb. hat fast halb-2spaltige Blüten-Blätter mit scherenförmigen Lappen und Stengelblätter, deren Lappen schmäler und fiederspaltig sind!

—. XVII., 4; Hülſenpfl.; O. spinōsa L.; ſ. Nr. 1321.
—. „ „ O. hircīna Jacq.; ſ. Nr. 1322.
—. „ „ Genīsta tinctorĭa L.; ſ. Nr. 1124.
—. „ „ *Medicago satīva L.; ſ. Nr. 1323.
—. „ „ M. falcāta L.; ſ. Nr. 1324.
—. „ „ M. lupulīna L.; ſ. Nr. 468.
—. „ „ Bucĕras monspeliăcum All.; ſ. Nr. 1325.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Melilōtus alba Lmk.; ſ. Nr. 2197.
—. „ „ M. officināliS L.; ſ. Nr. 1326.
—. „ „ M. parviflōra Desf.; ſ. Nr. 1327.
—. „ „ *M. coerulĕus Desr.; ſ. Nr. 1328.
2281. „ „ M. dentāta Pers. (Trifolĭum kochiānum Hayne). Gezähnter Steinklee. St. meiſt aufſteig.; Nebenbltr. aus gezähnter Baſis pfrieml.; Flüg. kürzer als die Fahne, länger als das Schiffchen; Bl. gelb; Hülſe eif., ſpitzl., netzig-runz., kahl; ♂; 7 bis 9.*)
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolĭum ochroleucum L.; ſ. Nr. 1140.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: T. repens L.; ſ. Nr. 597.
—. „ „ T. filiförme L.; ſ. Nr. 599.
—. „ „ T. procūmbens L.; ſ. Nr. 1329.
—. „ „ Lotus corniculātus L.; ſ. Nr. 1239.
—. „ „ Astragălus arenarĭus L.; ſ. Nr. 1187.
—. „ „ A. cicer L.; ſ. Nr. 1330.
—. „ „ Coronīlla varĭa L.; ſ. Nr. 1331.
—. „ „ Hippocrēpis comōsa L.; ſ. Nr. 600.
—. „ „ Ervum tetraspērmum L.; ſ. Nr. 1125.
—. „ „ E. monānthos L.; ſ. Nr. 1332.
—. „ „ Vicĭa cracca L.; ſ. Nr. 1228.
—. „ „ Lathyrus tuberōsus L.; ſ. Nr. 2198.
—. „ „ L. aphăca L.; ſ. Nr. 1333.
—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hypericum perforātum L.; ſ. Nr. 2068.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum pilosēlla L.; ſ. Nr. 1181.
—. „ „ H. auricŭla L.; ſ. Nr. 1334.
—. „ „ H. pratēnse Tausch; ſ. Nr. 1335.
—. „ „ H. murōrum L.; ſ. Nr. 447.
—. „ „ H. rigĭdum Hoffm.; ſ. Nr. 2094.
—. „ „ Crepis foetĭda L.; ſ. Nr. 1336.
—. „ „ C. tectōrum L.; ſ. Nr. 1366.

*) M. italicus Desr., aus Südeuropa ſtammend, iſt in neuerer Zeit einigemal unter Luzerne gefunden!

2282. XIX., 1; Korbblütler: C. setōsa Hall. fil. (C. hispĭda W. et K., Borkhausĭa set. DC.). Borstige Grundfeste. St. ästig, beblätt.; Bltr. schrotsägig; Hauptk. und Blütenst. steifborstig; Bl. zitrongelb; Deckbltchn. der Stiele borstig-gewimp.; ⊙; 7 bis 9; Brd., Th., W., Rh., Schl., Bö., E., Pfalz, St., Ty., Kr. u. s. w.

2283. XIX., 1; Korbblütler: Lactūca salīgna L. Weidenblättriger Lattich (Weidenlattich). Bltr. lineal., zugesp.; Schnabel der braunen Schießfr. weiß, harf., dopp. so lang als die Fr.; Bl. gelb; Aeste rutenf.; ⊙; 7 bis 8.

2284. XIX., 1; Korbblütler: L. scariōla L. Wilder L. (Zaun- oder Lämmerlattich, Hasenöhrchen). Rispe piramidal; Bltr. fast aufr.; Achänen bläulichgrau, schmalrand., an der Spitze kurzborst.; Schnabel weiß; St. lichtgrün; ⊙; 7 bis 8; ×; ‡; ʒ.

Varirt: L. sylvēstris Lmk. (Rispe verläng.-piramidenf.; Bltr. fiederspalt. oder ungetheilt, auf den Rippen und am Rande borstig-gewimp.), L. satīva L. (Gartensalat: Rispe doldig; Bltr. meist kahl; ♆).

—. XIX., 1; Korbblütler: Sonchus asper Hall.; s. Nr. 1263.

—. " " Taraxăcum officināle Mnch.; s. Nr. 59.

—. XIX., 1; Korbblütler: Chondrīlla juncĕa L.; s. Nr. 2096.

—. " " Hypochoeris radicāta L.; s. Nr. 1126.

—. XIX., 1; Korbblütler: Tragopōgon major Jacq.; s. Nr. 1337.

—. XIX., 1; Korbblütler: Podospērmum laciniātum DC.; s. Nr. 602.

—. XIX., 1; Korbblütler: Helminthĭa echioīdes Gaertn.; s. Nr. 1232.

—. XIX., 1; Korbblütler: Picris hieracioīdes L.; s. Nr. 2241.

—. " " Leontŏdon vulgāris Kitt.; s. Nr. 1079.

—. XIX., 1; Korbblütler: Cichorĭum intўbus L.; s. Nr. 1328.

—. " " Lampsăna commūnis L.; s. Nr. 1128.

2285. " " Scolўmus hispanĭcus L. Spanische Golddistel. St. kurzästig; Bltr. in einem, nach unten schmäler werdenden Flüg. herablauf.; Köpfchen von 2 rinnigen Deckbltchn. begleitet, blattachselst., einzeln oder zu 2 bis 3; Bl. gelb; ♁ bis ♃; 7 bis 8; Triest.

—. XIX., 1; Korbblütler: Lappa minor DC.; s. Nr. 2199.

—. " " L. major Gaertn.; s. Nr. 2200.

—. " " L. tomentōsa Lmk.; s. Nr. 2201.

2286. XIX., 1; Korbblütler: Cirsĭum arvēnse Scop. (Serratŭla arvēnsis L., Cardŭus arv. Sm.). Acker-Wegdiſtel (Feld-Kratzdiſtel, Acker- oder Haferdiſtel, Landsknecht). St. faſt kahl, blattreich, äſtig; Blütenköpfchen klein, eif., riſp.-ebenſträuß.; Bl. hellpurpurn oder lila; 4; 7 bis 9; ×.*)
Varirt: horrĭdum Koch (W. et Gr.; St. von den Flügeln dornig, Bltr. ſtark-dornig), mite Koch (St. wegen der kaum herablauf. Bltr. nicht geflüg.; Bltr. ſchwach-dornig, buchtig-gezähnt), neglēctum Fisch. (Bltr. unterſ. filziggrau), argentĕum Vest (Bltr. unterſ. weißfilzig).

2287. XIX, 1; Korbblütler: C. eriophŏrum Scop. (Cardŭus eriophŏrus L.). Wollköpfige Kratzdiſtel (Wolldiſtel, Mönchskrone). Bltr. umfaſſ., nicht herablauf., unterſ. filz.; Blütenköpfe kugelf., ſpinnwebe-wollig; Bl. purpurn; Hüllbltchn. unter dem Dorne in ein trapezoid. Läppchen ſich erweiternd; ♂; 7 bis 8; Bö., Th., Sa., Hn., Br., Rh. u. ſ. w.

—. XIX., 1; Korbblütler: C. lanceōlatum Scop.; ſ. Nr. 1339.

2288. „ „ C. polyanthĕmon DC. (Cardŭus polyanthĕmos L.). Vielblütige K. Blütenſt. krausgeflüg.; Köpfchen gehäuft, eif., Hüllbltchn. eif., ſtumpf, langdornig; Bl. rot; ♂; 7 bis 8; Trier.

—. XIX., 1; Korbblütler: Cardŭus tenuiflōrus Sm.; ſ. Nr. 1340.

—. XIX., 1; Korbblütler: C. acanthoīdes L.; ſ. Nr. 1233.

2289. „ „ C. nutans L. Nickende Diſtel (Brach-, Eſels- oder Biſamdiſtel). Bltr. herablauf., tiefiederſpalt., Fiedern eif., faſt 3ſpalt., gezähnt, dornig-gewimp., ſtark-ſtachelſp.; Blütenköpfe rundl., einzeln, nickend; Bl. purpurn; ♂; 7 bis 8; ×.**)

2290. XIX., 1; Korbblütler: C. hamulōsus Ehrh. Hakige D. St. dornig-geflüg., äſtig; Aeſte faſt bis zum Köpfchen geflüg., 1köpf.; Bltr. unterſ. kahl, auch ſpinnwebig; innere Hüllbltchn. an der Spitze zurückgekr.; Bl. purpurn; ♂; 7 bis 8; Oe.

2291. XIX., 1; Korbblütler: C. candĭcans W. et K. Bleichköpfige D. St. dornig-geflüg., oben äſtig; Aeſte ungeflüg., aber ſchuppig, filz.-flockig, meiſt 1köpf.; Bltr. unterſ.

*) Ein vorzügliches Mittel, dieſes läſtige Unkraut zu vertilgen, iſt das Ausſtechen der Pflanze; wiederholter Oelfruchtbau läßt die Ackerdiſtel ebenfalls nicht aufkommen!

**) Carduus iſt eine heraldiſche Pflanze in dem Wappen Schottlands, wie Sauerkleeblätter im Wappen der Irländer und die Lilie in dem der Franzoſen!

grau- oder weißfilz.; Hüllbltchn. angedr., Spitzen locker oder selbst zurückgebogen; Blütenköpfchen immer nickend, rot; ♁; 7 bis 8; Kr.

Varirt: C. collīnus W. et K. (Hüllbltchn. zurückgekr.), C. candĭcans Koch (Hüllbltchn. angedrückt).

—. XIX., 1; Korbblütler: Onopōrdon acanthĭum L.; s. Nr. 2202.

—. XIX., 1; Korbblütler: *Silȳbum mariānum Gaertn.; s. Nr. 2242.

—. XIX., 2; Korbblütler: Senecĭo vulgāris L.; s. Nr. 218.

—. " " S. viscōsus L.; s. Nr. 1341.

—. " " *S. vernālis W. et K.; s. Nr. 1040.

—. " " S. jacobaea L.; s. Nr. 2075.

—. " " S. erucaefolĭus Huds.; s. Nr. 2100.

2292. " " Filāgo germanĭca L. (Gnaphalĭum germanĭcum Huds.). Deutsches Schimmelkraut (Faden-, Filz-, Mäusekraut, Feldkatze). Filzig-wollig; St. gabelspalt.; Bltr. lanzettl.; Bl. gelblichweiß; äußere Hüllbltchn. mit unbeharter, glänz., fast stechender Spitze; ⊙; 7 bis 8; ×.

Varirt: stricta (St. einzeln, aufr., einfach, oben gabel-ästig; Aeste aufr., grade, steif), gymnŏpus (St. wie bei vor.; Aeste aufr.-absteh., gabel-zweigig), ramōsa (St. von der Mitte an gabel-ästig; Bltr. lineal-lanzettl.), caespitōsa (St. 4 bis mehre, aufsteig., oben gabelig; Bltr. längl.-lanzettl., vorn etwas breiter), alterniflōra (St. aufr., von Grund aus aus den Blattachseln einfache, aufr.-absteh. Aeste treibend), squarrōsa (St. von der Basis an sperrig-ästig, Aeste gabelig, zalreich).

2293. XIX., 2; Korbblütler: Tanacētum vulgāre L. (Chrysanthĕmum vulg. Bernh., Chr. tanac. Karsch). Gemeiner Rainfarn (Wurmkraut, Kraft- oder Milchkraut, Jesus- oder Heilwurz, Räuber). St. aufr.; Bltr. dopp.-fiederspalt., Zipf. längl.-lanzettl., fiederspalt.; Bl. gelb; ♃; 7 bis 8; ↕; ⚡; ×.

—. XIX., 2; Korbblütler: Artemisĭa vulgāris L.; s. Nr. 2205.

2294. " " *Cotŭla coronopifolĭa L. Krähenfußblättrige Laugenblume. St. ligend, mit 1köpf. Aesten; Bltr. lanzettl.-lineal., umfass., fiederspalt.-gezähnt; Bl. gelb; ⊙; 7 bis 8; Ha., S.-H., Hamburg, W.; Vaterland: Kapland (Südafrika).

—. XIX., 2; Korbblütler: *Pyrethrum parthenĭum Sm.; s. Nr. 2243.

—. XIX., 2; Korbblütler: Matricarĭa inodōra L.; s. Nr. 2206.

—. XIX., 2; Korbblütler: Leucanthĕmum vulgāre Lmk.; ſ. Nr. 1130.
—. XIX., 2; Korbblütler: Achillēa millefolĭum L.; ſ. Nr. 2101.
—. „ „ Anthĕmis arvēnsis L.; ſ. Nr. 1342.
2295. „ „ Inŭla hirta L. Rauhhariger Alant. St. wagr.-abſteh.-behart; Bltr. rauhharig, obere mit verſchmäl. Baſis ſitz.; Bl. gelb; äußere Hüllbltchn. länger, als die innern; 4; 7 bis 8.
2296. XIX., 2; Korbblütler: I. germanĭca L. Deutſcher A. St. zott.; Bltr. unterſ. behart, ſtengelſt. mit herzf. Baſis; Ebenſtrauß zſgeſetzt, geknäult, vielköpf.; Bl. gelb; 4; 7 bis 8. *)
2297. XIX., 2; Korbblütler: I. conȳza DC. (Conȳza squarrōsa L.). Sparriger A. (Dürrwurz-A.). St. dünnfilz., oberw. riſpig-äſtig; Aeſte ebenſträuß., reichblüt.; Bltr. ellipt., ſpitzl., oberſ. weichharig, unterſ. dünnfilz.; Stralbl. 3ſpalt., kaum zungenf., von Hauptkelchlänge, rötlich; ♂; 7 bis 8.
—. XIX., 2; Korbblütler: Bellis perēnnis L.; ſ. Nr. 2.
—. „ „ Stenāctis annŭa Nees; ſ. Nr. 2245.
—. XIX., 3; „ Centaurēa scabiōsa L.; ſ. Nr. 1131.
—. „ „ C. jacēa L.; ſ. Nr. 1343.
2298. „ „ C. calcitrāpa L. Stern-Flockenblume (Sterndiſtel). St. ſparrig-äſtig; Bltr. tief-fiederſpalt.; Hauptk. kahl; ſeitenſt. Köpfchen einzeln, faſt ſitz.; Bl. blaßpurpurn; ☉ bis ♂; 7 bis 8.
2299. XIX., 3; Korbblütler: C. paniculāta Jacq. (C. maculōsa Lmk.). Riſpigäſtige F. (gefleckte F.). St. riſp.-äſtig; untere Bltr. dopp.-, obere einfach-gefied., lineal.-zipfel.; Anhängſel der eif. Kbltchn. mit 3eck., ſchwarzem Fleck; Bl. blaßpurpurn, ſelten weiß; ♂; 7 bis 8.
2300. XIX., 3; Korbblütler: C. amāra L. Bittere F. Grundſtänd. Bltr. geſtielt, ganzrand. oder eingeſchn., eif. oder lanzettl., ſtengelſt. lanzettl. oder lineal., ſpitz, ganzrand. oder gezähnt; die beiden unteren Hüllſchuppen nicht gefied., deutlich-geſpitzt; Hülle roſtrot; Bl. purpurn oder violet; 4; 7 bis 8; Kr.
—. XX., 5; Oſterluzeipfl.: Aristolochĭa clematītis L.; ſ. Nr. 2209.
2301. XXI., 1; Giftmilcher: Euphorbĭa lathȳris L. (Tithymā-

*) Inula hybrida Baumg. iſt ein Baſtard von I. ensifolia L. und I. germanica L. und findet ſich unter den Mutterpflanzen in Niederöſterreich und Mähren!

lus lath. Scop.). Kreuzblättrige Wolfsmilch (Maulwurfs- oder kleines Springkraut). Bltr. längl.-lanzettl.; Kapſ. und Samen rundl.; Bltr. ſitz., kreuzweis-gegenſt.; ♁; 7 bis 8; ‡; ×; ‡.

—. XXI., 1; Giftmilcher: E. gerardiāna Jacq.; ſ. Nr. 1344.
—. „ „ E. salicifolĭa Host; ſ. Nr. 473.
—. „ „ E. esŭla L.; ſ. Nr. 1345.
—. XXI., 4; Neſſelpfl.: Urtīca dioĭca L.; ſ. Nr. 2102.
—. „ „ U. urens L.; ſ. 1234.
—. „ „ U. pilulifĕra L.; ſ. Nr. 1266.
—. XXI., 5; Meldenpfl.: Atrĭplex patŭlum L.; ſ. Nr. 2211.
—. „ „ A. angustifolĭum Sm.; ſ. Nr. 2159.

2302. „ „ A. nitens Rebent. (A. acumināta W. et K.). Glänzende Melde. Bltr. oberſ. glänz., unterſ. ſilberweiß-ſchülferig, 3eck.-ſpießf., obere an der Baſis abgeſtutzt, unterſ. bläulich; K. der ♀ ſtumpf; ⊙; 7 bis 8.

2303. XXI., 5; Meldenpfl.: A. oblongifolĭum W. et K. (A. tatarĭcum L.). Länglichblättrige M. (tatariſche M.). Untere Bltr. eilanzettl.; Blütenh. zur Fruchtzeit ei-, faſt rautenf., ganzrand.; Kelchlappen der ♀ trapezoid.-eif., ſpitz, auf dem Rücken eben; ⊙; 7 bis 8.

—. XXI., 5; Amarantpfl.: Amarāntus blitum L.; ſ. Nr. 2247.
—. „ „ A. prostrātus Balb.; ſ. Nr. 2248.

2304. „ Spitzklettenpfl.: Xanthĭum strumarĭum L. Gemeine Spitzklette (Bettlersläuſe, Igelklette). St. wehrlos; Bltr. herzf., 3lapp.; Fr. eif., zw. den Stacheln weichharig; Bl. grün; ⊙; 7 bis 8; ×.

2305. XXI., 5; Spitzklettenpfl.: X. macrocārpum d. Aut. (X. orientāle einiger Aut., X. italĭcum Morētti, X. riparĭum Lasch, X. saccharātum Wallr.). Großfrüchtige Sp. St. wehrlos; Bltr. an der Baſis pfeilf.; Fr. eif.-längl., zw. den Stacheln ſteifharig; Bl. grün; ⊙; 7 bis 9; Elbe von Bö. bis Hamburg, Brd., Po., Pr., Pſ., Wien, Kr.*)

2306. XXI., 5; Spitzklettenpfl.: *X. spinōsum L. Dornige Sp. St. an der Baſis der Bltr. mit 3gabel. Dornen; Bltr. ungetheilt oder 3lapp., Mittellappen verläng., zugeſp.; Bl. grün; ⊙; 7 bis 8; ‡; ×; Kr., in Th., Sa., Brd., Po., Pſ., Schl., Bö. verwildert; Vaterland: Südrußland.**)

---

*) Zwiſchen X. strumarium L. und X. italicum Moretti iſt angeblich an verſchiedenen Orten ein Baſtard beobachtet worden!

**) Seit 30 Jahren in Europa verbreitet; 1828 kam ſie durch ruſſiſche

2307. XXI., 5; Spitzkettenpfl.: X. macrocárpum DC. Istrische Sp. Fruchtstacheln von der Mitte an gebogen, an der Spitze zirkelf.-eingerollt; Bl. grün; ☉; 7 bis 9; ↕; Istrien; bei Frankfurt a. d. O. und Lippstadt verwildert.

a. An feuchten Wegen:

—. IV., 1; Kardenpfl.: Dipsăcus pilōsus L.; s. Nr. 2079.

—. V., 1; Schlüsselblümler: Lysimachĭa nummularĭa L.; s. Nr. 1008.

—. VI., 1; Semede: Juncus tenŭis Roth; s. Nr. 1346.

2308. XIV., 2; Rachenblümler: Euphrasĭa odontītes L. (Odontītes rubra Pers., Bartschĭa odont. Sm., E. verna Bellard.). Rotblütiger Trost (Zahntrost). St. ästig; Bltr. aus breiterer Basis verschmäl., lineal-lanzettl.; Deckbltr. länger als die rosenroten, selten weißen Bl.; Staubb. an der Spitze etwas wollig; ☉; 7 bis 9.

2309. XIV., 2; Rachenblümler: E. serotīna Lmk. Später T. Bltr. lanzettl., beiders. verschmäl.; Deckbltr. kürzer als die Bl.; Bl. rot; ☉; 7 bis 8; Kr., Ty.

—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Tetragonolŏbus siliquōsus L.; s. Nr. 1347.

b. An sandigen, feuchten Wegen:

—. V., 3; Paronychienpfl.: Corrigiŏla littorālis L.; s. Nr. 1348.

c. An schattigen Wegen:

—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Galēga officinālis L.; s. Nr. 1349.

d. In Wagengleisen:

—. IV., 1; Schlüsselblümler: Centuncŭlus minĭmus L.; s. Nr. 1350.

e. In feuchten, wenig befarenen Wagengleisen:

—. X., 4; Nelkenblütler: Sagīna apetăla L.; s. Nr. 604.

f. An Hohlwegen:

—. V., 1; Glockenblümler: Phyteuma spicātum L.; s. Nr. 1049.

g. An Wegen neben Hecken:

Vergl. §. 481, i.

Truppen nach der Wallachei; 1830 erschien sie zugleich mit der Cholera in der Bukowina, weshalb das Landvolk die Pflanze „Choleradistel" nannte; 1839 ward sie in Ungarn verbreitet; von dort aus kam sie durch Schweine und Schafwolle nach Deutschland!

§. 485. **H. In und um Dörfer, Städte, menschliche Wohnungen u. dergl.:**

2310. III., 2; Graspfl.: *Panĭcum capillāre L. Haarästige Hirse. Rispe offen, straffästig; Zweige derselben hardünn; ☉; 7 bis 8; Wien; Vaterland: Nordamerika.

—. IV., 1; Nesselpfl.: Parietarĭa officinālis L.; s. Nr. 2171.

—. „ „ P. ramiflōra Mnch.; s. Nr. 2225.

—. V., 1; Rachenblümler: Verbăscum nigrum L.; s. Nr. 2082.

—. „ Nachtschattenpfl.: Hyoscyămus niger L.; s. Nr. 1195.

—. „ „ *Datūra stramonĭum L.; s. Nr. 1253.

—. V., 1; Borretschpfl.: *Borrago officinālis L.; s. Nr. 2250.

—. „ „ Cynoglōssum officināle L.; s. Nr. 1287.

—. „ Glockenblümler: Campanŭla rapunculoīdes L.; s. Nr. 3002.

2311. V., 1; Schnabelpfl.: *Impatĭens parviflōra DC. Kleinblütiges Springkraut. Bl. aufr., in lockeren, wenigblüt. Trauben: Sporn grade; Blkr. gelb; ☉; 7 bis 8; Jena, Blankenburg a. H., Berlin, Frankfurt a. d. O., Breslau, Prag; Vaterland: Mongolei.

2312. V., 2; Meldenpfl.: Blitum capitātum L. Aehrentragender Erdbeerspinat. Blr. 3eck., fast spießf., wenigzähn.; Aehren endständ., blattlos; Fr. dunkelrot; Bl. blattachselst.; ☉; 7 bis 8; ♆; Ty.

—. V., 2; Meldenpfl.: Chenopodĭum bonus henrĭcus L.; s. Nr. 1291.

—. V., 2; Meldenpfl.: Ch. rubrum L.; s. Nr. 2228.

—. „ „ Ch. glaucum L.; s. Nr. 1292.

—. „ „ Ch. hybrĭdum L.; s. Nr. 2229.

—. „ „ Ch. murāle L.; s. Nr. 2230.

—. „ „ Ch. urbĭcum L.; s. Nr. 2269.

—. „ „ Ch. album L.; s. Nr. 2231.

—. „ „ Ch. vulvarĭa L.; s. Nr. 2232.

—. „ Doldenpfl.: Aethūsa cynapĭum L.; s. Nr. 2178.

—. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygŏnum aviculāre L.; s. Nr. 2255.

—. XI., 3; Waupfl.: Resēda luteŏla L.; s. Nr. 1299.

—. XII., 3; Rosenpfl.: Geum urbānum L.; s. Nr. 1077.

—. „ „ Potentīlla supīna L.; s. Nr. 1369.

—. „ „ P. anserīna L.; s. Nr. 578.

—. XIII., 1; Linde: Tilĭa parvifolĭa Ehrh.; s. Nr. 2061.

—. „ Mohnpfl.: Chelidonĭum majus L.; s. Nr. 534.

—. XIV., 1; Lippenblümler: *Leonūrus cardiăca L.; ſ. Nr. 1182.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Lamĭum album L.; ſ. Nr. 169.
2313. „ „ Stachys germanĭca L. Deutſcher Zieſt (Katzenblut, Acker-Andorn). St. dichtwollig-zottig; Bltr. herz-eif., wollig-ſtlz.; Bl. hellpurpurn, in reichen Quirlen; K. wollig; Pfl. widrigriechend; 4; 7 bis 8.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Ballōta nigra L.; ſ. Nr. 1219.
—. XIV., 2; Eiſenkrautpfl.: Verbēna officinālis L.; ſ. Nr. 1304.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Lepidĭum satīvum L.; ſ. Nr. 1223.
—. „ „ L. ruderāle L.; ſ. Nr. 1224.
—. „ „ L. graminifolĭum L.; ſ. Nr. 1308.
—. „ „ Senebiēra coronŏpus Poir.; ſ. Nr. 2258.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Sisymbrĭum sophīa L.; ſ. Nr. 591.
—. „ „ S. loeselĭi L.; ſ. Nr. 1312.
—. „ „ Diplotāxis tenuifolĭa DC.; ſ. Nr. 1313.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum rotundifolĭum L.; ſ. Nr. 560.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: G. robertiānum L.; ſ. Nr. 431.
—. „ „ G. molle L.; ſ. Nr. 539.
—. „ „ Erodĭum cicutarĭum l'Herit.; ſ. Nr. 217.
—. XVI., 5; Pappelroſenpfl.: Malva vulgāris Fr.; ſ. Nr. 1318.
—. „ „ M. boreālis Wallm.; ſ. Nr. 1319.
—. „ „ M. sylvēstris L.; ſ. Nr. 1225.
—. XIX., 1; Korbblütler: Sonchus oleracĕus L.; ſ. Nr. 1262.
—. „ „ Lappa minor DC.; ſ. Nr. 2199.
—. „ „ L. major Gaertn.; ſ. Nr. 2200.
—. „ „ L. tomentōsa Lmk.; ſ. Nr. 2201.
2314. XIX., 2; „ *Artemisĭa absinthĭum L. Wermut (bitterer Beifuß, Abſint). Stbltr. 2- bis 3fach-gefied., ſeidengrau-weichharig; Blütenboden harig; Bl. gelb; Krbltr. an der Baſis nicht geöhrt; 4; 7 bis 8; ♆; ♃; Vaterland: Südeuropa.
—. XIX., 3; Korbblütler: *Pyrĕthrum partheníum Sm.; ſ. Nr. 2243.
—. XIX., 2; Korbblütler: Bellis perēnnis L.; ſ. Nr. 2.
2315. XIX., 3; „ *Heliānthus annŭus L. Einjährige Sonnenroſe (Sommerblume, indiſche Sonne, Sonnenblume, -krone). St. aufr.; Bltr. herzf.; Blütenſt. verdickt; Bl. gelb; Fr. an den 2 Ecken oben mit kurzen,

gezähnten Grannen; Wrz. ästig; ☉; 7 bis 8; ♆; ☨; ⚓; Vaterland: Peru.*)

—. XIX., 4; Korbblütler: *Calendŭla officinālis L.; s. Nr. 2208.

—. XXI., 4; Nesselpfl.: Urtīca dioĭca L.; s. Nr. 2102.

—. „ „ U. urens L.; s. Nr. 1234.

—. XXI., 5; Meldenpfl.: *Atrĭplex hortēnse L.; s. Nr. 2260.

—. „ „ A. hastātum L.; s. Nr. 2210.

—. „ „ A. patŭlum L.; s. Nr. 2211.

—. „ „ A. angustifolĭum Sm.; s. Nr. 2159.

—. „ Amarantpfl.: Amarāntus blitum L.; s. Nr. 2247.

—. „ „ A. prostrātus Balb.; s. Nr. 2248.

a. Auf bebauten Orten:

2316. XIV., 1; Lippenblümler: *Elsholtzĭa cristāta Willd. (E. patrīni Grcke., Mentha patr. Lepech.). Kammartige Elsholtzie. Bltr. gestielt, eif., auch längl., beiders. verschmäl.; Deckbltr. breit-eif., gewimp., einseitswendig; Quirle genähert, einseitswendig; Bl. blaßviolet; ☉ und ♂; 7 bis 8; Hamburg, Ha., Po., Pf. u. s. w.; Vaterland: Südeuropa.

§. 486. **I. Auf Schutt, wüsten Dorfplätzen u. dergl.:**

—. II., 1; Lippenblümler: Salvĭa verticillāta L.; s. Nr. 1191.

—. III., 2; Graspfl.: Poa comprēssa L.; s. Nr. 1278.

—. IV., 1; Nesselpfl.: Parietarĭa officinālis L.; s. Nr. 2171.

—. „ Kardenpfl.: Dipsăcus sylvēstris Mill.; s. Nr. 2172.

—. „ „ D. laciniātus L.; s. Nr. 2264.

—. „ „ D. fullōnum L.; s. Nr. 2263.

—. „ „ D. pilōsus L.; s. Nr. 2079.

—. V., 1; Rachenblümler: Verbăscum lychnītis L.; s. Nr. 2266.

—. „ Nachtschattenpfl.: Hyoscyămus niger L.; s. Nr. 1195.

—. „ „ *Datura stramonĭum L.; s. Nr. 1253.

—. „ „ *Solānum nigrum L.; s. Nr. 1254.

2317. „ „ *S. melanocerăsum Willd. (S. judaĭcum Roth). Kantiger Nachtschatten. St. und Aeste kant.; Kanten mit aufwärtsgericht., kurzen, steifen Borsten; Bltr. rautenf., buchtig-gezähnt; Bl. weiß; Beere schwarz; ☉; 7 bis 9; ☥; ✕; Vaterland: Amerika.

—. V., 1; Borretschpfl.: Cerīnthe minor L.; s. Nr. 1198.

—. „ „ Echĭum vulgāre L.; s. Nr. 1108.

2318. „ „ E. italĭcum L. Italischer Natter-

*) Kam i. J. 1569 nach Europa!

kopf. St. nebst den lineal-lanzettl. Bltrn. dicht-gestrichelt-borstig; Blkrröhre von dopp. Kelchlänge; Stbgf. fast von dopp. Kronlänge; Griff. an der Spitze 2spalt.; Bl. blaß-blau, violet oder weiß; ☉; 7 bis 8; De., St., Ty. u. s. w.

—. V., 1; Borretschpfl.: *Borrāgo officinālis L.; s. Nr. 2250.
—. „ „ Echinospērmum lappŭla Lehm.; s. Nr. 1286.
—. V., 1; Borretschpfl.: E. squarrōsum Rchb.; s. Nr. 2226.
—. „ „ Cynoglōssum officināle L.; s. Nr. 1287.
—. „ Glockenblümler: Campanŭla rapunculoīdes L.; s. Nr. 3002.
—. V., 2; Meldenpfl.: Chenopodĭum rubrum L.; s. Nr. 2228.
—. „ „ Ch. glaucum L.; s. Nr. 1292.
—. „ „ Ch. hybrĭdum L.; s. Nr. 2229.
—. „ „ Ch. murāle L.; s. Nr. 2230.
—. „ „ Ch. urbĭcum L.; s. Nr. 2269.
—. „ „ Ch. album L.; s. Nr. 2231.
—. „ „ Ch. opulifolĭum Schrad.; s. Nr. 2270.
—. „ „ Ch. vulvarĭa L.; s. Nr. 2232.
2319. „ „ Kochĭa scoparĭa Schrad. Besen-artige Kochie. Krautig, fast aufr., weichhaarig; Bltr. lineal-lanzettl., gewimp.; Bl. zu 2 blattachselst., endl. mit eif., spitzen Anhängen; ☉; 7 bis 8; Bö., Mä., De., Kr. *)
—. V., 2; Doldenpfl.: Petroselīnum satīvum Hoffm.; s. Nr. 1293.
—. V., 2; Doldenpfl.: Aethūsa cynapĭum L.; s. Nr. 2178.
—. „ „ Tordylĭum maxĭmum L.; s. Nr. 2272.
—. „ „ Anthrīscus cerefolĭum Hoffm.; s. Nr. 456.
—. V., 2; Doldenpfl.: Chaerophўllum temŭlum L.; s. Nr. 1177.
—. VI., 3; Knöterichpfl.: Rumex obtusifolĭus L.; s. Nr. 2104.
—. „ „ R. crispus L.; s. Nr. 2254.
—. VIII., 1; „ Polygŏnum aviculāre L.; s. Nr. 2255.
—. X., 3; Nelkenblütler: Silēne inflāta Sm.; s. Nr. 1178.
—. „ „ Stellarĭa medĭa Vill.; s. Nr. 4.
—. „ „ Alsīne verna Bartl.; s. Nr. 618.
—. X., 5; Schnabelpfl.: *Oxălis stricta Jacq.; s. Nr. 1260.
—. „ „ *O. corniculāta L.; s. Nr. 1261.
—. XI., 3; Waupfl.: Resēda luteŏla L.; s. Nr. 1299.
—. „ „ R. lutĕa L.; s. Nr. 1372.
—. XII., 3; Rosenpfl.: Potentīlla anserīna L.; s. Nr. 578.

*) Diese Pflanze ward vor etwa 30 Jahren am salzigen See bei Eisleben gefunden, wird aber neuerdings daselbst vergeblich gesucht!

—. XII., 3; Rosenpfl.: P. argentea L.; s. Nr. 464.
—. XIII., 1; Mohnpfl.: Chelidonium majus L.; s. Nr. 534.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Nepeta cataria L.; s. Nr. 1215.
—. " " N. nepetella L.; s. Nr. 2189.
—. " " Lamium album L.; s. Nr. 169.
—. " " *Leonurus cardiaca L.; s. Nr. 1182.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Chaitūrus marrubiāstrum Rchb.; s. Nr. 2064.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Galeopsis tetrahit L.; s. Nr. 2190.
—. XIV., 1; Lippenblümler: G. pubescens Bess.; s. Nr. 2109.
—. " " Stachys germanica L.; s. Nr. 2313.
2320. " " Marrubium candidissimum L. Weißfilziger Andorn. Gelblichweiß-filzig oder -wollig; Aeste aufr.; Bltr. runzelig, untere breit-eif., obere längl.; Kzähne fast gleich, filz., endl. abstehend.; Bl. weiß, flockig; 4; 7 bis 8; Kr.
2321. XIV., 1; Lippenblümler: M. pannonicum Rchb. (M. paniculātum Desr., M. peregrīnum var. a. L.). Ungarischer A. St. sehr spreizästig; Bltr. eif. oder längl., locker-graufilz.; Kzähne 5 bis 10, zur Fruchtzeit abstehend., fein dornig, stechend, an der Spitze nackt; Bl. weiß, dicht-filz.; 4; 7 bis 8; Oe., Sa. (Erdeborn, Wormsleben).
2322. XIV., 1; Lippenblümler: M. cretīcum Mill. (M. pauciflōrum Wallr., M. peregrīnum var. b. L.). Kretischer A. St. sehr abstehend.-ästig; Bltr. ellipt.-lanzettl., in den Blattst. verschmäl., dicht-weißfilz.; Kzähne 5, stets aufr., bis zur Spitze filz., nicht stechend; Bl. wie bei vor.; 4; 7 bis 8; an den gleichen Standorten.
—. XIV., 1; Lippenblümler: M. vulgāre L.; s. Nr. 2192.
—. " " Ballōta nigra L.; s. Nr. 1219.
—. " " *Elsholtzia cristata Willd.; s. Nr. 2316.
—. XIV., 2; Eisenkrautpfl.: Verbēna officinālis L.; s. Nr. 1304.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Alyssum campēstre DC.; s. Nr. 580.
—. " " Thlaspi arvense L.; s. Nr. 215.
—. " " Lepidium satīvum L.; s. Nr. 1223.
—. " " L. ruderale L.; s. Nr. 1224.
—. " " Capsella bursa pastōris Vent.; s. Nr. 3.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Senebiera coronopus Poir.; s. Nr. 2258.
2323. XV., 1; Kreuzblütler: S. didyma Pers. (Lepidium

didymum L., S. pinnatifida DC., Coronopus didymus Sm.). Zweiknotige Feldkresse (Stinkkresse). Blütenst. länger, als die weißen Bl.; Schötchen 2knot., zsgedr., an der Basis und an der Spitze ausgerand.; Griff. fehlend; ☉; 7 bis 8; Hamburg, Po., Pr., Th., Aschaffenburg, Bern.

—. XV., 1; Korbblütler: *Bunias orientalis L.; s. Nr. 1268.
—. XV., 2; " Sisymbrium sophia L.; s. Nr. 591.
—. " " S. columnae Jacq.; s. Nr. 1310.
—. " " S. irio L.; s. Nr. 1311.
—. " " S. loeselii L.; s. Nr. 1312.
—. " " S. officinale Scop.; s. Nr. 1361.
—. " " Diplotaxis muralis DC.; s. Nr. 1314.
—. " " Erucastrum pollichii Sch. et Sp.; s. Nr. 1315.
—. XV., 2; Korbblütler: E. obtusangulum Rchb.; s. Nr. 1362.
2324. XIV., 2; Rachenblümler: Antirrhinum orontium L. (Orontium arvense L.). Feld-Löwenmaul (kleiner Dorant, Hundskopf, Affenschädel, Kalbsnase, Todtenkopf, Teufelsband). Bl. entfernt, blaßrot; Kelchzipf. lanzettl., länger als die Blkr.; Samen auf der einen Seite rauh, gekielt, auf der andern mit buchtig-gekerbter Längsrinne; ☉; 7 bis 9; ✕.*)
—. XIV., 2; Rachenblümler: Linaria striata DC.; s. Nr. 2240.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: *Geranium sibiricum L.; s. Nr. 2259.
—. " " G. pusillum L.; s. Nr. 537.
—. " " G. rotundifolium L.; s. Nr. 560.
—. " " G. columbinum L.; s. Nr. 675.
—. " " G. dissectum L.; s. Nr. 538.
—. " " G. molle L.; s. Nr. 539.
—. " " Erodium ciconium Willd.; s. Nr. 1373.
—. " " E. cicutarium l'Herit.; s. Nr. 217.
—. " " E. moschatum Ait.: s. Nr. 540.
—. XVI., 5; Pappelrosenpfl.: Althaea pallida W. et K.; s. Nr. 1374.
—. XVI., 5; Pappelrosenpfl.: Malva vulgaris Fr.; s. Nr. 1318.
—. " " M. sylvestris L.; s. Nr. 1225.
—. " " M. nicaeensis All.; s. Nr. 2280.
—. " " Lavatera thuringiaca L.; s. Nr. 2092.

*) Diese Pflanze gehörte ehemals zu den wichtigsten Zauberkräutern (Räucherung gegen Hexen) und soll einen Bestandtheil der aqua tofana gebildet haben!

—. XVII., 2; Erdrauchpfl.: Fumaria officinālis L.; ſ. Nr. 561.
—. „ „ F. capreolāta L.; ſ. Nr. 541.
—. „ „ Corydălis claviculāta Pers.; ſ. Nr. 1029.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Melilōtus alba Lmk.; ſ. Nr. 2197.
—. „ „ Lathyrus lenticŭla Kitt.; ſ. Nr. 1470.
—. XIX., 1; Korbblütler: Crepis foetida L.; ſ. Nr. 1336.
—. „ „ C. tectōrum L.; ſ. Nr. 1366.
—. „ „ Lactūca scariōla L.; ſ. Nr. 2284.
—. „ „ Sonchus oleracĕus L.; ſ. Nr. 1262.
—. „ „ S. asper Hall.; ſ. Nr. 1263.
—. „ „ Chondrilla juncĕa L.; ſ. Nr. 2096.
—. „ „ Leontŏdon vulgāris Kitt.; ſ. Nr. 1079.
—. XIX., 1; Korbblütler: Lappa minor DC.; ſ. Nr. 2199.
—. „ „ L. major Gaertn.; ſ. Nr. 2200.
—. „ „ L. tomentōsa Lmk.; ſ. Nr. 2201.
—. „ „ Cirsium eriophŏrum Scop.; ſ. Nr. 2287.
—. XIX., 1; Korbblütler: C. polyanthĕmon DC.; ſ. Nr. 2288.
—. „ „ Carduus nutans L.; ſ. Nr. 2289.
—. „ „ C. acanthoīdes L.; ſ. Nr. 1233.
—. „ „ C. hamulōsus Ehrh.; ſ. Nr. 2290.
—. „ „ Onopōrdon acanthium L.; ſ. Nr. 2202.
—. XIX., 2; Korbblütler: Senecio jacobaea L.; ſ. Nr. 2075.
—. „ „ Artemisia vulgāris L.; ſ. Nr. 2205.
—. „ „ *Pyrĕthrum partheni̇um Sm.; ſ. Nr. 2243.
—. XIX., 2; Korbblütler: Matricaria inodōra L.; ſ. Nr. 2206.
—. „ „ Achillēa nobĭlis L.; ſ. Nr. 2244.
—. „ „ Anthĕmis arvēnsis L.; ſ. Nr. 1342.
—. „ „ A. altissĭma DC.; ſ. Nr. 1375.
2325. „ „ A. ruthenĭca M. B. (A. neilreichĭi Ortm., A. cota Koch, A. austriăca, virēscens Rchb.). Ruteniſche Hundskamille (ruſſiſche H.). Blütenboden verläng.-zilindr., innen markig; Deckbltr. breit-lanzettl., ſtumpfl., etwas gezähnt, ſtarr-ſtachelſp.; Blattſpindel ſehr ſchmal-geflüg., nicht gezähnt; Stral weiß; ⊙; 7; Bö., K. S., Brd., Kr.
—. XIX., 2; Korbblütler: Inŭla helenĭum L.; ſ. Nr. 2207.
—. „ „ Stenactis annŭa Nees.; ſ. Nr. 2245.
—. XIX., 3; „ Centaurēa jacea L.; ſ. Nr. 1343.

—. XIX., 4; Korbblütler: *Calendŭla officinālis L.; s. Nr. 2208.

2326. XXI., 1; Giftmilcher: Euphorbĭa platyphȳllus L. (Tithymālus platyph. Scop., E. tithymālus). Flachblättrige Wolfsmilch. Bltr. lanzettl., mit herzf. Basis sitz., unterste verk.-eif.; Trugdolden 3- bis 5spalt., Stralen 3gabel.; Kapselwarzen fast kug.; ⊙; 7 bis 9; ‡.

—. XXI., 4; Nesselpfl.: Urtīca dioĭca L.; s. Nr. 2102.

—. " " U. urens L.; s. Nr. 1234.

—. " " U. pilulifĕra L.; s. Nr. 1266.

—. XXI., 5; Meldepfl.: *Atriplex hortēnse L.; s. Nr. 2260.

—. " " A. nitens Rchb.; s. Nr. 2302.

—. " " A. hastātum L.; s. Nr. 2210.

—. " " A. patŭlum L.; s. Nr. 2211.

—. " " A. angustifolĭum Sm.; s. Nr. 2159.

2327. " " A. rosĕum L. (A. album Scop.). Sternmelde (rosenfarbige Melde, Rosenmelde). Bltr. buchtig-gezähnt, untere rautenf., obere eif.; Aehren unterbrochen, beblätt.; Kelchlappen der ♀ rautenf., spitz-gezähntrandig; ⊙; 7 bis 8.

2328. XXI., 5; Meldepfl.: A. laciniātum L. sp. pl. Gelappte M. Bltr. tief-buchtig-gezähnt, fast spießf., untere 3eck.-rautenf., obere spießf.-längl.; Aehren endständ., blattlos, nur an der Basis beblätt.; Kelchlapp. der ♀ spießrautenf.; ⊙; 7 bis 8; Helgoland, M., Schl., Bö., Würzburg.*)

—. XXI., 5; Amarantpfl.: Amarāntus blitum L.; s. Nr. 2247.

—. " " A. prostrātus Balb.; s. Nr. 2248.

—. " Kardenpfl.: Xanthĭum strumarĭum L.; s. Nr. 2304.

—. XXI., 5; Kardenpfl.: X. macrocārpum DC.; s. Nr. 2305.

—. XXII., 8; Giftmilcher: Mercuriālis annŭa L.; s. Nr. 1267.

K. Auf Düngerhaufen, an Düngstätten u. dergl.: §. 487.

2329. III., 2; Graspfl.: Echinochlŏa crus-galli L. (Panĭcum cr.-g. L., Ophismĕnus cr.-g. Wth.). Hühner-Grannenhirse (Hühnerhirse, Hahnensporn). Aehren wechsel- oder gegenst., zsgesetzt, lineal.; Aehrchen risp.; Klappen begrannt; ⊙; 7 bis 8; ×.

—. V., 1; Nachtschattenpfl.: Hyoscyămus niger L.; s. Nr. 1195.

---

*) Diese Pflanze ward früher auch am salzigen See bei Eisleben gefunden. — In Schlesien ist sie aus Ungarn nach Ratibor verschleppt!

—. V., 1; Nachtſchattenpfl.: *Datūra stramonĭum L.; ſ. Nr. 1253.
—. V., 1; Nachtſchattenpfl.: *Solānum nigrum L.; ſ. Nr. 1254.
—. V., 2; Meldenpfl.: Chenopodĭum glaucum L.; ſ. Nr. 1292.
—. „ „ Ch. album L.; ſ. Nr. 2231.
—. „ „ Ch. vulvarĭa L.; ſ. Nr. 2232.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygŏnum persicarĭa L.; ſ. Nr. 2182.
—. XII., 3; Roſenpfl.: Potentīlla supīna L.; ſ. Nr. 1369.
—. XIII., 1; Mohnpfl.: Chelidonĭum majus L.; ſ. Nr. 534.
—. XIX., 1; Korbblütler: Sonchus oleracĕus L.; ſ. Nr. 1262.
—. „ „ Lappa minor DC.; ſ. Nr. 2199.
—. „ „ L. major Gaertn.; ſ. Nr. 2200.
—. „ „ L. tomentōsa Lmk.; ſ. Nr. 2201.
—. XIX., 2; „ *Cotŭla coronopifolĭa L.; ſ. Nr. 2294.
—. XXI., 5; Kardenpfl.: Xanthĭum strumarĭum L.; ſ. Nr. 2304.
—. XXI., 5; Meldenpfl.: Atrĭplex patŭlum L.; ſ. Nr. 2211.
—. „ „ A. oblongifolĭum W. et K.; ſ. Nr. 2303.
—. XXI., 5; Meldenpfl.: A. roseŭm L.; ſ. Nr. 2327.
—. „ „ A. laciniātum L.; ſ. Nr. 2328.

§. 488. **L. Auf Aeckern:**

—. II., 1; Rachenblümler: Veronīca agrēstis L.; ſ. Nr. 224.
—. „ „ V. polīta Fr.; ſ. Nr. 61.
—. „ Lippenblümler: Salvĭa sylvēstris L.; ſ. Nr. 2168.
2330. III., 1; Baldrianpfl.: *Valerianēlla morisonĭi DC. (Fedĭa dentāta Auct. german., V. dentāta Poll.). Moriſon's Rapünzchen. Bl. bläulichweiß; Fr. eikegelf., mit längl. Mittelfelde; Kelchrand von halber Fruchtbreite; Deckbltr. knorp.-gewimp.; ☉; 7 bis 8; ✕.
Varirt: leiocārpa DC. (Valeriāna locūsta var. d. dentata L., Fedĭa dent. Vahl), lasiocarpa Koch (V. mixta Dufr., V. dent. Poll., Fedĭa morisonĭi Spr.).
—. III., 1; Baldrianpfl.: *V. hamāta Bastard; ſ. Nr. 1376.
—. „ „ *V. carināta Lois.; ſ. Nr. 226.
—. „ „ *V. vesicarĭa Mnch.; ſ. Nr. 1378.
—. III., 2; Graspfl.: Andropōgon ischaemum L.; ſ. Nr. 2261.
—. „ „ Agrōstis spica venti L.; ſ. Nr. 1379.
—. „ „ A. interrūpta L.; ſ. Nr. 1380.
—. „ „ Setarĭa verticillāta P. B.; ſ. Nr. 1249.
—. „ „ S. virĭdis P. B.; ſ. Nr. 2249.

2331. III., 2; Graspfl.: S. glauca P. B. (Panĭcum glaucum L., Pennisētum gl. R. Br.). Gelbharige Borſtenhirſe (Borſtengras, Fennich). Spelzen der ♀ querrunzelig; Hülle roſtbraungelb; Bltr. blaugrün; ☉; 7 bis 8; ✕.
—. III., 2; Graspfl.: Echinochlŏa crus-galli L.; ſ. Nr. 2329.
2332. „ „ „ Cynŏdon dactȳlon Rich. (Panĭcum dact. L.). Gefingerter Hundszahn (Himmelsſchwade, Bermudagras, Graswurzel). Wrzſtock mit kriech. Ausläufern; Bltr. unterſ. behart; Aehre 3- bis 5fingerig; 2↳; 7 bis 8; ✕.
—. III., 2; Graspfl.: Digitarĭa ciliāris Koel.; ſ. Nr. 1251.
—. „ „ Alopecūrus agrēstis L.; ſ. Nr. 1381.
—. „ „ Phleum aspĕrum Vill.; ſ. Nr. 523.
—. „ „ Arrhenathērum avenacĕum P. B.; ſ. Nr. 1382.
—. III., 2; Graspfl.: Avēna brevis Roth; ſ. Nr. 1383.
—. „ „ *A. strigōsa Schreb.; ſ. Nr. 1384.
—. „ „ *A. fatŭa L.; ſ. Nr. 1385.
2333. „ „ *A. nuda L. Nackter Hafer (Nackt- oder Spinnenhafer). Bl. meiſt 3blüt.; obere Klappe 7- bis 9nervig; Bl. ſtark-nervig, an der Spitze harſpitz.-2ſpalt.; Riſpenachſe kahl; Samenkorn bei der Reife blos von den Blütenſcheidchen bedeckt; ☉; 7 bis 8; ♆; Oe.
2334. III., 2; Graspfl.: *A. orientālis Schreb. Türkiſcher H. Riſpe einſeitswendig, zſgezogen; Bl. kahl; obere Klappe 9nervig; Bälge meiſt 2blüt.; Granne weiß; unteres Bl. begrannt; ☉; 7 bis 8; ♆; Vaterland: Orient.
2335. III., 2; Graspfl.: *A. hybrĭda Peterm. (A. intermedĭa Lindgr.). Baſtard-H. Riſpe etwas zſgezog.; Bälge meiſt 2blüt.; untere Klappe 9-, obere 11nervig; Bl. kahl; ☉; 7 bis 8.
—. III., 2; Graspfl.: Bromus arvēnsis L.; ſ. Nr. 1193.
2336. „ „ „ B. secalĭnus L. Roggentreſpe (Töberich, Dort). Blattſch. kahl; fruchttrag. Bl. am Rande zſgezog., ſtielrund, ſich nicht deckend; Spelzen gleichlang; Bltr. oberſ. weichharig, am Rande entfernt-lang-gewimp.; ☉ und ♂; 7 bis 8; ✕.
Varirt: vulgāris (Aehrchen glatt, fein-punkt.; Granne kurz), Br. velutīnus (Aehrchen weichharig, Granne mittel), Br. multiflōrus Sm. (Aehrchen faſt einſeitswendig; Granne lang), Br. hordacĕus Gmel. (wie vor.; ſammetharig, kleinährig).
—. III., 2; Graspfl.: Eragrōstis pilōsa P. B.; ſ. Nr. 1386.
—. „ „ Poa annŭa L.; ſ. Nr. 14.

—. III., 2; Graspfl.: Tritĭcum repens L.; ſ. Nr. 1279.
—. „ „ Lolĭum temulēntum L.; ſ. Nr. 1387.
—. „ „ L. arvēnse With.; ſ. Nr. 1388.
—. „ „ L. speciōsum Stev.; ſ. Nr. 1389.
—. IV., 1; Kardenpfl.: Scabiōsa columbarĭa L.; ſ. Nr. 2080.
—. „ „ Sc. arvēnsis L.; ſ. Nr. 1283.
—. „ Krapppfl.: Sherardĭa arvēnsis L.; ſ. Nr. 632.
—. „ „ Galĭum aparīne; ſ. Nr. 2155.
—. „ Roſenpfl.: Alchemīlla aphănes Leers; ſ. Nr. 631.
—. „ „ Poterĭum sanguisōrba L.; ſ. Nr. 569.
—. V., 1; Schlüſſelblümler: Anagāllis arvēnsis L.; ſ. Nr. 55.
—. „ „ A. coerulĕa Schreb.; ſ. Nr. 227.
—. „ Nachtſchattenpfl.: *Solānum nigrum L.; ſ. Nr. 1254.
—. „ „ *S. melanocerăsum Willd.; ſ. Nr. 2317.
—. V., 1; Borretſchpfl.: Cerīnthe minor L.; ſ. Nr. 1198.
—. „ „ Echĭum vulgāre L.; ſ. Nr. 1108.
—. „ „ Lithospērmum arvēnse L.; ſ. Nr. 571.
—. „ „ Anchūsa angustifolĭa Lehm.; ſ. Nr. 960.
—. V., 1; Borretſchpfl.: Myosōtis intermedĭa Lk.; ſ. Nr. 1391.
—. „ Windenpfl.: Convolvŭlus arvēnsis L.; ſ. Nr. 1255.
—. „ Glockenblümler: Campanŭla rotundifolĭa L.; ſ. Nr. 1288.
—. V., 1; Glockenblümler: C. rapunculoīdes L.; ſ. Nr. 3002.
—. „ Veilchenpfl.: Viŏla tricŏlor L.; ſ. Nr. 525.
—. V., 2; Meldenpfl.: Blitum virgātum L.; ſ. Nr. 2251.
—. „ „ Chenopodĭum hybrĭdum L.; ſ. Nr. 2229.
—. „ „ Ch. album L.; ſ. Nr. 2231.
—. „ „ Ch. polyspērmum L.; ſ. Nr. 2233.
—. „ „ Kochĭa scoparĭa Schrad.; ſ. Nr. 2319.
—. „ Doldenpfl.: Critămus falcarĭa Rchb.; ſ. Nr. 2252.
2337. „ „ Ammi majus L. Großes Ammi. St. kahl, ſtumpf-kant.; untere Bltr. einfach- und dopp.-geſied., Bltchn. lanzettl., knorp.-ſtachelſp.-geſägt; Hüllchen vielblättr., Bltchn. 3ſpalt.; Bl. weiß; ☉; 7; Kr., Wien und ſonſt eingeſchleppt.
—. V., 2; Doldenpfl.: Aethūsa cynapĭum L.; ſ. Nr. 2178.
2338. „ „ Turgenĭa latifolĭa Hoffm. (Tordylĭum latifolĭum L. sp. pl., Caucălis latif. L. syst. nat.). Breitblättrige Turgenie. St. oberw. kurz-borſtig, abſteh.-äſtig; Bltr. geſied.; Hülle 2- bis 5-, Hüllchen 5- bis 7blättr.; Bl. weiß oder rotbraun; Fruchtrippen ſtachelig; ☉; 7 bis 8; ×.

—. V., 2; Doldenpfl.: Conium maculatum L.; ſ. Nr. 2181.
—. VI., 1; Lilienpfl.: Allium vineale L.; ſ. Nr. 1392.
—. „ „ A. sphaerocephalum L.; ſ. Nr. 1393.
—. „ „ A. scorodoprasum L.; ſ. Nr. 1207.
2339. „ „ A. oleraceum L. Gemüſe-Lauch. Bltr. lineal., unterſ. vielriefig; Dolde zwiebeltrag.; Stbf. etwa ſo lang, als die ſtumpfen Blütenhüllbltr.; Blütenſch. 2klapp., die eine Klappe lang-geſchnäbelt; Bl. grünlichweiß oder rötlich; ☉ und ♃ (4); 7 bis 8; ♆.
—. VI., 3; Knöterichpfl.: Rumex acetosella L.; ſ. Nr. 1296.
—. VIII., 1; Knöterichpfl,: Polygonum aviculare L.; ſ. Nr. 2255.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: P. convolvulus L.; ſ. Nr. 1257.
2340. „ „ *P. tataricum L. (Fagopyrum tat. Gaertn.). Tatariſcher Buchweizen. Bl. in riſp. Trauben, grün; Kanten der Nüſſe ausgeſchweift-gezähnt; Bltr. faſt vollk.-3eck.; ☉; 7 bis 8; ♆; ✕; Vaterland: Aſien.*)
—. X., 2; Paronychienpfl.: Scleranthus annuus L.; ſ. Nr. 574.
—. X., 3; Nelkenblütler: Silene noctiflora L.; ſ. Nr. 2257.
—. „ „ Spergularia rubra Presl.; ſ. Nr. 576.
—. „ „ Melandrium dubium Hampe; ſ. Nr. 1258.
—. X., 3; Nelkenblütler: Stellaria media Vill.; ſ. Nr. 4.
—. „ „ Arenaria serpyllifolia L.; ſ. Nr. 1259.
—. X., 4; „ Sagina procumbens L.; ſ. Nr. 635.
—. „ „ Spergula arvensis L.; ſ. Nr. 1394.
—. X., 5; „ Agrostemma githago L.; ſ. Nr. 1395.
—. „ Schnabelpfl.: *Oxalis stricta Jacq.; ſ. Nr. 1260.
—. „ „ *O. corniculata L.; ſ. Nr. 1261.
—. XI., 1; Fettkrautpfl.: Portulaca oleracea L.; ſ. Nr. 1269.
—. XI., 3; Waupfl.: Resēda luteola L.; ſ. Nr. 1299.
—. XII., 3; Roſenpfl.: Rubus caesius L.; ſ. Nr. 443.
—. XIII., 1; Mohnpfl.: *Hypecoum pendulum L.; ſ. Nr. 1396.
—. XIII., 1; Mohnpfl.: Papaver rhoeas L.; ſ. Nr. 638.
2341. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: Nigella arvensis L. Feld-Schwarzkümmel (Spinneleblümchen). Bltr. 2- bis 3fach-

*) Der tatariſche oder ſibiriſche Buchweizen kam erſt im 18. Jahrh. aus der Tatarei oder aus Sibirien durch deutſche Einwanderer nach Petersburg, von wo aus er ſich nach dem übrigen Europa verbreitete! Man baut ihn in der Tatarei, in Schweden und in Piemont.

fiedertheil.; Hülle fehlend; Staubb. ſtachelſp.; Kapſ. glatt; Bl. bläulichweiß; ⊙; 7 bis 9; ✕.

—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: N. damascēna L.; ſ. Nr. 559.
—. " " Delphinĭum consolĭda L.; ſ. Nr. 636.
—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: *D. ajācis L.; ſ. Nr. 1398.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Lamĭum purpurĕum L.; ſ. Nr. 10.
—. XIV., 1; Lippenblümler: L. incīsum Willd.; ſ. Nr. 206.
—. " " L. intermedĭum Fr.; ſ. Nr. 639.
—. " " L. amplexicaule L.; ſ. Nr. 214.
2342. " " Galeōpsis ladănum L. Acker-Daun (Hohlzahn). Bltr. lanzettl. oder längl.-lanzettl.; Wirtel alle getrennt; Kronröhre von 3facher Kelchlänge; Bl. von purpurrot bis weiß, außen flockig; Unterl. mit gelbem, rot-geadertem Fleck; ⊙; 7 bis 8; ✕.

Varirt: latifolĭa (untere Bltr. eif.), vulgāris (Bltr. lanzettl.), intermedĭa Vill. (Bltr. lanzettl., ſtark-gezähnt; Bl. klein), canēscens Schult. (Bltr. lineal-lanzettl., ſchwach-gezähnt; St. oberw. grauharig), integrifolĭa (Bltr. lanzettl., faſt ganzrand., ſtark-geſtielt; K. rauh).

—. XIV., 1; Lippenblümler: G. bifĭda Boenngh.; ſ. Nr. 2191.
—. " " G. pubēscens Boss.; ſ. Nr. 2109.
—. " " Ajŭga chamaepĭtys Schreb.; ſ. Nr. 1493.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Linarĭa minor Desf.; ſ. Nr. 1399.
—. " " L. vulgāris Desf.; ſ. Nr. 2193.
—. " " Melampўrum arvēnse L; ſ. Nr. 1400.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Camelĭna microcārpa Andrz.; ſ. Nr. 582.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Thlapsi arvēnse L.; ſ. Nr. 215.
—. " " T. alliacĕum L.; ſ. Nr. 640.
—. " " Lepidĭum campēstre R. Br.; ſ. Nr. 1307.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Capsēlla bursa pastōris Vent.; ſ. Nr. 3.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Rapīstrum perēnne All.; ſ. Nr. 1309.
—. XV., 1; Kreuzblütler: R. rugōsum All.; ſ. Nr. 1401.
—. " Senebiēra coronŏpus Poir.; ſ. Nr. 2258.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Bunĭas erucāgo L.; ſ. Nr. 1402.

—. XV., 2; Kreuzblütler: Raphănus raphanĭstrum L.; ſ. Nr. 588.
—. XV., 2; „ Arăbis thaliāna L.; ſ. Nr. 58.
—. „ „ Erysĭmum repāndum L.; ſ. Nr. 670.
—. „ „ Diplotāxis murālis DC.; ſ. Nr. 1314.
—. „ „ Erucastrum obtusangŭlum Rchb.; ſ. Nr. 1362.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum rotundifolĭum L.; ſ. ſ. Nr. 560.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: G. columbīnum L.; ſ. Nr. 675.
—. „ „ Erodĭum moschātum Ait.; ſ. ſ. Nr. 540.
—. XVI., 5; Pappelroſenpfl.: Hibīscus triōnum L.; ſ. Nr. 2278.
—. „ „ Althaea hirsūta L.; ſ. Nr. 2195.
—. XVII., 2; Erdrauchpfl.: Fumarĭa officinālis L.; ſ. Nr. 561.
—. „ „ F. vaillantĭi Lois.; ſ. Nr. 643.
—. „ „ F. wirtgenĭi Koch; ſ. Nr. 1403.
—. „ „ F. rostellāta Knaf; ſ. Nr. 1489.
—. „ „ F. parviflōra L.; ſ. Nr. 644.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Medicāgo glomerāta Balb.; ſ. Nr. 1404.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: M. prostrāta Jacq.; ſ. Nr. 1405.
2343. „ „ Pocockĭa radiāta Trautv. (Medicāgo rad. L.). Stralfrüchtiger Stralklee. Wrz. ſpindelf.; St. mehre; Nebenblтr. eif., zugeſp., gezähnt; Bl. klein, gelb, rotſtreifig; Hülſe groß, blattartig, flach, gebogen, ſtraladerig, 3kielig, äußerer Kiel kurz-dornig; ☉; 7 bis 9; Kr.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Melilōtus parviflōra Desf.; ſ. Nr. 1337.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: *M. sulcāta Desf.; ſ. Nr. 1407.
—. „ „ Trifolĭum arvēnse L.; ſ. Nr. 1408.
—. „ „ T. incarnātum L.; ſ. Nr. 648.
—. „ „ T. campēstre Schreb.; ſ. Nr. 1409.
—. „ „ T. procūmbens L.; ſ. Nr. 1329.
—. „ „ Ervum gracĭle DC.; ſ. Nr. 1410.
—. „ „ E. hirsūtum L.; ſ Nr. 1227.
—. „ „ Vicĭa cracca L.; ſ. Nr. 1228.
—. „ „ V. tenuifolĭa Roth; ſ. Nr. 1229.
—. „ „ V. lutĕa L.; ſ. Nr. 1411.
—. „ „ V. grandiflōra Scop.; ſ. Nr. 1412.
—. „ „ V. narbonēnsis L.; ſ. Nr. 1413.
—. „ „ V. satīva L.; ſ. Nr. 650.
—. „ „ V. angustifolĭa Roth; ſ. Nr. 1230.

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Lathyrus tuberōsus L.; ſ. Nr. 2198.
—. „ „ L. aphāca L.; ſ. Nr. 1333.
—. „ „ L. nissolia L.; ſ. Nr. 1414.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracium auricŭla L.; ſ. Nr. 1334.
—. XIX., 1; Korbblütler: Crepis virens L.; ſ. Nr. 1415.
—. „ „ Lactūca pērennis L.; ſ. Nr. 1231.
—. „ „ Sonchus oleracĕus L.; ſ. Nr. 1262.
—. „ „ S. asper Hall.; ſ. Nr. 1263.
—. „ „ Taraxăcum officināle Mnch.; ſ. Nr. 59.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hypochoeris glabra L.; ſ. Nr. 1416.
—. XIX., 1; Korbblütler: Helminthia echioīdes Gaertn.; ſ. Nr. 1232.
—. XIX., 1; Korbblütler: Lampsăna commūnis L.; ſ. Nr. 1128.
—. XIX., 1; Korbblütler: Cirsium arvēnse Scop.; ſ. Nr. 2286.
—. XIX., 1; Korbblütler: Carduus nutans L.; ſ. Nr. 2289.
—. XIX., 2; „ Senecio vulgāris L.; ſ. Nr. 218.
—. „ „ *S. vernālis W. et K.; ſ. Nr. 1040.
2344. „ „ Filāgo arvēnsis L. (F. arv. et montāna L. fl. suec. et herb., Gnaphalium arvēnse Lmk., F. montāna Whlbg.). Acker-Schimmelkraut (Faden- oder Filzkraut). Dichtwollig; St. riſp., mit aufr., faſt einfachen, zieml. ährenf. Aeſten; Bl. gelblichweiß; ⊙; 7 bis 8; ×.
Varirt: Gnaphalium neglēctum Willem. (St. wenigäſtig; Hüllbltchn. an der Spitze bräunlich).
—. XIX., 2; Korbblütler: Matricaria chamomilla L.; ſ. Nr. 1417.
—. XIX., 2; Korbblütler: Anthĕmis arvēnsis L.; ſ. Nr. 1342.
2345. XIX., 2; Korbblütler: A. austriăca Jacq. Oeſterreichiſche Hundskamille. Aeſte faſt zur Hälfte nackt oder oben blos ſchuppig; Blattſpindel ſchmal-geflügelt, kaum gezähnt; Blütenboden gewölbt; Spreubltchn. längl., in eine die Länge der Scheibenbl. erreichende ſcharfe Spitze verſchmäl.; Fr. an der Spitze mit Hautrand; ⊙; 7 bis 8; ×; Bö., Mä., Oe., St.
2346. XIX., 2; Korbblütler: *Galinsōga parviflōra Cav. (Wiborgia acmella Roth, W. parviflōra H. B. K.). Kleinblütige Galinſoge (Franzoſenkraut). St. kahl, oberw.

3gab.=veräſtelt; Bltr. gegenſt., herz=eif.; Bl. weiß; ☉; 7 bis 9; ✕; Vaterland: Peru.*)

—. XIX., 2; Korbblütler: Bellis perēnnis L.; ſ. Nr. 2.

2347. „ „ *Erigĕron canadĕnsis L. Kanadiſche Dürrwurz (kanadiſches Berufkraut, Altemannskraut). St. ſteif=aufr., riſpig; Riſpe längl., vielköpf.; Bltr. borſtig=gewimp., lineal=lanzettl., kurz=ſteifharig; Köpfchen zalr., geſtielt; Bl. weißlich oder lila; Hüllblttchn. lineallanzettl., randhäutig; ☉ und ♂; 7 bis 9; ✕; Vaterland: Kanada.**)

2348. XIX., 3; Korbblütler: *Centaurēa solstitiālis L. Sonnenwenden=Flockenblume (Sommer=F.). Bltr. lineal=lanzettl., herablauf.; Hauptk. wollig; endſt. Köpfchen einzeln; Bl. zitrongelb; Pappus dopp., äußere mehrreihig, innerer kürzer, zſgeneigt; ♂; 7 bis 8; ✕; Kr.

—. XIX., 4; Korbblütler: Calendŭla arvēnsis L.; ſ. Nr. 1418.

—. XXI., 1; Giftmilcher: *Euphorbĭa peplus L.; ſ. Nr. 1265.

—. „ „ E. helioscopĭa L.; ſ. Nr. 222.

2349. „ „ E. falcāta L. (Tithymālus falcātus Kl. et Grcke.). Zugeſpitzte Wolfsmilch. Bltr. lanzettl., an der Baſis verſchmäl., ſpitz oder zugeſp.; Kapſ. glatt; Samen 4kant.; ☉; 7 bis 10; ☥; ✕.

—. XXI., 4; Neſſelpfl.: Urtĭca urens L.; ſ. Nr. 1234.

—. „ „ U. pilulifĕra L.; ſ. Nr. 1266.

—. XXI., 5; Meldenpfl.: Atrĭplex hastātum L.; ſ. Nr. 2210.

—. „ „ A. patŭlum L.; ſ. Nr. 2211.

—. „ „ A. angustifolĭum Sm.; ſ. Nr. 2159.

—. XXII., 8; Giftmilcher: Mercuriālis annŭa L.; ſ. Nr. 1267.

a. Kulturpflanzen:

—. III., 2; Graspfl.: *Avēna nuda L.; ſ. Nr. 2333.

—. „ „ *A. strigōsa Schreb.; ſ. Nr. 1384.

—. „ „ *A. orientālis Schreb.; ſ. Nr. 2334.

—. „ „ *A. satīva L.; ſ. Nr. 1420.

2350. „ „ *A. chinēnsis Fisch. Chineſiſcher Hafer. Riſpe locker, ausgebreit.; Aehrchen 4= bis 6blüt.; Blütenachſe kurzborſtig; Bl. ihre Scheiden überragend; Samen weißgrau; ☉; 7; ♆; Vaterland: Aſien.

*) Iſt als Unkraut ſehr zu fürchten, da die feinen, leichten Samen ſchnell durch den Wind verbreitet werden!

**) Dieſe Pflanze ward um's Jahr 1655 in einem ausgeſtopften Vogelbalge nach Europa verſchleppt und iſt jetzt als ein gemeines Unkraut faſt über ganz Europa verbreitet. Die kanadiſche Dürrwurz gehört zu den berüchtigten Zauberkräutern und wurde früher von abergläubiſchen Leuten gegen das Beſchreien der Kinder gebraucht

—. III., 2; Graspfl.: *Panĭcum miliacĕum L.; s. Nr. 1419.
2351. „ „ Setarĭa italĭca Kth. (Panĭcum italĭcum L., Pennisĕtum ital. R. Br.). Italiſche Borſtenhirſe (italiſcher Fennich). Riſpe dopp.-zſgeſetzt, lappig; Aehrchen geknäuelt; Bltr. breit lanzett-lineal.; ☉; 7 bis 8; ♆; Vaterland: Südeuropa.
Varirt: P. germanĭcum Roth (Hüllborſten die Zweige kaum überragend).
—. III., 2; Graspfl.: Digitarĭa glabra R. et Sch.; s. Nr. 1272.
2352. III., 2; Graspfl.: *Phalăris canariēnsis L. Kanarienhirſe (Kanariengras, Glanz, Glanzgras). Klappen zugeſp., am Rande 1nervig, auf dem Rücken ganzrand.-geflüg.; ☉; 7 bis 8; ♆; ⚓; Vaterland: Südeuropa.
—. III., 2; Graspfl.: *Hordēum vulgāre L.; s. Nr. 1428.
—. „ „ *H. hexastĭchon L.; s. Nr. 653.
—. „ „ *H. distĭchon L.; s. Nr. 1429.
—. „ „ *H. zeocrĭton L.; s. Nr. 1430.
2353. IV., 1; Wegerichpfl.: Plantāgo psyllĭum L. Flohſamen-Wegerich. St. äſtig; Bltr. lineal.; Aehren eirund; Deckbltr. aus eif. Baſis pfriemf.-zugeſp.; Kelchklappen lanzettl., allmälig zugeſp., gleichmäßig; Same flohähnlich; ☉; 7 bis 8; ♆; früher ♃.
—. IV., 1; Krapppfl.: *Rubĭa tinctōrum L.; s. Nr. 2173.
2354. V., 1; Nachtſchattenpfl.: *Nicotiāna tabăcum L. Virginiſcher Tabak. Bltr. ſitz., längl.-lanzettl., zugeſp., untere verſchmäl.-herablauf.; Kronſaum zugeſp.-5zipf.; Bl. roſenrot; ☉; 7 bis 9; ♀; ♆; ⚓; ♃; Vaterland: Amerika.*)
2355. V., 1; Nachtſchattenpfl.: *N. macrophȳlla Spr. (N. latissĭma Mill.). Breitblättriger T. Bltr. breit-eilanzettl., aus geöhrter Baſis herablauf.; Saumlappen kurz-zugeſp.; Bl. roſenrot; ☉; 7 bis 9; ♀; ♆; ⚓; ♃; Vaterland: Amerika.
—. V., 1; Nachtſchattenpfl.: *N. rustĭca L.; s. Nr. 1431.
2356. „ „ *Solānum tuberōsum L. Kar-

*) Die erſte Nachricht über den Tabak gab der ſpaniſche Pater Roman Pane, des Kolumbus Begleiter, im J. 1496. Nach Rumph's, Loureiro's und Pallas' Meinung iſt indeß der Gebrauch des in China einheimiſchen Tabaks älter als die Entdeckung Amerika's. Pater Roman Pane ſah auf der Inſel St. Domingo die Wilden daſelbſt aufgerollte Blätter in den Mund nehmen, anzünden, Rauch (Tabako) machen und zum Schutze gegen die Muskito's um ſich her blaſen. Jean Nicot, Geſandter des franzöſiſchen Königs Franz II. am Hofe zu Liſſabon, pflanzte den Tabak im J. 1560 als wichtiges Arzneigewächs in ſeinen Garten!

toffel (Erdapfel, Erd- oder Grundbirne, Knollen, Grüblinge). St. krautig; Bltr. unparig-gefied.; Bl. verschiedenfarbig; Knollen ⊙; ♃; 7 bis 8; ‡; ⚘; ⚓; ⚔; Vaterland: Südamerika.*)

2357. V., 2; Meldenpfl.: Beta vulgāris L. Gemeine Runkelrübe (Mangold). Wrz. einstengelig; St. aufr.; untere Bltr. eif., stumpf, etwas herzf., obere rauten-eif.; Narbe eif.; Bl. grünlich; ♁; 7 bis 9; ⚘; ⚓.**)

Varirt: B. cicla L. (weiße R.; Wrz. durch Kultur sehr vergrößert, fetter, doch nicht so stark als bei) B. rapacĕa Koch (Wrz. dick, fleischig).

2358. V., 2; Doldenpfl.: *Pimpinēlla anĭsum L. Anis. St. stielrund, zart-gerillt, kurz-weichharig; untere Bltr. ungetheilt, herzf.-rundl.; Bl. weiß; ⊙; 7 bis 8; ⚘; ⚓; ⚔; Vaterland: Egypten.

2359. V., 2; Doldenpfl.: *Sium sisărum L. Zuckerhaltiger Merk (Zuckerwurzel, -merk). Wrz. knollig-blüsch.; untere Bltr. gefied., obere 3zäl.; Fruchthalter 2theil., frei; Bl. weiß; ♃; 7 bis 8; ⚘; Vaterland: Asien.

—. V., 2; Doldenpfl.: *Foenicŭlum vulgāre Gaertn.; s. Nr. 1433.

—. V., 2; Doldenpfl.: Daucus carōta L.; s. Nr. 1294.

—. " " *Coriandrum satīvum L.; s. Nr. 1434.

—. V., 5; Leinpfl.: *Linum usitatissĭmum L.; s. Nr. 1435.

—. VIII., 1; Knöterichpfl.: *Polygŏnum tatarĭcum L.; s. Nr. 2340.

2360. VIII., 1; Knöterichpfl.: *P. fagopȳrum L. (Fagopȳrum esculēntum Mnch.). Buchweizen (Heidekorn, Blende, Griken, Franzweizen, Haden, Heidel, Heidewegtritt). Bltr. herz-pfeilf.; Nüsse zugesp., 3kant., Kanten ganzrand.; Bl. rosenrot oder weiß; ⊙; 7 bis 8; ⚘; ⚓; Vaterland: Asien.

2361. X., 6; Schminkpfl.: *Phytolācca decāndra L. Ge-

---

*) Die erste Nachricht über die Kartoffel verdanken wir dem Sklavenhändler Joh. Hawkins, der sie 1565 (nach Berghaus 1545) in Santa Fé als Mundvorrat für sein Schiffsvolk erhielt und sie in seinen Reise-Nachrichten zuerst anführt. Die früheren Angaben, daß die Kartoffel durch Walter Ralegh 1584 nach Irland und durch Franz Drake 1586 nach England gebracht worden sei, sind falsch. Kaspar Bacchin beschrieb die K. zuerst unter dem Namen Solanum tuberosum esculentum, lieferte auch eine schlechte Abbildung; Clusius bildete sie unter dem Namen Arachnida theophrasti in seinen „seltenen Gewächsen" ab (1588). In Preußen ist der Kartoffelbau seit 1738 eingeführt. — Die sog. Kartoffelkrankheit hat ihre Ursache in dem Schmarotzerpilz Perenospora infestans Casp.

**) Die ursprüngliche Form ist B. foliosa Ehrenb. (Wrz. dünn; so am Meere)!

meine Schminkbeere (Kermesbeere). Wrz. holzig; St. aufr., äſtig, rot; Bltr. geſtielt, eilanzettl., ſpitz oder ſtumpf mit Stachelſp.; Bl. in langgeſtielten Trauben; Beere bläulichrot; 4; 7 bis 9; ♆; †; Oe., Ty.; Vaterland: Nordamerika.

—. XI., 3; Waupfl.: Resēda luteŏla L.; ſ. Nr. 1299.

—. XIII., 1; Mohnpfl.: *Papāver somnifĕrum L.; ſ. Nr. 1436.

—. XIII., 2; Pfingſtroſenpfl.: *Cimicifŭga foetĭda L.; ſ. Nr. 2062.

2362. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: *Nigēlla satīva L. Gemeiner Schwarzkümmel (St. Katarinenrädchen, Satenjungfer, Gartenmichel). Bltr. 3fach-fiedertheil.; Hülle fehlend; Staubb. nicht ſtachelſp.; Bl. bläulichweiß; Kapſ. drüſig-rauh; ☉; 7 bis 9; ♆; ♃; Vaterland: Südeuropa.

—. XV., 2; Kreuzblütler: Brassĭca rapa L.; ſ. Nr. 654.

—. " " Sināpis alba L.; ſ. Nr. 1437.

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: *Medicāgo satīva L.; ſ. Nr. 1323.

—. " " *Trigonēlla foenum-graecum L.; ſ. Nr. 1438.

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: *Melilōtus coerulĕus Desr.; ſ. Nr. 1328.

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolĭum incarnātum L.; ſ. Nr. 648.

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: T. pratēnse L.; ſ. Nr. 1032.

—. " " T. repens L.; ſ. Nr. 597.

2363. " " *Glycyrrhīza glabra L. Gemeines Süßholz (Fuchsbaum). K. 2lipp., die beiden obern Zähne bis zur Mitte verwachſ.; Kiel 2blättr., ſpitz; Bl. violet; 4; 7 bis 8; ♆; ♃; ⚓; Vaterland: Südeuropa.

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: *Astragălus baetĭcus L.; ſ. Nr. 1439.

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: *Ornithŏpus satīvus Brot.; ſ. Nr. 1440.

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Onobrўchis satīva Lam.; ſ. Nr. 655.

—. " " Ervum monānthos L.; ſ. Nr. 1332.

—. " " Vicĭa satīva L.; ſ. Nr. 650.

—. " " V. narbonēnsis L.; ſ. Nr. 1413.

—. " " *V. faba L.; ſ. Nr. 1441.

—. " " Cicer arietĭnum L.; ſ. Nr. 1442.

—. " " *Pisum satīvum L.; ſ. Nr. 656.

—. " " P. arvēnse L.; ſ. 657.

—. " " *P. umbellātum C. Bauh.; ſ. Nr. 658.

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: *P. saccharātum Hortul.; ſ. Nr. 1443.
—. „ „ *P. quadrātum C. Bauh.; ſ. Nr. 1444.
—. „ „ *P. leptolōbum Camer.; ſ. Nr. 1445.
. „ „ *Lathyrus lens Kitt.; ſ. Nr. 1446.
—. „ „ *Phaseōlus vulgāris L.; ſ. Nr. 1447.
2364. „ „ *Carthāmus tinctorius L. Färber-Saflor. Bltr. ungetheilt, dornig-gezähnt, nebſt dem St. kahl; letzterer aufr., weißl., glänz.; Bl. ſafrangelb; ☉; 7; ♆; ⚓; Th., Voigtland, Brd., Rh.; Vaterland: Egypten.
2365. XIX., 3; Hülſenpfl.: *Cnicus benedictus L. spec. pant. ed. 1 (Centaurēa benedicta L. spec. plant. ed. 2). Gemeine Benedikte (Bitter- oder Heildiſtel, Kreuzwurz, St. Bernhardskraut, Kardobenedikte, Spinnendiſtel). Bltr. bucht., ſtachelſp.; innere Bltchn. des Hauptk. an der Spitze mit gefied. Dorn, wollig, äußere breiter, deckblattartig, einfach-gedornt; Bl. gelb; ☉; 7 bis 8; ♆; ♃; ⚓; Vaterland: Orient.
—. XIX., 3; Hülſenpfl.: *Helianthus annuus L.; ſ. Nr. 2315.
—. XXI., 3; Graspfl.: *Zea mays L.; ſ. Nr. 1448.
2366. XXI., 9; Kürbispfl.: *Cucumis satīvus L. Gemeine Gurke (Kukumer). St. ſteifharig, kletternd; Bltr. herzf., 5eck.; Bl. gelb; ☉; 7 bis 9; ♆; ⚓; Vaterland: Orient.*)
2367. XXI., 9; Kürbispfl.: *Cucurbīta pepō L. Gartenkürbis (Schafränzel). St. ſteifharig, kletternd; Bltr. herzf., 5lapp., rauh; Bl. groß, gelb; ☉; 7 bis 10; ♆; ↕; Vaterland: Mittelaſien.**)
—. XXII., 5; Neſſelpfl.: *Cannabis satīva L.; ſ. Nr. 1449.
—. „ „ Humulus lupulus L.; ſ. Nr. 2103.

b. Unter der Sat:

2368. III., 1; Baldrianpfl.: *Valerianella dentāta DC. (V. tridentāta Rchb.). Gezähntes Rapünzchen. Fr. meiſt kahl, ſchwach-3- bis 5rippig; Mdg. ſchief-ohrf., 3- bis 5-zähn., der äußerſte, größere Zahn ſpitzl.; Bltr. ganzrand.; Bl. bläulichweiß; ☉; 7 bis 8; ✕.
2369. III., 1; Baldrianpfl.: *V. auricula DC. Ohr-R. Fr. kug.-eif., kahl, ſchwach-5leiſtig; Mdg. ſchief-ohrf., kaum gezähnt, ſtumpfl.; Bl. bläulichweiß; ☉; 7 bis 8; ✕.

*) Die ähnliche Schlangengurke, *C. flexuosus L., hat lange, gebogene, gefurchte Früchte; ☉; 7 bis 8; ♆; Vaterland: Aſien.

**) Der Flaſchenkürbis, *C. lagenaria L., hat weiße Blüten und keulenförmige Früchte; ☉; 7 bis 8; ↕; Vaterland: Oſtindien. (Herkuleskeule!)

—. IV., 1; Wegerichpfl.: Plantāgo psyllĭum L.; ſ. Nr. 2353.
2370. IV., 1; Krapppfl.: Galĭum tricōrne With. (G. valantĭa Wigg., Valantĭa apar. Poll.). Dreihörniges Labkraut. Bltr. meiſt 8ſtänd., ſtachelſp., 1nervig, am Rande und Kiele rückw.-ſtach.-rauh; Blütenſt. nach dem Verblühen zurückgekr.; Bl. weiß oder gelblich; ☉; 7 bis 10; ✕.
— IV., 1; Krapppfl.: G. saccharātum All.; ſ. Nr. 1450.
—. V., 1; Borretſchpfl.: Myosōtis versicŏlor Rchb.; ſ. Nr. 440.
—. „ Glockenblümler: Specularĭa vulgāris Kitt.; ſ. Nr. 1451.
—. V., 1; Glockenblümler: Sp. hybrĭda DC.; ſ. Nr. 1452.
—. V., 2; Doldenpfl.: Carum bulbocastănum Koch; ſ. Nr. 1453.
—. V., 2; Doldenpfl.: Bupleurum protrăctum Lk.; ſ. Nr. 1454.
—. „ „ B. rotundifolĭum L.; ſ. Nr. 1455.
2371. „ „ Orlaÿa grandiflōra Hoffm. (Caucălis grand. L.). Großblättrige Orlaye (Breitſame). St. gefurcht, kahl; Bltr. 2- bis 3fach-gefied.; Krbltr. ſtralend, weiß; ☉; 7 bis 8; ✕.
—. V., 2; Doldenpfl.: Caucălis daucoïdes L.; ſ. Nr. 1456.
—. „ „ C. leptophÿlla L.; ſ. Nr. 1457.
—. „ „ Torĭlis infēsta Rchb.; ſ. Nr. 2180.
2372. „ „ T. helvetĭca Gmel. (Caucălis helv. Jacq.). Schweizer Klettenkerbel. Untere Bltr. einfach- bis dopp.-gefied., obere 3zäl., die Fiedern trapezoidiſch, eingeſchn.-ſägezähn. bis fiederſpalt.; Dolden klein, 2- bis 5-ſtral.; Hülle fehlend oder ein kleines Bltchn.; Fruchtſtacheln faſt grade, ſcharf, an der Spitze widerhakig; Bl. weiß; ☉ bis ♂; 7 bis 8; ✕.
—. V., 2; Doldenpfl.: Bifōra radĭans M. B.; ſ. Nr. 1458.
—. VI., 3; Knöterichpfl.: Rumex crispus L.; ſ. Nr. 2254.
—. X., 2; Nelkenblütler: Vaccarĭa pyramidāta Fl. Wett.; ſ. Nr. 2185.
—. X., 3; Nelkenblütler: Silēne annulāta Thore; ſ. Nr. 1459.
—. „ „ S. gallĭca L.; ſ. Nr. 1460.
—. „ „ S. conoidĕa L.; ſ. Nr. 1461.
—. „ „ Spergularĭa semidecāndrum Kitt.; ſ. Nr. 1462.
—. XIII., 1; Mohnpfl.: Glaucĭum phoenicĕum Gaertn.; ſ. Nr. 1397.
—. XIII., 1; Mohnpfl.: Papāver argemōne L.; ſ. Nr. 663.
—. „ „ P. hybrĭdum L.; ſ. Nr. 664.
—. „ „ P. dubĭum L.; ſ. Nr. 665.
—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: Nigēlla arvēnsis L.; ſ. Nr. 2341.

—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Adōnis aestivālis L.; ſ. Nr. 666.
—. „ „ A. flammĕa Jacq.; ſ. Nr. 1463.
—. „ „ A. autumnālis L.; ſ. Nr. 1302.
—. „ „ Ranuncŭlus arvēnsis L.; ſ. Nr. 668.

2373. XIV., 1; Lippenblümler: Stachys annŭa L. Jähriger Zieſt (Zeiſig-, Hexen-, Beſchrei- oder Berufkraut). Untere Bltr. ellipt.-längl., obere lanzettl.; Quirle 4- bis 6blüt.; K. zott., weichharig-ſtachelſp.; Blkr. blaßgelb; St. oben weichharig; ☉; 7 bis 9; ✕.

—. XIV., 1; Lippenblümler: Galeōpsis ochroleuca Lmk.; ſ. Nr. 2238.

2374. XIV., 2; Rachenblümler: Linarĭa arvēnsis Desf. (Antirrhīnum arvēnse var. a. L.). Acker-Leinkraut (kleines Löwenmaul, Kalbsnaſe). Kahl; K. und Blütenſt. drüſenharig; Bltr. lineal., untere zu 4; Traube geſtielt, kopf.; Samen glatt oder körnigrauh (L. simplex DC.)*); Bl. klein, hellblau; ☉; 7 bis 9; ✕.

—. XV., 1; Kreuzblütler: *Neslĕa paniculāta Desv.; ſ. Nr. 1469.

—. XV., 1; Kreuzblütler: Rapistrum rugōsum All.; ſ. Nr. 1401.

2375. XV., 2; „ Melānosināpis commūnis Sch. et Sp. (Sināpis nigra L., Brassĭca nigra Koch). Gemeiner Schwarzſenf (ſchwarzer Senf). Bltr. ſämmtl. geſtielt; Blütenſt. und Schoten der Spindel angedr.; Bl. gelb; ☉; 7 bis 9; ✕; ♆; ♃.

—. XV., 2; Kreuzblütler: Sināpis arvēnsis L.; ſ. Nr. 1465.
—. „ „ S. alba L.; ſ. Nr. 1437.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Medicāgo denticulāta Willd.; ſ. Nr. 1466.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Melilōtus officinālis L.; ſ. Nr. 1326.
—. „ „ Trifolĭum arvēnse L.; ſ. Nr. 1408.
—. „ „ T. campēstre Schreb.; ſ. Nr. 1409.
—. „ „ Ervum ervilĭa L.; ſ. Nr. 1467.
—. „ „ Vicĭa villōsa Roth; ſ. Nr. 673.
—. „ „ V. lutĕa L.; ſ. Nr. 1411.
—. „ „ V. pannonĭca Jacq.; ſ. Nr. 1468.
—. „ „ V. angustifolĭa Roth; ſ. Nr. 1230.
—. „ „ Cicer arietĭnum L.; ſ. Nr. 1442.
—. „ „ Lathўrus lenticŭla Kitt.; ſ. Nr. 1470.

*) Ich finde (mit Kittel) die L. simplex DC. von L. arvensis Desf. nicht verſchieden!

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: L. hirsūtus L.; ſ. Nr. 1471.
—. „ „ L. aphăca L.; ſ. Nr. 1333.
—. „ „ L. nissolĭa L.; ſ. Nr. 1414.
—. XIX., 1; Korbblütler: Crepis tectōrum L.; ſ. Nr. 1366.
—. „ „ Cirsĭum arvēnse Scop.; ſ. Nr. 2286.
2376. XIX., 2; „ Chrysanthĕmum segĕtum L. Sat-Wucherblume (Acker- oder wilde Kamille, Johannis- oder Kalbsblume). Bltr. kahl, gezähnelt, vorn verbreit., 3ſpalt.-eingeſchn., obere herzf.-umfaſſ.; Bl. gelb; ☉; 7 bis 8; ✕.*)
—. XIX., 2; Korbblütler: *Anthĕmis nobĭlis L.; ſ. Nr. 1264.
—. „ „ A. ruthenĭca M. B.; ſ. Nr. 2325.
—. XIX., 3; „ *Centaurēa cyănus L.; ſ. Nr. 674.

c. Auf Brachen:

—. II., 1; Rachenblümler: Veronĭca arvēnsis L.; ſ. Nr. 64.
2377. IV., 1; Krapppfl.: Galĭum anglĭcum Huds. Engliſches Labkraut. St. aufſteig., ſehr äſtig, 4kant.; Bltr. zu 4 bis 6, lineal-lanzettl., ſtachelſp., am Rande fein-ſtachelig-ſägezähn.; Bl. grüngelblichweiß; Fr. kahl oder ſchwachbehart, fein-körnig; ☉; 7 bis 9; ✕.

Varirt: C. gracĭle Wallr. (Fr. kahl; Blütenſt. ſo lang oder kürzer als die Bl.), G. divaricātum Lmk. (Fr. kahl; Blütenſtielchen von dopp. Blütenlänge), G. tenuissĭmum M. B. (Blütenſt. von 3- bis 4facher Blütenlänge), G. parisiēnse L. (Fr. behart).

—. V., 1; Zauberpfl.: Thesĭum humifūsum DC.; ſ. Nr. 1472.
—. „ „ Th. ramōsum Hayne; ſ. Nr. 1473.
—. „ „ Th. humĭle Vahl; ſ. Nr. 1474.
—. „ Glockenblümler: Specularĭa vulgāris Kitt.; ſ. Nr. 1451.
—. VI., 3; Knöterichpfl.: Rumex acetosēlla L.; ſ. Nr. 1296.
2378. XIV., 1; Lippenblümler: Melĭssa acĭnos Benth. (Thymus ac. L., Acĭnos vulgāris Pers., Calamīntha ac. Clairv., A. thymoĭdes Much.). Ackermelisſe (Feldkalaminte, Steinpolei). St. aufr., kurz-zott.; Bltr. eif., geſägt; Quirle 6blüt.; Blütenſt. ungetheilt; Fruchtkelch durch die

*) An manchen Orten wurde der Verbreitung dieſes ſehr ſchädlichen Unkrautes durch gerichtliche Maßregeln Schranken geſetzt. Zur Blütezeit mußte nämlich von einem der Beamten oft nachgeſehen werden, und dann mußte für jedes Exemplar, welches derſelbe, quer über die Felder gehend, ſah, vom Beſitzer des Grundſtücks 1 Sgr. bezalt werden!

anliegenden Zähne geschlossen; Bl. hellviolet oder lila, selten weiß; 4; 7 bis 8.*)

—. XIV., 1; Lippenblümler: Galeŏpsis ladănum L.; s. Nr. 2342.

—. XIV., 1; Lippenblümler: Stachys annŭa L.; s. Nr. 2373.

2379. „ „ Siderītis montāna L. (Burgsdorfĭa mont. Rchb.). Berg-Gliedkraut. Krautig; K. länger als die Kr., Oberl. 3spalt.; Bl. erst gelb, dann braun; Bltr. lanzettl., in den Blattst. verlauf.; ☉; 7 bis 8; Oe. (S. romāna L., römisches G., das in Istrien vorkommt, unterscheidet sich durch ungetheilte Oberl. des K. und weiße Bl.)

—. XIV., 1; Lippenblümler: Ajŭga chamaepĭtys Schreb.; s. Nr. 1493.

—. XIV., 2; Rachenblümler: Antirrhīnum orontĭum L.; s. Nr. 2324.

2380. XIV., 2; Rachenblümler: Linarĭa spurĭa Mill. Rundblättriges Leinkraut. Bltr. rundl.-eif.; Sporn bogenf.; Blütenst. zottig oder unbehart; Bl. gelb, mit purpurnem Schlunde und violeter Oberl.; ☉; 7 bis 8; fehlt in Norddeutschland.

—. XV., 1; Kreuzblütler: *Nesl̆ĕa paniculāta Desv.; s. Nr. 1464.

—. XV., 1; Kreuzblütler: Rapīstrum rugōsum All.; s. Nr. 1401.

—. XV., 1; Kreuzblütler: Bunĭas erucāgo L.; s. Nr. 1402.

—. XV., 2; „ Erysĭmum repāndum L.; s. Nr. 670.

—. XV., 2; Kreuzblütler: Erucāstrum pollichĭi Sch. et Sp.; Nr. 1315.

—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum columbīnum L.; s. Nr. 675.

—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Medicāgo denticulāta Willd.; s. Nr. 1466.

—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Trifolĭum stellulātum L.; s. Nr. 1475.

—. „ „ T. filifōrme L.; s. Nr. 599.

—. „ „ Ervum tetraspērmum L.; s. Nr. 1125.

—. „ „ Hyperīcum humifūsum L.; s. Nr. 2134.

—. XIX., 2; Korbblütler: Senecĭo sylvatĭcus L.; s. Nr. 1080.

—. „ „ Achillēa millefolĭum L.; s. Nr. 2101.

---

*) Eine Varietät, welche in den südlichen Strichen vorkommt, ist M. rotundifolia Benth., mit liegendem Stengel, aufsteigenden Aesten, rauten-eiförmigen, beiderseits spitzen, länger gestielten Blättern und größeren Blüten!

d. Auf mageren Brachen:

—. X., 2; Nelkenblütler: Gypsophila murālis L.; s. Nr. 2234.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Alyssum campēstre DC.; s. Nr. 580.

e. Auf sandigen Brachen:

—. V., 1; Paronychienpfl.: Herniaria glabra L.; s. Nr. 1476.
—. X., 5; Nelkenblütler: Spergella subulāta Rchb.; s. Nr. 1188.

f. Auf feuchten Brachäckern:

—. X., 4; Nelkenblütler: Sagina apetāla L.; s. Nr. 604.
2381. XIX., 2; Korbblütler: Asteriscus aquatĭcus Less. (Buphthalmum aquatĭcum L.). Wasser-Sternköpfchen. St. gabeläst., unter den Köpfchen neue Zweige treibend; Bltr. wechselst., längl., stumpf, zott., halb-umfass.; Aeste 1köpf.; äußere Hüllbltr. blattartig, länger als die gelben Bl.; Fr. weißborstig; ⊙; 7 bis 8; Kr.

g. Auf Sandäckern:

2382. III., 1; Amarantpfl.: Polycnēmum arvēnse L. Acker-Knorpelkraut. St. ausgebreit.; Aeste knorp., geglied.; Bltr. steif, 3kant., weiß-spitz.; Bl. blattachselst., sitz.; ⊙; 7 bis 8; ×.

Varirt: P. majus A. B. (in allen Theilen größer), P. minus (kleinere, gemeine Form), P. verruculōsum Lang (mit kleinen Warzen oder Höckern bedeckt).

—. III., 2; Graspfl.: Aira capillāris Host; s. Nr. 677.
—. „ „ Bromus brachystāchys Horng.; s. Nr. 1478.
—. III., 2; Graspfl.: *Eragrōstis poaeformis Lk.; s. Nr. 1479.
2383. „ „ *E. megastachya Lk. (E. major Host, Briza eragr. L.). Großähriges Liebesgras. Wrz. ästig; Blattsch. an der Mdg. bärtig; Aehrchen lineal-längl., 15- bis 20blüt.; Bl. auf der stumpfen, etwas ausgerand. Spitze kurz-stachelsp.; Aehrchen meergrün; ⊙; 7 bis 9; ×; Blankenburg, Rhein- und Maingebiet, Ty.
—. III., 2; Graspfl.: Poa comprēssa L.; s. Nr. 1278.
—. IV., 1; Wegerichpfl.: Plantāgo psyllĭum L.; s. Nr. 2353.
2384. „ „ P. arenaria W. et K. (P. ramōsa Aschrsn., P. indĭca L.?). Sand-Wegerich. St. beblätt., ästig; Bltr. lineal.; vordere Kzipf. schief-spatelf., sehr stumpf, hintere lanzettl., spitz; 2 Hüllbltr. unter der Aehre; Pfl. lang-grau-gliederharig; ⊙; 7 bis 8; ×.
—. IV., 1; Krapppfl.: Galĭum anglĭcum Huds.; s. Nr. 2377.

2386. IV., 1; Kardenpfl.: Scabiōsa ochroleuca L. Gelblichweiße Skabiose. Borsten des innern K. hellbraun; Bl. gelblichweiß, selten rötlich; 4; 7 bis 9.

2387. V., 1; Rachenblümler: Verbāscum versiflōrum Schrad. (V. thapsophoenicĕum Koch). Braunblumiges Wollkraut. St. stielrund; Bltr. graufilz.; Blütenst. länger als der K.; Hauptbüschel der Traube 3- bis 5blüt.; Blkr. rotbraun; Wolle der Stbf. violet; ♂; 7 bis 8; Prag.

2388. V., 1; Borretschpfl.: Heliotropĭum europaeum L. Europäische Sonnenwende (Godeskraut, Krebsblume, Skorpionsschwanz). St. ausgebreit.; Bltr. eif., ganzrand., filz.-rauh; Aehren weißblütig; Bl. genähert, 2reih., einseitswendig, sehr klein; ☉; 7 bis 10; Süddeutschl.

—. V., 1; Borretschpfl.: Myosōtis versicŏlor Rchb.; s. Nr. 440.

—. V., 1; Glockenblümler: Jasiōne montāna L.; s. Nr. 1290.

2389. „ Paronychienpfl.: Herniarĭa hirsūta L. Hariges Bruchkraut. St., Bltr. und K. kurzharig, letztere borstigstachelsp.; Bl. gelbgrün; Kelchlappen rauhharig; ♂; 7 bis 9.

—. V., 2; Meldenpfl.: Chenopodĭum botrys L.; s. Nr. 1352.

2390. „ „ Kochĭa prostrāta Schrad. Ligende Kochie. Staudenartig, aufsteig., weichharig; Bltr. lineal., flach, trocken, weichharig bis zott.; Bl. meist zu 3, endl. mit verk.-eif., rundl. Anhängen; Staubb. purpurrot; St. oben zottig, rot; 4; 7 bis 8; Mä., Oe., St.

—. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus prolĭfer L.; s. Nr. 2275.

—. „ „ Gypsophīla fastigiāta L.; s. Nr. 1480.

—. X., 3; „ Silēne conĭca L.; s. Nr. 680.

—. „ „ Alsīne tenuifolĭa Whlbg.; s. Nr. 1355.

—. „ „ A. jacquīni Koch; s. Nr. 1481.

—. X., 5; „ Spergŭla arvēnsis L.; s. Nr. 1394.

2391. „ Dickblattpfl.: Sedum sexangulāre L. Sechskantige Fetthenne. St. ligend, wurzelnd; nichtblüh. Aeste dicht-6zeil.-beblätt.; Bltr. längl., walzenf., abgerund.-stumpf, abwärts mit freiem Sporn oder Ansatzspitzchen versehen, nicht buckelig; Bl. gelb; Pfl. geschmacklos, gelblichgrün; 4; 7 bis 8.

Varirt: S. acriförme (rasenf., unfruchtb. Aeste gedrungen-beblätt.; Zymenäste wenigblüt., locker-beblätt.), S. boloniēnse Lois. (sehr locker, ausgebreit.; unfruchtb. Aeste locker-beblätt.; Zymenäste 5- bis 8blüt., oft selbst 2zweigig; Waldform).

—. XIII., 1; Mohnpfl.: Papāver argemōne L.; s. Nr. 663.

—. XIII., 1; Mohnpfl.: P. dubĭum L.; ſ. Nr. 665.
—. „ Sonnenröslein: Helianthĕmum guttātum Mill.; ſ. Nr. 1482.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Phlomis tuberōsa Rchb.; ſ. Nr. 1122.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Linarĭa vulgāris Desf.; ſ. Nr. 2193.
—. „ „ L. arvēnsis Desf.; ſ. Nr. 2374.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Arābis arenōsa Scop.; ſ. Nr. 681.
—. „ „ Sisymbrĭum sophĭa L.; ſ. Nr. 591.
—. „ „ Sināpis cheiränthus Koch; ſ. Nr. 1316.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum dissĕctum L.; ſ. Nr. 538.
—. „ „ Erodĭum cicutarĭum l'Herit.; ſ. Nr. 217.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Medicāgo denticulāta Willd.; ſ. Nr. 1466.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolĭum arvēnse L.; ſ. Nr. 1408.
—. „ „ T. scabrum L.; ſ. Nr. 682.
—. „ „ Ornithŏpus perpusillus L.; ſ. Nr. 516.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: *O. comprēssus L.
—. „ „ *O. ebracteātus Brot.
—. „ „ Ervum tetraspērmum L.; ſ. Nr. 1125.
—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperĭcum humifūsum L.; ſ. Nr. 2134.

2392. XIX., 1; Korbblütler: Arnosĕris pusĭlla Gaertn. (A. minĭma Lk., Hyosĕris minĭma L.). Kleines Lammkraut (Lämmerſalat). Schaft blattlos, unten rot gefärbt, 1- bis 3köpf.; Blütenſt. oberw. keulenf.-verdickt, röhrig; Blütenköpfe klein, gelb; Bltr. grundſt., verk.-eif.-längl., gezähnt; ☉; 7 bis 8.

—. XIX., 2; Korbblütler: Filāgo arvēnsis L.; ſ. Nr. 2344.
—. „ „ *Anthĕmis nobĭlis L.; ſ. Nr. 1264.

h. Auf mageren Sandäckern:

2393. X., 2; Paronychienpfl.: Sclerānthus intermedĭus Kitt. Baſtard-Knäuel. Blütendeckbltr. kürzer als die Bl.; Kelchlappen ſtumpf, mit breitem Hautrande, zur Fruchtzeit abſteh., mit einwärtsgekr. Spitze, länger als die Kelchröhre; Pfl. grau- bis gelbgrün; ☉ bis ♂; 7 bis 8; ⚔.*)

*) Dieſe Art wird bald für Scl. annuus L., bald für Scl. perennis L. genommen, zwiſchen welchen ſie in der Mitte ſchwebt, und findet ſich unter letzterm Namen auch in Reichenbach's „Zenturien". (Kittel, pag. 1106.)

—. X., 5; Dickblattpfl.: Sedum reflexum L.; ſ. Nr. 2235.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolium scabrum L.; ſ. Nr. 682.

i. Auf feuchten Sandfeldern:

—. V., 2; Paronychienpfl.: Illecebrum verticillātum L.; ſ. Nr. 1483.
—. X., 3; Nelkenblütler: Spergularia rubra Presl.; ſ. Nr. 576.
2394. XI., 1; Weiderichpfl.: Lythrum hyssopifolia L. Iſop-blättriger Weiderich. Blr. lineal.-lanzettl.; K. an der Baſis mit 2 kleinen, pfrieml. Deckblrn.; Bl. 2-, 3-, 4- oder 6männig, einzeln in den Blattachſeln, klein, violetrot; ☉; 7 bis 8.
Varirt: L. thymifolia L. (Blütenſtücke 4, Stbgf. 2 bis 4).
—. XV., 2; Kreuzblütler: Erysimum cheiranthoides L.; ſ. Nr. 1484.

k. Auf feuchten Aeckern:

—. II., 1; Rachenblümler: Veronica serpyllifolia L.; ſ. Nr. 424.
—. III., 1; Fettkrautpfl.: Montia fontāna L.; ſ. Nr. 683.
—. IV., 1; Schlüſſelblümler: Centunculus minimus L.; ſ. Nr. 1350.
—. V., 1; Glockenblümler: Wahlenbergia hederacea Rchb.; ſ. Nr. 2113.
—. X., 2; Nelkenblütler: Gypsophila murālis L.; ſ. Nr. 2234.
—. X., 4; „ Sagina apetāla L.; 604.
—. X., 5; „ Cerastium vulgātum L. spec.; ſ. Nr. 463.
—. X., 5; Nelkenblütler: C. viscosum L.; ſ. Nr. 684.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Mentha arvensis L.; ſ. Nr. 2213.
—. „ „ Galeopsis versicolor Curt.; ſ. Nr. 2124.
2395. XIV., 1; Lippenblümler: Stachys arvensis L. Acker-Zieſt (Flur- oder Feldzieſt, kleinblütiger Daun). St. aufſteig., aufſtreb.-äſtig; Blr. herz-eif., ſtumpf; K. faſt von Kronlänge; die unteren, längeren Stbgf. unter der Oberl. verborgen; Bl. hellrot; ☉; 7 bis 9; ✕.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Alectorolophus major Rchb.; ſ. Nr. 1485.
—. XIV., 2; Rachenblümler: A. hirsūtus All.; ſ. Nr. 1486.
—. „ „ Euphrasia odontites L.; ſ. Nr. 2308.
—. XIV., 2; Rachenblümler: E. serotina Lmk.; ſ. Nr. 2309.

—. XV., 2; Kreuzblütler: Nasturtium sylvestre R. Br.; s. Nr. 1487.

2396. XIX., 2; Korbblütler: Marŭta cotŭla DC. (Anthĕmis cot. L.). Stinkender Gänsekropf (stinkende Hundskamille, Afterkamille, Hundsdistel, Kröten- oder Kuhdille). Deckbltr. lineal-borstenf., spitz; Blütenboden verläng.-kegelf., innen markig; Fr. eif., warzig, ohne Hautkrone; Spreubltchn. borstenf.; Scheibe gelb; Stral weiß; ☉; 7 bis 9; ✕.

2397. XIX., 3; Korbblütler: Bidens bipinnāta L. Doppeltfiederblättriger Wasserdost. St. aufr., 4kant., oben ästig; untere Bltr. fiedertheil., Fiedern eingeschn.-fiederspalt.; Köpfchen ohne Deckbltr., anfangs nickend, stralend; Bl. gelb; ☉; 7 bis 8; ✕.

—. XXI., 1; Giftmilcher: Euphorbĭa stricta Sm.; s. Nr. 1041.

l. Auf nassen, sandigen Aeckern:

2398. XIX., 2; Korbblütler: Gnaphalĭum uliginōsum L. Sumpf-Ruhrkraut. St. von der Basis an ästig, ausgebreit., weißwollig; Köpfchen knäuelartig-gehäuft, beblätt.; Bl. gelblichweiß; ☉; 7 bis 8; ✕.

Varirt: G. subsĭmplex (St. nach oben immer stärker ästig werdend), G. divaricātum (vom Wrzkopfe aus starkästig), G. nudum Hoffm. (Blütenköpfe etwas dicker, weit lockerer gehäuft; fast völlig kahl; Herbstform), G. nanum Kitt. hb. (Köpfchen verhältnißmäßig groß; Pflänzchen niedlich, kahl).

2399. XXI., 1; Giftmilcher: Euphorbĭa segetālis L. (Tithymālus seg. Kl. et Grcke.). Sat-Wolfsmilch. Bltr. zerstreut, bläulichgrün, lineal., zugesp., stachelsp.; Hüllbltr. nierenf.; Aeste der 5spalt. Trugdolde wiederholt 2spalt.; Samen runzel., knötig oder grubig; ☉; 7 bis 9; ☤; ✕; Untermain, Oe., St., Kr., Schl., Sa.

m. Auf Kiesfeldern:

2400. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus saxifrăga L. (Tunĭca saxifr. Scop.). Steinnelke (Felsennelke). Kelchdeckschuppen 4, häutig, grüngekielt, der Kiel stachelsp., nahe $^1/_4$ so lang als der K.; Blbltr. spatelf., ausgerand., fast noch einmal so lang als der häutige, grün-gekielte, halb-5spalt. K.; Bl. gipfelst., einzeln, lilafarben bis violet, dunkler-gestreift; 4; 7 bis 8; Ty., Donaugebiet, Mergentheim u. s. w. *)

*) Die G. rigida L. (Tunica rig. Rchb.), welche sehr ähnlich ist, unterscheidet sich durch ausgebreitet-mehrstengeligen Wurzelstock, größere Blüten bei niedrigeren Stengeln und Kelchdeckschuppen von halber Kelchröhrenlänge!

n. An kultivirten, liesigen Orten:

—. V., 2; Meldenpfl.: Blitum capitātum L.; s. Nr. 2312.

o. Auf mageren Aeckern:

—. V., 2; Doldenpfl.: Eryngĭum campēstre L.; s. Nr. 2271.
—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Onōnis spinōsa L.; s. Nr. 1321.
—. XIX., 1; Korbblütler: Crepis foetĭda L.; s. Nr. 1336.
2401. XIX., 2; „ Filāgo montāna DC. (F. minĭma Fr., F. arvēnsis Whlbg., Gnaphalĭum montanum Huds.). Berg-Schimmelkraut (kleinstes Sch., Faden- oder Filzkraut). Filzig, etwas wollig; St. mit gabelspalt. Aesten; Bltr. lineal-lanzettl.; Bl. gelblichweiß; ☉; 7 bis 8; ✕.
Varirt: F. ramosissĭma Kitt. (Aeste zalr., wechselst., kurz-2gabel., aufsteig.; St. selten aufr.; Astbltr. einseitswendig), F. brachiāta Kitt. (St. aufr., einfach, oben gabelästig; Aeste gabelig-verzweigt oder einfach), F. multicaulis Kitt. (St. an der Basis ästig, so daß die Wrz. mehrstengel. erscheint).

p. Auf rauhen Aeckern:

—. XIX., 2; Korbblütler: Filāgo germanĭca L.; s. Nr. 2292.

q. Auf steinigen, rauhen Feldern:

—. VIII., 1; Seidelpfl.: Passerīna annŭa Wickst.; s. Nr. 1477.

r. Auf kalkhaltigen Aeckern:

—. IV., 1; Rosenpfl.: Poterĭum sanguisōrba L.; s. Nr. 569.
—. V., 1; Borretschpfl.: Echinospērmum lappŭla Lehm.; s. Nr. 1286.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Melampўrum arvēnse L.; s. Nr. 1400.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Ibēris amāra L.; s. Nr. 1494.
—. „ „ I. pinnāta L.; s. Nr. 1306.
—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Lathўrus tuberōsus L.; s. Nr. 2198.
—. „ „ L. nissolĭa L.; s. Nr. 1414.
—. XXI., 1; Giftmilcher: Euphorbĭa platyphўllos L.; s. Nr. 2326.

s. Auf Mergel- und Thonäckern:

2402. XIX., 1; Korbblütler: Sonchus arvēnsis L. Feld-Saudistel (Gänseldistel, Ackersalat). Hauptwurzel mit langen, horizontal laufenden Nebenwurzeln mit Adventivknospen; Bltchn. mit abgerund., stumpfen Oehrchen; Bl. groß, gelb; Fr. kastanienbraun; 2|; 7 bis 8; ✕.

Varirt: S. maritimus L. amoen. ac., non spec. pl. et hb. (S. intermedius Brückn., S. uliginōsus M. B.), mit kahlen Blütenst. und Hauptkelchen.

2403. XIX., 2; Korbblütler: Filāgo gallica L. Französisches Schimmelkraut. Bltr. lineal-pfrieml., am Rande umgerollt, länger als die Knäulchen; Bl. gelblichweiß; Hüllschuppen an der Spitze vertrocknet; St. gabelästig; ☉; 7 bis 9; ✕.

Varirt: F. spathulāta F. Schultz (Bltr. spatelf.).

t. Auf Lehm- und Mergeläckern:

—. X., 4; Nelkenblütler: Sagina ciliāta Fr.; s. Nr. 1491.

2404. XIV., 2; Rachenblümler: Linaria elatine Mill. (Elatinoides hastifolia K. h., Antirrhinum elat. L.). Spießblättriger Frauenflachs (Kalbsnase). Bltr. 3eck. bis eispießf.; Sporn grade; Bl. weißl., Unterl. gelb, Oberl. innen violet; St. niederlig., langharig; ☉; 7 bis 8; ✕.

u. Auf Lehmäckern:

—. X., 5; Nelkenblütler: Cerastium vulgātum L. spec.; s. Nr. 463.

—. XVII., 2; Erdrauchpfl.: Fumaria densiflōra DC.; s. Nr. 1488.

v. Auf mergeligen Aeckern:

—. XV., 2; Kreuzblütler: Diplotāxis viminea DC.; s. Nr. 1492.

—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Lathyrus tuberōsus L.; s. Nr. 2198.

w. Auf Krautäckern:

—. IV., 1; Krapppfl.: Galium spurium L.; s. Nr. 2217.

x. Auf Kartoffeläckern:

—. IV., 1; Krapppfl.: G. saccharātum All.; s. Nr. 1450.

y. Auf Aeckern in Gebirgsgegenden:

2405. XIV., 1; Lippenblümler: Teucrium botrys L. Trauben-Gamander (Ivenkraut). Bltr. gestielt, herzf., einfach oder dopp.-fiederspalt.-geschlitzt; Quirle 2- bis 6blüt.; Bl. purpurrot oder lila, seltener weiß, in der Mitte mit dunkelrotpunkt. Linie; ☉; 7 bis 9; ✕.

—. XIV., 2; Rachenblümler: Melampyrum arvēnse L.; s. Nr. 1400.

z. An sumpfigen Ackerrändern:

—. XIV., 1; Lippenblümler: Stachys palūstris L.; s. Nr. 1905.

a¹. Unter Lein:

—. XV., 1; Kreuzblütler: *Camelīna dentāta Pers.; ſ. Nr. 1495.

b¹. Unter Serradella:

—. V., 1; Borretſchpfl.: *Echĭum plantaginĕum L.

M. An faſt allen Orten: §. 489.

2406. XIV., 2; Rachenblümler: Euphrasĭa officinālis L. Gemeiner Augentroſt. Bltr. eif., ſitz., meiſt beiderſ. 5zähn.; Bl. in den Blattachſeln gegenſt., weiß oder bläulich, weißröhrig; Schlund gelb; Ober- und Unterl. violet-linirt; ☉; 6 bis 9; früher ☽.

Varirt: E. obtusifolĭa Kitt. (E. pratēnse Scheuchz.; Blattendzahn ſtumpfl.; St. rückw.-behart; gemeine, größere Wieſenform), E. rostkoviāna Hayne (E. pratēnsis Fr.; Bltr. eif.; St. oben mit Drüſenhärchen; Bl. groß, lila oder weiß; Form unfruchtb. Wieſen und Oedungen), E. acutifolĭa Kitt. (E. officinālis Rchb.; Endzahn ſpitz; St. rückw.-kurz-ſteifharig, oben mit einzelnen Drüſenhärchen; Form trockner Wieſen und Raine), E. nemorōsa Pers. (Blattzähne länger harſp.; St. drüſenlos, faſt wollharig; Form ſteiniger, ſonniger Hügel und Raine), E. micrāntha Rchb. (Bltr. oberſ. glänz., Zähne kurz-knorp.-zugeſp.; St. angedr.-drüſenharig, kleinblüt.; Form feſten, trocknen Waldbodens), E. alpīna Kitt. (Bltr. eif., mit 3 bis 5 groben, ſtachelſp. Zähnen; St. 2- bis 4blüt.; Alpenform), E. minĭma Jacq. (Bltr. eif., ſpitz-geſägt; Lappen der Oberl. zſgeneigt; Alpenform), E. salisburgēnsis Funk (Bltr. lanzettl., beiderſ. gleichf.-2- bis 3zähn., Zähne harſp.; St. wenigblüt.; Kalkalpenform), E. gracĭlis Fr. (Bltr. längl.-lanzettl., beiderſ. gleichmäßig-3zähn.; St. rundl.; Bl. klein), E. tricuspidāta L. (Bltr. längl., lineal., beiderſ. 2zähn., Zähne ohne Knorpelſp.; Ty., Kr.), E. picta Wimm. (St. ſchlank, meiſt einfach; Bltr. entfernt, breit, rundl.-eingeſchn.-gekerbt; K. kahl, weniger tief-geſpalten; Form fruchtb. Triften der Hochgebirge).

2407. XXI., 1; Giftmilcher: Euphorbĭa cyparissĭas L. (Tithymālus cypar. Scop.). Zipreſſen-Wolfsmilch (Hundemilch). Bltr. ſchmal-lineal., ganzrand., kahl; Hüllbltchn. ei-rautenf., ganzrand.; Kapſ. fein-punkt.-rauh; Samen glatt; 4; 4 bis 7; ⫩.

§. 490. **N. Auf fettem Boden:**

—. III., 2; Graspfl.: Echinochlŏa crus-galli L.; ſ. Nr. 2329.
—. V., 1; Nachtſchattenpfl.: *Datūra stramonĭum L.; ſ. Nr. 1253.
—. V., 2; Meldenpfl.: Chenopodĭum album L.; ſ. Nr. 2231.
—. „ „ Ch. vulvarĭa L.; ſ. Nr. 2232.
—. „ „ Ch. polyspērmum L.; ſ. Nr. 2233.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Mentha sylvēstris L.; ſ. Nr. 2218.
—. XXI., 5; Meldenpfl.: Atrĭplex hastātum L.; ſ. Nr. 2210.
—. „ „ A. patŭlum L.; ſ. Nr. 2211.
—. „ „ A. angustifolĭum Sm.; ſ. Nr. 2159.

a. Auf ſchwerem Boden:

—. XIX., 1; Korbblütler: Cardŭus crispus L.; ſ. Nr. 2099.

b. Auf fettem, bebautem Boden:

—. X., 5; Schnabelpfl.: *Oxălis corniculāta L.; ſ. Nr. 1261.

§. 491. **O. Auf Sandboden:**

—. IV., 1; Kardenpfl.: Scabiōsa arvēnsis L.; ſ. Nr. 1283.
—. „ Krapppfl.: Crucianēlla angustifolĭa L.; ſ. Nr. 1498.
—. V., 1; Rachenblümler: Verbāscum flocōssum W. et K.; ſ. Nr. 1499.
—. V., 1; Borretſchpfl.: Onōsma arenarĭum W. et K.; ſ. Nr. 1185.
—. V., 1; Paronychienpfl.: Herniarĭa glabra L.; ſ. Nr. 1476.
2408. V., 2; Meldenpfl.: Corispērmum marschallĭi Stev. Marſchall's Wanzenſame. K. fehlend; Bltr. lineal-lanzettl., lang-zugeſp.; Bl. genähert, in gipfel- und blattachſelſt. Aehren; Fruchtflügel gezähnelt, an der Spitze ausgeſchn., im Ausſchnitte mit 2 Stachelſpitzchen; oberſte Deckbltr. eif.; ⊙; 7 bis 8; Schwetzingen.
—. V., 2; Doldenpfl.: Eryngĭum campēstre L.; ſ. Nr. 2271.
—. „ „ Pimpinēlla saxifrăga L.; ſ. Nr. 2176.
2409. V., 5; Bleiwurzpfl.: Armerĭa plantaginĕa Willd. (Statĭce plant. All.). Wegetrittblättriges Nelkengras (Grasnelke). Schaft 1köpf.; Bltr. lineal.-lanzettl., 3- bis 7nervig; äußerſte Hüllbltchn. harſp., innere ſehr ſtumpf; Bl. roſenrot; 2↓; 7 bis 8; Mainz.
—. VI., 1; Lilienpfl.. Allĭum flavum L.; ſ. Nr. 1500.
—. VI., 3; Knöterichpfl.: Rumex acetosēlla L.; ſ. Nr. 1296.
—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: *Oenothēra biēnnis L.; ſ. Nr. 2256.

—. X., 1; Rautenpfl.: Tribŭlus terrēstris L.; ſ. Nr. 1353.
—. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus arenarĭus L.; ſ. Nr. 1501.
—. „ „ Gypsophīla fastigiāta L.; ſ. Nr 1480.
—. „ „ Saponarĭa officinālis L.; ſ. Nr. 2184.
—. „ Paronychienpfl.: Scleránthus perēnnis L.; ſ. Nr. 676.
—. X., 3; Nelkenblütler: Silēne conĭca L.; ſ. Nr. 680.
—. „ „ S. inflāta Sm.; ſ. Nr. 1178.
—. „ „ S. viscōsa Pers.; ſ. Nr. 1297.
—. „ „ S. otītes Sm.; ſ. Nr. 461.
—. „ „ Spergularĭa rubra Presl.; ſ. Nr. 576.
—. X., 5; Dickblattpfl.: Sedum acre L.; ſ. Nr. 1298.
—. XI., 1; Fettkrautpfl.: Portulāca oleracĕa L.; ſ. Nr. 1269.
—. XII., 3; Roſenpfl.: Rosa pimpinellifolĭa L.; ſ. Nr. 1211.
—. XIII., 1; Mohnpfl.: Glaucĭum lutĕum Scop.; ſ. Nr. 1502.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Stachys recta L.; ſ. Nr. 1303.
—. „ „ Teucrĭum scorodonĭa L.; ſ. Nr. 2090.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Linarĭa vulgāris Desf.; ſ. Nr. 2193.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Scrophularĭa canīna L.; ſ. Nr. 687.
2410. XV., 1; Kreuzblütler: Biscutēlla laevigāta L. Gemeines Brillenſchötchen. Untere Bltr. längl., in den Stiel verſchmäl., obere längl., mit abgerund., halbumfaſſ. Baſis ſitzend; Bl. gelb; Schötchen an beiden Enden ausgerand., kahl und glatt; 4; 7 bis 8.
Varirt: B. ambigŭa DC. (Bltr. von ſtärkeren Borſten ſteifharig).
—. XV., 1; Kreuzblütler: Senebiēra didўma Pers.; ſ. Nr. 2323.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Erysĭmum hieracifolĭum L.; ſ. Nr. 551.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum columbīnum L.; ſ. Nr. 675.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Onōnis repens L.; ſ. Nr. 1320.
—. „ „ Genīsta tinctorĭa L.; ſ. Nr. 1124.
—. „ „ Medicāgo denticulāta Willd.; ſ. Nr. 1466.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Melilōtus officinālis L.; ſ. Nr. 1326.
—. „ „ Astragălus arenarĭus L.; ſ. Nr. 1187.
—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperĭcum pulchrum L.; ſ. Nr. 1089.

—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum pilosĕlla L.; ſ. Nr. 1181.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hypochoeris glabra L.; ſ. Nr. 1416.
—. XIX., 2; Korbblütler: Senecĭo sylvatĭcus L.; ſ. Nr. 1080.
—. XIX., 2; Korbblütler: S. livĭdus L.; ſ. Nr. 1503.
—. „ „ Tanacētum vulgāre L.; ſ. Nr. 2293.
2411. „ „ Gnaphalĭum lutĕo-album L. Gelblichweißes Ruhrkraut. St. einfach oder äſtig; Bltr. weißwollig; Köpfchen geknäuelt, deckblattlos, weißlichgrün, mit gelben oder rötl. Spitzen; Pappus ſchmutzigweiß; ☉; 7 bis 8.

a. Auf Sandfeldern:

Vergl. §. 488, g; außerdem:

—. V., 2; Doldenpfl.: Pastināca satīva L.; ſ. Nr. 2058.
—. X., 2; Paronychienpfl.: Scleränthus annŭus L.; ſ. Nr. 574.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: *Ornithŏpus satīvus Brot.; ſ. Nr. 1440.

b. Auf feuchtem Sandboden:

—. III., 1; Fettkrautpfl.: Montĭa fontāna L.; ſ. Nr. 683.
—. III., 2; Graspfl.: Andropōgon ischaemum L.; ſ. Nr. 2261.
—. „ „ Calamagrōstis epigeios Roth; ſ. Nr. 2170.
—. „ „ C. montāna Host; ſ. Nr. 1102.
—. „ „ Phleum arenarĭum L.; ſ. Nr. 1511.
—. „ „ Koelerĭa glauca DC.; ſ. Nr. 689.
2412. IV., 1; Enzianpfl.: Cicendĭa filiformis Rchb. (Exăcum fil. Sm., Gentiāna fil. L.). Fadenförmiges Bitterblatt. St. von der Baſis an äſtig; Bltr. lanzettl.; Blütenſt. verläng., blattlos; K. kurz-glock., 4zähn.; Bl. goldgelb; ☉; 7 bis 8.
2413. IV., 4; Leinpfl.: Radiŏla millegrāna Sm. (Linum radiŏla L., Rad. linioīdes Gmel., R. multiflōra Aschrsn.). Zwerglein (Stralkraut). St. fadenf., gabelſpalt.-vieläſtig; Bltr. gegenſt., eif.; Bl. klein, einzeln, faſt geknäuelt, weiß; ☉; 7 bis 8; ✕.
—. V., 1; Paronychienpfl.: Illecĕbrum verticillātum L.; ſ. Nr. 1483.
—. V., 2; Doldenpfl.: Hydrocotўle vulgāris L.; ſ. Nr. 2137.
—. V., 3; Paronychienpfl.: Corrigiŏla littorālis L.; ſ. Nr. 1348.

—. V., 5; Bleiwurzpfl.: Armeria vulgaris Willd.; ſ. Nr. 1295.
—. VI., 1; Semede: Juncus communis E. Mey; ſ. Nr. 1512.
—. „ „ J. bufonius L.; ſ. Nr. 1513.
—. „ „ J. tenageia Ehrh.; ſ. Nr. 1514.
2414. „ Lilienpfl.: Allium kermesinum Rchb. Karmoiſinblütiger Lauch. Zwiebel verk.-längl., zerſchlitzthäutig; Bltr. lineal., ſtumpf; Schaft ſchlank; Blütenſch. faſt ſo lang als die Blütenſt.; Stbgf. faſt von dopp. Kelchlänge; 4; 7 bis 8; Ulm, Kr.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygonum minus Huds.; ſ. Nr. 2118.
—. X., 4; Nelkenblütler: Sagina apetala L.; ſ. Nr. 604.
—. X., 5; „ Cerastium brachypetalum Desp.; ſ. Nr. 690.
—. X., 5; Nelkenblütler: Spergella subulata Rchb.; ſ. Nr. 1188.
2415. X., 5; Nelkenblütler: S. nodosa Rchb. (Spergula nod. L., Sagina nod. Fenzl). Knotiger Fünfling. St. ausgebreit., ligend, einſeitig-äſtig, kahl oder oben drüſenharig; Krbltr. faſt von dopp. Kelchlänge, weiß; 4; 7 bis 8.
Variirt: Sp. glandulosa Bess. (Blütenſt. und K. drüſenharig), Sp. pubescens Koch (St., Blütenſt., Kelchgrund und Blattränder drüſig-behart).
—. X., 5; Nelkenblütler: Spergula arvensis L.; ſ. Nr. 1394.
—. XI., 2; Roſenpfl.: Aremonia agrimonioides Neck.; ſ. Nr. 1515.
—. XII., 3; Roſenpfl.: Potentilla supina L.; ſ. Nr. 1369.
—. „ „ P. norvegica L.; ſ. Nr. 1516.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Nasturtium palustre DC.; ſ. Nr. 1933.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Erysimum cheiranthoides L.; ſ. Nr. 1484.
2416. XV., 2; Kreuzblütler: Braya supina Koch (Sisymbrium supinum L.). Niedrige Braye. St. im Kreiſe umherligend, rückw.-behart; Bltr. buchtig-fiederſpalt.; Bl. und Schoten blattachſelſt., einzeln, aufr., weichharig, erſtere weiß; Schirmähre beblätt.; ⊙; 7 bis 8; E. (Lauterthal).
—. XXI., 3; Halbgras: Carex cyperoides L.; ſ. Nr. 1517.
—. „ „ C. oederi Retz.; ſ. Nr. 691.

c. Auf feuchten Sandtriften:

—. IV., 4; Leinpfl.: Radiola millegrana Sm.; ſ. 2413.

—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperĭcum humifūsum L.; ſ. Nr. 2134.

d. Auf feuchtem Kies:

—. V., 1; Schlüſſelblümler: Lysimachĭa nemŏrum L.; ſ. Nr. 1048.

e. Auf feuchtem Quarzſandboden:

—. VI., 1; Semede: Juncus capitātus Weig.; ſ. Nr. 1510.

f. Auf Quarzſand:

—. VIII., 1; Heidepfl.: Callūna vulgāris Salisb.; ſ. Nr. 1075.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Galeōpsis ochroleuca Lmk.; ſ. Nr. 2238.

g. Auf unfruchtbarem Sandboden:

2417. III., 2; Graspfl.: Calamagrōstis arenarĭa Roth (Arūndo aren. L., Ammophĭla aren. Lk., Psamma aren. R. et Sch.). Sandrohr (Sandhalm). Bltr. eingerollt; Riſpe ährenf., gedrungen, walzl.; Klappen lineal., ſpitz; Hare 3mal kürzer, als die Spelzen; Pfl. grünlichweiß; 4; 7 bis 8.
—. III., 2; Graspfl.: Setarĭa glauca P. B.; ſ. Nr. 2331.
—. „ „ Tragus racemōsus Desf.; ſ. Nr. 1504.
—. „ „ Cynŏdon dactўlon Rich.; ſ. Nr. 2332.
—. „ „ Digitarĭa glabra R. et Sch.; ſ. Nr. 1272.
—. „ „ D. ciliāris Koel.; ſ. Nr. 1251.
—. „ „ Aira canēscens L.; ſ. Nr. 1507.
—. „ „ Koelerĭa cristāta Pers.; ſ. Nr. 608.
—. V., 1; Rachenblümler: Verbascum thapsus L.; ſ. Nr. 2107.
2418. „ „ V. thapsifōrme Schrad. (V. thapsus Mey. fl. hannov., V. schradēri Mayer). Kleinblumiges Wollkraut. Kr. radf., vertieft, gelb; die 3 oberen Stbf. weißwollig-behart, mit quer-auflig., nierenf. Antheren, die 2 unteren etwas länger, mit parallel-anſitz., eif. Antheren, faſt kahl; Narbe kopfig; ♂; 7 bis 9; ☼.*)
—. X., 5; Dickblattpfl.: Sedum reflēxum L.; ſ. Nr. 2235.
2419. XIX., 2; Korbblütler: Helichrўsum arenarĭum DC. (Gnaphalĭum aren. L.). Sand-Immerſchön (Sonnengold, Strohblume, Immortelle, Katzenpfötchen, Mottenblume, Honigblümchen, Jüngling, Furmannsblume). Bltr. filz.,

*) Fries ſieht dieſe Art als das ächte Linné'ſche V. thapsus an. — Das V. cuspidatum Schrad. zeichnet ſich durch langgeſpitzte obere Blätter, längere Blütenſtiele und mindere Beharung aus!

untere verk.-eif.-lanzettl., mittl. lineal.-lanzettl.; Köpfchen kugelf.; Hüllbltchn. goldgelb; ♃; 7 bis 8; ♄; ‡; ×.
—. XXI., 1; Giftmilcher: Euphorbĭa chamaesȳce L.; s. Nr. 1509.
—. XXII., 13; Zapfenfrüchtler: Ephĕdra monostachy̆a L.; s. Nr. 1505.

h. Auf unfruchtbaren Sand- und Kiesstellen:

—. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus saxifrăga L.; s. Nr. 2400.

i. Auf sonnigen, sandigen Stellen:

2420. V., 1; Paronychienpfl.: Herniarĭa alpīna Vill. Alpen-Bruchkraut. St. ligend; Bltr. verk.-eif., auch längl., gewimp.; Blütenknäuel auf den Gipfeln der blattachselst. Aestchen, 1- bis 3blüt.; Kelchlappen kurzharig; Bl. gelblichgrün; ♃; 7 bis 8; Ty. (Wippthal).
—. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus armerĭa L.; s. Nr. 2133.
—. „ „ D. deltoīdes L.; s. Nr. 1111.
—. XII., 3; Rosenpfl.: Potentīlla argentĕa L.; s. Nr. 464.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Berterŏa incāna DC.; s. Nr. 1305.
—. XV., 2; „ Turrītis glabra L.; s. Nr. 466.

k. Auf lockerem Sandboden:

—. V., 1; Glockenblümler: Campanŭla rapuncŭlus L.; s. Nr. 1289.

l. Auf lehmsandigem Boden:

—. II., 1; Lippenblümler: Salvĭa aethiŏpis L.; s. Nr. 1270.

m. Auf kalkhaltigem Sandboden:

—. III., 2; Graspfl.: *Eragrōstis poaefōrmis Lk.; s. Nr. 1479.
—. V., 1; Rachenblümler: Verbāscum thapsifōrme Schrad.; s. Nr. 2418.
—. X., 3; Nelkenblütler: Alsīne tenuifolĭa Whlg.; s. Nr. 1355.
—. XV., 1: Kreuzblütler: Alȳssum campēstre DC.; s. Nr. 580.
—. XIX., 1; Korbblütler: Chondrīlla juncĕa L.; s. Nr. 2096.

n. Auf Sandstein:

—. XV., 2; Kreuzblütler: Arăbis arenōsa Scop.; s. Nr. 681.

o. In Sandebenen:

2421. XIX., 2; Korbblütler: Artemisĭa scoparĭa W. et K. Besen-Beifuß. St. einzeln, aufsteig., krautig, nebst den

Bltrn. etwas abſteh.=rauhharig oder kahl, riſpig; untere Bltr. 3fach=fiederſpalt., obere dopp.=fiederſpalt., untere ſtengelſt. am Blattſt. geöhrelt; Blütenköpfchen geſtielt, eif., kahl, nickend; ♂, ſelten ☉ (♃); 7 bis 9; Pr., Pſ., Schl., Bö., Mä., Oe., St.

p. Auf Sandfeldern unter der Saat:

—. XIII., 1; Mohnpfl.: Papāver argemōne L.; ſ. Nr. 663.
—. „ „ P. dubĭum L.; ſ. Nr. 665.
—. XIX., 2; Korbblütler: *Anthĕmis nobĭlis L.; ſ. Nr. 1264.

q. Auf Sandboden in Gebüſchen:

—. XIV., 2; Rachenblümler: Digitālis ambigŭa Murr.; ſ. Nr. 1024.

r. Auf nacktem, ſterilem Sand der Flußufer:

—. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygŏnum aviculāre L. und zwar die Varietät: aphўllum Kitt.; ſ. Nr. 2255.

s. Auf ſandigen Rainen und den Rändern der Sandfelder:

—. V., 1; Rachenblümler: Verbāscum moenchĭi Schultz; ſ. Nr. 2267.

§. 492. **P. Auf kalkhaltigem Boden:**

—. III., 2; Graspfl.: Stipa capillāta L.; ſ. Nr. 1518.
—. „ „ St. pennāta L.; ſ. Nr. 1519.
—. „ „ Calamagrōstis montāna Host; ſ. Nr. 1102.
—. III., 2; Graspfl.: Melĭca ciliāta L.; ſ. Nr. 1103.
—. „ „ *Avēna fatŭa L.; ſ. Nr. 1385.
—. „ „ *Eragrōstis poaeformis Lk.; ſ. Nr. 1479.
—. IV., 1; Krapppfl.: Sherardĭa arvēnsis L.; ſ. Nr. 633.
—. „ „ Asperŭla tinctorĭa L.; ſ. Nr. 2143.
—. „ Roſenpfl.: Poterĭum sanguisōrba L.; ſ. Nr. 569.
—. V., 1; Borretſchpfl.: Echinospērmum lappŭla Lehm.; ſ. Nr. 1286.
—. V., 1; Borretſchpfl.: E. deflexum Lehm.; ſ. Nr. 1520.
—. „ Glockenblümler: Campanŭla bononiēnsis L.; ſ. Nr. 2224.
—. V., 1; Paronychienpfl.: Herniarĭa hirsūta L.; ſ. Nr. 2389.
—. V., 2; Doldenpfl.: Critămus falcarĭa Rchb.; ſ. Nr. 2252.
—. „ „ Bupleurum rotundifolĭum L.; ſ. Nr. 1455.

—. V., 2; Doldenpfl.: B. longifolĭum L.; ſ. Nr. 1201.
—. „ „ Athamanta libanōtis L.; ſ. Nr. 2083.
—. „ „ Caucălis daucoïdes L.; ſ. Nr. 1456.
—. „ „ Torĭlis helvetĭca Gmel.; ſ. Nr. 2372.
—. VI., 1; Semede: Luzŭla flavēscens Gaud.; ſ. Nr. 696.
—. X., 2; Nelkenblütler: Vaccarĭa pyramidāta Fl. Wett.; ſ. Nr. 2185.
2422. X., 2; Paronychienpfl.: Scleränthus polycārpus (Scl. verticillātus Tausch). Büſchelblütiger Knauel. Blütendeckbltr. kürzer als die grünl. Bl.; Kelchlapp. längl.-lineal., lang-zugeſp., ſchmal-randhäutig, zur Fruchtzeit grade, aber offen; Bl. auf den kurzen, blattachſelſt. Zweigen büſchelig-gehäuft; ☉; 7 bis 8; Süddeutſchl.
—. XII., 2; Roſenpfl.: Spiraea filipendŭla L.; ſ. Nr. 1019.
—. XII., 3; „ Potentīlla recta L.; ſ. Nr. 439.
—. XIII., 1; Sonnenröslein: Helianthĕmum apennīnum Willd.; ſ. Nr. 1522.
—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: Nigēlla arvēnsis L.; ſ. Nr. 2341.
—. XIII., 3; „ Adōnis aestivālis L.; ſ. Nr. 666.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Melīssa calamīntha L.; ſ. Nr. 2063.
2423. XIV., 1; Lippenblümler: M. nepĕta L. Poleiartige Meliſſe. St. aufſteig., aufr., rauhharig; Bltr. geſtielt, eif., beiderſ. ſtumpf, an den Seiten ſteiffägezähn., mehr oder weniger rauhharig; Bl. bläulich, auf der Unterl. violet-getüpfelt; 4; 7 bis 8; Regensburg, Sg., Oe., Ty.
—. XIV., 1; Lippenblümler: M. acĭnos Benth.; ſ. Nr. 2378.
—. „ „ Stachys germanĭca L.; ſ. Nr. 2313.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Ajŭga chamaepĭtys Schreb.; ſ. Nr. 1493.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Teucrĭum chamaedrys L.; ſ. Nr. 2239.
2424. XIV., 1; Lippenblümler: T. montānum L. Berg-Gamander (Marienkraut). Bltr. lineal.-lanzettl., ganzrand., unterſ. graufilz.; Quirle in ein endſt. Köpfchen zſgedrängt; Bl. blaßgelb; 4; 7 bis 8.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Ibēris amāra L.; ſ. Nr. 1494.
—. „ „ I. pinnāta L.; ſ. Nr. 1306.
—. „ „ Biscutēlla laevigāta L.; ſ. Nr. 2410.
—. „ „ Lepidĭum campēstre R. Br.; ſ. Nr. 1307.
—. XV., 1; Kreuzblütler: *Neslĕa paniculāta Desv.; ſ. Nr. 1464.

—. XV., 2; Kreuzblütler: Arăbis sagittāta DC.; ſ. Nr. 697.
—. „ „ Sinăpis arvēnsis L.; ſ. Nr. 1467.
—. XVII., 2; Erdrauchpfl.: Fumarĭa vaillantĭi Lois.; ſ. Nr. 643.
—. XVII., 3; Bitterling: Polygăla chamaebūxus L.; ſ. Nr. 1030.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Onobrўchis satīva Lam.; ſ. Nr. 655.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Vicĭa villōsa Roth; ſ. Nr. 673.
—. „ „ Lathўrus lenticŭla Kitt.; ſ. Nr. 1470.
—. „ „ L. nissolĭa L.; ſ. Nr. 1414.
—. „ „ L. tuberōsus L.; ſ. Nr. 2198.
—. XIX., 1; Korbblütler: Crepis setōsa Hall. fil.; ſ. Nr. 2282.
—. XIX., 1; Korbblütler: Tragopōgon major Jacq.; ſ. Nr. 1337.
—. XIX., 1; Korbblütler: Podospērmum laciniātum DC.; ſ. Nr. 602.
—. XIX., 1; Korbblütler: Leontŏdon incānus Schrk.; ſ. Nr. 1523.
—. XIX., 1; Korbblütler: Jurinĕa mollis DC.; ſ. Nr. 1524.
—. „ „ Cirsĭum acaule All.; ſ. Nr. 2097.
—. „ „ C. tuberōso-acaule Freyer; ſ. Nr. 1525.
—. XIX., 1; Korbblütler: Cardŭus deflorātus L.; ſ. Nr. 2074.
—. XIX., 2; „ Cinerarĭa campēstris Retz.; ſ. Nr. 1136.
—. XIX., 2; Korbblütler: Achillēa nobĭlis L.; ſ. Nr. 2244.
—. „ „ Inŭla germanĭca L.; ſ. Nr. 2296.
—. XIX., 3; „ Centaurēa calcitrāpa L.; ſ. Nr. 2298.
—. „ „ C. paniculāta L.; ſ. Nr. 2299.
—. „ „ C. montāna L.; ſ. Nr. 1526.
—. XXI., 1; Giftmilcher: Euphorbĭa platyphўllos L.; ſ. Nr. 2326.
—. XXI., 3; Halbgras: Carex heleonāstes Ehrh.; ſ. Nr. 700.

a. Auf feuchtem Kalkboden:

2425. V., 2; Doldenpfl.: Sison amōnum L. Bibernellblättriges Siſon. St. aufr., walzenf., etwas geſtreift, äſtig; untere Blr. gefied., Fiedern eilanzettl., obere gefied., Blthn. fiederſpalt., ganzrand.; Dolden ſeiten- und gipfelſt., 4ſtral.; Döldchen 4- bis 5ſtral.; Bl. weiß; ☌; 7 bis 8; Kr., Genf.
—. VI., 1; Semede: Juncus obtusiflōrus Ehrh.; ſ. Nr. 1527.

b. Auf trocknem Kalkboden:

—. IV., 1; Kugelblütler: Globularĭa vulgāris L.; ſ. Nr. 701.
—. V., 1; Rachenblümler: Verbāscum thapsiförme Schrad.; ſ. Nr. 2418.
—. XXI., 1; Giftmilcher: Euphorbĭa verrucōsa Lam.; ſ. Nr. 706.

c. Auf ſandigem Kalkboden:

—. X., 3: Nelkenblütler: Alsīne tenuifolĭa Whlbg.; ſ. Nr. 1355.

d. Auf Kalkboden unter der Saat:

—. XIV., 1; Lippenblümler: Stachys annŭa L.; ſ. Nr. 2373.
2426. „ „ Galeōpsis angustifolĭa Ehrh. (Ladănum segĕtum L.). Schmalblättriger Daun. St. durch die kreuzweis-geſtellten Aeſte piramidenf., weichharig; Bltr. lineal-lanzettl. bis ſchmal-lineal., von der Mitte an entfernt-ſägezähn., die oberſten ganzrand.; oberſte Wirtel ſich berührend; Röhre der pfirſichblütroten Blkr. von dopp. Kelchlänge; ☉; 7 bis 9; Süd- und Mitteldeutſchl.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Melampўrum arvēnse L.; ſ. Nr. 1400.

e. Auf Kalkwieſen:

—. XIX., 1; Korbblütler: Cirsĭum tuberōsum All.; ſ. Nr. 1528.
2427. XIX., 1; Korbblütler: C. acăule-oleracĕum Schiede (C. rigens Wallr., C. decoloratum Koch, C. lachenalĭi Koch z. Th.). Bleichſüchtige Kratzdiſtel. Wrzfaſern dünn; Bltr. faſt ſitz., mit eif., kurz-2- bis 3ſpalt. Fiedern; Blütenköpfe einzeln oder etwas gehäuft, kurz- oder etwas länger geſtielt; Bl. gelblichweiß; 4; 7 bis 8.

f. Auf Kalkboden in rauheren Gegenden:

—. XV., 2; Kreuzblütler: Arăbis sagittāta DC.; ſ. Nr. 697.

g. Auf ſteinigem Kalkgebirgsboden unter Lein:

—. X., 3; Nelkenblütler: Silēne linicŏla Gmel.; ſ. Nr. 1530.

h. Auf felſigem Kalkboden:

—. XV., 2; Kreuzblütler: Sisymbrĭum austriăcum Jacq.; ſ. Nr. 613.

i. Auf Kalkfelſen:

—. IV., 1; Kugelblütler: Globularĭa vulgāris L.; ſ. Nr. 701.

2428. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus plumarius L. Federnelke (Pfingstnelke, Marientröpfchen). Köpfe ligend, wurzelnd; Bltr. lang-zugesp., fast stechend-spitz, knorp.-feinsägezähn.; die beiden inneren Kelchdeckschuppen mit kurzer, 3eck., zugesp. Spitze; Krbltr. meist bis zur Mitte fing.-zerschn., blaßrosenrot bis weiß, an der Basis mit purpurnen Querstreifen; 4; 7 bis 8; ↕; Oe.

2429. X., 3; Nelkenblütler: Silēne saxifrăga L. Steinbrech-Leimkraut. St. von sehr kurzen, zurückst. Härchen schärfl.; Bltr. schmal-lineal., drüsig-scharf; Bl. auf borstenf., langen Stielen gipfelst., einzeln oder zu 2, oben weiß, unten rötl.; Krbltr. tief-2spalt.; 4; 7 bis 8.

—. X., 3; Nelkenblütler: Möhringĭa ponae Fenzl; s. Nr. 1531.

—. X., 3; Nelkenblütler: M. heterophȳlla Doll.; s. Nr. 1532.

2430. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Thalĭctrum foetĭdum L. Stinkende Wiesenraute. St. nebst den Bltrn. von abstehend., einfachen und drüsentrag. Haren weichharig; Bltchn. rundl., gezähnt, besond. Blattst. schwach-kant.; Narben fransig-gezähnelt, mit hinterwärts an einander geschlag. Seiten; Fr. eilängl., zsgedr., spitz, beiders. 3rippig; Bl. in lockeren Zymen überhäng., blaßgrün; 4; 7 bis 8; Bö., Ty.

2431. XIV., 1; Lippenblümler: Melīssa pulegĭum Rochel (Calamīntha subnūda Rchb.). Majoranblättrige Minze. St. weichharig; Bltr. kurzgestielt, eif., spitz, scharf-sägezähn., beiders. grün und weichharig; Bl. in blattachselst., gestielten, meist einseitswend., deckblättr. Gabelzymen; K. gleichf.-5zähn., Zähne borstenf.; Bl. sehr klein, lila; 4; 7; Kr.

—. XV., 1; Kreuzblümler: Capsēlla pauciflōra Koch; s. Nr. 704.

—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperĭcum elĕgans Steph.; s. Nr. 1533.

2432. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum porrifolĭum Jacq. Lauchblättriges Habichtskraut. Kahl, graugrün; St. ästig, beblätt.; Aeste fadenf., locker-abstehend.; grundst. Bltr. bleibend, an der einscheidenden Basis zott.; Blütenst. beschuppt, nebst den Hüllen kahl; Bl. gelb; 4; 7 bis 8; Oe.

—. XIX., 1; Korbblütler: Crepis chondrilloĭdes Jacq.; s. Nr. 1534.

2433. XIX., 1; Korbblütler: C. alpēstris Tausch (Hieracĭum alpēstre Jacq.). Alpen-Grundfeste. St. schaftartig, 1- bis 2köpf., 1- bis 2blättr.; Hüllbltchn. dachig, weißrand., von schwarzen, kurzen Borsten und geglied. Drüsenharen scharf; Fr. geschnäbelt; Bl. hellgelb; 4; 7 bis 8.

—. XIX., 2; Korbblütler: Doronĭcum caucasĭcum M. B.; ſ. Nr. 1535.

k. Auf Kalkhügeln:

—. IV., 1; Kugelblütler: Globularĭa vulgāris L.; ſ. Nr. 701.
—. V., 1; Borretſchpfl.: Echinospērmum deflēxum Lehm.; ſ. Nr. 1520.
2434. V., 2; Doldenpfl.: Seselĭ hippomarăthrum L. Pferdeſeſel. Bltr. 3fach-geſied., lineal.-zipf.; Blattſch. angedr., obere blattlos; Dolden 9- bis 12ſtral.; Hülle fehlend; Bl. weiß oder rötlich; Hüllchen beckenf.-zſgezogen, gezähnt; 4; 7 bis 8; Sa., Rh., Bö., Mittel- und Süddeutſchl.
—. VI., 1; Lilienpfl.: Allĭum montānum Schmidt; ſ. Nr. 1536.
—. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus prolĭfer L.; ſ. Nr. 2275.
—. „ Paronychienpfl.: Scleränthus polycārpus L.; ſ. Nr. 2422.
—. XIII., 1; Sonnenröslein: Helianthĕmum vineāle Pers.; ſ. Nr. 1537.
—. XIII., 1; Sonnenröslein: H. fumāna Mill.; ſ. Nr. 1538.
2435. XVII., 4; Hülſenpfl.: Dorycnĭum herbacĕum Vill. (Lotus dorycnĭum L.). Krautiger Backenklee. St. ausgebreit., oben rauhharig; Bltchn. verk.-eif. oder längl., keilf. in die Baſis verlauf., faſt zott.; Blütenſt. fadenf., blattachſel- und gipfelſt.; Bl. weiß, rötl. geſchminkt; Döldchen 3- bis 20blüt.; Hülſe eikugelf., ſtachelſp., wenigſamig; 4; 7 bis 8; Oe., St., Kr., Ty. u. ſ. w.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Coronĭlla vaginālis Lamk.; ſ. Nr. 1596.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Hippocrēpis comōsa L.; ſ. Nr. 600.
—. XIX., 1; Korbblütler: Scorzonēra purpurĕa L.; ſ. Nr. 1127.
—. XIX., 1; Korbblütler: Jurinĕa mollis DC.; ſ. Nr. 1524.
—. „ „ Serratŭla radiāta M. B.; ſ. Nr. 1540.
2436. „ „ Carlīna acaulis L. (C. subacaulis DC., C. alpīna Jacq.). Stengelloſe Eberwurz (Hundszorn, Roßkopfsſtaude, Sand-, Wetter-, Karls-, Samen- oder engliſche Diſtel). Stengellos oder ſtengelig ſich erhebend, meiſt 1köpf.; Bltchn. ſtralend, untere Hälfte lineal.; grundſt. Bltr. kahl, Lappen eingeſchn.-gezähnt; innere Hüllbltchn. ſilberweiß-glänzend; Bl. weißlichgelb, endl. rötl.; ♂ bis 4; 7 bis 8; ☼. *)

*) Die Wurzel dieſer Pflanze bildet in der Thierarzneikunde einen Hauptbeſtandtheil des ſogenannten „Roßpulvers" (pulvis equorum).

Varirt: acaulis L. (St. fehlend oder sehr kurz; 1köpf.), caulēscens Lmk. (St. bis 4 dm. hoch, 1köpf.), simplex W. et K. (St. verläng., 1- bis 3köpf.; Bltr. tief-fiederspalt.), aggregāta Willd. (St. mehre, 1köpf.).

2437. XIX., 2; Korbblütler: Achillēa odorāta L. Wohlriechende Garbe. Bltr. unterſ. behart, Spindel ſchmalgeflüg., vorn mit einem oder dem andern lanzettl., ſpitzen Läppchen unter den Fiedern, unter der Mitte ganzrand.; Blütenäſte ungleich-lang; Spreublttchn. an der Spitze behart; Bl. ſchmutzigweiß; 4; 7 bis 8; Kr.

—. XIX., 2; Korbblütler: Inŭla germanĭca L.; ſ. Nr. 2296.

l. Auf Kalkbergen:

—. V., 1; Borretſchpfl.: Echinospērmum deflēxum Lehm.; ſ. Nr. 1520.

—. V., 2; Doldenpfl.: Seseli hippomarăthrum L.; ſ. Nr. 2434.

2438. „ „ Peucedănum officinale L. Gebräuchlicher Harſtrang (Schnabel-, Ferkel- oder Schwefelwurz, Saufenchel, Jungfernweck). St. ſtielrund, gerillt; Bltr. fünfmal 3fach-zſgeſetzt, Bltchn. lineal.; Bl. gelb; Blütenſt. mehrmals länger, als die eilängl. Fr.; 4; 7 bis 8; früher ☿.

—. XV., 2; Kreuzblütler: Erysĭmum odorātum Ehrh.; ſ. Nr. 1542.

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolĭum elĕgans Sav.; ſ. Nr. 1543.

—. „ „ Coronilla coronāta L.; ſ. Nr. 1544.

—. „ „ Hippocrēpis comōsa L.; ſ. Nr. 600.

—. XIX., 2; Korbblütler: Achillēa odorāta L.; ſ. Nr. 2437.

m. Auf Kalkboden in Gebirgsgegenden:

2439. XIV., 1; Lippenblümler: Prunella grandiflōra Jacq. Großblumige Prunelle. Bltr. entfernt-gezähnt bis fiederſpalt.; Kelch-Oberl. eingeſchn.-3zähn., Zähne eif., ſtachelſp.; Stbf. zahnlos, längere an der Spitze mit einem kleineren Höcker verſehen; Bl. groß, violet; 4; 7 bis 8.

—. XIV., 1; Lippenblümler: Stachys alpīna L.; ſ. Nr. 1160.

—. „ „ Teucrĭum botrys L.; ſ. Nr. 2405.

—. XIX., 2; Korbblütler: Doronĭcum pardaliănches L.; ſ. Nr. 707.

n. Auf Kalkboden des ſchweizer Jura:

2440. XIX., 1; Korbblütler: Cardŭus multiflōrus Gaud. Vielköpfige Diſtel. Bltr. unterſ. auf den Adern zott. oder ſpinnwebig-wollig; Köpfchen eif., zu 3 bis 5 gehäuft; Aeſte

bis zu den Köpfchen dornig-kraus; Fr. der Länge nach feingestreift; Bl. purpurn; ♂; 7 bis 8.*)

Q. Auf Lehmboden: §. 493.

—. III., 2; Graspfl.: *Avēna fatŭa L.; ſ. Nr. 1385.
—. IV., 1; Wegerichpfl.: Plantāgo medĭa L.; ſ. Nr. 1282.
—. V., 2; Doldenpfl.: Critămus falcarĭa Rchb.; ſ. Nr. 2252.
—. „ „ Caucălis daucoïdes L.; ſ. Nr. 1456.
—. „ „ Torĭlis helvetĭca Gmel.; ſ. Nr. 2372.
—. X., 2; Nelkenblütler: Vaccarĭa pyramidāta Fl. Wett.; ſ. Nr. 2185.
—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: Nigēlla arvēnsis L.; ſ. Nr. 2341.
—. XIII., 3; „ Adōnis aestivālis L.; ſ. Nr. 666.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Stachys annŭa L.; ſ. Nr. 2373.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Linarĭa elatīne Mill.; ſ. Nr. 2404.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Lepidĭum campēstre R. Br.; ſ. Nr. 1307.
—. XV., 1; Kreuzblütler: *Nesl̆ĕa paniculāta Desv.; ſ. Nr. 1464.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Melilōtus officinālis L.; ſ. Nr. 1326.
—. „ „ Onobrўchis satīva Lam.; ſ. Nr. 655.
—. „ „ Vicĭa villōsa Roth; ſ. Nr. 673.
—. XIX., 1; Korbblütler: Podospērmum laciniātum DC.; ſ. Nr. 602.
—. XIX., 2; Korbblütler: *Senecĭo vernālis W. et K.; ſ. Nr. 1040.

a. Auf feuchtem Lehmboden:

—. V., 2; Doldenpfl.: Sison amōmum L.; ſ. Nr. 2425.

b. Auf lockerem Lehmboden:

—. V., 1; Glockenblümler: Campanŭla rapuncŭlus L.; ſ. Nr. 1289.

c. Auf ſandigem Lehmboden:

—. II., 1; Lippenblümler: Salvĭa aethiŏpis L.; ſ. Nr. 1270.
—. XXI., 1; Giftmilcher: *Euphorbĭa exigŭa L.; ſ. Nr. 1547.

d. Auf ſteinigem, unfruchtbarem Lehmboden:

—. VIII., 1; Seidelpfl.: Passerīna annŭa Wickst.; ſ. Nr. 1477.

*) Wurde einmal in wenigen Exemplaren bei Trier gefunden!

e. In Lehm-, Erd- und Lettengruben:

—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: Epilobĭum angustifolĭum L.; ſ. Nr. 2185.
—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: E. roseŭm Retz.; ſ. Nr. 2129.
—. XXI., 5; Tannenwedelpfl.: Myriophȳllum alterniflōrum DC.; ſ. Nr. 1546.

f. Auf Lehmäckern:

Vergl. §. 488, u; außerdem:

—. X., 4; Nelkenblütler: Sagīna ciliata Fr.; ſ. Nr. 1491.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolĭum maritĭmum Huds.; ſ. Nr. 1545.

§. 494. **R. Auf Mergelboden:**

—. III., 2; Graspfl.: Lolĭum speciōsum Stev.; ſ. Nr. 1389.
—. IV., 1; Krapppfl.: Galĭum tricōrne With.; ſ. Nr. 2370.
—. V., 1; Paronychienpfl.: Herniarĭa hirsūta L.; ſ. Nr. 2389.
—. V., 2; Doldenpfl.: Carum bulbocastănum Koch; ſ. Nr. 1453.
—. V., 2; Doldenpfl.: Orlaȳa grandiflōra Hoffm.; ſ. Nr. 2371.
—. X., 2; Nelkenblütler: Vaccarĭa pyramidāta Fl. Wett.; Nr. 2185.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Linarĭa elatīne Mill.; ſ. Nr. 2404.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Senebiēra coronŏpus Poir.; ſ. Nr. 2258.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Diplotāxis viminĕa DC.; ſ. Nr. 1492.
—. XVII., 3; Bitterling: Polygăla chamaebūxus L.; ſ. Nr. 1030.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolĭum striatum L.; ſ. Nr. 1548.
—. „ „ Lathȳrus tuberōsus L.; ſ. Nr. 2198.
—. XIX., 1; Korbblütler: Crepis pulchra L.; ſ. Nr. 2221.
—. XIX., 2; „ Filago gallĭca L.; ſ. Nr. 2403.

a. Auf feuchten Mergeläckern:

—. X., 4; Nelkenblütler: Sagīna ciliata Fr.; ſ. Nr. 1491.

§. 495. **S. Auf Thonboden:**

—. III., 2; Graspfl.: Alopecūrus agrēstis L.; ſ. Nr. 1381.
—. „ „ Lolĭum speciōsum Stev.; ſ. Nr. 1389.
—. IV., 1; Krapppfl.: Sherardĭa arvēnsis L.; ſ. Nr. 633.
—. „ „ Galĭum tricōrne With.; ſ. Nr. 2370.
—. V., 1; Rachenblümler: Verbāscum blattarĭa L.; ſ. Nr. 1285.
—. V., 2; Doldenpfl.: Carum bulbocastănum Koch; ſ. Nr. 1453.

—. V., 2; Doldenpfl.: Athamanta libanotis L.; ſ. Nr. 2083.
—. „ „ Orlaya grandiflora Hoffm.; ſ. Nr. 2371.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Melissa calamintha L.; ſ. Nr. 2063.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Lamium incisum Willd.; ſ. Nr. 206.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Teucrium chamaedrys L.; ſ. Nr. 2239.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Lepidium campestre R. Br.; ſ. Nr. 1307.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Senebiera coronopus Poir.; ſ. Nr. 2258.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Sinapis arvensis L.; ſ. Nr. 1465.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolium striatum L.; ſ. Nr. 1548.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracium auricula L.; ſ. Nr. 1334.
—. „ „ Crepis pulchra L.; ſ. Nr. 2221.
—. XIX., 2; „ Senecio erucaefolius Huds.; ſ. Nr. 2100.
—. XIX., 2; Korbblütler: Filago gallica L.; ſ. Nr. 2403.

T. Auf ſteinigem Boden: §. 496.

a. An trocknen, unfruchtbaren, ſteinigen Stellen:
—. I., 1; Baldrianpfl.: Centranthus ruber DC.; ſ. Nr. 1645.
—. II., 1; Lippenblümler: Salvia pratensis L.; ſ. Nr. 1101.
—. III., 2; Graspfl.: Phleum pratense L.; ſ. Nr. 1248.
—. „ „ Aira flexuosa Schrk.; ſ. Nr. 1097.
—. „ „ Avena tenuis Mnch.; ſ. Nr. 1555.
—. „ „ Bromus sterilis L.; ſ. Nr. 1351.
—. „ „ Poa bulbosa L.; ſ. Nr. 567.
—. „ „ Koeleria cristata Pers.; ſ. Nr. 608.
—. IV., 1; Krapppfl.: Galium rubrum L.; ſ. Nr. 1556.
2441. „ „ G. purpureum L. Purpurblütiges Labkraut. St. rutenf., ſehr äſtig, ſchärfl.; Bltr. zu 8 bis 10, ſchmal-lineal., faſt borſtenf., am Rande und an der Mittelrippe ſcharf-ſtachelig; Kronlappen längl., kurz-zugeſp.; Fr. glatt, kahl, ſchwärzl.; Bl. dunkel- oder braunrot; 4; 7 bis 8; Kr., Ty.
2442. IV., 1; Krapppfl.: Crucianella mollugioides M. B. Büſchelblütiges Kreuzblatt. St. aufr.; Bltr. zu 8 bis 12 wirtelig, lineal-lanzettl., am Rande umgerollt und ſcharf; Bl. in blattachſelſt., gegenſt., geſtielten Büſcheln, grüngelblichweiß; Deckbltr. eilanzettl., lang-zugeſp., zott.; Blütentheile 5zäl.; 4; 7 bis 8; Kr.

—. V., 1; Rachenblümler: Verbäscum thapsus L.; ſ. Nr. 2107.
—. „ „ V. lychnītis L.; ſ. Nr. 2266.
—. „ Nachtſchattenpfl.: Physălis alkekēngi L.; ſ. Nr. 1196.
—. „ Borretſchpfl.: Echĭum vulgāre L.; ſ. Nr. 1108.
—. „ Windenpfl.: Convolvŭlus cantabrĭca L.; ſ. Nr. 1557.
—. V., 1; Glockenblümler: Jasiōne montāna L.; ſ. Nr. 1290.
—. V., 2; Enzianpfl.: Gentiāna cruciāta L.; ſ. Nr. 1558.
—. „ Doldenpfl.: Eryngĭum campēstre L.; ſ. Nr. 2271.
2443. „ „ Seseli varĭum Trev. Bunter Seſel. St. wenigäſtig; Bltr. 3- und mehrfach-geſied.; Blattſt. rinnenf.; Dolde 7- bis 16ſtral.; Stralen oberſ. gefurcht, kahl; Hüllchen kürzer als die Döldchen; Bl. weiß; Fr. kahl; 4; 7 bis 8; Bö., Oe., St. u. ſ. w.
2444. V., 2; Doldenpfl.: Cnidĭum apioïdes Spr. Silau-blättrige Brennſat. Bltr. dopp.-geſied.; Bltchn. durchſcheinend-aderig, tief-fiederſpalt., die Fetzen lanzettl.; Blattſch. locker, Hüllchen kahl, kürzer als die Döldchen; Bl. weiß; Fr. eif., kahl; 4; 7 bis 8; Kr.
2445. V., 2; Doldenpfl.: Pastināca opāca Bernh. Glanzloſer Paſtinak. Bltr. glanzlos, beiderſ. behart; Bl. gelb; ſonſt wie Nr. 2058; ☉; 7 bis 8.
2446. V., 2; Doldenpfl.: P. fleischmānni Hladn. Fleiſchmann's P. St. gefurcht, kant.; Bltr. geſied., Fiedern fiedertheil., obere zuſammenfließend, Lappen entgegengeſetzt, lanzettl.; Hülle und Hüllchen fehlend; Bl. gelb; ☉; 7 bis 8; Laibach.
—. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus carthusianōrum L.; ſ. Nr. 459.
—. X., 5; Dickblattpfl.: Sedum acre L.; ſ. Nr. 1298.
—. XII., 3; Roſenpfl.: Rosa sempervĭrens L.; ſ. Nr. 1550.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Clemātis flammŭla L.; ſ. Nr. 1560.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Thalĭctrum vulgāre Kitt.; ſ. Nr. 579.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Th. morisonĭi Gmel.; ſ. Nr. 1561.
2447. XIV., 1; Lippenblümler: Melissa thymifolĭa Rchb. (Calamīntha thymif. Rchb., Cuspidocārpus rupēstris Spenn., Saturēja rup. Wulff.). Quendelblättrige Meliſſe (Stein-M.). St. ſchwachfilz.; Bltr. eif., kurz-zugeſp., kahl, ſchwach-ſägezähn.; Bl. in blattachſelſt., einſeitswend. Gabelzymen, weiß, Oberl. hellviolet, Unterl. gefleckt; Kſchlund kahl; Kelchzähne kurz, einwärtsgekr.; 4; 7 bis 8; Kr.
2448. XIV., 1; Lippenblümler: M. alba W. et K. (Calamīntha alba Rchb., Thymus duinēnsis Mor.). Weiße M. St. ſtrauch., rückw.-weichharig; Bltr. längl., ſtumpf, ganzrand.

oder geschweift-sägezähn.; K. fast kahl, drüsig-punkt.; Bl. weiß, rötl.-punkt.; 4; 7 bis 8; Kr.

—. XIV., 1; Lippenblümler: Hyssōpus officinālis L.; s. Nr. 2237.

—. XIV., 1; Lippenblümler: Stachys recta L.; s. Nr. 1303.

2449. XIV., 2; Eisenkrautpfl.: Vitex agnus castus L. Schaf-Müllen (Keuschbaum, Abrahamsstrauch, Mönchspfeffer). Bltr. 5- bis 7zäl.-gefing., Bltchn. lanzettf.-zugesp., ganzrand., unters. filz.; Bl. violet, in gipfelst., unterbroch. Aehren; ♄; 7 bis 8; ‡; Kr.*)

—. XV., 2; Kreuzblütler: Sisymbrĭum officināle Scop.; s. Nr. 1361.

—. XVI., 2; Schnabelpfl.: *Geranĭum sibirĭcum L.; s. Nr. 2259.

—. „ „ G. columbīnum L.; s. Nr. 675.

—. XVII., 3; Bitterling: Polgăla vulgāris L.; s. Nr. 467.

—. „ „ P. chamaebūxus L.; s. Nr. 1030.

—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Lathўrus lenticŭla Kitt.; s. Nr. 1470.

—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum pratēnse Tausch; s. Nr. 1335.

—. XIX., 1; Korbblütler: Crepis tectōrum L.; s. Nr. 1366.

2450. „ „ „ Serratŭla nitĭda Bess. (Cardŭus nitĭdus W. et K., S. heterophўlla Desf.). Glänzende Scharte. St. einfach, 1köpf.; Bltr. scharf, gewimp., grundst. langgestielt, eif. stengelst. wenige, längl., oberste lineal.; Hülle eif.; innere Hüllblättchen trockenspitz.; Bl. rot; 4; 7 bis 8; Kr.

—. XIX., 1; Korbblütler: Lappa minor DC.; s. Nr. 2199.

—. „ „ L. major Gaertn.; s. Nr. 2200.

—. „ „ L. tomentōsa Lmk.; s. Nr. 2201.

—. „ „ Cirsĭum lanceolātum Scop.; s. Nr. 1339.

—. XIX., 1; Korbblütler: Cardŭus nutans L.; s. Nr. 2289.

—. „ „ Carlīna corymbōsa L.; s. Nr. 1562.

—. XIX., 2; „ Achillēa nobĭlis L.; s. Nr. 2244.

—. „ „ Anthĕmis ruthenĭca M. B.; s. Nr. 2325.

2451. XIX., 3; Korbblütler: Centaurēa karstiāna Scop. Karst-Flockenblume. St. aufr.; Aeste aufr.-abstehend.; Bltr. kahl, rauhrandig; Hüllbltchn. an den Seitenrändern mit zerfress. Haut, am Vorderrande stark-knorp.-gefranst, an der

*) Nach Fraas' Angabe wird die Pflanze noch jetzt in Griechenland zur Bewahrung der Keuschheit in's Bett gelegt! Auch soll unter diesem schönen Strauche die Göttin Hera geboren worden sein. Die Frauen des alten Athen legten während des Festes der Thesmophorien Zweige dieses Strauches in ihr Bett!

Spitze in einen kurzen, roſtbraunen Dorn auslauf.; Pappus etwa von Fruchtlänge; Bl. rot; ♂; 7 bis 8; Kr. (Karſt).

—. XXI., 1; Giftmilcher: Euphorbĭa platyphyllos L.; ſ. Nr. 2326.

b. An ſteinigen, felſigen Stellen:

2452. VI., 1; Lilienpfl.: Allĭum strictum Schrad. (A. reticulātum Presl.). Steifblättriger Lauch. Zwiebelhäute zuletzt netzfaſerig; Bltr. lineal., oberſ. rinnig, grundſt.; Blütenſch. 2klapp.; Dolde kaſeltrag.; K. rötlich; 4; 7: Th., Hn., Schl., Bö. u. ſ. w.

—. X., 3; Nelkenblütler: Drypis spinōsa L.; ſ. Nr. 1549.

2453. „ „ Alsīne setacĕa M. et K. (Arenarĭa set. Thuill., A. heteromălla Pers., Subulīna set. Rchb.). Borſtenblättrige Alſine. Bltr. pfrieml.-borſtenf., 3nervig; Kbltr. eif., ſpitz, weiß, faſt knorp., grün-rückenſteifig; Krbltr. oval, wenig länger als der K., weiß; 4; 7bis 8; Bö., Mä., De., Bd., Donau.

—. X., 5; Dickblattpfl.: Sedum acre L.; ſ. Nr. 1298.

—. XII., 3; Roſenpfl.: Rosa sempervĭrens L.; ſ. Nr. 1550.

2454. XIV., 1; Lippenblümler: Saturēja pygmaea Sieb. Kleines Bohnenkraut. Bltr. lanzettl., zugeſp., ſtachelſp., unterſ. wenig-punkt.; Bl. violet, purpurn-punkt.; ♄; 7 bis 8; Kr.

2455. XIV. 1; Lippenblümler: Teucrĭum polĭum L. Polei-Gamander. St. ſtrauchartig, ligend; Aeſte aufſteig., filz.; Bltr. ſitz., längl. bis lineal., keilf. in die Baſis zulauf., am Rande zurückgerollt, vorn zieml. gekerbt, ganz filz.; Bl. in kopf. Doldentraube, weiß, gelbl. oder rötl.; 4; 7 bis 8; früher ♃; Kr.

—. XV., 1; Kreuzblütler: Ibēris umbellāta L.; ſ. Nr. 1551.

—. „ „ Capsēlla pauciflōra Koch; ſ. Nr. 704.

—. XV., 2; „ Turrītis glabra L.; ſ. Nr. 466.

—. „ „ Arăbis arenōsa Scop.; ſ. Nr. 681.

—. „ „ Erysĭmum odorātum Ehrh.; ſ. Nr. 1542.

—. XV., 2; Kreuzblütler: Sisymbrĭum austriăcum Jacq.; ſ. Nr. 613.

—. XV., 2; Kreuzblütler: Hirschfeldĭa adprēssa Mnch.; ſ. Nr. 593.

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Genīsta procūmbens Willd.; ſ. Nr. 1552.

c. Auf Schlackenhalden:

—. X., 3; Nelkenblütler: Alsīne verna Bartl.; ſ. Nr. 618.

d. An ſchattigen, ſteinigen Orten:

—. XII., 3; Roſenpfl.: Potentilla recta L.; ſ. Nr. 439.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranium robertianum L.; ſ. Nr. 431.

e. Auf Porphirboden:

—. XV., 1; Kreuzblütler: Biscutella laevigata L.; ſ. Nr. 2410.

f. Auf Steingeröll:

—. X., 5; Dickblattpfl.: Sedum acre L.; ſ. Nr. 1298.
—. XIX., 2; Korbblütler: Inula salicina L.; ſ. Nr. 2222.

g. An und in Steinbrüchen:

—. V., 1; Rachenblümler: Verbascum nigrum L.; ſ. Nr. 2082.
—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: Epilobium angustifolium L.; ſ. Nr. 2085.
—. X., 5; Dickblattpfl.: Sedum acre L.; ſ. Nr. 1298.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Galeopsis ochroleuca Lmk.; ſ. Nr. 2238.
—. XIX., 2; Korbblütler: Senecio sylvaticus L.; ſ. Nr. 1080.
—. XXII., 1: Giftmilcher: Mercurialis ovata Hoppe; ſ. Nr. 717.

U. An Abhängen: §. 497.

—. V., 1; Rachenblümler: Verbascum blattaria L.; ſ. Nr. 1285.
—. „ Borretſchpfl.: Echium vulgare L.; ſ. Nr. 472.
—. „ Glockenblümler: Campanula rapunculus L.; ſ. Nr. 1289.
—. V., 1; Glockenblümler: Jasione montana L.; ſ. Nr. 1290.
—. VI., 1; Lilienpfl.: Allium scorodoprasum L.; ſ. Nr. 1207.
—. X., 2; Nelkenblütler: Dianthus carthusianorum L.; ſ. Nr. 459.
—. X., 2; Nelkenblütler: D. polifer L.; ſ. Nr. 2275.
—. „ „ Gypsophila muralis L.; ſ. Nr. 2234.
—. X., 5; Dickblattpfl.: Sedum acre L.; ſ. Nr. 1298.
—. XII., 3; Roſenpfl.: Potentilla rupestris L.; ſ. Nr. 434.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Thymus serpyllum L.; ſ. Nr. 2088.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Prunella vulgaris L.; ſ. Nr. 2277.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Diplotaxis tenuifolia DC.; ſ. Nr. 1313.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Erodium cicutarium l'Herit.; ſ. Nr. 217.
—. XVI., 5; Pappelroſenpfl.: Malva moschata L.; ſ. Nr. 1563.
—. XVII., 3; Bitterling: Polygala vulgaris L.; ſ. Nr. 467.

—. XIX., 2; Korbblütler: Senecĭo erucaefolĭus Huds.; ſ. Nr. 2100.
—. XIX., 2; Korbblütler: S. nemorēnsis L.; ſ. Nr. 2150.

a. An feuchten Abhängen:

2456. V., 2; Enzianpfl.: Gentiāna germanĭca Willd. Deutſcher Enzian. St. aufr., 4kant.; untere Bltr. verk.-ei- oder ſpatelf., ſpitz, obere eilanzettl., feinzugeſp.; Bl. groß, violet; K. 5ſpalt., Lappen am Rande zurückgerollt; Kronſaum von 1/3 Kronlänge; Klappenränder ſchwach-eingebog.; Samen kug., 1reihig; ☉; 7 bis 9.
—. XI., 2; Roſenpfl.: Agrimonĭa procēra Wallr.; ſ. Nr. 1115.
—. XII., 2; „ Spiraea arūncus L.; ſ. Nr. 1151.

b. An trocknen Abhängen:

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Astragălus austriăcus L.; ſ. Nr. 1567.

c. An ſonnigen Abhängen:

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Anthўllis vulnerarĭa L.; ſ. Nr. 721.
—. „ „ Trifolĭum striātum L.; ſ. Nr. 1548.
—. „ „ Hippocrēpis comōsa L.; ſ. Nr. 600.
—. XIX., 2; Korbblütler: Solidāgo virga aurĕa L.; ſ. Nr. 2077.

d. An ſonnigen, ſteinigen Abhängen:

—. X., 2; Paronychienpfl.: Sclerānthus perēnnis L.; ſ. Nr. 676.
—. X., 5; Dickblattpfl.: Sedum sexangulāre L.; ſ. Nr. 2391.
—. „ „ S. reflēxum L.; ſ. Nr. 2235.
—. XIII., 1; Sonnenröslein: Helianthĕmum vulgāre Gaertn.; ſ. Nr. 1120.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Sinăpis cheiranthus Koch; ſ. Nr. 1316.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Oxytrŏpis pilōsa DC.; ſ. Nr. 1564.
—. „ „ Onobrўchis arenarĭa DC.; ſ. Nr. 1565.

2457. XIX., 1; Korbblütler: Leontŏdon crispus Vill. (L. saxatĭlis Rchb., Apargĭa tergestĭna Hoppe, Ap. saxat. Ten.). Krauſer Löwenzahn. Wrz. verk.-kegelf., 1- bis mehrköpf.; grundſt. Bltr. lineal.-lanzettl., 3eck.-gezähnt, beiderſ. mit ſternf., widerhak., kurzen, ſteifen, weißen Haren; Schaft 1köpf.; Bl. gelb; Schließfr. faſt von dopp. Pappuslänge, von der Mitte an harſcharf-geſchnäbelt; 4; 7 bis 8; Kr.

e. An sonnigen, steinigen, bewaldeten Abhängen:

—. X., 1; Rautenpfl.: Dictāmnus albus L.; s. Nr. 1147.

f. An steinigen, felsigen Abhängen:

—. III., 2; Graspfl.: Festūca duriuscŭla L. sp.; s. Nr. 1133.

—. IV., 1; Wegerichpfl.: Plantago victoriālis Poir.; s. Nr. 1566.

—. V., 1; Borretschpfl.: Echinospērmum squarrōsum Rchb.; s. Nr. 2226.

—. XIV., 2; Rachenblümler: Digitālis ambigŭa Murr.; s. Nr. 1024.

g. An steinigen, begrasten Abhängen:

2458. IV., 1; Kardenpfl.: Scabiōsa leucāntha L. Weißblumige Skabiose. Behart bis rauhharig; St. rundl.; Bltr. fiedertheil.; Köpfchen fast kug., gestielt; Hüllbltchn. eif., grauharig, innere nebst den Spreubltchn. spitzl.; Hüllchen mehrzähnig-gesäumt; Bl. weiß; 4; 7 bis 8; Kr.

h. An steinigen, waldigen Abhängen:

—. XIV., 1; Lippenblümler: Dracocephălum ruyschiāna L.; s. Nr. 1025.

i. An Abhängen unter Gebüsch:

—. XII., 3; Rosenpfl.: Rosa arvēnsis L.; s. Nr. 1020.

—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: Aquilegĭa vulgāris L.; s. Nr. 1179.

—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum columbīnum L.; s. Nr. 675.

—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Ervum sylvatĭcum Peterm.; s. Nr. 1148.

k. An Bergabhängen:

—. V., 2; Doldenpfl.: Peucedānum officināle L.; s. Nr. 2438.

2459. XIV., 2; Rachenblümler: Digitālis medĭa Roth (D. ambigŭo-lutĕa G. Mey.). Mittlerer Fingerhut. St. oberw. und Blütenst. drüsig-weichharig; Blkr. röhrig-glock., außen drüsig-weichharig, gelb, innen braun-netzaderig, oben 2streif.; ♂; 7; ╪; Glan- und Nahegebiet, Maienfeld.*)

—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum divaricātum Ehrh.; s. Nr. 2194.

---

*) Ist Bastardform zwischen D. lutea L. und D. ambigua Murr.!

—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracium stoloniflōrum W. et K.; ſ. Nr. 1569.
—. XIX., 1; Korbblütler: Cirsium serratuloïdes Scop.; ſ. Nr. 1570.

l. An ſonnigen Bergabhängen:

—. XVII., 3; Erdrauchpfl.: Corydălis capnoïdes Pers.; ſ. Nr. 1571.
—. XIX., 3; Korbblütler: Centaurēa rupēstris L.; ſ. Nr. 1572.

m. An unfruchtbaren Bergabhängen:

2460. V., 1; Zauberpfl.: Thesium divaricātum Jan. Geſpreiztes Verneinkraut. Wrz. ſchief, mehrſtengelig; Aeſte wagr.-abſteh.; Blr. lineal., ſpitz; Fr. längl.-walzenf., langgeſtielt; Bl. grünlich; 4; 7 bis 8; Kr.

n. An bewachſenen Bergabhängen:

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Vicĭa dumetōrum L.; ſ. Nr. 1070.
—. „ „ Lathyrus sylvēstris L.; ſ. Nr. 1036.

o. An Abhängen in Gebirgen:

—. XIII., 3; Roſenpfl.: Geum sudetĭcum Tausch; ſ. Nr. 1573.
2461. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperĭcum coris L. Strauchiges Hartheu. St. aufſteig., ſtrauchig, walzenf.; Blr. zu 3 bis 4 wirtelig, lineal., am Rande zurückgebog., ſtumpf, durchſcheinend-punkt.; Bl. gelb; kleiner ♄; 7 bis 8; Ty.

§. 498. V. In Weinbergen:

—. II., 1; Jasminpfl.: Olĕa europaea L.; ſ. Nr. 1574.
—. „ Lippenblümler: Salvĭa pratēnsis L.; ſ. Nr. 1101.
—. „ „ S. sclarēa L.; ſ. Nr. 1271.
—. III., 1; Schwertelpfl.: Iris sambucīna Vahl; ſ. Nr. 605.
—. III., 2; Graspfl.: Andropōgon ischaemum L.; ſ. Nr. 2261.
—. „ „ Setarĭa verticillāta P. B.; ſ. Nr. 1249.
—. „ „ S. virĭdis P. B.; ſ. Nr. 2249.
—. „ „ Digitarĭa sanguinālis Scop.; ſ. Nr. 1250.
—. „ „ D. ciliāris Koel.; ſ. Nr. 1251.
—. „ „ Lagūrus ovātus L.; ſ. Nr. 1575.
—. V., 1; Nachtſchattenpfl.: Physălis alkekēngi L.; ſ. Nr. 1196.
—. V., 1; Borretſchpfl.: Echĭum vulgare L.; ſ. Nr. 1108.
—. „ Windenpfl.: Convolvŭlus arvēnsis L.; ſ. Nr. 1255.
—. „ Glockenblümler: Campanŭla rapunculoïdes L.; ſ. Nr. 3002.

—. VI., 1; Spargelpfl.: Asparāgus officinālis L.; f. Nr. 1205.
—. „ Lilienpfl.: Allium scorodoprasum L.; f. Nr. 1207.
—. „ „ A. vineāle L.; f. Nr. 1392.
—. „ „ A. oleracĕum L.; f. Nr. 2339.
—. X., 2; Nelkenblütler: Vaccaria pyramidāta Fl. Wett.; f. Nr. 2185.
—. X., 3; Nelkenblütler: Stellaria media Vill.; f. Nr. 4.
—. X., 5; „ Cerastium brachypetălum Desp.; f. Nr. 690.
—. X., 5; Dickblattpfl.: Sedum acre L.; f. Nr. 1298.
—. XI., 3; Waupfl.: Resēda lutĕa L.; f. Nr. 1372.
—. XIII., 1; Mohnpfl.: Glaucium phoenicĕum Gaertn.; f. Nr. 1397.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Melissa acĭnos Benth.; f. Nr. 2378.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Galeōpsis ladănum L.; f. Nr. 2342.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Sideritis montana L.; f. Nr. 2379.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Ajŭga chamaepĭtys Schreb.; Nr. 1493.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Bunias erucāgo L.; f. Nr. 1402.
—. „ „ *B. orientālis L.; f. Nr. 1268.
—. XV., 2; „ Raphănus raphanistrum L.; f. Nr. 588.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Diplotāxis viminĕa DC.; f. Nr. 1492.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranium rotundifolĭum L.; f. Nr. 560.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: G. divaricātum Ehrh.; f. Nr. 2194.
—. XVI., 5; Pappelrosenpfl.: Althaea hirsūta L.; f. Nr. 2195.
—. „ „ A. pallĭda W. et K.; f. Nr. 1374.
—. „ „ Lavatēra thuringiāca L.; f. Nr. 2092.
—. XVII., 2; Erdrauchpfl.: Fumaria officinālis L.; f. Nr. 561.
—. „ „ F. vaillantĭi Lois.; f. Nr. 643.
—. „ „ F. wirtgenĭi Koch; f. Nr. 1403.
—. „ „ F. parviflōra L.: f. Nr. 644.
—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Galēga officinālis L.; f. Nr. 1349.
—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperīcum elēgans Steph.; f. Nr. 1533.
—. XIX., 1; Korbblütler: Crepis pulchra L.; f. Nr. 2221.
—. „ „ Lactūca perēnnis L.; f. Nr. 1231.
—. „ „ Tragopōgon major Jacq.; f. Nr. 1337.

—. XIX. 1; Korbblütler: Podospērmum laciniātum DC.; ſ. Nr. 602.
—. XIX., 1; Korbblütler: Helminthĭa echioīdes Gaertn.; ſ. Nr. 1232.
—. XIX., 1; Korbblütler: *Silўbum mariānum Gaertn.; ſ. Nr. 2242.
—. XIX., 4; Korbblütler: Calendŭla arvēnsis L.; ſ. Nr. 1418.
—. XIX., 5; „ Echīnops sphaerocephălum L.; ſ. Nr. 2246. *)
—. XX., 5; Oſterluzeipfl.: Aristolochĭa clematītis L.; ſ. Nr. 2209.
—. XXI., 1; Giftmilcher: Euphorbĭa falcāta L.; ſ. Nr. 2349.
—. XXI., 4; Neſſelpfl.: Urtīca urens L.; ſ. Nr. 1234.
—. XXI., 5; Meldenpfl.: Atrĭplex nitens Rebent.; ſ. Nr. 2302.
—. XXI., 5; Amarantblütige: Amarāntus blitum L.; ſ. Nr. 2247.
—. XXI., 9; Kürbispfl.: *Cucurbĭta melopĕpo L.; ſ. Nr. 1576.

a. An Weinbergsmauern:

—. V., 2; Doldenpfl.: Petroselīnum satīvum Hoffm.; ſ. Nr. 1293.
—. XIX., 1; Korbblütler: Lactūca scarĭola L.; ſ. Nr. 2284.

§. 499. **W. Auf Anhöhen und Hügeln:**

—. II., 1; Rachenblümler: Veronīca latifolĭa L.; ſ. Nr. 1189.
—. „ Lippenblümler: Salvĭa pratēnsis L.; ſ. Nr. 1101.
—. „ „ S. sylvēstris L.; ſ. Nr. 2168.
—. III., 1; Schwertelpfl.: Iris sambucīna Vahl; ſ. Nr. 605.
—. IV., 1; Krapppfl.: Galĭum mollūga L.; ſ. Nr. 1006.
—. V., 1; Borretſchpfl.: Echĭum vulgāre L.; ſ. Nr. 1108.
—. „ Glockenblümler: Campanŭla morettiāna Rchb.; ſ. Nr. 1578.
—. V., 1; Glockenblümler: C. patŭla L.; ſ. Nr. 1010.
—. „ „ Jasiōne montāna L.; ſ. Nr. 1290.
—. V., 2; Doldenpfl.: Pimpinēlla saxifrăga L.; ſ. Nr. 2176.
2462. „ „ Bupleurum juncĕum L. Binſenartiges Haſenöhrchen. St. aufr., etwas geſtreift, abſteh.-gabeläſtig; Bltr. ſteif, lineal., langzuſp., am Rande

*) Die *E. banaticus Rchb. aus Ungarn wird als Futterkraut empfohlen, weil ſie jede Art des Viehs gern frißt, weil ſie jährlich dreimal und Frühjahrs am zeitigſten gemäht werden kann, mit ſchlechtem Boden vorlieb nimmt, die ſtrengſte Kälte aushält und gute Bienennarung liefert!

schärfl., obere umfass.; Hüllblthn. lineal., langgesp.; Bl. gelb; ♂; 7 bis 9; Kr.

2463. V., 2; Doldenpfl.: Peucedănum oreoselīnum Mnch. (Athamānta or. L.). Berg-Hirschheil (Grundheil, Bergpetersilie). St. stielrund, gerillt; Bltr. 3fach-gefied., Blthn. glänz., eis., eingeschn.- oder fast fiederspalt.-gezähnt; Hülle und Hüllchen reichblüt., bleibend, erstere zurückgebog.; Bl. weiß; 4; 7 bis 8; früher 3.

—. V., 2; Doldenpfl.: P. cervaría Cuss.; s. Nr. 2132.

—. „ „ Pastināca satīva L.; s. Nr. 2058.

—. V., 5; Leinpfl.: Linum tenuifolĭum L.; s. Nr. 1541.

—. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus carthusianōrum L.; s. Nr. 459.

—. X., 2; Nelkenblütler: D. caryŏphyllus L.; s. Nr. 1354.

—. X., 3; „ Silēne otītes Smith; s. Nr. 461.

—. „ „ Arenaría serpyllifolĭa L.; s. Nr. 1259.

—. X., 5; Dickblattpfl.: Sedum acre L.; s. Nr. 1298.

—. XII., 2; Rosenpfl.: Spiraea filipendŭla L.; s. Nr. 1019.

—. XII., 3; „ Rubus fruticōsus L.; s. Nr. 1119.

—. „ „ Rosa resinōsa Sternb.; s. Nr. 1213.

—. XIV., 1; Lippenblümler: Thymus serpyllum L.; s. Nr. 2088.

2464. XIV., 1; Lippenblümler: Saturēja montāna L. Berg-Bohnenkraut (Winterbohnenkraut). St. holzig; Bltr. verk.-lineal-lanzettl., stachelsp., am Rande fein-stachel.-gezähnelt, an der Basis stachel.-gewimp., beiders. punkt., 1nervig; Kelchzähne stachelsp.; Kmdg. schwach-gebärt.; Bl. purpur-violet oder weiß; ♄; 7 bis 9; ♆; Kr., Kä. u. s. w.

—. XIV., 1; Lippenblümler: Ajŭga chamaepĭtys Schreb.; s. Nr. 1493.

—. XIV., 2; Rachenblümler: Euphrasĭa lutĕa L.; s. Nr. 2138.

—. XV., 1; Kreuzblütler: Rapīstrum perēnne All.; s. Nr. 1309.

—. XV., 2; „ Turrītis glabra L.; s. Nr. 466.

—. „ „ Hirschfeldĭa adprēssa Mnch.; s. Nr. 593.

—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum columbīnum L.; s. Nr. 675.

—. XVI., 5; Pappelrosenpfl.: Malva alcĕa L.; s. Nr. 2279.

—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Genista procūmbens Willd.; s. Nr. 1552.

—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Trifolĭum montānum L.; s. Nr. 485.

—. „ „ T. filifōrme L.; s. Nr. 599.

—. „ „ Onobrÿchis satīva Lam.; s. Nr. 655.

—. XIX., 1; Korbblütler: Crepis pulchra L.; s. Nr. 2221.

—. XIX., 1; Korbblütler: Lactūca saligna L.; ſ. Nr. 2283.
—. „ „ Leontŏdon incānus Schrk.; ſ. Nr. 1523.
—. XIX., 1; Korbblütler: Cirsĭum acaule All.; ſ. Nr. 2097.
—. XIX., 2; „ Filāgo germanĭca L.; ſ. Nr. 2292.
—. „ „ Matricarĭa chamomĭlla L.; ſ. Nr. 1417.
—. XIX., 2; Korbblütler: Anthĕmis ruthenĭca M. B.; ſ. Nr. 2325.
2465. XIX., 2; Korbblütler: Erigĕron villarsĭi Bell. Drüſenhariges Berufkraut. St. aufr., einfach, oben äſtig, nebſt den Bltrn. kurz-drüſenhaarig, etwas ſchmierig; Bltr. 3- bis 5nervig, längl.-lanzettl., ganzrand., ſtachelſpitz.; Bl. lila bis purpurn; ♂; 7 bis 8; Kä., Ty. u. ſ. w.
—. XIX., 3; Korbblütler: Centaurēa paniculāta L.; ſ. Nr. 2299.

a. Auf trocknen Hügeln:

—. III., 2; Graspfl.: Stipa capillāta L.; ſ. Nr. 1518.
—. „ „ St. pennāta L.; ſ. Nr. 1519.
—. „ „ Agrōstis vulgāris With.; ſ. Nr. 2169.
—. „ „ Calamagrōstis epigaeos Roth; ſ. Nr. 2170.
—. III., 2; Graspfl.: Setarĭa glauca P. B.; ſ. Nr. 2331.
—. „ „ Lagūrus ovātus L.; ſ. Nr. 1575.
—. „ „ Phleum aspĕrum Vill.; ſ. Nr. 623.
—. „ „ P. boehmēri Willd.; ſ. Nr. 1577.
—. „ „ Aira flexuōsa Schrk.; ſ. Nr. 1097.
—. „ „ Avēna tenŭis Mnch.; ſ. Nr. 1555.
—. „ „ A. flavēscens L.; ſ. Nr. 1273.
—. „ „ A. pratēnsis L.; ſ. Nr. 1171.
—. „ „ Bromus erēctus Huds.; ſ. Nr. 1276.
—. „ „ Festūca duriuscŭla L. spec.; ſ. Nr. 1133.
—. IV., 1; Kugelblütler: Globularĭa vulgāris L.; ſ. Nr. 701.
—. „ Roſenpfl.: Poterĭum sanguisōrba L.; ſ. Nr. 569.
—. „ Kardenpfl.: Scabiōsa columbarĭa L.; ſ. Nr. 2080.
2466. „ „ Sc. suavcŏlens Desf. (Sc. canēscens W. et K., Asterocephălus suav. Wallr.). Wohlriechende Skabioſe. St. fein-behart; Bltr. der nichtblüh. Wrzköpfe und die unteren Stbltr. längl. oder lanzettl., ungetheilt, ganzrand., die übrigen fiederſpalt.; Fr. 8furchig; Borſten des innern K. etwa dopp. ſo lang, als der kleingekerbte Saum des äußern K., weißgelb; Bl. blau, rötl. oder weiß, ſelten gelb, wohlriech.; 4; 7 bis 9.

—. V., 1; Borretſchpfl.: Echium italicum L.; ſ. Nr. 2318.
—. V., 2; Doldenpfl.: Peucedānum alsaticum L.; ſ. Nr. 1202.
—. V., 5; Leinpfl.: Linum corymbulōsum Rchb.; ſ. Nr. 1579.
—. „ „ L. flavum L.; ſ. Nr. 1580.
—. X., 3; Nelkenblütler: Silene nutans L.; ſ. Nr. 1112.
—. „ „ Alsine jacquīni Koch; ſ. Nr. 1481.
—. XII., 3; Roſenpfl.: Potentilla argentea L.; ſ. Nr. 464.
—. „ „ P. inclināta Vill.; ſ. Nr. 1581.
—. XIII., 1; Sonnenröslein: Helianthemum vulgare Gaertn.; ſ. Nr. 1120.
—. XIII., 1; Sonnenröslein: H. apennīnum Willd.; ſ. Nr. 1522.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Teucrium chamaedrys L.; ſ. Nr. 2239.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Genista ovata W. et K.; ſ. Nr. 1582.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Bucĕras monspeliăcum All.; ſ. Nr. 1325.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolium striatum L.; ſ. Nr. 1548.
—. „ „ Astragălus hypoglōttis L.; ſ. Nr. 753.
—. „ „ A. austriăcus L.; ſ. Nr. 1567.
—. „ „ Onobrўchis arenarĭa DC.; ſ. Nr. 1565.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracium cymōsum L.; ſ. Nr. 1583.
—. XIX., 1; Korbblütler: H. murōrum L.; ſ. Nr. 447.
—. „ „ Podospērmum laciniātum DC.; ſ. Nr. 602.
—. XIX., 1; Korbblütler: Carlina acaulis L.; ſ. Nr. 2436.
—. XIX., 2; „ Inŭla ocŭlus christi L.; ſ. Nr. 1584.

b. Auf ſteinigen Hügeln:

2467. V., 1; Rachenblümler: Verbascum collinum Schrad. (V. thapsonīgrum Schiede, V. nigro-thapsus Wirtg.). Hügel-Wollkraut. St. nach oben kant.; Bltr. gekerbt, gelbfilzig; Büſchel der Traube meiſt 5blüt.; Bl. gelb; Stbf. rotwollig; ♃; 7 bis 8.
—. V., 2; Doldenpfl.: Bupleurum longifolium L.; ſ. Nr. 1201.
—. „ „ Seseli hippomarăthrum L.; ſ. Nr. 2434.
2468. „ „ Peucedānum austriăcum Koch. Oeſterreichiſcher Harſtrang. St. gefurcht; Bltr. 3zäl.-dreifach-gefied.; Bltchn. fiederſpalt., Fetzen lineal.-lanzettl. oder lanzettl., knorp.-zugeſp.; Hülle vielblättr., endl. zurück-

geſchlagen; Bl. weiß; Fr. eif. oder eilängl.; 4; 7 bis 8; De., Kä., Kr. *)

—. V., 2; Doldenpfl.: Siler aquilegifolium Gaertn.; ſ. Nr. 1589.

—. V., 5; Leinpfl.: Linum angustifolium Huds.; ſ. Nr. 1590.

—. X., 2; Nelkenblütler: Dianthus saxifraga L.; ſ. Nr. 2400.

—. X., 3; „ Silene italica Pers.: ſ. Nr. 750.

—. „ „ Alsine verna Bartl.; ſ. Nr. 618.

—. „ „ A. jacquini Koch; ſ. Nr. 1481.

—. XI., 3; Waupfl.: Reseda lutea L.; ſ. Nr. 1378.

—. XII., 3; Roſenpfl.: Rosa pimpinellifolia L.; ſ. Nr. 1211.

—. XIII., 1; Sonnenröslein: Helianthemum alpestre Rchb.; Nr. 1591.

—. XIV., 1; Lippenblümler: Melissa nepeta L.; ſ. Nr. 2423.

—. „ „ M. acinos Benth.; ſ. Nr. 2378.

—. „ „ Nepeta cataria L.; ſ. Nr. 1218.

—. „ „ N. nepetella L.; ſ. Nr. 2189.

—. „ „ Marrubium vulgare L.; ſ. Nr. 2192.

2469. XIV., 2; Nachenblümler: Linaria italica Trev. Italiſches Leinkraut. Kahl; St. aufr., rutenf., ſteif; Bltr. zerſtreut, lineal-lanzettl., genähert, 3nervig, ſtachelſp., ganzrand.; Kelchlappen längl., kurz-zugeſp., nervenlos; mittl. Lappen der Unterl. aufr.; Bl. tiefgelb; 4; 7 bis 8; Ty.

—. XV., 2; Kreuzblütler: Erysimum suffruticosum Spr.; ſ. Nr. 589.

—. XVI., 5; Pappelroſenpfl.: Malva moschata L.; ſ. Nr. 1563.

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Genista scariosa Vis.; ſ. Nr. 1592.

—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracium brachiatum Bertol.; ſ. Nr. 1593.

—. XIX., 2; Korbblütler: Filago montana L.; ſ. Nr. 2401.

c. Auf ſonnigen, ſteinigen Hügeln:

2470. II., 1; Nachenblümler: Veronica spicata L. Aehrentragender Ehrenpreis (Ehrenkranz, Schwalkenzagel). Graugrün; Bltr. gekerbt-geſägt, an der Spitze ganzrand., untere ſtumpf, ſtengelſt. kurz-geſtielt oder ſitz.; Aehre gedrängt-blütig; Bl. himmelblau, ſelten rötlich oder weiß; 4; 7 bis 8; ↕.

Varirt: V. vulgaris (V. spicata d. Aut., V. clusii Schott, V. squamosa Presl.; unterſte Bltr. verk.-längl., lang-ſtielverlauf.); V. barrelieri Schott (Bltr. eilängl., bis auf die oberſten alle ſtumpfl.-ſägezähn.; Aehre zur

*) Die ſchmalblättrige Form iſt P. montanum Auct.!

Fruchtzeit an der Basis locker); V. paludōsa Lej. (Bltr. eilanzettl., untere meist dopp.-, spitzl.-, obere ungleich-sägezähn.; Aehren lockerblütig); V. orchidĕa Crtz. (V. cristata Bernh.; Bltr. glänz., lederig, stengelst. klein); V. crassifolĭa Wierzb. (ebenso, aber breitblättr.); V. incana L. (lang-graufilz.; Aehren lang, schlank, mit Deckbltr. von über Kelchlänge: südl. Kalkform); V. squamōsa Presl. (drüsenharig); V. canēscens Schrad. (St. verworren-kurzgrauharig; K. dichtzottig).

2471. IV., 1; Wegerichpfl.: Plantago carināta Schrad. (P. serpentīna Lmk.). Kielblättriger Wegerich. Bltr. rosettenf.-ausgebreit., lineal-fadenf., halbrund-3seit., zurückgebog., pfriemf., fein-zähnig-gewimp., an der Basis wollig; Aehre walzenf., locker; Deckbltr. langzugesp.; 4; 7 bis 8; Kr. *)

—. V., 1; Rachenblümler: Verbascum lychnītis L.: s. Nr. 2266.

—. V., 2; Seidenfrüchtler: Vincetoxĭcum officināle Mnch.; s. Nr. 2175.

2472. V., 2; Doldenpfl.: Bupleurum odontītes L. Niedriges Hasenöhrchen. St. aufr., rispig-ästig; Bltr. sitz., lineal.-schwertf., zugesp., kahl, 3nervig; Hülle und Hüllchen 5-blättr.; Hüllbltchn. lineal-lanzettl., zugesp., Mittelnerv netzaderig; Bl. gelb; ☉; 7 bis 8; Kr.

—. XIV., 1; Lippenblümler: Teucrĭum montānum L.; s. Nr. 2424.

—. XIV., 2; Rachenblümler: Digitalis lutĕa L.; s. Nr. 1221.

—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Bonjeanĭa hirsūta Rchb., s. Nr. 1598.

—. XIX., 1; Korbblütler: Lactūca perēnnis L.; s. Nr. 1231.

d. Auf steinigen, felsigen Hügeln:

2473. XIX., 1; Korbblütler: Phaenŏpus viminĕus DC. (L.; Prenanthes viminĕa L., Phoenixŏpus viminĕus Cass.). Klebriger Steinsalat. Bltr. herablauf., untere fiederspalt., Blattzipfel lineal., oberste Bltr. lineal., ungetheilt; Bl. gelb; ♂; 7 bis 8; K. S., Bö., Mä., Oe.

e. Auf rauhen Hügeln:

—. XIV., 1; Lippenblümler: Stachys germanĭca L.; s. Nr. 2313.

*) Ist wol nur Varietät von P. maritima L.?!

f. Auf steinigen, buschigen, sonnigen Hügeln:

—. XIV., 2; Rachenblümeer: Digitalis micrántha Roth; s. Nr. 1180.

g. Auf felsigen Hügeln:

—. V., 1; Glockenblümler: Campanŭla graminifolĭa L.; s. Nr. 1594.

h. Auf unfruchtbaren Hügeln:

—. V., 2; Doldenpfl.: Eryngĭum campēstre L.; s. Nr. 2271.
—. „ „ Tordylĭum maxĭmum L.; s. Nr. 2272.
—. X., 2; Nelkenblütler: Diánthus prolĭfer L.; s. Nr. 2275.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum echioĭdes Lumn.; s. Nr. 1595.
—. XIX., 2; Korbblütler: Senecĭo viscōsus L.; s. Nr. 1341.

i. Auf sonnigen, trocknen, steinigen, sandigen Hügeln:

—. IV., 1; Krapppfl.: Asperŭla tinctorĭa L.; s. Nr. 2143.
—. „ „ A. cynanchĭca L.; s. Nr. 2265.
—. X., 2; Nelkenblütler: Diánthus prolĭfer L.; s. Nr. 2275.
2474. „ „ D. monspessulánus L. Vorgebirgs-Nelke. Wrzstock schief, mehrköpf., 1steng.; Bl. gipfelst., zu 1 oder 2, blaßrosa, oft mit sammetbraunem Fleck am Schlunde; Bltr. sämmtl. lineal., lang-zugesp.; Kdeckschuppen häutig, mit grünem Rücken und Spitzen, ungefär von halber Länge des kahlen K.; 4: 7 bis 8; Kä., Kr., Ty.*)
—. XIX., 1; Korbblütler: Crepis virens L.; s. Nr. 1415.
2475. XIX., 2; „ Helichrȳsum angustifolĭum DC. Schmalblättriges Immergrün. St. strauchig; Aeste weißfilz., Bltr. lineal., sitz., am Rande zurückgerollt, unters. filz.; Köpfchen verk.-kegelf., auch eilängl. bis walzenf.; Hüllblttchen hellgelb; Bl. dottergelb; 4; 7 bis 8; Kr.
—. XIX., 2; Korbblütler: Anthĕmis tinctorĭa L.; s. Nr. 1599.
—. „ „ Inŭla conȳza DC.; s. Nr. 2297.

k. Auf sonnigen Anhöhen und Hügeln:

—. II., 1; Rachenblümler: Veronĭca officinalis L.; s. Nr. 997.
—. „ Jasminpfl.: Olĕa europaea L.; s. Nr. 1574.
—. IV., 1; Krapppfl.: Asperŭla galioĭdes M. B.; s. Nr. 744.
—. „ „ Galĭum pumĭlum Lamk.; s. Nr. 1585.
—. V., 1; Borreischpfl.: Anchūsa italĭca Retz.; s. Nr. 1586.

*) D. waldsteinii Sternb. ist eine steifere, breitblättrige, robustere Form mit bartlosen Blumen und führt nach D. alpestris oder D. speciosus hinüber!

—. V., 1; Glockenblümler: Campanula rotundifolia L.; s. Nr. 1288.
—. V., 1; Glockenblümler: Jasione montana L.; s. Nr. 1290.
—. „ Rachenblümler: Verbascum phoeniceum L.; s. Nr. 2131.
2476. V., 2; Doldenpfl.: Ptychotis heterophylla Koch (Aethusa bunius L., Pimpinella bun. Rchb.). Verschiedenblättriges Faltenohr. St. aufr., von der Basis an gabelig-rutenästig; grundst. Bltr. groß, gestielt, gefied., stengelst. unregelm.-fiederspalt.; Blattst. scheidenf., eingerollt-randig; Bl. weiß; ♂; 7 bis 8; Ty., Genfersee.
2477. V., 2; Doldenpfl.: Bupleurum aristatum Bartl. Begranntes Hasenöhrchen. Hüllchenbltchn. lanzettl. oder ellipt., begrannt, mit 3, sich netzartig-verästelnden Nerven; Stielchen der Zentralbltr. halb so lang, als die der peripher. der Döldchen; Bl. gelb; ☉; 7 bis 8; Kr., Ty.
—. V., 2; Doldenpfl.: Daucus carota L.; s. Nr. 1294.
—. V., 5; Leinpfl.: Linum hirsutum L.; s. Nr. 1587.
—. „ „ L. perenne L.; s. Nr. 1094.
—. „ Bleiwurzpfl.: Armeria vulgaris Willd.; s. Nr. 1295.
—. VI., 1; Lilienpfl.: Allium carinatum L.; s. Nr. 1588.
—. X., 2; Paronychienpfl.: Scleranthus perennis L.; s. Nr. 676.
—. X., 3; Nelkenblütler: Alsine verna Bartl.; s. Nr. 618.
—. XII., 3; Rosenpfl.: Potentilla inclinata Vill.; s. Nr. 1581.
—. „ „ P. recta L.; s. Nr. 439.
—. XIII., 1; Sonnenröslein: Helianthemum guttatum Mill.; s. Nr. 1482.
—. XIII., 1; Sonnenröslein: H. vineale Pers.; s. Nr. 1537.
—. „ „ H. fumana Mill.; s. Nr. 1538.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Thalictrum vulgare Kitt.; s. Nr. 579.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Origanum vulgare L.; s. Nr. 2087.
—. „ „ Stachys germanica L.; s. Nr. 2313.
—. „ „ St. recta L.; s. Nr. 1303.
2478. XIV., 2; Rachenblümler: Linaria genistifolia Mill. Ginsterblättriger Frauenflachs. Kahl; Bltr. zugesp., wechselst., auch zerstreut; Samen eif., 3kant., flügellos; Kelchlappen lanzettl., spitz; Sporn etwas zurückgebog.; Kapf. langgestielt; Bl. gelb; 2; 7 bis 8; Th., K. S., Schl., Bö., Mä., Oe.*)
—. XV., 2; Kreuzblütler: Erysimum durum Presl.; s. Nr. 745.
—. „ „ E. diffusum Ehrh.; s. Nr. 746.
—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Anthyllis vulneraria L.; s. Nr. 721.

*) L. chloraefolia Rchb. ist eine Form mit kürzern, breitern Blättern!

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Oxytrŏpis pilōsa DC.; ſ. Nr. 1564.
—. „ „ Coronīlla varĭa L.; ſ. Nr. 1331.
—. „ „ Hippocrēpis comōsa L.; ſ. Nr. 600.
—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperīcum elĕgans Steph.; ſ. Nr. 1533.
—. XIX., 1; Korbblütler: Tragopōgon major Jacq.; ſ. Nr. 1337.
—. XIX., 1; Korbblütler: Carduus candĭcans W. et K.; ſ. Nr. 2291.
—. XIX., 2; Korbblütler: Filāgo montāna L.; ſ. Nr. 2401.
—. „ „ Achillēa nobĭlis L.; ſ. Nr. 2244.
—. „ „ Inŭla hirta L.; ſ. Nr. 2295.
—. „ „ I. germanĭca L.; ſ. Nr. 2296.
—. XIX., 3; „ Centaurēa nigra L.; ſ. Nr. 2162.
2479. XIX., 5; „ Echīnops ritro L. Glattblättrige Kugeldiſtel. Blтr. fiederlapp., oberſ. kahl, unterſ. nebſt dem St. graufilz.; äußere Hüllſchuppen der Köpfchen borſtenf., 3- bis 4mal kürzer als die innern; Bl. weiß oder blau; 4; 7 bis 8; Kr.
—. XX., 1; Orchidee: Platanthēra ensifolĭa Rich.; ſ. Nr. 1162.

l. Auf ſonnigen, kräuterreichen Hügeln:

—. XIV., 1; Lippenblümler: Nepĕta nuda L.; ſ. Nr. 2089.

m. Auf Sandhügeln:

—. II., 1; Rachenblümler: Veronīca spicāta L.; ſ. Nr. 2470.
—. XXI., 1; Giftmilcher: Euphorbĭa gerardiāna Jacq.; ſ. Nr. 1344.
—. XXI., 1; Giftmilcher: E. esŭla L.; ſ. Nr. 1345.

n. Auf trocknen, ſandigen Hügeln:

—. XIV., 1; Lippenblümler: Prunēlla alba Pall.; ſ. Nr. 1597.

o. Auf lockeren, ſandigen Hügeln:

—. X., 2; Nelkenblütler: Dianthus plumarĭus L.; ſ. Nr. 2428.
—. XIX., 2; Korbblütler: Senecĭo sylvatĭcus L.; ſ. Nr. 1080.

p. Auf ſandigen, graſigen Hügeln:

—. X., 3; Nelkenblümler: Silēne chlorantha Ehrh.; ſ. Nr. 2164.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Vicĭa tenuifolĭa Roth; ſ. Nr. 1229.

q. Auf graſigen Hügeln:

—. II., 1; Rachenblümler: Veronīca arvēnsis L.; ſ. Nr. 64.
—. „ Lippenblümler: Salvĭa austriăca Ait.; ſ. Nr. 755.
—. „ „ S. sclarēa L.; ſ. Nr. 1271.
—. „ „ S. verticillata L.; ſ. Nr. 1191.

2480. V., 1; Rachenblümler: Verbāscum speciōsum Schrad. Prachtvolles Wollkraut. Blttr. ganzrand., filz., untere oval-lanzettl., obere geöhrt-herzf., sitz.; Bl. gelb; Stbf. safrangelb, weiß-wollig; ♂; 7 bis 8; Mä., Oe.
—. V., 1; Enzianpfl.: Erythraea centaurĭum Rich.; s. Nr. 1009.
—. X., 5; Nelkenblütler: Cerastĭum brachypetălum Desp.; s. Nr. 690.
—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Ervum gracĭle DC.; s. Nr. 1410.
—. „ „ Vicĭa villōsa Roth; s. Nr. 673.

r. Auf kurzgrasigen Hügeln:

—. XIX., 1; Korbblütler: Scorzonēra purpurĕa L.; s. Nr. 1127.

s. Auf trocknen Grashügeln:

—. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus seguierĭi Vill.; s. Nr. 2086.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Thalĭctrum simplex L.; s. Nr. 1600.

t. Auf sonnigen Grashügeln:

—. X., 2; Paronychienpfl.: Scleränthus polycārpus L.; s. Nr. 2422.

u. Auf feuchten Hügeln:

—. X., 2; Nelkenblümler: Diānthus liburnĭcus Bartl.; s. Nr. 1603.

v. Auf buschigen Hügeln:

—. III., 2; Graspfl.: Holcus mōllis L.; s. Nr. 1132.
—. „ „ Festūca heterophўlla Haenke; s. Nr. 1001.
—. III., 2; Graspfl.: Elўmus europaeus L.; s. Nr. 1004.
—. IV., 1; Krapppfl.: Asperŭla laevigāta L.; s. Nr. 1601.
—. V., 1: Glockenblümler: Campanŭla glomerāta L.; s. Nr. 1602.
—. V., 2; Doldenpfl.: Torĭlis anthrĭscus Gaertn.; s. Nr. 1073.
—. „ „ Chaerophўllum aurĕum L.; s. Nr. 1203.
—. XI., 2; Rosenpfl.: Agrimonĭa eupatorĭa L.; s. Nr. 1104.
—. XII., 2; „ Mespĭlus germanĭca L.; s. Nr. 1018.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Sideritis montāna L.; s. Nr. 2379.
—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Cytĭsus capitātus Jacq.; s. Nr. 698.
—. „ „ Trifolĭum medĭum L.; s. Nr. 1033.
—. „ „ Astragălus glycyphўllos L.; s. Nr. 1035.

—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Ornithŏpus perpusillus L.; s. Nr. 516.

—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Ervum cassubĭcum Peterm.; s. Nr. 1085.

2481. XVII., 4; Hülsenpfl.: Lathyrus latifolĭus L. Breitblättrige Platterbse. Bltr. sämmtl. 1parig oder sehr selten die obersten 2parig; Nabel kaum 1/3 des Samens umgebend; Bl. schön rosenrot; 4; 7 bis 8; ‡; Harz.

—. XIX., 3; Korbblütler: Centaurēa jacēa L.; s. Nr. 1343.

w. Auf Gipshügeln:

—. X., 2; Nelkenblütler: Gypsophīla fastigiāta L.; s. Nr. 1480.

2482. „ „ G. repens L. Kriechendes Gipskraut. St. oberw. locker-ebensträuß., nebst den Aesten kahl; Stbgf. und Griff. kürzer als die weiße oder rötl. Bl.; Bltr. lineal., beiders. kurz-zugesp.; Bl. in wiederholt-3theil. Zyme; 4; 7 bis 8.*)

x. Auf Kalkhügeln:

Vergl. §. 492, k; außerdem:

—. IV., 1; Kardenpfl.: Scabiōsa suaveŏlens Desf.; s. Nr. 2466.

—. V., 5; Leinpfl.: Linum tenuifolĭum L.; s. Nr. 1541.

—. XV., 2; Kreuzblütler: Erysĭmum repāndum L.; s. Nr. 670.

—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Cytīsus capitātus Jacq.; s. Nr. 698.

—. XIX., 3; Korbblütler: Centaurēa calcitrāpa L.; s. Nr. 2298.

y. Auf Hügeln der subalpinen Gegenden:

2483. XIV., 2; Rachenblümler: Alectorolŏphus angustifolius Gmel. Schmalblättriger Klapper. Bltr. aus lanzettl. Basis lang-lineal., unters. gestrichelt-aderig, grubig, obers. glänz.; Deckbltr. bleich, aus rundl., tief-eingeschn. Basis lang-zugesp., sehr lang-harsp.-gezähnt; K. kahl, glänz.; Oberl. vorgestreckt, abgerund.; Bl. gelb, violetzähnig; St. oben rot angelaufen; ☉; 7 bis 9; Harz, Rh. u. s. w.

§. 500. X. Auf Bergen:

2484. III., 1; Halbgras: Scirpus gracĭlis Salzm. Schmächtige Binse. Blaßgrün, schmächtig; Halm gestreift; Aehre eif.; Narben 3; Fr. verk.-eif., zsgedr., fein-gestreift und quergefältelt; ♂; 7 bis 8; Kr. (Adlersberg).

*) G. prostrata L., auf den südlichen Alpen der Schweiz vorkommend und mit G. repens L. bis auf die Krone übereinstimmend, welche abgerundete, nicht ausgerandete Blumenblätter und vorragende Griffel besitzt, dürfte sich vielleicht in Südtyrol finden!

—. III., 2; Graspfl.: Melica ciliata L.; ſ. Nr. 1103.
—. „ „ Aira flexuōsa Schrk.; ſ. Nr. 1097.
—. „ „ Avēna tenŭis Mnch.; ſ. Nr. 1555.
2485. IV., 1; Kardenpfl.: Scabiōsa hladnikiana Host. Hladnik's Skabioſe. Kurz-grauharig; St. oben nackt, meiſt 1köpf.; mittlere Stbltr. leierf.-fiederſpalt., mit lanzettl., eingeſchn.-gezähnten Fiedern; Hüllchen 8furchig, papierartig-trocken-geſäumt; K. 5borſtig, Borſten 2- bis 4mal länger als der Hüllchenſaum; Bl. pfirſichblütrot; 4; 7 bis 8; Kr.
—. IV., 1; Kardenpfl.: Sc. brachiata Sibth.; ſ. Nr. 1604.
2486. „ „ Sc. ucranĭca L. Ukrainiſche Sk. St. an der Baſis filz., oben abſteh.-langharig, armf.-dünnäſtig; Bltr. zurückgerollt-gerand., an der Baſis lang-gewimp., untere ſtengelſt. einfach-fiedertheil., mit lineal., gewimp. Fiedern; Hüllchen ſilberharig; K. mit 5 gewimp. Borſten; Bl. himmelblau, auch gelblichweiß; ♂; 7 bis 8; Kr.
—. IV., 1; Krappfl.: Asperŭla laevigata L.; ſ. Nr. 1601.
—. V., 1; Borretſchpfl.: Echĭum vulgāre L.; ſ. Nr. 1108.
2487. „ Glockenblümler: Campanŭla rhomboidalis L. Rautenblättrige Glockenblume. St. oben traubig; Bltr. ei- bis lanzettf., ſägezähn., untere ſtumpf, obere ſpitz, faſt ſitz.; Kr. weittrichterig, blaßblau, Lappen breit-eif., grade; K. von halber Kronlänge; Kapſ. an der Baſis aufſpring.; ♂; 7 bis 8; Kr.
2488. V., 2; Doldenpfl.: Bupleurum exaltatum M. B. Hohes Haſenöhrchen. St. aufr., ſehr äſtig; Aeſte aufr.-abſteh.; Bltr. lineal., halb-umfaſſ., zugeſp., parallel-vielnervig; Hüllbltchn. ſehr klein, borſtenf., ungleich; Fr. eif., mit ſcharfkant. Hauptrippen; Bl. gelb; 4; 7 bis 8; Kr. (Nanas bei Prewald).
2489. V., 2; Doldenpfl.: Peucedănum verticillare Koch (Imperatorĭa vert. L., Tommasinĭa verticillāris Bertol., Angelĭum verticillare Rchb., Magisterĭum vert. Kitt.). Quirldoldiger Harſtrang (Magenſtärk). Bltr. dopp.- bis 3fach-gefied., Bltchn. eif., ſpitz-ſägezähn.; Blattſch. groß, aufgeblaſen: Bl. grüngelb; 4; 7; Kr., Ty.
—. V., 2; Doldenpfl.: P. orĕoselĭnum Mnch.; ſ. Nr. 2463.
2490. „ „ Molospērmum cicutarĭum DC. (Ligustĭcum peloponnesiăcum L.). Farnkrautblättriger Striemenſame. St. röhrig, kahl; Bltr. 3fach-gefied., Bltchn. lanzettl., glänz.; Hüllbltr. breit-häutig-berand.; Bl. weiß; 4; 7 bis 8; Kr., Ty.
—. V., 5; Leinpfl.: Linum narbonēnse L.; ſ. Nr. 1605.

—. VIII., 1; Seidelpfl.: Daphne blagayāna Freyer; ſ. Nr. 1606.
—. X., 2; Nelkenblümler: Dianthus carthusianōrum L.; ſ. Nr. 459.
—. X., 5; Dickblattpfl.: Sedum acre L.; ſ. Nr. 1298.
—. XII., 2; Roſenpfl.: Spiraea filipendŭla L.; ſ. Nr. 1019.
—. XII., 3; „ Rosa resinōsa Sternb.; ſ. Nr. 1213.
—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: Delphinĭum hybrĭdum Willd.; ſ. Nr. 1607.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Saturēja montāna L.; ſ. Nr. 2464.
2491. „ „ Betonĭca hirsūta L. Rauhharige Betonie. Bltr. aus herzf. oder quer-abgeſtutzter Baſis längl., gekerbt; Aehre eif., an der Baſis oft unterbrochen; K. vorſpring.-netzaderig; Kronoberl. grade-vorgeſtr.; Stbgf. faſt von Oberlippenlänge; Bl. purpurn, ſelten weiß; 4; 7; Kr.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Marrubĭum vulgāre L.; ſ. Nr. 2192.
—. XVI., 5; Pappelroſenpfl.: Malva alcĕa L.; ſ. Nr. 2279.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolĭum montānum L.; ſ. Nr. 485.
—. „ „ Lathўrus heterophўllus L.; ſ. Nr. 2067.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum cymōsum L.; ſ. Nr. 1583.

a. Auf ſonnigen Bergen:

—. II., 1; Rachenblümler: Veronica officinālis L.; ſ. Nr. 997.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Thymus serpўllum L.; ſ. Nr. 2088.
2492. XIV., 1; Lippenblümler: Lavendŭla spica L. (L. vera DC., L. angustifolĭa Ehrh.). Schmalblättriger Lavendel (Spike, deutſche Narde, Mariamagdalenenblume, Zöpfli). Kurzharig; Bltr. lineal., auch längl.-lineal., am Rande zurückgerollt; Bl. veilchenblau; ♄; 7 bis 8; ♃; ⚓; ☨; ♆; Ty., früher in der Pfalz.

b. Auf ſonnigen, ſteinigen, unfruchtbaren Bergen:

—. V., 2; Doldenpfl.: Bupleurum longifolĭum L.; ſ. Nr. 1201.
„ „ Seseli hippomarăthrum L.; ſ. Nr. 2434.
—. „ „ Peucedănum austriăcum Koch; ſ. Nr. 2468.
—. V., 2; Doldenpfl.: Pastināca fleischmanni Hladn.; ſ. Nr. 2446.
—. V., 2; Doldenpfl.: Siler aquilegifolĭum Gaertn.; ſ. Nr. 1589.

—. XII., 3; Roſenpfl.: Rosa pimpinellifolĭa L.; ſ. Nr. 1211.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Clemātis recta L.; ſ. Nr. 1121.
—. XVI., 5; Pappelroſenpfl.: Malva moschāta L; ſ. Nr. 1563.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum brachiātum Bertol.; ſ. Nr. 1593.
—. XIX., 2; Korbblütler: Anthĕmis tinctorĭa L.; ſ. Nr. 1599.

c. Auf trocknen, ſteinigen Bergen:

2493. V., 2; Doldenpfl.: Trinĭa vulgāris DC. (T. glauca Dumort., Pimpinēlla gl. L.). Gemeine Trinie. Bl. polygam. in derſelben Dolde, weiß; St. ſehr äſtig; Bltr. graugrün, untere 3fach-gefied.; Fr. ſtumpf-riefig; Pfl. kahl; ♂; 7 bis 8; Rhein-, Main- und Nahethal, Oe., Ty., Kr.

Varirt: T. henningĭi Hoffm. (Pimpinēlla glauca L.; Fiedern lineal-borſtenf.); T. jacquīnī DC. (Pimpinēlla dioĭca L., T. pumĭla Rchb.; Fiederläppchen lineal., kurz, gleichlang).

—. V., 2; Doldenpfl.: Peucedānum alsatĭcum L.; ſ. Nr. 1202.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolĭum striātum L.; ſ. Nr. 1548.

d. Auf ſandigen, ſteinigen Bergen:

—. II., 1; Rachenblümler: Veronĭca spicāta L.; ſ. Nr. 2470.

e. Auf ſonnigen, ſteinigen Bergen:

—. XIV., 1; Lippenblümler: Teucrĭum chamaedrys L.; ſ. Nr. 2239.
—. XIV., 1; Lippenblümler: T. montānum L.; ſ. Nr. 2424.

f. Auf Kies- und Sandboden der trockenſten, unfruchtbarſten Berge:

2494. XIX., 1; Korbblütler: Chondrĭlla prenanthoĭdes Vill. (Prenānthes chondrilloĭdes L.). Haſenſalatartiger Knorpelſalat. Kahl; St. wiederholt-gabeläſtig, zuletzt 3theil.; grundſt. Bltr. lanzettl., in die langgezog., ſitz. Baſis zulauf.: Bl. gelb; Schließfr. mit einem Kranze ſehr kleiner, ſtumpfer, abſteh. Schuppen; 4; 7 bis 8; Kr., Ty., Bay.

g. Auf Kalkbergen:

Vergl. §. 492, 1; außerdem:

—. V., 5; Leinpfl.: Linum tenuifolĭum L.; ſ. Nr. 1541.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Cytĭsus capitātus Jacq.; ſ. Nr. 698.

h. An Bergabhängen:

—. II., 1; Lippenblümler: Salvĭa glutinōsa L.; ſ. Nr. 2106.
—. V., 2; Doldenpfl.: Peucedānum officināle L.; ſ. Nr. 2438.

—. XIV., 1: Lippenblümler: Origănum vulgare L.; ſ. Nr. 2087.
—. „ „ Melīssa calamintha L.; ſ. Nr. 2063.
—. „ „ M. nepĕta L.; ſ. Nr. 2423.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Digitālis medĭa Roth; ſ. Nr. 2459.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum divaricatum Ehrh.; ſ. Nr. 2194.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum stoloniflōrum W. et K.; ſ. Nr. 1569.
—. XIX., 1; Korbblütler: Cirsĭum serratuloides Scop.; ſ. Nr. 1570.

i. An ſonnigen Bergabhängen:

—. XVII., 2; Erdrauchpfl.: Corydălis capnoides Pers.; ſ. Nr. 1571.
—. XIX., 3; Korbblütler: Centaurēa rupēstris L.; ſ. Nr. 1572.

k. An unfruchtbaren Bergabhängen:

—. V., 1; Zauberpfl.: Thesĭum divaricatum Jan.; ſ. Nr. 2460.

l. An felſigen, ſteinigen Bergabhängen:

—. XIV., 1; Lippenblümler: Hyssōpus officinālis L.; ſ. Nr. 2237.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Digitalis umbigŭa Murr.; ſ. Nr. 1024.

m. Auf Bergtriften:

—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum sylvatĭcum L.; ſ. Nr. 422.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Erodĭum moschātum Ait.; ſ. Nr. 540.
—. XIX., 1: Korbblütler: Hieracĭum bifūrcum M. B.; ſ. Nr. 1608.

n. Auf Bergwieſen:

—. II., 1; Rachenblümler: Veronĭca latifolĭa L.; ſ. Nr. 1189.
—. „ Lippenblümler: Salvĭa austriăca Ait.; ſ. Nr. 755.
—. IV., 1; Kardenpfl.: Scabiōsa sylvatĭca L.; ſ. Nr. 2141.
—. V., 1; Glockenblümler: Campanŭla patŭla L.; ſ. Nr. 1010.
—. „ „ C. persicifolĭa L.; ſ. Nr. 1072.
—. „ „ C. glomerata L.; ſ. Nr. 1602.
—. V., 2; Doldenpfl.: Athamanta libanōtis L.; ſ. Nr. 2083.
2495. „ „ Seseli coloratum Ehrh. (S. annŭum L., S. biēnne Crtz.). Gefärbter Seſel. St. oben aufr.-äſtig; untere Blr. 3fach- oder nur dopp.-gefied.;

Blattſt. ausgerand., rinnig, ſteif; Stralen kant., auf der Innenſeite flaumig; Hauptdolde 20- bis 30ſtral.; Bl. weiß; ♄ bis 4; 7 bis 9.

2496. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: Delphinium elatum L. Hoher Ritterſporn. Bltr. 5ſpalt., Zipf. 3ſpalt., breit, eingeſchn.-geſägt; Blütenſt. oberw. mit 2 lineal. Deckbltrn.; Blkr. 4blättr., Saum der untern Bltr. 2ſpalt., bärtig; K. azurblau; Kr. rußfarben; 4; 7 bis 8; ↕; Schl., Bö., Mä., St.

—. XIV., 2; Rachenblümler: Melampyrum cristatum L.; ſ. Nr. 1123.

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolium agrarium L.; ſ. Nr. 1084.

—. „ „ Vicia villosa Roth; ſ. Nr. 673.

—. „ „ V. tenuifolia Roth; ſ. Nr. 1229.

—. „ „ Lathyrus sylvestris L.; ſ. Nr. 1036.

—. „ „ L. albus Kitt.; ſ. Nr. 769.

—. XIX., 1; Korbblütler: Hypochoeris maculata L.; ſ. Nr. 2111.

—. XIX., 1; Korbblütler: Scorzonera humilis L.; ſ. Nr. 479.

—. „ „ Serratula nitida Bess.; ſ. Nr. 2450.

2497. „ „ Cirsium acaule-tuberosum Schiede (C. bulboso-acaule Naeg., C. medium All., C. zizianum Koch). Baſtard.*) Wrzfaſern ein wenig verdickt; St. beblätt.; Blütenſt. ſpinnwebig; Bltr. nicht gezähnelt und ſpinnwebig; Fiedern eif., 3ſpalt., mit längl. Zipf.; Köpfchen 1 bis 4, purpurrot; 4; 7 bis 8; Mainz, Bingen, Leipzig, Th., Sa.

2498. XIX., 1; Korbblütler: C. pannonicum DC. (C. serratuloides Jacq., Carduus pannonicus L.). Ungariſche Wegdiſtel. Wrzſtock ſchief, fadenf.-faſerig; St. von der Mitte an blattlos, 1- bis 3köpf.; Bltr. eif.- oder längl.-lanzettl., obere kurz-herablauf., halbumfaſſ.; Bl. rot; 4; 7 bis 8; Schl., Bö., Oe., Kä., Kr. u. ſ. w.

—. XIX., 2; Korbblütler: Cineraria campestris Retz.; ſ. Nr. 1136.

2499. XIX., 2; Korbblütler: Pyrethrum macrophyllum Willd. Großblättrige Bertrammwurz. St. aufr., etwas zott.; Bltr. etwas rauhharig, faſt ſitz., bis faſt zur Mittelrippe fiederſpalt., Fiedern ſpitz, ſpitzwinkelig-abſteh.; Doldentraube zuſammengeſetzt, gewölbt; Stralbl. ſchmutzigweiß; Fr. ungetheiltrandig; 4; 7 bis 8; Kr.

---

*) Von C. acaule All. und C. tuberosum All.!

—. XIX., 2; Korbblütler: Inŭla germanĭca L.; ſ. Nr. 2296.
—. XIX., 3; „ Centaurēa sordĭda Willd.; ſ. Nr. 1610.

o. Auf ſonnigen Bergwieſen:

—. V., 1; Borretſchpfl.: Echĭum rubrum Jacq.; ſ. Nr. 1613.
—. „ Glockenblümler: Campanŭla patŭla L.; ſ. Nr. 1010.

p. Auf trocknen Bergwieſen:

—. II., 1; Rachenblümler: Veronĭca latifolĭa L.; ſ. Nr. 1189.
—. IV., 1; Kardenpfl.: Scabiōsa gramuntĭa L.; ſ. Nr. 1611.
—. V., 5; Leinpfl.: Linum flavum L.; ſ. Nr. 1580.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum sanguinĕum L.; ſ. Nr. 486.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolĭum montānum L.; ſ. Nr. 485.
—. „ „ Astragălus onobrўchis L.; ſ. Nr. 1612.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: A. cicer L.; ſ. Nr. 1330.
—. XXI., 1; Giftmilcher: Euphorbĭa nicaeēnsis All.; ſ. Nr. 1914.

q. Auf naſſen, feuchten Bergwieſen:

—. IV., 1; Krapppfl.: Galĭum boreāle L.; ſ. Nr. 2081.
—. V., 2; Doldenpfl.: Selīnum carvifolĭa L.; ſ. Nr. 2057.
2500. V., 4; Studentenröschen: Parnassĭa palūstris L. Sumpf-Herzblatt (Studentenröschen*), Einblatt, Herz-, Herren- oder Frauenblümchen, Erdgalle). Untere Bltr. herzf., langgeſtielt, ſtengelſt. einzeln, ſitz.; Bl. weiß, längsſtreifig; 4; 7 bis 9; +; ☲.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygŏnum bistōrta L.; ſ. Nr. 1139.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Trollĭus europaeus L.; ſ. Nr. 798.
2501. XIX., 1; Korbblütler: Cirsĭum heterophўllum DC. (Carduus heterophўllus L.). Verſchiedenblättrige Kratzdiſtel. St. reichblättr., 1- bis 3köpf.; Bltr. umfaſſ., lanzettl., langzugeſp., ungetheilt oder die mittl. vorn eingeſchn.; Bl. dunkelpurpurn; 4; 7 bis 8.

Varirt: vulgāre Kitt. (mit ☒), dioĭcum Kitt. (mit eingeſchlecht. Köpfchen), indivīsum DC. (mit ungetheilten unteren Bltrn.), pinnatifĭdum Kitt. (mit eingeſchn.-fiederſpalt., unteren Bltrn.).

—. XIX., 1; Korbblütler: C. anglĭcum DC.; ſ. Nr. 1615.

*) Wenn dieſe Blume blüht, ſind die Herbſtferien vor der Thür — daher dieſe Bezeichnung!

—. XX., 1; Orchidee: Herminium monorchis R. Br.; s. Nr. 1842.

r. In schattigen Thälern der Bergwälder:

—. V., 2; Doldenpfl.: Astrantia major L.; s. Nr. 1157.

s. Auf buschigen, bewaldeten Bergen:

—. XIV., 1; Lippenblümler: Sideritis montana L.; s. Nr. 2379.

t. An Bergen unter Gebüsch:

—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranium columbinum L.; s. Nr. 675.
—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Cytisus nigricans L.; s. Nr. 1092.
—. „ „ C. capitatus Jacq.; s. Nr. 698.
—. „ „ Vicia dumetorum L.; s. Nr. 1070.
—. „ „ Lathyrus sylvestris L.; s. Nr. 1036.
—. „ „ L. latifolius L.; s. Nr. 2481.
—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hypericum montanum L.; s. Nr. 1037.

u. In Bergwäldern:

—. II., 1; Rachenblümler: Veronica spuria L.; s. unter Nr. 2212.
2502. V., 2; Enzianpfl.: Gentiana obtusifolia Willd. (G. spathulata Bartl., G. pyramidalis Nees). Stumpfblättriger Enzian. Blr. längl., stumpf; Kzähne lanzettl. oder eif., in eine lanzettl. Spitze auslauf.; Bl. groß, blaßlila, weißröhrig; ☉; 7 bis 8. *)
—. XII., 3; Rosenpfl.: Fragaria elatior Ehrh.; s. Nr. 26.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Euphrasia lutea L.; s. Nr. 2138.
—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Trifolium rubens L.; s. Nr. 1031.
—. „ „ T. montanum L.; s. Nr. 485.
—. „ „ Ervum sylvaticum Peterm.; s. Nr. 1148.
—. XVII., 4; Hülsenpfl.: E. pisiforme Peterm.; s. Nr. 1149.

v. In lichten Bergwäldern:

—. IV., 1; Kardenpfl.: Scabiosa sylvatica L.; s. Nr. 2141.
—. X., 1; Rautenpfl.: Dictamnus albus L.; s. Nr. 1147.
—. X., 2; Nelkenblütler: Dianthus superbus L.; s. Nr. 1016.
—. X., 5; Dickblattpfl.: Sedum telephium L.; s. Nr. 2142.
—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: Aconitum lycoctonum L.; s. Nr. 2153.

*) Variirt wie G. amarella L. und scheint wol nur Abart derselben, nämlich nördliche Form trockner Wiesen!

w. In ſchattigen Bergwäldern:

—. II., 1; Nachtkerzenpfl.: Circaea intermedia Ehrh.; ſ. Nr. 2140.

x. In feuchten Bergwäldern:

—. X., 5; Nelkenblütler: Cerastium sylvaticum W. et K.; ſ. Nr. 1150.

—. X., 5; Dickblattpfl.: Sedum villosum L.; ſ. Nr. 1614.

—. XII., 2; Roſenpfl.: Spiraea aruncus L.; ſ. Nr. 1151.

§. 501. **Y. In Gebirgen:**

—. II., 1; Rachenblümler: Veronica crenulata Hoffm.; ſ. unter Nr. 2212.

—. II., 1; Rachenblümler: V. alternifolia Lej.; ſ. unter Nr. 2212.

—. III., 1; Baldrianpfl.: Valeriana triptĕris L.; ſ. Nr. 1616.

2503. III., 2; Graspfl.: Poa cenisia All. Zeniſiſches Riſpengras. Wrz. büſchelf., ſproſſ. und auslauf.; Halm oben rundl., unten nebſt den Blattſch. etwas zſgedr.; Bltr. flach, kahl; Riſpe einlängl., Aeſte zu 2, ſchärfl.: Aehrchen eif., 3- bis 8blüt.; Blütchen an der Baſis durch Wollhare verbunden; obere Blattſch. ſehr lang; 4; 7 bis 8; Süddeutſchl.*)

Varirt: vulgaris (Aeſte bis an die Baſis mit Aehrchen), P. flexuosa Whlbg. (P. distichophylla Gaud.; Aeſte unten nackt, hin- und hergebogen; Aehrchen bleich, 3- bis 4blüt.), P. hallĕri R. et Sch. (Aehrchen bleich).

2504. IV., 1; Kardenpfl.: Scabiosa lucida Vill. (Sc. norica Host). Glattblättrige Skabioſe. Kahl; St. meiſt 1köpf.; Bltr. glatt, die der nichtblüh. Köpfe und die unterſten der blüh. geſtielt, verk.-eif. oder eif., ſtumpf-ſägezähn., untere ſtengelſt. lanzettl., an der Baſis eingeſchn., die folg. leierf.-fiederſpalt., mit großem, lanzettl., ſägezähn. Endlappen, oberſte fiederſp. bis fiedertheil.; Hüllchen 8furchig, mehrnervig; Bl. rötlichblau; 4; 7 bis 8; Süddeutſchl.

—. V., 1; Borretſchpfl.: Onosma stellulatum W. et K.; ſ. Nr. 1617.

2505. V., 1; Veilchenpfl.: Viola lutĕa Sm. Gelbes Veilchen. Stämmchen kriech., fadenf.; Bltr. gekerbt, untere herz-eif. oder lanzettl.; Nebenbltr. fingerig-vieltheil., Zipf. lineal., mittl. breiter; Bl. gelb, auch violet oder nur die oberen Bltr. violet; 4; 7 bis 8.

*) Wächſt nicht auf dem Brocken und iſt wol nur Alpenform von P. pratensis L.!

Varirt: grandiflōra Vill. (niedriger; Bl. groß; Krbltr. länger benagelt, sehr gestutzt, das unparige bisweilen tiefeingeschn.), sudetĭca Willd. (höher; Bl. groß; Bltr. oft geschweift-gekerbt), multicaulis Koch (V. calaminarĭa Lej.; St. und Aeste zalr., niederlig.; Bl. nicht größer als bei V. tricŏlor; Aachen, Belgien).

2506. V., 2; Enzianpfl.: Gentiana lutĕa L. Gelber Enzian (St. Ladislaikraut). K. halbirt, scheidenf., Zipf. lanzettl., verschmäl.-spitz, von 3facher Röhrenlänge; Bl. groß, gelb; 4; 7 bis 9; ♈; ☼.

2507. V., 2; Enzianpfl: G. pannonĭca Scop. Ungarischer E. St. rundl.; K. fast lederart., gefärbt, glockig, die Lappen eilanzettl., zurückgekr.; Kr. meist buchtig-6spalt., glock., in Streifen punkt., Lappen eif., 1/3- bis 1/2mal so lang als die Röhre, schmutzig-purpurn oder blasser, schwarz-punkt.; gelbröhrig; 4; 7 bis 9; Süddeutschl.

—. V., 2; Enzianpfl.: G. cruciāta L.; s. Nr. 1558.

—. „ Doldenpfl.: Meum mutellīna Gaertn.; s. Nr. 1618.

2508. „ „ Conĭoselīnum fleischēri W. et Gr. (C. tatarĭcum Fisch.). Fischer's Schierlingssilje (Maludenwurz). St. stielrund, bereift; Aeste gefurcht; Blattsch. aufgeblasen; Bltr. 3fach-gefied., mit längl. Zipf.; Bl. weiß; 4; 7 bis 8; Pr., Schl., Mä., St.

—. V., 2; Doldenpfl.: Heraclēum sibirĭcum L.; s. Nr. 2145.

—. VI., 1; Lilienpfl.: Lilĭum bulbifĕrum L.; s. Nr. 1051.

—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: Epilobĭum angustifolĭum L.; s. Nr. 2085.

—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: E. virgātum Fr.; s. Nr. 2121.

2509. „ „ E. rosmarinifolĭum Haenke (E. dodonaei Vill., Chamaenerĭon palūstre Scop., Ch. dodon. Vill.). Rosmarinblättriges Weidenröschen. Bltr. lineal., rippenlos; Krbltr. ellipt.-längl., purpurn; Kelchlappen purpurrot; 4; 7 bis 8.*)

2510. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: E. alpīnum L. (E. anagallidifolĭum Lmk.). Alpen-W. Bltr. kurzgestielt, längl. oder längl.-lanzettl., stumpf, ganzrand., an der Basis verschmäl.; Bl. blaßrot, mit armblüt., vor dem Aufblühen nickender, lockerer Aehre; 4; 7 bis 8.

Varirt: E. nutans Schmidt (Tausch; Bl. nickend).

2511. X., 2; Nelkenblütler: Dianthus barbātus L. Bart-

*) Ist der Griffel kürzer, wie er auf mageren Stellen der höheren Alpen bei kleinen, armblütigen Exemplaren vorkommt, so ist es E. fleischeri Hochstett. (E. denticulatum Wender., E. angustissimum Ait.)!

Nelke (Studenten-N., schöner Hans, Gartenwilhelm). Bltr. lanzettl.; äußere Deckbltr. lineal-lanzettl., sehr spitz, zurückgebog.-abstehend.; Bl. rot bis weiß; Krbltr. vorn gezähnelt; 4; 7 bis 8; ‡.

—. X., 2; Steinbrechpfl.: Saxifraga umbrosa L.; s. Nr. 1639.

—. X., 5; Dickblattpfl.: Sedum dasyphyllum L.; s. Nr. 1357.

—. XII., 2; Rosenpfl.: Pyrus chamaemespilus Lindl.; s. Nr. 1619.

—. XII., 3; Rosenpfl.: Rosa alpina L.; s. Nr. 1620.

—. „ „ R. hampeana Griseb.; s. Nr. 1621.

—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Thalictrum simplex L.; s. Nr. 1600.

—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Anemone alpina L.; s. Nr. 771.

—. XIV., 1; Lippenblümler: Dracocephalum moldavica L.; s. Nr. 2147.

—. XIV., 2; Rachenblümler: Alectorolophus angustifolius Gmel.; s. Nr. 2483.

2512. XIV., 2; Rachenblümler: A. alpestris Whlbg. Alpen-Klappertopf. Niedrig; K. länger als die Kronröhre; Zähne der Oberl. lang-vorgezog., abgerund., seicht-gekerbt; Hautrand der Samen breiter; sonst wie A. pulcher Schummel; ☉; 7 bis 8; Sudeten.

—. XIV., 2; Rachenblümler: Bartschia alpina L.; s. Nr. 1622.

2513. XV., 2; Kreuzblütler: Cardamine resedifolia L. Reseden-blättriges Schaumkraut. Untere Stbltr. 3theil. oder nebst den oberen gefied.-2- bis 3parig; Bltchn. längl.-keilf., stumpf, ganzrand.; Schoten und Blütenst. aufr.; Bl. weiß; 4; 7 bis 8.

—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranium sylvaticum L.; s. Nr. 422.

2514. XIX., 1; Korbblütler: Hieracium alpinum L. Gebirgs-Habichtskraut. St. 1- bis 3köpf., zott. und sternharig, oben nebst dem vor dem Aufblühen etwas nick. Hauptk. mit langen, weißen, an der Basis schwarzen und zugleich mit kürz., drüsentrag., schwarzen Haren besetzt; Bltr. grasgrün, lanzettl. oder ellipt.; innere Bltchn. des Hauptk. zugesp.; Bl. goldgelb; 4; 7 bis 8.

Varirt: a. Dickköpfige: villosissimum Wimm. (niedrig, 1köpf., 1blättr., Hüllen lang-grauzott.), atricapillum Hoppe (H. hallēri Hoppe; höher, 1köpf., 1blättr.; Hülle dicht-schwarzdrüsig, braunharig), leptophyllum Froel. (höher, 1köpf.; Bltr. lineal-lanzettl., ganzrand.), sudeticum Sternb. (höher, 2- bis 3köpf., 2- bis 3blättr., zott.; Bltr. lanzettl.; Hülle grauzott.); — b. Schmalköpfige: albovillōsum Froel. (höher, 1köpf., 2- bis 3blättr.; Bltr. lang-weißzott.), hallēri Vill. (1- bis 3köpf., zott., weniger drüsig), gla-

brēscens Froel. (St. höher, 1- bis 2köpf., beblätt.; Bltr. grob-gezähnt), latifolĭum Wimm. (niedrig, 1köpf., grau-zott.; Bltr. eilanzettl.), inapērtum Wimm. (H. stylōsum Wimm.; 1köpf., 1- bis 2blättr.; Bl. eingerollt oder verkümmert-kurz), pumĭlum Hoppe (niedrig, 1köpf., 1blättr.; Bltr. meist ganzrand., spatel-lanzettf.), bellidifolĭum Froel. (niedrig, 1köpf., 1blättr.; Bltr. verk.-eispatelf., fast ganzrand, drüsenharig), nigrēscens Froel. (St. höher, ästig, 1- bis 3köpf., fast blattlos, schwach-behart; Bltr. eilängl. bis lanzettl.; Hülle schwarzharig, etwas zott.), atratum Fr. (1- bis 3blättr., 1- bis 3köpf.; Bltr. ellipt.-längl., behart; Blütenst. und Hülle schwarz-drüsenzott.).

2515. XIX., 1; Korbblütler: H. villōsum L. Zottiges H. Weißgelblich- oder rötlich-zott.; St. 1- bis 3köpf., nebst den Bltrn. lang-wollharig; Bltr. bläulichgrün; längl.-lanzettl., obere eif., halb-umfass.; Blütenst. lang-weißwollig; Bl. goldgelb; Pfl. nirgends drüsenharig; 4; 7 bis 8.

Varirt: a. Großköpfige: cordifolĭum Froel. (Stbltr. breit-eif., umfass.; 1köpf.), bracteolātum Froel. (Blütenst. oben schupp.; Bltr. fast kahl, gezähnelt), bellidifolĭum Froel. (grundst. Bltr. verk.-eif., fast kahl, klein), luxurĭans Hegetschw. (St. mehrköpf.; Bltr. gezähnt); — b. Kleinköpfige: pygmaeum Froel. (grundst. Bltr. spitz., fast so lang, als der 1köpf. St.), rupicāprae Schrk. (St. niedr., 1köpf.; Stbltr. herz-eif., umfass.), fissiflōrum Froel. (Zungenblümchen klein, 5theil.), tubŭliflōrum Froel. Zungenbl. in Röhren- oder Ganzblümchen verwandelt), glabrātum Hoppe (St. 1köpf., an der Basis wie die grundst. Bltr. fast kahl), elātum Ser. (St. verläng., sehr zott.), ramōsum Froel. (St. ästig, mehrköpf.; Bltr. stärker gezähnt), scorzonērifolĭum Vill. (St. 1köpf.; Bltr. lineal.-lanzettl., gezähnt).

—. XIX., 1; Korbblütler: H. tridentātum Fr.; s. Nr. 2071.

2516. „ „ Cardŭus personata Jacq. (Arctĭum personata L.). Klettenartige Distel. Bltr. herablauf., unters. spinnwebig-wollig, ungleich-dornig-gewimp., untere breit-eif., bis zur Mittelrippe fiederspalt., obere ei- oder lanzettf., ungetheilt; Köpfchen gehäuft, klettenähnl., purpurrot; 4; 7 bis 8.

Varirt: C. tenuifolĭus Gaud. (Hüllbltchn. stumpfl.).

2517. XIX., 2; Korbblütler: Senecĭo alpīnus Scop. (Cinerarĭa alpīna L.). Alpen-Baldgreis (Staffelblume*)). Bltr.

*) Weil sie in großer Menge um die Sennhütten wächst!

gestielt, mit an der Basis geöhrten Blattst. und aus herzf. Basis eif., nach unten dopp.-, gegen die Spitze einfach-sägezähn., oberf. kahler, unterf. spinnweb. Blattscheibe; Köpfchen nick., mit schupp. Stiele; Hüllblttchn. lanzett-lineal., hautrand.; Bl. goldgelb; 4; 7 bis 8.

Varirt: S. cordifolius Rchb. (S. cordatus Koch; Blattst. ohne Läppchen), S. auriculatus Rchb. (S. subalpinus Koch; Blattst. mit Läppchen).

—. XIX., 1; Korbblütler: Cineraria crispa Jacq.; s. Nr. 1623.
—. „ „ C. pappōsa Rchb.; s. Nr. 1624.
—. „ „ Doronicum pardalianches L.; s. Nr. 707.

2518. XIX., 1; Korbblütler: Achillēa magna L. Große Garbe. St. nebst den Bltrn. zott., gestreift, einfach oder aufr.-absteh.-blütenästig; grundst. Bltr. gestielt, stengelst. sitz., an der Basis mit 4, kreuzweis-gestellten Oehrchen; Blattspindel halbrund, oftmals gezähnt; Bl. meist rot; 4; 7 bis 8; Kr., St.*)

2519. XIX., 1; Korbblütler: A. tanacetifolia All. Rainfarnblättrige G. St. kant., oben oft ästig; Bltr. abwechs.- und unterbrochen-dopp.-gefied., unterf. punkt.; Blattspindel geflüg., mit kleinen, zw. den Fiedern abwechs., gezähnten Läppchen; Hüllblttchn. am Rande steifharig; Bl. rötl. bis weiß; 4; 7 bis 8; Kr., St.

Varirt: A. ambigua Rochel (Blattspindel zw. den Fiedern geflüg., 2zähn.), A. dentifĕra DC. (Blattspind. der unteren Bltr. breit-geflüg., zw. den Fiedern mit 1 bis 2 kleinen, gezähnten Fiederläppchen), A. distans W. et K. (Blattspind. breit-geflüg., zw. den Fiedern trapezoidisch, eingeschn.-sägezähn. oder gelappt), A. stricta Schleich. (Blattsp. schmal.-geflüg., zw. den Fiedern beiderf. mit 1 bis 3 Läppchen oder Zähnen).

2520. XIX., 1; Korbblütler: Adenostyles albifrons Rchb. (Cacalia albifr. L. fil.). Graublättriger Alpendost (Pestwurz). Bltr. nieren-herzf., grob-ungleich-dopp.-gezähnt, unterf. etwas filz.; Köpfchen 3- bis 6blüt.; Bl. fleischrot, bisweilen fast weiß; 4; 7 bis 8.

—. XIX., 3; Korbblütler: Centaurea montana L.; s. Nr. 1526.
—. XXI., 3; Halbgras: Carex rigida Good.; s. Nr. 1656.
—. XXII., 7; Dickblattpfl.: Rhodiola rosea L.; s. Nr. 1625.

*) Hierher gehört A. lanata Spr., welche die häufigere, stärker beharte Form darstellt und eine an der Basis gezähnte (auriculata) Blattspindel besitzt, welche jedoch eben so wenig Beständigkeit zeigt, als die Beharung. (Kittel, T., pag. 691.)

a. Auf höheren Gebirgen:

—. II., 1; Rachenblümler: Veronica bellidioides L.; ſ. Nr. 1629.

2521. V., 1; Schlüſſelblümler: Primula minima L. Kleine Schlüſſelblume. Schaft kurz, 1- bis 2blüt.; Bltr. flach, kahl, unbepudert, keilf., vorn abgeſtutzt und gezähnt; Bl. roſenrot; 4; 7 bis 10.

—. V., 1; Schlüſſelblümler: Androsace obtusifolia All.; ſ. Nr. 1630.

2522. V., 1; Schlüſſelblümler: A. carnea L. Fleiſchfarbner Mannsſchild. St. weichharig; Bltr. lineal., ſpitz, ganzrand., gewimp.; Blkr. länger, als der kreiſelf. K., roſenrot, gelbſchlundig, ſelten weiß; K. bleich, grünſpitz.; 4; 7 bis 8; Ty., E.

—. V., 2; Doldenpfl.: Peucedanum ostruthium L.; ſ. Nr. 1626.

—. X., 5; Nelkenblütler: Cerastium alpinum L.; ſ. Nr. 1627.

2523. „ Dickblattpfl.: Sedum repens Schleich. (S. rubens Hänke). Kriechende Fetthenne. Nichtblüh. St. zerſtreut- und dicht-beblätt.; Bltr. lineal., mit gleichbreiter Baſis ſitz.; Trugdolde 2- bis 5blüt., kahl; Bl. gelb; 4; 7 bis 8.

2524. XI., 5; Dickblattpfl.: Sempervivum montanum L. Berg-Hauswurz. Bltr. der Roſetten längl.-keilig, kurz-zugeſp., beiderſ. fein-drüſenharig, am Rande gewimp., ſtengelſt. längl., vorn ein wenig breiter; Blkr. faſt von 4facher Kelchlänge, rötlich; 4; 7 bis 8.

—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: Aconitum napellus L.; ſ. Nr. 1628.

2525. XIV., 2; Rachenblümler: Melampyrum sylvaticum L. Wald-Wachtelweizen. Aeſte aufſteig.; Bltr. faſt ſitz., ſehr ſchmal, lineal-lanzettl.; Bl. blattachſelſt., einzeln, einſeitswendig, klein, dunkelgelb; Deckbltr. an der Baſis ganzrand.; ⊙; 7 bis 8.

2526. XIX., 1; Korbblütler: Crepis grandiflora Willd. enum. (Tausch; Hieracium grandiflorum All., Soyeria grandiflora Monn.). Großblütiger Pippau. St. 2- bis 5köpf.; Bltr. drüſig-weichharig, mittl. pleilf.; Bltchn. des Hauptk. rauhharig, äußere kurz, locker, ſpitz; Bl. goldgelb; 4; 7 bis 8.

Varirt: C. taraxacifolia Lallem. (ſchlitzblättrig).

2527. XIX., 1; Korbblütler: C. sibirica L. (Soyeria sib. Monn.). Sibiriſcher P. St. ſteifharig; Bltr. längl.-

ellipt., grob-gezähnt, untere in einen schrotsägef.-geflüg., umfass. Stiel verschmäl., obere längl.-eif.; Hauptk. rauhharig; Achänen 30riefig; Bl. dunkelgelb; 4; 7 bis 8.

2528. XIX., 1; Korbblütler: Mulgedium alpinum Less. (Sonchus alpinus L., Cicerbita alpina Wallr.). Gebirgs-Milchlattich (Melkkraut). Bltr. leierf., Endzipf. sehr groß, 3eck.-spießf., lang-zugesp., die oberen mit geflüg., an der Basis herzf. Blattst. umfass.; Traube drüsenharig; Bl. blau; 4; 7 bis 8; ×.

2529. XIX., 1; Korbblütler: M. plumieri DC. (Sonchus pl. L.). Elsässer M. St. aufr., nebst den Blütenst. und Deckbltrn. völlig kahl; Bltr. eck.-gezähnt, schrotsäge-fiederspalt.; Bl. lila; Fr. sehr kurz-geschnäb., beiderf. 5nervig, Nerven querrunzel., sonst breit-berand.; 4; 7 bis 8; ‡; E.*)

b. In Kalkgebirgen:

2530. V., 2; Doldenpfl.: Seseli montanum DC. (S. mont. et glaucum L.). Berg-Sesel. St. gabeläsẗig; Bltr. graugrün, untere dopp.- bis 3fach-gefied., Läppchen fadenf.; Blattst. scheidenf.; Dolde 5- bis 12stral., Stralen an den oberen Kanten weichharig; Hüllchenbltchn. häutig-berand.; Fr. graugrün, fein-kurzharig, auf verdicktem Stiele; 4; 7 bis 8; E., St., Kr.

—. XIV., 1; Lippenblümler: Prunella grandiflora Jacq.; s. Nr. 2439.

—. XV., 1; Kreuzblütler: Draba aizoides L.; s. Nr. 285.

—. XIX., 1; Korbblütler: Leontodon incanus Schrk.; s. Nr. 1523.

—. XIX., 2; Korbblütler: Doronicum austriacum Jacq.; s. Nr. 1529.

c. Auf Lehm in Kalkgebirgsgegenden:

—. XV., 2; Kreuzblütler: Arabis arenosa Scop.; s. Nr. 681.

d. Auf Urgebirgen:

2531. X., 2; Steinbrechpfl.: Saxifraga exarata Vill. Gefurchter Steinbrech. Grundst. Bltr. kahl, an der Basis keilf., vorn 5- bis 3spalt., stengelst. 3theil. oder einfach, Lappen längl.-lineal., völlig stumpf, oberf. längsrinnig; Krbltr. sitz., noch einmal so lang als die längl., stumpfen Kelchlappen, gelblichweiß; 4; 7 bis 8; Ty.

—. XV., 2; Kreuzblütler: Arabis arenosa Scop.; s. Nr. 681.

*) *M. macrophyllum DC., wahrscheinlich aus Armenien stammend, findet sich jetzt bisweilen in Parkanlagen truppweise verwildert!

—. XV., 2; Kreuzblütler: Cardamīne residifolĭa L.; ſ. Nr. 2513.
—. XIX., 3; Korbblütler: Centaurēa nigra L.; ſ. Nr. 2162.

e. Auf Sandſteingebirgen:

—. XV., 2; Kreuzblütler: Arăbis arenōsa Scop.; ſ. Nr. 681.
—. XIX., 3; Korbblütler: Centaurēa nigra L.; ſ. Nr. 2162.

f. Auf Baſaltkuppen:

2532. X., 2; Steinbrechpfl.: Saxifrăga bryoïdes L. Knotenmosartiger Steinbrech. St. niedergeſtreckt, dichte, faſt kug. Raſen bildend; St. 1blüt.; Bltr. lanzett-lineal., gewimp., dornſpitz.; Bl. hellgelblich; 4; 7 bis 8.

g. An Felſen und felſigen Orten:

2533. V., 1; Glockenblümler: Campanŭla caespitōsa Scop. Raſen-Glockenblume. St. locker-riſpig-äſtig; grundſt. Bltr. verk.-eif., kurzgeſtielt, nebſt den unteren ſtengelſt. wenigzähnig, untere lanzettl., dachziegelf.-genähert, obere lineal., entfernt, ganzrand.; Bl. einzeln, trichter-glock., blau; Kapſ. 10kant.; 4; 7 bis 8; Süddeutſchl.
—. X., 2; Steinbrechpfl.: Saxifrăga bryoïdes L.; ſ. Nr. 2532.
—. „ „ S. oppositifolĭa L.; ſ. Nr. 1631.
—. „ „ S. nivālis L.; ſ. Nr. 1638.
2534. „ „ S. aïzōon Jacq. Traubenblütiger Steinbrech. St. aufr., traubig, Aeſte 1blüt. oder an der Spitze 2- bis 3blüt.; Bltr. der Roſetten zungenf., knorp.-geſägt, längs des Randes grubig-punkt., Sägezähne zugeſp., vorw.-gericht.; Krbltr. rundl., weiß, rot-punkt.; 4; 7 bis 8.

Varirt: S. recta Lap. (Bltr. längl.-lineal., meiſt ſtumpf), S. acutifolĭa Kitt. hb. (Bltr. lanzettl., ſpitz), S. pusĭlla Kitt. hb. (Roſettenbltr. faſt rundl., ſehr klein), S. riparĭa Kitt. hb. (ohne grundſt. Bltrroſette; Stbltr. kruſtenlos, ganzrand.).

2535. X., 2; Steinbrechpfl.: S. elatĭor M. et Koch. Hochſtengeliger St. St. hoch, oberw. traubig-riſp., Aeſte verläng., an der Spitze ebenſträuß., 6- bis 12blüt.; Sägezähne der Bltr. kurz, breit, geſtutzt; Krbltr. verk.-eif., weiß, rot-punkt.; 4; 7; Felſen des Keſſels im Geſenke.
2536. X., 3; Nelkenblütler: Silēne rupēstris L. Felſen-Leimkraut. St. oben gabeläſtig, kahl, glatt; Bltr. kahl, ganzrand., obere eilanzettl., ſpitz; Bl. gabel- und gipfelſt.; hardünn-geſtielt, milchweiß oder hellrot; K. verk.-kegel- oder trichterf., 10nervig; 4; 7 bis 8; A., E.

—. X., 5; Dickblattpfl.: Sedum annŭum L.; ſ. Nr. 1356.
2537. XI., 5; „ Sempervīvum hirtum L. Kurzharige Hauswurz. Blr. der Roſetten längl.-lanzettl., ſpitz, kahl, nur am Rande gewimp., ſtengelſt. herz-eif. beiderſ. kurzharig, wimperrandig; Blütentheile vorherrſchend 6zäl.; Bl. grünlichweiß, gekielt; 4; 7 bis 8; Bö., Mä., Oe., A.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Saturēja pygmaea Sieber; ſ. Nr. 2454.

h. An begraſten, felſigen Berglehnen:

—. X., 5; Nelkenblütler: Spergēlla saginoīdes Rchb.: ſ. Nr. 1643.

i. In Gebirgsſchluchten:

—. V., 2; Doldenpfl.: Archangelīca officinālis Hoffm.; ſ. Nr. 1646.
—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: Epilobĭum trigōnum Schrk.; ſ. Nr. 1647.
—. X., 2; Steinbrechpfl.: Saxifrăga umbrōsa L.; ſ. Nr. 1639.
—. XII., 3; Roſenpfl.: Rosa alpīna L.; ſ. Nr. 1620.

k. In Gebirgsthälern:

2538. III., 1; Halbgras: Cypērus badĭus Desf. (C. thermālis Dumort.). Kaſtanienbraunes Zipergras. Wrzſtock kriech.; Spirre dopp.-zſgeſetzt; Aehren geſtielt und ſitz., an der Spitze der längeren Aeſte zu 3 und 4, die ſeitenſt. Aeſte faſt gradwinkl.-ausgehend; Bälge kaſtanienbraun; Narben 3; 4; 7 bis 8; Burſcheid, Eifel.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Scrophularĭa chrysanthemifolĭa M. B.: ſ. Nr. 1644.
2539. XXI., 3; Halbgras: Carex vahlĭi Schkhr. Vahl's Segge. Wrz. faſerig; Blr. ſchmal-lineal, mit röhrig-verwachſ. Blattſch.; Aehrchen zu 1 und 3 genähert-gehäuft, kurzgeſtielt, aufr., eif.; Blütenſcheidchen ſchwarzbraun, mit lichtem Nerv und Rand; 4; 7 bis 8; Vintſchgau.

l. An Gebirgsabhängen:

—. XII., 3; Roſenpfl.: Geum sudetĭcum Tausch; ſ. Nr. 1573.
2540. XIV., 2; Rachenblümler: Anarrhīnum bellidifolĭum Desf. Maßliebblättriger Lochſchlund. St. aufr., kahl, äſtig; grundſt. Blr. längl., verk.-eif., ſtumpf, ungleich-geſägt, mittl. 5- bis 7theil., lineal-gezipf.; Bl. klein, violet; Sporn ſchlank, aufſtreb.; 4; 7 bis 8; Trier.
—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hypericum coris L.; ſ. Nr. 2461.

m. Auf Gebirgsrücken:

2541. XII., 3; Rosenpfl.: Dryas octopetăla L. Achtblättrige Driade (Hirsch- oder Silberwurz, Waldgötterkraut, -nimfe). Bltr. stumpf, gekerbt, unters. weißfilz., immergrün; Bl. einzeln, gipfelst., weiß; Fr. dicht-weißharig; ♄; 7 bis 8; ‡; ⅄; A.*)

n. In rauhen Gebirgsgegenden:

2542. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum setigĕrum Rchb. (Tausch; H. cymōsiförme Froel., H. echioïdes W. et K., H. cymōsum Spr., H. rothianum Wallr., H. cinerĕum Tausch). Borstiges Habichtskraut. Dichtlangborstig und graufilz.; St. beblätt.; Bltr. verläng., zugesp., stengelst. nicht kleiner werdend; Doldentraube gelappt; Köpfchen längl.-walzenf.; Bl. gelb; 2|; 7.

o. In steinigen Gebirgen und Gebirgsgegenden:

—. VI., 1; Lilienpfl.: Antherĭcum liliägo L.; s. Nr. 1636.

—. „ „ A. ramōsum L.; s. Nr. 1090.

—. X., 2; Nelkenblütler: Gypsophĭla fastigiāta L.; s. Nr. 1480.

—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Trifolĭum alpēstre L.; s. Nr. 1083.

2543. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum pallēscens W. et K. (H. anglĭcum Wimm.). Graugrünes Habichtskraut. Graugrün; St. dünn und schlank, aufr., einfach, meist 1blättr.; untere Bltr. gestielt, obere sitz., sämmtl. etwas zott., an der Basis gezähnt, gewimp.; Blütenst. einfach oder gabelig, nebst den Hüllen graufilz., langharig; Bl. gelb; 2|; 7 bis 9.

Varirt: H. willdenowĭi Froel. (St. oben doldentraub., Aeste meist 2köpf., Stbltr. 2 bis 4), H. pallĭdum Bivon (H. lawsonĭi Rchb., H. rupēstre Schmidt; St. oben ästig, 3- bis 4köpf.; Bltr. eilanzettl.; Form der mitteldeutschen Hochgebirge), H. vulcanĭcum Griseb. (St. 1- bis 2blättr., 1- bis 2köpf., oben drüsig; Phonolitfelsen der Milseburg im Rhöngebirge), H. bifĭdum Koch (St. fast blattlos, gabelig-abstehend-getheilt), H. gracĭle Froel. (St. einfach, oben wenig köpf., 1- bis 2blättr.), H. lasiophўllum Fr. (Schaft 1blättr., gabelästig; Bltr. lederig, borstig).

2544. XIX., 1; Korbblütler: Lactūca virōsa L. Gift-Lattich (Giftsalat). Bltr. an der Basis pfeilf., längl.-verk.-eif., auf der Mittelrippe unters. stachelig, am Rande stachelsp.-gezähnt, ungetheilt oder buchtig; Achänen schwarz, breit-

*) Ward früher auf dem Meißner in Hessen gefunden!

berand., an der Spitze kahl; Schnabel weiß, von Achänenlänge; Bl. gelb; ⊙ und ♁; 7 bis 8; ⫲; ⚡; ×.

p. Zwischen Gestein und in Felsenspalten:

—. III., 2; Graspfl.: Calamagrōstis montāna Host; s. Nr. 1102.

2545. XIV., 2; Rachenblümler: Tozzĭa alpīna L. Alpen-Tozzie (Alpendorant). Bltr. gegenst., sitz., breit-eif., gekerbt-gesägt; Bl. blattachselst., einzeln, gelb, Unterl. rotpunkt.; ♃; 7 bis 8.

—. XV., 2; Kreuzblütler: Arăbis alpīna L.; s. Nr. 788.

q. An feuchten, quellenreichen Felsen und Geröll:

—. XIV., 2; Rachenblümler: Tozzĭa alpīna L.; s. Nr. 2545.

r. An felsigen, waldigen Orten:

2546. XIV., 1; Lippenblümler: Melīssa stricta Rchb. Steife Melisse. St. zott.; Bltr. lang-gestielt, untere breit-eif., fast 3eck., spitz, beiders. zott.; Bl. blattachselst., hellrot oder weiß; K. fast kahl, drüsig-punkt., die 3 oberen Zähne fein-, die 2 unteren lang-gewimp.; ♃; 7 bis 8; Kr.

s. Auf trocknen, sonnigen Gebirgsstrecken:

—. II., 1; Rachenblümler: Veronīca latifolĭa L.; s. Nr. 1189.

t. An schattigen, mosigen, humusreichen Stellen:

—. XX., 2; Orchidee: Cypripedĭum calceŏlus L.; s. Nr. 1642.

u. An feuchten Stellen:

—. V., 2; Doldenpfl.: Archangelĭca officinālis Hoffm.; s. Nr. 1646.

—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: Epilobĭum alpīnum L.; s. Nr. 2510.

2547. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: E. origănifolĭum Lmk. (E. alsīnefolĭum Vill.). Majoranblättriger Schotenweiderich. St. aufr., armblüt.; Bltr. etwas gestielt, eif.-lanzettl., zugesp., geschweift- und etwas entfernt-gezähnelt, kahl; Bl. rosenrot; ♃; 7 bis 8.

Varirt: E. alternifolĭum Kitt. (Bltr. abwechselnd).

—. XIX., 2; Korbblütler: Senecĭo dorĭa L.; s. Nr. 2126.

v. An feuchten, quelligen Stellen:

2548. IV., 1; Rosenpfl.: Alchemīlla fissa Schumm. (A. palmatifĭda Tausch). Gespaltener Sinau. Untere Bltr. nierenf., 7- bis 9lapp., Lappen verk.-eif., vorn eingeschn.-

gezähnt, an der Basis ganzrand., die Hälfte der ganzen Blattfläche einnehmend; Bl. grünl.; 4; 7 bis 8; Riesengeb., A.

w. An Quellen:

—. XIV., 2; Rachenblümler: Pedicularis sudetica Willd.; s. Nr. 1648.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Tozzia alpina L.; s. Nr. 2545.
—. „ „ Bartschia alpina L.; s. Nr. 1622.

x. An Bächen:

—. II., 1; Rachenblümler: Veronica media Schrad.; s. unter Nr. 1212.

y. Auf faulen Baumstämmen:

—. XX., 1; Orchidee: Epipogium gmelini Rich.; s. Nr. 2105.

z. Auf Gebirgsäckern:

—. VIII., 1; Knöterichpfl.: *Polygonum fagopyrum L.; s. Nr. 2360.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Teucrium botrys L.; s. Nr. 2405.

a¹. Unter Gebüsch:

2549. V., 2; Doldenpfl.: Laserpitium marginatum W. et K. Berandetes Laserkraut. St. walzenf., gestreift, kahl; Bltr. 3zäl.-dopp.-gefied., Fiedern eingeschn.-2- bis 3lapp., herz-eilängl., stumpfl., sägezähn.; Doldenstralen auf der innern Seite kurzharig; Krbltr. grün- oder schmutziggelb, gelbrot-gerand., verk.-herzf.; 4; 7 bis 8; Kr.
2550. X., 3; Nelkenblütler: Silene armeria L. Garten-Taubenkropf (Leimkraut, Silene, Lichtnelke). Kahl; obere Stglieder klebrig-beringelt; Krbltr. ungetheilt ausgerand., kirschrot; ☉; 7 bis 8; ‡; Kreuznach, Aschaffenburg, Kä., Kr. Ty.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Cardamine impatiens L.; s. Nr. 421.
—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Coronilla emerus L.; s. Nr. 773.
—. XX., 5; Osterluzeipfl.: Aristolochia pallida W. et K.; s. Nr. 774.

b¹. In der Waldregion:

2551. XIX., 1; Korbblütler: Hieracium prenanthoides Vill. Hasenlattichartiges Habichtskraut. St. gestreift, einfach, steif, beblätt.; grundst. Bltr. 1 bis 2, früh verwelkend, stengelst. mit herzf. Basis umfass., gewimp.; äußere Hüllbltchn. wenige, innere zalr., stumpf; Bl. goldgelb; Fr. blaß; 4; 7 bis 8.

Variirt: H. reticulātum Kitt. (Bltr. längl.-lanzettl., unterſ. netzaderig, blaugrün; gemeine Form), H. denticulātum Sm. (Bltr. breit-eif., gezähnelt), H. cotoneïfolĭum Lamk. (Bltr. lanzettl., beiderſ. gleichfarb., unterſ. zott.-zwiebelharig), H. perfoliātum Froel. (Bltr. breit-herzf., umfaſſ.; Köpfchen klein), H. bupleurifolĭum Tausch (Bltr. ellipt., oberſ. weichharig, unterſ. rauh, blaugrün), H. elongātum Lapeyr. (untere Bltr. längl., geigenf.-eingeſchnürt, an der Baſis geöhrt), H. strictissĭmum Froel. (Bltr. lederig, lanzettl., halb-umfaſſ., unterſ. graugrün).

c¹. In Gebirgswäldern:

—. III., 1; Baldrianpfl.: Valeriāna montāna L.; ſ. Nr. 1153.
—. IV., 1; Krapppfl.: Asperŭla tinctorĭa L.; ſ. Nr. 2143.
—. „ „ Galĭum sylvatĭcum L.; ſ. Nr. 2144.
—. „ „ G. aristātum L.; ſ. Nr. 1154.
—. V., 1; Nachtſchattenpfl.: Atrŏpa belladōnna L.; ſ. Nr. 2053.
—. „ Borretſchpfl.: Cynoglōssum montānum Lmk.; ſ. Nr. 1155.
—. V., 2; Doldenpfl.: Astrantĭa major L.; ſ. Nr. 1157.
—. „ „ Heraclēum sibirĭcum L.; ſ. Nr. 2145.
—. „ „ H. alpīnum L.; ſ. Nr. 2146.
—. „ „ Laserpitĭum latifolĭum L.; ſ. Nr. 1158.
—. XII., 3; Roſenpfl.: Potentĭlla rupēstris L.; ſ. Nr. 434.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Digitālis purpurāscens Roth; ſ. Nr. 1161.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Scrophularĭa scopolĭi Hoppe; ſ. Nr. 2148.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolĭum rubens L ; ſ. Nr. 1031.
—. „ „ Ervum pisifōrme Peterm.; ſ. Nr. 1149.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Lathўrus heterophўllus L.; ſ. Nr. 2067.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: L. niger Wimm.; ſ. Nr. 1086.
—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperĭcum pulchrum L.; ſ. Nr. 1089.
—. XIX., 1; Korbblütler: Prenānthes purpurĕa L.; ſ. Nr. 2149.
—. XIX., 2; Korbblütler: Senecĭo nemorēnsis L.; ſ. Nr. 2150.
—. XX., 1; Orchidee: Cephalanthēra pallens Rich.; ſ. Nr. 1163.

d¹. In ſchattigen Gebirgswäldern:

—. II., 1; Nachtkerzenpfl.: Circaea alpīna L.; ſ. Nr. 1062.
—. V., 1; Schlüſſelblümler: Cyclămen europaeum L.; ſ. Nr. 288.

—. V., 1; Schlüsselblümler: Lysimachĭa thyrsiflōra L.; s. Nr. 1145.
—. VI., 1; Spargelpfl.: Streptŏpus amplexifolĭus Pers.; s. Nr. 1166.
—. VI., 1; Lilienpfl.: Antherĭcum liliago L.; s. Nr. 1636.
—. XII., 3; Rosenpfl.: Rubus glandulōsus Bellard.; s Nr. 1167.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Cardamĭne impatĭens L.; s. Nr. 421.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum lucĭdum L.; s. Nr. 504.
—. XX., 1; Orchidee: Corallorrhĭza innāta R. Br.; s. Nr. 1659.
—. XXI., 1; Giftmilcher: Euphorbĭa procēra M. B.; s. Nr. 1169.

e¹. In schattigen, mosigen Gebirgswaldungen:

—. IV., 1; Krapppfl.: Galĭum rotundifolĭum L.; s. Nr. 2151.

f¹. In feuchten Gebirgswäldern:

—. II., 1; Nachtkerzenpfl.: Circaea alpīna L.; s. Nr. 1062.
—. III., 1; Baldrianpfl.: Valerĭana phu L.; s. Nr. 507.

g¹. In Gebirgshainen:

—. XIX., 1; Korbblütler: Crepis praemōrsa Tausch; s. Nr. 512.
—. XIX., 3; Korbblütler: Centaurēa phrygĭa L.; s. Nr. 2162.

h¹. In Nadelwäldern:

—. XX., 1; Orchidee: Corallorrhĭza innāta R. Br.; s. Nr. 1659.

i¹. In steinigen Gebirgswaldungen:

—. XIV., 2; Rachenblümler: Digitālis purpurĕa L.; s. Nr. 1170.

k¹. An Gebirgswaldrändern:

—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: Aconītum lycoctŏnum L.; s. Nr. 2153.
—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Coronĭlla emĕrus L.; s. Nr. 773.
—. „ „ Vicĭa dumetōrum L.; s. Nr. 1070.

l¹. Auf grasigen Anhöhen in Gebirgswäldern:

—. XIX., 2; Korbblütler: Cinerarĭa spathŭlaefolĭa Gmel.; s. Nr. 1172.

m¹. Auf trockenen Grasstellen in Gebirgswäldern:

—. V., 1; Zauberpfl.: Thesĭum montānum Ehrh.; s. Nr. 1173.

n¹. Auf sonnigen Rasenplätzen:

—. XII., 3; Rosenpfl.: Potentilla aurĕa L.; s. Nr. 1650.

o¹. Auf Grasplätzen der Gebirge:

2552. XII., 3; Rosenpfl.: Sieversĭa montāna Spr. (Geum montānum L.). Berg-Sieversie. St. 1-, selten 2blüt.; Bltchn. ungleich-gekerbt, das endst. sehr groß, fast herzf., stumpf-lapp.; Fr. und Griff. zott., letzterer nicht geglied.; Bl. gelb; 4; 7 bis 9.

2553. XIX., 1; Korbblütler: Leontŏdon squamōsus Lmk. (L. pyrenaĭcus Gouan., Apargĭa alpīna Willd.). Schuppiger Löwenzahn. St. 1köpf., blattlos, schupp., oberw. dicker; Köpfchen vor dem Aufblühen überhäng., goldgelb; Bltr. verk.-eilanzettl.; 4; 7 bis 8; Harz, Schwarzwald, Vogesen, A.

Varirt: L. aurantĭcus Rchb. (Bl. orangegelb).

—. XIX., 1; Korbblütler: Cirsĭum acaule All.; s. Nr. 2097.

p¹. Auf nassen Gebirgstriften:

—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Hedysārum obscūrum L.; s. Nr. 1649.

q¹. Auf Gebirgswiesen:

—. II., 1; Rachenblümler: Veronĭca medĭa Schrad.; s. unter Nr. 2212.

—. V., 1; Glockenblümler: Phyteuma orbiculāre L.; s. Nr. 1653.

—. V., 1; Veilchenpfl.: Viŏla lutĕa Sm.; s. Nr. 2505.

—. V., 2; Enzianpfl.: Gentiāna obtusifolĭa Willd.; s. Nr. 2502.

2554. „ Doldenpfl.: Mēum athamantĭcum Jacq. (Athamanta meum L.). Gemeine Bärenwurz (Hausmark). St. wenig-ästig, fast blattlos; Bltr. dopp.-gefied., Fiedern fiedertheil.-vielspalt., Zipf. hardünn, spitz; Bl. weiß; 4; 7 bis 8; ♃.

—. V., 2; Doldenpfl.: Chaerophўllum hirsūtum L.; s. Nr. 2130.

—. VI., 1; Lilienpfl.: Allĭum schoenoprasum L.; s. Nr. 1654.

—. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygŏnum bistōrta L.; s. Nr. 1139.

—. X., 3; Nelkenblütler: Arenarĭa grandiflōra L.; s. Nr. 797.

—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Trollĭus europaeus L.; s. Nr. 798.

2555. XIV., 2; Rachenblümler: Alectorolŏphus pulcher Schumm. (Rhinānthus alpīnus Baumg., A. alpīnus Grcke.). Gebirgs-Klapper. Bltr. lineal-lanzettl.; Deckbltr. bleich, schwarz-gefleckt und -punkt.; K. kahl; Oberl. aufstreb., mit 2 längl. Zähnen; Röhre gekrümmt, fast von Kelchlänge;

Bl. gelb, Unterl. mit blauem Fleck; ☉; 7 bis 8; Harz, Sudeten, Erzgebirge (?).

—. XIX., 1; Korbblütler: Cardŭus deflorātus L.; ſ. Nr. 2074.
—. XIX., 2; „ Arnĭca montāna L.; ſ. Nr. 1634.
—. XIX., 3; „ Centaurēa phrygĭa L.; ſ. Nr. 2163.
2556. „ „ C. nigrēscens Willd. Baſtard-Flockenblume. Hauptkelchbltr. faſt ſämmtl. mit kammf.-gefied. Anhängſeln; Federkelch kurz-borſtig; Aeſte oben verdickt; Bltr. ſchärfl., ſtachelſp., untere bucht.-gezähnt, obere fein-ſtachelig-gezähnelt; Bl. pfirſichblütrot; 4; 7 bis 9.

Varirt: C. pratēnsis Thuill. (C. jacēo-nigra Kitt.; untere Hüllbltchn. mit ſchwärzl., lanzettl. Anhängſel; Deckbltr. das Köpfchen überrag.), C. decipĭens Thuill. (C. nigro-jacēa Kitt.; ſtärker behart; äußerſte Hüllbltchn. mit eif., braunem, geſchlitzt-gefied. Anhängſel).

—. XX., 1; Orchideæ: Orchis mascŭla L.; ſ. Nr. 799.
—. „ „ Leucōrchis albĭda Lindl.; ſ. Nr. 483.*)
—. „ „ Epipactis palūstris Sw.; ſ. Nr. 1138.

r¹. Auf feuchten Gebirgswieſen:

—. IV., 1; Roſenpfl.: Sanguisōrba officinālis L.; ſ. Nr. 1658.
2557. V., 2; Doldenpfl.: Pleurospērmum austriăcum Hoffm. (Ligustĭcum austr. L.). Oeſterreichiſcher Rippenſame. St. geſtreift, röhrig, kahl; Bltr. 3zäl., mit längl., geſägten Zipf.; Hülle zurückgeſchl.; Hüllchen vielblättr.; Bl. weiß; Rippen mit ſtumpfem, gekerbtem Kiele; 4; 7 bis 8; Schl., Pſ., Pr., Th., Rh., Bö. u. ſ. w.
—. X., 3; Nelkenblütler: Melandrĭum sylvēstre Roehl.; ſ. Nr. 428.
—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: Aconĭtum stoerkeānum Rchb.; ſ. Nr. 1168.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Trollĭus europaeus L.; ſ. Nr. 798.
2558. XIX., 1; Korbblütler: Crepis succisaefolĭa Tausch (Hieracĭum succisaefolĭum All., H. molle Jacq.). Abbißblättrige Grundfeſte. Bltr. längl., undeutl.-gezähnt, untere ſtiel-verſchmäl., mittl. umfaſſ.; Blütenſt. und Hauptk. drüſenhaarig; Achänen 20riefig; Federkelch ſchneeweiß; Bl. gelb; 4; 7 bis 8; Pr., Schl., Pſ., Hn., K. S., Sa., Th., Bö., Mä., Oe., Bay.

*) L. friwaldii Rchb. fil. (Gymnadenia friwaldskyana Hampe), Friwald's Weißſtändel, unterſcheidet ſich durch längliche innere Kelchlappen, walzigen, ſpitzen Sporn, der faſt die halbe Länge des Eierſtocks erreicht. Findet ſich auf Alpen in Ungarn und iſt wol in Unterkrain zu finden!

Variirt: Hierac. molle Jacq. (H. croatĭcum W. et K.; St. und Blr. kahl), H. integrifolĭum Hoppe (Cr. hieracioïdes W. et K.; kahl).

2559. XIX., 1; Korbblütler: Cirsĭum palūstri-tuberōsum Schiede (C. palūstri-bulbōsum Naeg., C. semidecūrrens Richt., C. kocheānum Löhr). Bastard. Wrzfasern etwas verdickt; Blr. kaum halb-herablauf.; Blütenköpfchen etwa 6 bis 15, klein, längl., fast einzeln, deckblattlos; Bl. purpurrot; 4; 7 bis 8; Rh., Leipzig, Sa.

s¹. Auf Sumpfwiesen in Gebirgen:

2560. V., 2; Enzianpfl.: Sweertĭa perēnnis L. Ausdauernde Sweertie (Bitterling, Sumpfenzian). St. einfach: untere Blr. ellipt., gestielt; Blütenst. fast geflüg.-4kantig; Bl. stahlblau, dunkel-punkt., oder schwefelgelb; 4; 7 bis 8; S.-H., M., Pr., A. u. s. w.

t¹. Auf Torfmoren:

—. XIV., 2; Rachenblümler: Pediculāris sceptrum carolīnum L.; s. Nr. 1056.

u¹. Auf Torfwiesen:

2561. VIII., 1; Heidepfl.: Tetrălix septentrionālis E. Mey. (Erīca tetrălix L.). Nördliche Dopheide (Sumpf-, Reh- oder Glockenheide). Blr. 3- oder 4ständ., steifhariggewimp.; Bl. endst.. kopf.-doldig, fleischfarben, selten weiß; ♄; 7 bis 9.*)

v¹. Auf morigen Torfwiesen:

—. X., 1; Heidepfl.: Andromĕda polifolĭa L.; s. Nr. 804.

w¹. Auf trocknen Gebirgswiesen:

—. V., 1; Glockenblümler: Phyteuma orbiculare L.; s. Nr. 1653.

—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Trifolĭum ochroleucum L.; s. Nr. 1140.

x¹. Auf Waldwiesen der höheren Gebirge:

—. V., 2; Doldenpfl.: Myrrhis odorāta Scop.; s. Nr. 490.

y¹. Auf Triften über der Waldregion:

—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: Delphinĭum elatum L.; s. Nr. 2496.

---

*) Die Sumpfheide ist eine Torfpflanze, vorzüglich häufig in den Nielanden, von wo aus sie sogar nach Surinam gewandert ist!

z¹. In Gebirgsgegenden:

—. IV., 1; Krappypfl.: Galium saxatile L.; ſ. Nr. 1640.
—. V., 1; Borretſchpfl.: Onosma echioides L.; ſ. Nr. 1632.
2562. „ Glockenblümler: Phyteuma humile Schleich. Niedriger Teufelskrallen. Bltr. alle lineal.-lanzettl., auch lineal., ſitz., abwärts-gewimp., faſt ganzrand.; Deckbltchn. aus eif., ſägezähn. Baſis lanzett-lineal., oft länger als das rundl. Köpfchen; Narben 2; Bl. blau; 4; 7; Bö. (Außengefilde).
—. XII., 2; Roſenpfl.: Mespilus germanica L.; ſ. Nr. 1018.
—. XII., 3; „ Rosa resinosa Sternb.; ſ Nr. 1213.
—. „ „ R. rubrifolia Vill.; ſ. Nr. 1215.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Ranunculus muricatus L.; ſ. Nr. 778.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Alyssum montanum L.; ſ. Nr. 779.
—. „ „ Iberis intermedia Guers.; ſ. Nr. 1633.
—. XIX., 1; Korbblütler: Cirsium eriophorum Scop.; ſ. Nr. 2287.
2563. XIX., 1; Korbblütler: Centrophyllum lanatum DC. (Carthamus lanatus L.). Wolliges Spornblatt. St. an der Baſis behart, oben ſpinnwebig-wollig; untere Bltr. fiederſpalt.-gezähnt, oberſte umfaſſ., eingeſchn.-gezähnt; Hülle wollig; Bl. gold-, endl. ſafrangelb, ſchwarzſtreifig; ⊙; 7 bis 8; Kr.
—. XIX., 2; Korbblütler: Cineraria papposa Rchb.; ſ. Nr. 1624.
—. „ „ Arnica montana L.; ſ. Nr. 1634.
—. „ „ Pyrethrum corymbosum Willd.; ſ. Nr. 1129.
2564. XIX., 2; Korbblütler: Telekia cordifolia Kit. (T. speciosa Baumg., Buphthalmum speciosum Schreb.). Herzblättrige Telekie. Bltr. geſtielt, herzf., dopp.-geſägt, obere ſitz., an der Baſis abgerund. oder herzf.-umfaſſ.; Bl. gelb; 4; 7 bis 8; ‡; Schl., Bö., Gera, Kr.
—. XIX., 2; Korbblütler: T. speciosissima Less.; ſ. Nr. 1635.
2565. „ „ Inula viscosa Ait. (Pubicaria visc. Cass., Erigeron viscosum L.). Klebriger Alant. St. aufr., klebrig-harig, oben äſtig; Bltr. lanzettl., ſägezähn., mit herzf.-geöhrter Baſis ſitz.; Köpfchen groß, Stralbl. weniger zalr., goldgelb; Fr. behart; 4; 7 bis 8; Kr.
2566. XIX., 2; Korbblütler: I. montana L. Berg-A. St. aufr., meiſt 1köpf., zott.; Bltr. lanzettl., ganzrand., zott., unterſte ſtiel-verſchmäl., obere ſitz., ſämmtl. unterſ. weißfilz.; Bl. gelb; Fr. kurzharig; 4; 7 bis 8; Oe., Kr.

—. XIX., 2; Korbblütler: Crupīna vulgāris Cass.; ſ. Nr. 1637.

§. 502. **Z. An und auf Felſen:**

—. III., 2; Graspfl.: Andropōgon allionĭi DC.; ſ. Nr. 1661.
—. V., 1; Borretſchpfl.: Myosōtis versicŏlor Rchb.; ſ. Nr. 440.
—. „ Glockenblümler: Campanŭla pyramidālis L.; ſ. Nr. 2227.
—. V., 1; Glockenblümler: C. glomerāta L.; ſ. Nr. 1602.
2567. „ „ Phyteuma comōsum L. Schopfiger Teufelskrallen. Bltr. ungleich-grob-gezähnt, geſtielt, am Rande behart; Deckbltr. lanzettl. bis lineal.; Bl. doldenartig-büſchelſt., umgek.-birnf., unten himmelblau, oben dunkelviolet; Narben 2; 4; 7; Kr., Ty.
—. V., 1; Veilchenpfl.: Viŏla tricŏlor L.; ſ. Nr. 525.
—. V., 2; Doldenpfl.: Peucedănum verticillāre Koch; ſ. Nr. 2489.
2568. VI., 1; Lilienpfl.: Allĭum saxatīle M. B. Felſen-Lauch. Zwiebel längl.; St. an der Baſis beblätt.; Bltr. zſgerollt-fadenf., halbrund, innen rinnig; Blütenſch. 2, eine langgeſchnäb.; Dolde halbkugelf., locker, kapſeltrag.; Bl. weiß, mit rötl. Schminke; 4; 7 bis 8; Kr.
—. VI., 3; Knöterichpfl.: Rumex scutātus L.; ſ. Nr. 610.
2569. VIII., 1; Rautenpfl.: Ruta graveŏlens L. Gemeine Raute (Kreuz- oder Weinraute). Bltr. dopp.- oder faſt 3fach-gefied., im Umriſſe faſt 3eck., Bltchn. verk.-eif.; Bl. gelb; 4; 7 bis 8; ☨; ♆; ♃; Kr, Ty. u. ſ. w.
Varirt: R. holopetăla Kitt. (breitblättr., Blbltr. ganzrand., Deckbltr. längl.), R. intermedĭa Stev. (breitblättr., Krbltr. vorn gekerbt-gezähnelt, Deckbltchn. längl.), A. bracteōsa DC. (breit-blättr., Blbltr. gewimp.-gekerbt, Deckbltr. breit-ei- bis herzf., oft gezähnt), R. angustifolĭa Pers. (ſchmalblättr., Krbltr. lang-gewimp., Deckbltchn. lineallängl., Fr. 1/3-4ſpalt.), R. divaricāta Ten. (ſchmalblättr., Krbltr. an der Baſis gekerbt-gezähnt, vorn ganzrand., Kapſ. halb-4ſpalt.).
2570. X., 2; Nelkenblütler: Gypsophīla paniculata L. Riſpiges Gipskraut. Wrz. mehrköpf., Köpfe aufſteig.; St. aufſteig. oder aufr., von der Baſis aus äſtig, am Grunde kurzharig, ſonſt kahl; Bl. weiß; 4; 7 bis 8; Mä., Oe., Kä., Kr.
—. X., 2; Steinbrechpfl.: Saxifrăga exarāta Vill.; ſ. Nr. 2531.
—. „ „ S. hypnoĭdes L.; ſ. Nr. 807.
2571. „ „ S. planifolĭa Lapeyr. Flach-

blättriger Steinbrech. St. verdickt, ästig; Aeste aufr., dachblättr.; untere Bltr. lineal-längl., gestutzt oder abgerund. stumpf; Krbltr. meist 3nervig, von dopp. Kelchlappenlänge, an der Spitze dunkelpurpurn oder safranrot; 4; 7 bis 8.

Varirt: S. planifolĭa Koch (abgestorb. Bltr. 3nervig, grauspitz.; St. gleichmäß.-beblätt., 1- bis 3blüt.; Blbltr. eif., gelblichweiß), S. facchinīi Koch (abgestorb. Bltr. 3- bis 5nervig, ganz oder nur an der Spitze grau; St. von der Basis aus gleich-beblätt., 1- bis 3blüt.; Krbltr. längl., trübrot).

—. X., 3; Nelkenblütler: Möhringĭa villōsa Fenzl; s. Nr. 1663.

—. X., 5; Dickblattpfl.: Sedum telephĭum L.; s. Nr. 2142.

—. „ „ S. annŭum L.; s. Nr. 1356.

—. „ „ S. acre L.; s. Nr. 1298.

—. „ „ S. reflēxum L.; s. Nr. 2235.

2572. „ „ S. album L. Weißblühende Fetthenne. Bltr. walzenf., stumpf, kahl; Rispe fast gleich-hoch, kahl oder sehr zerstreut-behart; Bl. weiß oder rötlich; 4; 7 bis 8; ☨.

—. XI., 5; Dickblattpfl.: Sempervīvum tectōrum L.; s. Nr. 2236.

2573. XI., 5; Dickblattpfl.: S. globifĕrum L. Kugelknospige Hauswurz. Rosettenbltr. verk.-eif., an der Basis keilig, beiders. drüsenharig, lang-gewimp.; Krbltr. lineal-lanzettl., fast von 4facher Kelchlappenlänge, gelblichweiß, grünnervig; 4; 7 bis 8; Mä., Galizien.

—. XII., 3; Rosenpfl.: Potentīlla argentĕa L.; s. Nr. 464.

—. XIV., 1; Lippenblümler: Hyssōpus officinalis L.; s. Nr. 2237.

—. XIV., 1; Lippenblümler: Stachys recta L.; s. Nr. 1303.

—. „ „ Teucrĭum flavum L.; s. Nr. 1663.

—. „ „ T. scorodonĭa L.; s. Nr. 2090.

2574. XIV., 2; Rachenblümler: Digitālis laevigāta W. et K. Glatter Fingerhut. Kahl; Bltr. lanzett-lineal.; Bl. allseitswendig, schmutziggelb; Kr. kurzglock., Mittellappen der Unterl. lang-vorgezog., rinnig, zugesp., aufsteig., innen behart; 4; 7; Kr.

—. XIV., 2; Rachenblümler: Linarĭa cymbalarĭa Dill.; s. Nr. 1360.

—. XV., 1; Kreuzblütler: Berterŏa incāna DC.; s. Nr. 1305.

—. „ „ Biscutēlla laevigāta L.; s. Nr. 2410.

—. XV., 2; „ Sisymbrĭum austriăcum Jacq.; s. Nr. 613.

—. XV., 2; Kreuzblütler: Diplotaxis tenuifolĭa DC.; ſ. Nr. 1313.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Sināpis cheiränthus Koch; ſ. Nr. 1316.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum lucĭdum L.; ſ. Nr. 504.
—. XVII., 2; Erdrauchpfl.: Corydălis lutĕa Pers.; ſ. Nr. 1364.
—. XVII., 2; Erdrauchpfl.: C. ochroleuca Koch; ſ. Nr. 1365.
—. XVII., 3; Bitterling: Polygăla vulgăris L.; ſ. Nr. 467.
—. „ „ P. chamaebūxus L.; ſ. Nr. 1030.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Genĭsta scariōsa Vis.; ſ. Nr. 1592.
—. „ „ Melilōtus alba Lam.; ſ. Nr. 2197.
—. XIX., 1; Korbblütler: Lactūca perēnnis L.; ſ. Nr. 1231.
—. „ „ Leontŏdon incānus Schrk.; ſ. Nr. 1523.
—. XIX., 1; Korbblütler: Cirsĭum acaule All.; ſ. Nr. 2097.
—. XIX., 2; „ Doronĭcum caucasĭcum M. B.; ſ. Nr. 1535.
—. XIX., 2; Korbblütler: Pyrĕthrum corymbōsum Willd.; ſ. Nr. 1129.
2575. XIX., 3; Korbblütler: Centaurēa alba L.*). Weißköpfige Flockenblume. St. aufr., abſteh.-vieläſtig; grundſt. Bltr. geſtielt, leierf. oder fiederſpalt., ſtengelſt. fiederſpalt.; Köpfchen eif., glänz.-gelblichweiß; Hüllbltchn. lang-weichſtachelſp.; Bl. nicht ſtralend, blaßpurpurn; Pappus ein häut., dopp., feingewimp. Rand; 4; 7 bis 8; Kr.
—. XXI., 4; Neſſelpfl.: Urtīca piluliflĕra L.; ſ. Nr. 1266.
—. XXII., 8; Giftmilcher: Mercurĭalis ovāta Hoppe; ſ. Nr. 717.
—. XXII., 13; Zapfenfrüchtler: Ephĕdra distachўa L.; ſ. Nr. 1664.

a. An ſchattigen Felſen:

—. III., 2; Graspfl.: Sesleria coerulĕa Ard.; ſ. Nr. 83.
2576. „ „ S. elongata Host. Langährige Seslerie. Wrz. ein horizont. Rhizom, am Kopfe mit weißen Blattſch. ſpärl. beſetzt; Aehre lineal., an der Baſis dünner; unteres Blütenſcheidchen 4fach-ſtachelſp., die inneren mit zu einer Granne verläng., ſcharfem Kiele, Granne von 1/3 Blütenſcheidchenlänge; 4; 7 bis 8; Kr.

*) C. splendens Auct. germ. plurim. et italic. non Linné, qui C. splendentis squamas calycis obtusas esse asserit, cum albae L. mucronatas indicit. (Kitt., Tasch., p. 611.)

—. IV., 1; Krapppfl.: Galium saxatile L.; ſ. Nr. 1640.
2577. X., 2; Steinbrechpfl.: Saxifraga arachnoidea Sternb. Spinnwebiger Steinbrech. Spinnwebig; Wrz. einfach; St. ligend, mehrblüt.; untere Bltr. aus keilf. Baſis breit-nierenf., 5- bis 7ſpalt., Lappen abgerund.-ſtumpf; Bl. hellzitrongelb; 4; 7 bis 8; Ty.
—. X., 3; Nelkenblütler: Moehringia muscosa L.; ſ. Nr. 1666.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Lunaria biennis Mnch.; ſ. Nr. 309.
—. XIX., 1; Korbblütler: Prenanthes purpurea L.; ſ. Nr. 2149.

b. An trocknen Felſen:

—. X., 2; Paronychienpfl.: Scleranthus perennis L.; ſ. Nr. 676.

c. An feuchten Felſen:

—. X., 5; Nelkenblütler: Cerastium brachypetalum Desp.; ſ. Nr. 690.
—. X., 5; Dickblattpfl.: Sedum dasyphyllum L.; ſ. Nr. 1357.

d. An felſigen, ſchattigen Orten:

2578. X., 5; Dickblattpfl.: S. cepaea L. Riſpige Fetthenne. Wrz. dünn, ohne kriech. Stämmchen; Bltr. flach, ganzrand.; Ebenſträuße endſtänd., gedrungen; Bl. roſenrot; ♂ (⊙); 7 bis 8; Maſtricht (Petersberg), Kr. *)

e. An felſigen, waldigen Orten:

—. XIV., 1; Lippenblümler: Melissa stricta Rchb.; ſ. Nr. 2546.

f. In Felsritzen:

2579. III., 2; Graspfl.: Triticum biflorum Brignoli. Zweiblütige Quecke. Wrz. faſerig, büſchelig; Bltr. oberſ. kurzborſtig-ſcharf, unterſ. faſt glatt; Aehrchen 2- bis 3blüt.; Blütenſch. lanzettl., 3nervig; Granne von halber Blütenſcheidchenlänge; 4; 7 bis 8; Kr. (Matajar).
—. XIV., 2; Rachenblümler: Linaria genistifolia Mill.; ſ. Nr. 2479.

g. In Steinklüften:

—. V., 2; Doldenpfl.: Pimpinella tragium Vill.; ſ. Nr. 1667.

h. Am Fuße der Felſen:

—. X., 2; Nelkenblütler: Saponaria officinalis L.; ſ. Nr. 2184.

*) Ward früher bei Rollsdorf am ſalzigen See gefunden!

i. In Felſenſpalten:

—. XIII., 1; Kappernpfl.: Cappăris spinōsa L.; ſ. Nr. 1358.
—. „ „ C. ovāta Desf.; ſ. Nr. 1359.

k. Unter Felſen:

—. V., 2; Doldenpfl.: Bupleurum longifolĭum L.; ſ. Nr. 1201.
2580. X., 2; Steinbrechpfl.: Saxifrăga cernŭa L. Ueberhängender Steinbrech. Drüſenharig; Wrz. ſchupp. Knöllchen tragend; St. einfach, 1blüt.; grundſt. Bltr. breitlapp.-5- bis 7kerbig, ſtengelſt. in den Achſeln zwiebeltrag.; Bl. gipfelſt., nickend, einzeln, weiß; K. faſt frei, d. h. faſt bis zur Baſis geſpalten; 4; 7 bis 8; St., Ty.

l. An Kalkfelſen:

—. IV., 1; Kugelblütler: Globularĭa vulgāris L.; ſ. Nr. 701.
—. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus plumarĭus L.; ſ. Nr. 2428.
—. X., 3; „ Silēne saxifrăga L.; ſ. Nr. 2429.
—. „ „ Moehringĭa ponae Fenzl; ſ. Nr. 1531.
—. „ „ M. heterophȳlla Doll.; ſ. Nr. 1532.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Melĭssa pulegĭum Rochel; ſ. Nr. 2431.

m. An ſonnigen Sand- und Kalkſteinfelſen:

—. XV., 1; Kreuzblütler: Capsēlla pauciflōra Koch; ſ. Nr. 704.
—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperĭcum elĕgans Steph.; ſ. Nr. 1533.

n. An Schieferfelſen:

—. XV., 1; Kreuzblütler: Ibēris intermedĭa Guers.; ſ. Nr. 1633.

o. Auf Felſen am Meere:

—. X., 2; Nelkenblütler: Dianthus ciliātus Guss.; ſ. Nr. 1668.

p. An felſigen, ſteinigen Orten:

Vergl. §. 496, a.

q. An felſigen Orten:

—. V., 1; Wegdornpfl.: Paliūrus aculeātus Lam.; ſ. Nr. 810.
2581. V., 2; Doldenpfl.: Seselĭ tortuōsum L. Spreizender Sefel. St. ſperrig-äſtig; untere Blтr. 3zäl.-3fach-gefied.; Blattſt. ſcheidenf.; Dolde 5- bis 10ſtral.; Stralen kant., innere Kante ſchärfl.; Hüllblтchn. lanzett-lineal., breithautrand., von Dölbchenlänge; Bl. weiß; Fr. weichharig; 4; 7 bis 8; Kr.

2582. V., 3; Paronychienpfl.: Telephium imperati L. Gemeine Telefie. St. aufsteig., aufr., walzenf., fast einfach, kahl; Bltr. in 2/5 Stellung wechselst., kurzgestielt, ellipt., ganzrand., kahl; Nebenbltchn. sehr klein; Bl. deckblattachselst., weiß; 4; 7 bis 8; Ty.
—. X., 3; Nelkenblütler: Silene armeria L.; s. Nr. 2550.
—. „ „ Alsine setacea M. et K.; s. Nr. 2453.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Iberis umbellata L.; s. Nr. 1551.
—. XIX., 1; Korbblütler: Scolymus hispanicus L.; s. Nr. 2285.

A[1]. In den Alpen und Voralpen: §. 503.

2583. II., 1; Rachenblümler: Veronica fruticulosa Wulff. Staudenförmiger Ehrenpreis. St. niederlig., rundl., mit den Jahrestrieben aufst., oben drüsenharig; Bltr. kahl, am Rande weichharig, untere kleiner; Bl. bläulichrot, purpurn geadert; 4; 7 bis 8; A.
2584. II., 1; Rachenblümler: Wulffenia carinthiaca Jacq. Kärntische Wulffenie. Grundst. Bltr. längl., verk.-eif., blattstiel-verlauf., grob- und stumpf-sägezähn.; Schaft rund, zerstreut-schuppig; Bl. in ährigen Trauben 2reihig, violblau; 4; 7; Kä., Ty.
—. II., 1; Lippenblümler: Salvia glutinosa L.; s. Nr. 2106.
—. III., 1; Baldrianpfl.: Valeriana triptēris L.; s. Nr. 1616.
2585. III., 2; Graspfl.: Calamagrostis tenella Lk. (Arundo ten. Schrad.). Zartes Reitgras. Bltr. lineal., flach, kahl; Rispe ausgebreit.; Blütensch. spitz; Hare kürzer als die grannenlosen oder sehr kurz-begrannten Blütenscheidchen; 4; 7 bis 8; A.
2586. III., 2; Graspfl.: Avena alpestris Host. Alpenhafer. Wrz. büschelf.; Bltr. kurzharig, am Rande gewimp.; Rispe gelappt; Aehrchen 3- bis 4blüt., gelb, purpurn und grün; Fruchtk. behart; 4; 7 bis 9; Oe., St.
2587. III., 2; Graspfl.: A. argentea L. Silberhafer. Wrz. kriech.; Bltr. 2zeil., kahl, an der Scheidenmdg. behart; Rispe aus einer Blattsch. hervorragend; Aehrchen grüngelb und weißglänz.; 4; 7 bis 8; südl. A.
2588. III., 2; Graspfl.: A. scheuchzeri All. Bunter H. Wrz. schief, büschelf.; Bltr. flach, schmal, scharfrand.; Rispe fast einfach, traubenf.; unteres Blütenscheidchen mit in der Mitte entspring., fuchsiger Granne; Achse zott.; ⊙; 7 bis 9; südl. A.
—. III., 2; Graspfl.: Festuca laxa Host; s. Nr. 1670.
—. „ „ Poa cenisia All.; s. Nr. 2503.

2589. III., 2; Graspfl.: P. laxa Haenke. Schlaffes Rispengras. Wrz. büschelf.; Rispe mehr oder weniger zsgezog., an der Spitze nickend; Aeste fadenf., kahl, zu 1 bis 2; Aehrchen längl.-eif., 2- bis 4blüt.; Blütenscheidchen scharfgekielt, stachelsp.; Halm aufr., schlank; 4; 7 bis 9.*)
—. IV., 1; Wegerichpfl.: Plantāgo atrāta Hoppe; s. Nr. 1671.
—. „ „ P. alpīna L.; s. Nr. 1672.
—. „ Kugelblütler: Globulaŕia cordifolĭa L.; s. Nr. 816.
—. „ „ G. nudicaulis L.; s. Nr. 1673.
—. „ Kardenpfl.: Scabiōsa lucĭda Vill.; s. Nr. 2504.
—. „ „ Sc. graminifolĭa L.; s. Nr. 1674.
—. „ „ Sc. longifolĭa Kit.; s. Nr. 1675.
2590. „ Krapppfl.: Asperŭla longiflōra W. et K. (A. commutāta R. et Sch.). Langblütiger Meier. St. mehre, sperrig-ästig, kahl; Bltr. zu 4, lineal., ungleich, zugesp., scharfrand.; Bl. zu 3 zw. 4 pfriemf. Deckbltchn. sitz., außen rosenrot, innen gelblichweiß; 4; 7 bis 8; Kr., Kä., St.
—. IV., 1; Rosenpfl.: Alchemilla alpīna L.; s. Nr. 1284.
—. V., 1; Schlüsselblümler: Soldanēlla alpīna L.; s. Nr. 817.
—. „ „ Primŭla longiflōra All.; s. Nr. 1676.
—. „ „ P. villōsa Jacq.; s. Nr. 1677.
—. „ „ P. floerkeāna Schrad.; s. Nr. 1678.
—. „ „ P. truncāta Lehm.; s. Nr. 1679.
—. „ „ Androsăce alpīna Lam.; s. Nr. 1741.
—. V., 1; Schlüsselblümler: A. lactĕa L.; s. Nr. 820.
2591. „ Borretschpfl.: Cerīnthe aspĕra Roth (C. major L. var. a. aspĕra Willd.). Rauhblättrige Wachsblume. St. oben ästig; Bltr. unters. von verhärt. Drüsen rauh, am Rande gezähnelt-gewimp.; Bl. rötlich-blau, am Saum gelbl.; ☉; 7 bis 8; Ty., Kr. u. s. w.
—. V., 1; Heidepfl.: Azaléa procūmbens L.; s. Nr. 1680.
—. „ Glockenblümler: Campanŭla pusilla Haenke; s. Nr. 1681.
—. V., 1; Glockenblümler: C. caespitōsa Scop.; s. Nr. 2533.
—. „ „ C. pubēscens Schmidt; s. Nr. 1682.
—. „ „ C. linifolĭa Lmk.; s. Nr. 1683.
—. „ „ C. carnĭca Schiede; s. Nr. 1684.
—. „ „ C. thyrsoidĕa L.; s. Nr. 1685.
—. „ „ Phyteuma michelĭi All.; s. Nr. 1686.
2592. „ „ Ph. scheuchzēri All. Scheuch-

*) Nach Traunsteiner gedrungene Hochgebirgsform von Poa nemoralis L. (s. Nr. 1002).

zer's Teufelskrallen. Bltr. entfernt- und klein-sägezähn. bis ganzrand.; unterste Deckbltr. lineal., länger als das kug., mehrblüt. Köpfchen; Bl. blau; Narben meist 3; 4; 7 bis 8; Ty., Kr.

—. V., 1; Glockenblümler: Ph. siebēri Spr.; s. Nr. 1687.

2593. „ „ Ph. globulariaefolium Sternb. et Hoppe. Kugelblumenblättriger T. Bltr. alle verk.-eif., auch verk.-längl., fast spatelf., an der Spitze 3- bis 4-zähn.; Deckbltchn. herzeif., gewimp., sehr stumpf oder abgerund.-2zähn., kürzer als das runde, armblüt. Köpfchen; Bl. blau; 4; 7 bis 8; Oe., Kä., Ty.*)

2594. V., 1; Glockenblümler: Ph. hemisphäricum L. Halbrunder T. Bltr. schmal-lineal., fast ganzrand., kahl; Deckbltchn. eif., mehr oder weniger lang-zugesp., wimperrand., meist kürzer, als das kug. Köpfchen; Bl. blau; 4; 7 bis 8.

—. V., 1; Geisblattpfl.: Lonicēra coerulĕa L.; s. Nr. 1688.

—. „ Veilchenpfl.: Viŏla tricŏlor L.; s. Nr. 525.

—. „ „ V. lutĕa Sm.; s. Nr. 2505.

2595. „ „ V. alpīna Jacq. Alpenveilchen. St. kurz oder fehlend, kahl; Bltr. rundl.-eif., an der Basis herzf.-ausgeschn.; Nebenbltr. lineal-lanzettl., ganzrand.; Bl. groß, tief-violet, die 2 seitl. Bltr. an der Basis gelbl., mit gelbl. Barte, das unterste 1/3 gelb, violet-geadert; 4; 7 bis 8; Oe., St.**)

—. V., 2; Enzianpfl.: Gentiāna lutĕa L.; s. Nr. 2506.

2596. „ „ G. purpurĕa Vill. (Coilanthe purp. Borkh.) Roter Enzian (Tupfen-E.). St. unten walzenf., oben undeutl.-4kant.; grundst. Bltr. rinnig-gestielt, eif.- oder ellipt., stengelst. sitz., halb umfass.; K. scheidenartig-längsspalt., spitzzähn.; Kr. 6spalt., glock., Lappen eif., von 1/3 Röhrenlänge, innen gelbl., außen purpurn-punkt.; 4; 7 bis 8; Schweiz.

—. V., 2; Enzianpfl.: G. pannonĭca Scop.; s. Nr. 2507.

—. „ „ G. acaulis L.; s. Nr. 1690.

2597. „ „ G. punctāta L. Punktirter E. Untere Bltr. ellipt., gestielt; K. glock.; Blkr. 6spalt., kahlschlundig, glockig-röhrig, hellgelb, schwarz-punkt.; Zipf. des Saumes von 1/4 Röhrenlänge; 4; 7 bis 9; Sudeten, Süddeutschl.

---

*) Ist wol nur Abart von Ph. pauciflorum L.?

**) Eigentlich nur Zwergform von V. tricolor L.!

2598. V., 2; Enzianpfl.: G. imbricāta Froel. Büſchelblättriger E. St. äſtig, raſenbildend, kant.; Bltr. fleiſch., ſitz., gedrängt, ſich deckend; Bl. einzeln, gipfelſt., tiefblau; K. trichterf., auf 1/3 ungleich-5ſpalt., lanzettl.-lappig; Kr.-ſaum von 1/3 Röhrenlänge, eilanzettl.-gelappt; 4; 7 bis 8; St., Ty., Kr.

—. V., 2; Doldenpfl.: Astrantĭa major L.; ſ. Nr. 1157.

2599. „ „ Eryngĭum alpīnum L. Alpen-Mannstreu. St. oben blau, wiederholt-3theil.-äſtig, gefärbt; untere Bltr. herzf., langgeſtielt, obere handf.-3- bis 5lapp., ſitz., umfaſſ.; Wrz. knollig; Bl. weiß oder bläulich; 4; 7 bis 8; Kä., Kr. u. ſ. w.

2600. V., 2; Doldenpfl.: Bupleurum graminifolĭum Vahl. Grasblättriges Haſenöhrchen. St. ſteif, einfach, faſt nackt; grundſt. Bltr. zalr., grasartig, ſtengelſt. 1 bis 2, halb-umfaſſ., ſchwertf.; Hüllbltchn. lanzettl., lang-zugeſp.; Hüllchenbltr. nicht verwachſen; Bl. gelb; Frucht-Hauptrippen geflüg.; 4; 7 bis 8; Kä., Kr., Ty.

2601. V., 2; Doldenpfl.: Turbith matthiōli Tausch (Seseli turbith L.). Matthioli's Turbit. Wrzſtock braunſchupp.; St. walzenf., hin- und hergebog., geſtreift, kahl; Bltr. 2- bis 3fach-gefied., Fiedern lineal., faſt fadenf.; Bl. weiß; ♂; 7 bis 8; St., Kr.

—. V., 2; Doldenpfl.: Meum mutellīna Gaertn.; ſ. Nr. 1618.

—. „ „ Peucedănum ostruthĭum L.; ſ. Nr. 1626.

2602. „ „ P. rablēnse Koch. Kärnthener Harſtrang. St. gefurcht; Bltr. 3fach-3zäl.-gefied., Bltchn. tief-fiederſpalt., Fetzen ſchmal-lineal.; Hüllbltchn. lineal.-pfriemf., hautrandig; Bl. weiß; Fr. ellipt., breit-geflüg.; 4; 7 bis 8; Kä., Kr.

—. V., 2; Doldenpfl.: Heraclēum sibirĭcum L.; ſ. Nr. 2145.

2603. „ „ Laserpitĭum alpīnum W. et K. (L. aquilegifolĭum DC.). Alpen-Laſerkraut. St. walzenf., fein-geſtreift, kahl; Bltr. 3zäl.-dopp.-gefied., auch dopp.-3zäl., Bltchn. faſt eif., ungleich-ſpitzgezähnt, kahl; Doldenſtralen kahl; Bl. weiß; Fr. eilängl., gleichf.-geflüg.; 4; 7 bis 8; Kr.

2604. V., 2; Doldenpfl.: L. gaudinĭi Mor. Akeleiblättriges L. St. walzenf., geſtreift; grund- und untere ſtengelſt. Bltr. 3zäl.-dopp.-gefied. oder 3zäl.-3fach-gefied.; Fiedern ei- oder herzf., ganz oder 2- bis 3ſpalt.; Doldenſtralen ungleich, kahl; Bl. weiß; 4; 7 bis 8; Ty.

2605. V., 2; Doldenpfl.: L. siler L. Gebräuchliches L. St. walzenf., fein-geſtreift; Bltr. 3zäl.-dopp.- oder 3fach-gefied.,

blaugrün, kahl; Fiedern lanzettl. oder lanzett-lineal., 3spalt. oder ungetheilt, ganzrand., mit gebog., seitl. Hauptnerven; Bl. weiß; Fr. längl.; 4; 7 bis 8.

2606. V., 2; Doldenpfl.: L. peucedanoïdes L. Harfstrangartiges L. St. und Bltr. wie bei vor., aber die Bltchn. längl.- bis lineal-lanzettl., ganzrand., die von der Basis der Mittelrippe ausgeh. Hauptnerven mit dem Rande parallel; Griff. fast aufr.; Bl. weiß, anfangs rötl.; 4; 7 bis 8; Kä., Kr., Ty.

2607. V., 2; Doldenpfl.: L. nitĭdum Zanted. Glattes L. St. kurz-steifharig, gestreift; Bltr. am Stiel, am Rande und unters. zerstreut-borstig, dopp.-gefied.; Fiedern längl., fiederspalt.-gelappt, scharf-sägezähn.; Hüllbltchn. lanzettl., vorn 2- bis 3spalt.; Bl. weiß; 4; 7 bis 8; Ty.

—. V., 2; Doldenpfl.: Malabaĭla hacquetii Tausch; s. Nr. 1689.

—. V., 5; Leinpfl.: Linum viscōsum L.; s. Nr. 1691.

—. „ „ L. alpīnum L.; s. Nr. 1692.

2608. VI., 1; Semede: Juncus arctĭcus Willd. Nordische Binse. Schaft nackt, fast glänz.-glatt, steif; Spirre seitl., einfach, kopf.-zsgezog., meist 1blüt.; Blütensch. fast stechend; Scheiden glänz.-muschelbraun; Blütenstielchen einfach, 1blüt.; 4; 7 bis 8; Ty.

—. VI., 1; Semede: J. castanĕus Sm.; s. Nr. 1693.

—. „ „ J. jacquīni L.; s. Nr. 1694.

—. „ „ Luzŭla forstēri Desv.; s. Nr. 822.

—. „ „ L. spadicĕa Desv.; s. Nr. 1695.

2609. „ Lilienpfl.: Allĭum ochroleucum W. et K. Gelblichweißer Lauch. Zwiebel häutig, längl., schief; Häute an der Spitze zerschlitzt; Schaft walzenf.; Bltr. grundst., lineal., stumpf, oberf. flach, unterf. gewölbt, 3nervig; Bl. gelblichweiß; 4; 7 bis 8; Kr.

—. VI., 1; Lilienpfl.: A. nigrum L.; s. Nr. 1696.

—. „ „ Lilĭum bulbifĕrum L.; s. Nr. 1051.

—. VI., 3; Knöterichpfl.: Rumex alpīnus L.; s. Nr. 1697.

2610. „ „ R. arifolĭus All. Aronblättriger Ampfer. Klappen rundl. herzf., an der Basis mit herabgebog. Schuppe; Bltr. spieß-pfeilf., an der Basis 5- bis 7nervig; Nebenbltr. ganzrand.; 4; 7 bis 8; Süddeutschl.*)

—. VIII., 1; Seidelpfl.: Daphne striāta Portenschl.; s. Nr. 1698.

---

*) Eine niedere Form mit rundlicheren Blättern und schwächer angedeuteten Nerven ist R. nivalis Hegetschw.!

—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: Epilobium rosmarinifolium Haenke; ſ. Nr. 2509.
—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: E. alpinum L.; ſ. Nr. 2510.
—. X., 1; Heidepfl.: Arbutus alpina L.; ſ. Nr. 824.
—. „ „ Rhododendron hirsutum L.; ſ. Nr. 1699.
—. X., 2; Nelkenblütler: Dianthus barbatus L.; ſ. Nr. 2511.
2611. „ „ D. sylvestris Wulff. Wilde Nelke. Wrzköpfe ſehr kurz, dichte Raſen bildend; die 2 Kelchdeckſchuppen rundl.-eif., mit ſehr kurzer, 3eck., aufgeſetzter Spitze; Kzähne ellipt.; Krbltr. nicht gebärt., roſen- bis purpurrot, dunkler-geadert; 4; 7 bis 8; Kä., Kr., Ty., Schweiz.
—. X., 2; Nelkenblütler: Gypsophila repens L.; ſ. Nr. 2482.
2612. „ „ Smegmanthe ocymoides Fenzl (Saponaria ocym. L.). Rundblättriger Seifenquendel. Rauhharig; St. aus dem kurzen, holz., ligengen Stocke mehre, von rückw.-ſteh. Härchen ſchärfl.; K. meiſt braun-, Bl. fleiſchrot; 4; 7 bis 8; ſüdl. A.
Varirt: S. pyrenaica Kitt. hb. (Bltr. unterſ. und am Rande ſtark-behart), S. glandulosa Kitt. (Bltr. drüſigſcharf).
—. X., 2; Steinbrechpfl.: Saxifraga rotundifolia L.; ſ. Nr. 1700.
—. X., 2; Steinbrechpfl.: S. muscoides Wulf.; ſ. Nr. 1701.
2613. „ „ S. tenella Wulf. Zarter Steinbrech. Blütenſtgl. 2- bis 5blüt.; untere Bltr. gehäuft, ſitz., dachzieg., lineal., vor der Spitze ſchwach-1punktig, an der Baſis ſtark-gewimp., obere ſehr klein, ſtachelſp.; Kelchlappen faſt oberſt.; Bl. weißl.; 4; 7 bis 8; Kä., Kr., St.
2614. X., 2; Steinbrechpfl.: S. cotylēdon L. Nabelkrautartiger St. Roſettenbltr. am Rande knorp.-ſägezähn., vielgrubig; St. aufr., drüſenharig; Bl. in gipfelſtänd., piramid., mehräſt. Riſpe, weiß, mit oder ohne Punkte, zuweilen grünlichweiß; 4; 7 bis 8; St. (Eiſenerz).
2615. X., 2; Steinbrechpfl.: S. cuneifolia L. Keilblättriger St. Untere Bltr. roſettig-gehäuft, faſt kreisf., raſch keilf. in den breiten, längl. Stiel zulauf., Zähne vorw.-gerichtet; Krbltr. weiß, an der Baſis mit 2 gelben Flecken; 4; 7 bis 8; Süddeutſchl.
—. X., 3; Nelkenblütler: Silene quadrifida L.; ſ. Nr. 1702.
—. „ „ S. saxifraga L.; ſ. Nr. 2429.
—. „ „ S. nutans L. (var. livida Willd.); ſ. Nr. 1112.
—. X., 5; Nelkenblütler: Cerastium suffruticosum L.; ſ. Nr. 1704.

—. X., 5; Nelkenblütler: C. alpinum L.; ſ. Nr. 1627.

2616. „ „ C. latifolium L. Breitblättriges Hornkraut. Stämmchen liegend, dicht-rasig; St. nebſt den Bltrn. meiſt zott. oder weichhaarig; Blütenſt. zur Blütezeit aufr., auch aufſteig., nach dem Abblühen überhäng.; Deckbltr. grün, nur an der Spitze häutig; Bl. weiß; 4; 7 bis 8; Süddeutſchl.

Varirt: C. glabriusculum Koch (St. kahl; Bltr. blos gewimp.), C. latifolium alpestre Kitt. (Bltr. ellipt., zott.; St. desgl.), C. lancifolium Kitt. (Bltr. lanzettl.; Blütenſt. kurz), C. glaciale Gaud. (Bltr. ſehr klein, eif., ſtumpf; Blütenſt. kurz), C. pedunculatum Gaud. (St. liegend; Bltr. längl.; Blütenſt. lang, aufſteig.).

2617. X., 5; Nelkenblütler: Alsine laricifolia Whlbg. Wahre Alſine. St. liegend, holz., äſtig; Bltr. ſchmal-lineal., pfriemf., ſtachelſp., nervenlos; Kbltchn. lineal-längl., ſtumpf, 3nervig; Krbltr. nervenlos, weiß, durchſcheinend-geadert; 4; 7 bis 8; Oe., Kr., Ty.

Varirt: incana Kitt. (Pfl. grauhaarig), Arenaria liniflora L. (oben drüſenhaarig).

2618. X., 5; Nelkenblütler: A. austriaca M. et K. Oeſterreichſche A. St. liegend; Bltr. ſchmal-lineal., flach, 1- bis 3nervig; Kbltchn. aus breiter Baſis lanzettl., ſpitz; Krbltr. vorn etwas ausgerand., weiß; 4; 7 bis 8; Oe., Kä., Ty.*)

Varirt: A. filicaulis Welw. (St. fadenf.-verläng., langgliederig).

—. X., 2; Nelkenblütler: A. stricta Whlbg.; ſ. Nr. 1703.

2619. X., 5: Dickblattpfl.: Sedum hispanicum L. Spaniſche Fetthenne. Stglbltr. halb-walzenf., längl., lineal., kurzzugeſp.; Skorpionzyme kahl, meiſt 2- bis 5äſtig, lockervielblüt., beblätt.; Blbltr. 6, weiß, mit rotem Mittelnerv; Stbgf. 12; ♂: 7.**)

—. X., 5; Dickblattpfl.: S. atratum L.; ſ. Nr. 1705.

—. „ „ S. dasyphyllum L.; ſ. Nr. 1357.

2620. XI., 5; „ Sempervivum funkii A. Br. Funk's Hauswurz. Roſettenbltr. längl., kurzzugeſp., beiderſ. drüſenhaarig, am Rande langgewimp., an der Spitze bärtig; Krbltr. lanzettl., purpurrot, 2- bis 3mal ſo lang, als die Kelchlappen; 4; 7 bis 8.

*) Die A. villarsii Koch, welche in der ſüdlichen Schweiz vorkommt, unterſcheidet ſich durch die Kapſel, welche ſo lang oder kürzer als der Kelch iſt!

**) S. glaucum W. et K. hat graugrüne, lineal-längliche Blätter, einen äſtigen Stengel und eine drüſenhaarige Zyme!

—. XI., 5; Dickblattpfl.: S. sobolifĕrum Sims.; s. Nr. 2167.
—. XII., 2; Rosenpfl.: Pyrus chamaemespĭlus Lindl.; s. Nr. 1619.
—. XII., 3; Rosenpfl.: Dryas octopetăla L.; s. Nr. 2541.
—. " " Rosa alpīna L.; s. Nr. 1620.
—. " " R. rubrifolĭa Vill.; s. Nr. 1215.
—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: Aquilegĭa pyrenaĭca DC.; s. Nr. 1711.
—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: Aconītum napēllus L.; s. Nr. 1628.
2621. XIII., 3; " Atragĕne alpīna L. Alpen-Waldrebe. St. kletternd; Bltr. dopp.-3zäl.-gesied., Bltchn. ungetheilt, ungesägt; Krbltr. zalr., spatelig, kleiner als der K., letzterer blau, violet; Bl. gelblich; ♄; 7 bis 8; ⧧; ‡; A., Schl. (angepflanzt im wroniner Walde bei Kosel).
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Thalıctrum simplex L.; s. Nr. 1600.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Anemōne narcissiflōra L.; s. Nr. 827.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: A. alpīna L.; s. Nr. 771.
. " " Ranuncŭlus alpēstris L.; s. Nr. 1706.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: R. traunfellnēri Hoppe; s. Nr. 1707.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: R. aconitifolĭus L.; s. Nr. 1709.
—. " " R. montānus Willd.; s. Nr. 1710.
2622. XIV., 1; Lippenblümler: Melīssa alpīna Benth. (Calamīntha alp. Lmk., Thymus alpīnus L.). Alpen-Melisse (Alpentimian). St. ein lig., holz. Stock; Aeste weichharig; Bltr. ganzrand. oder vorn angedr.-spitzsägezähn., weichharig; Kmdg. zur Fruchtzeit offen; Bl. rosenrot, violet bis weiß; ♃; 7 bis 8; ⚡; ‡; A.*)
—. XIV., 1; Lippenblümler: Betonĭca officinālis L.; s. Nr. 1027.
2623. XIV., 1; Lippenblümler: B. alopecūros L. Gelbweiße Betonie. Bltr. herzf., fast 3eck.-grobgezähnt; K. rauhharig, oberw. netzaderig; Kr. kahl, Lippen absteh., außen zott.-gebärt.; Stbgf. etwas länger, als die halbe Oberl.; Bl. gelblichweiß; ♃; 7 bis 8; Sg., Ty., St., Kä. u. s. w.
2624. XIV., 2; Rachenblümler: Pediculāris hacquetĭi Graf. Langähriges Läusekraut. Bltr. gesied.; K. vorn aufgeschlitzt-halb-2spalt., zott., 5zähn., Zähne kurz-3eck.; Bl.

*) Die Alpen-Melisse macht einen Theil des „Schweizerthee's" aus und wird von den Alpenbewohnern vorzüglich gegen Brustkrankheiten gerühmt!

schwefelgelb; Helm fast grade, fast kahl, länger als die Unterl.; längere Stbgf. gebärt.; 4; 7; †; Kr.

2625. XIV., 2; Rachenblümler: P. rosea Wulf. Rosenrotes L. Bltr. gefied.; K. zott., 5zähn., Zähne lanzettl., spitz, ganzrand.; Helm zott., fast länger als die Unterl.; Bl. rot; 4; 7; †; Kä., St., Ty.

2626. XIV., 2; Rachenblümler: P. fasciculāta Bellard. Büschel iges L. Bltr. tief-dopp.-fiederspalt.; K. glock., tief-5spalt., dicht-weichharig; Kelchlappen blattartig, fiederspalt., grade; Helm kurz-kegelf., kürzer als die Unterl.; Bl. purpurrot bis weiß; 2 obere Stbf. über der Mitte gebärt.; St. nebst den Bltrn. weichharig; 4; 7 bis 8; †; Ty.

—. XIV., 2; Rachenblümler: Melampyrum sylvatĭcum L.; s. Nr. 2525.

—. XIV., 2; Rachenblümler: Bartschĭa alpīna L.; s. Nr. 1612.

—. " " Erīnus alpīnus L.; s. Nr. 1712.

2627. XV., 1; Kreuzblütler: Alyssum wulffeniānum Bernh. Wulffen's Steinkraut. Kurz-graufternharig; St. lig., zuletzt holz.; Bltr. lanzettl. oder verk.-eif.; K. abfall.; längere Stbf. bis über die Mitte hinauf geflüg., kürzere mit häutigem Anhängsel an der Basis; Bl. gelb; Schötchen eilängl., kahl werdend, langgriffelig; 4; 7 bis 8; A.*)

—. XV., 1; Kreuzblütler: Draba stylāris Gay; s. Nr. 1713.

—. " " Biscutēlla laevigāta L.; s. Nr. 2410.

—. XV., 2; " Arăbis pumīla Jacq.; s. Nr. 1714.

—. " " A. bellidifolĭa Jacq.; s. Nr. 1715.

—. " " A. saxatĭlis All.; s. Nr. 1716.

2628. " " Cardamīne alpīna Willd. Alpen-Schaumkraut. Wrz. walzenf.; St. aufsteig., einfach, nebst den Bltrn. kahl; grundst. Bltr. eif., ganzrand., stengelst. sitz., ellipt., ganz oder selten die oberen 3lapp.; Bl. weiß; Schoten besenf.-zsgezog.; 4; 7 bis 8.

—. XV., 2; Kreuzblütler: C. resedifolĭa L.; s. Nr. 2513.

—. " " Erysĭmum cheiränthus Pers.; s. Nr. 829.

2629. XV., 2; Kreuzblütler: Brayă alpīna Hoppe. Ganzblättrige Braye. Bltr. lineal-lanzettl., auch lineal-längl., ungetheilt, ganzrand. oder wenig-gezähnt; Bl. weiß, beim trocknen lila, sitz.; 4; 7; A.

2630. XV., 2; Kreuzblütler: B. pinnatifĭda Koch (Sisymbrĭum pinnatifĭdum DC.). Fiederblättrige B. Bltr. buchtig-

*) Ist eigentlich nur Zwergform von A. campestre DC.! (Nr. 580.)

fiederspalt.; Schirmähre nicht beblätt.; Bl. gestielt, Stiel fast so lang als der K., weiß; 4; 7 bis 8; Ty.

—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Onōnis colūmnae All.; s. Nr. 1717.
—. " " O. rotundifolĭa L.; s. Nr. 830.
—. " " Trifolĭum badĭum Schreb.; s. Nr. 1718.

2631. XVII., 4; Hülsenpfl.: Phaca alpīna Jacq. (Astragălus alpīnus L.). Aestiges Knollenkraut (Berglinse). St. aufr., steif, kurzästig; Bltr. vielparig-gefied.; Nebenbltr. lineal-lanzettl.; K. schwarzharig; Bl. grünlichgelb; Hülse hängend; 4; 7 bis 8; Sg., Kä., Ty.

2632. XVII., 4; Hülsenpfl.: Ph. astragalīna Pers. (Astragălus alpīnus L.). Stragel-K. St. niederlig., weichharig; Bltr. vielparig-gefied., angedr.-behart, Bltchn. eif.; Bl. allseitswendig, nick., endl. herabhäng., himmelblau, an der Basis weiß; Flügel vorn ganzrand., kürzer als das Schiffchen und dieses wenig kürzer als die absteh. Fahne; 4; 7 bis 8; Sg., Kä. u. s. w.

—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Ph. frigĭda L.; s. Nr. 1719.
—. " " Ph. austrālis L.; s. Nr. 1720.
—. " " Oxytrŏpis montāna DC.; s. Nr. 1721.

2633. " " O. campēstris DC. (Astragălus camp. L.). Feld-Fahnwicke. Stengellos, fast zott.; Bltchn. eif. oder lanzettl., spitz; Nebenbltr. an den Blattst. gewachsen; Bl. ocker- bis schmutzig-gelb, selten schmutzigviolet, Schiffchen rötl. oder violet oder grün-gefleckt, Fahne herzf.; Deckbltr. eilanzettl.; 4; 7 bis 8.

2634. XVII., 4; Hülsenpfl.: Astragălus purpurĕus Lmk. Purpurblumiger Stragel. St. ligend, behart; Bltchn. eilanzettl., ausgerand., 2spitz.; Bl. purpurviolet; Eierstock im K. fast sitz.; Hülse aufr., eif., rauhharig; 4; 7 bis 8; Ty.

—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Coronīlla vaginālis Lmk.; s. Nr. 1596.
—. " " Hedysărum obscūrum L.; s. Nr. 1649.
—. " " Lathyrus ochracĕus Kitt.; s. Nr. 833.

2635. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperīcum richēri Vill. Richer's Hartheu. St. fast einfach, unten walzenf., oben schwach-2leistig, kahl; Bltr. sitz., halb-umfass., eif. oder längl., abgerund.-stumpf, zuweilen gestutzt oder seicht-ausgerand., nicht durchscheinend-punkt., am Rande zalr.-schwarzdrüsig; Deckbltr. eilängl., nebst den Kelchlappen schwarz-punkt.; Bl. gelb; Samen längs-wogenstreifig; 4; 7 bis 8; Kr. (Schneeberg).

—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracium bifurcum M. B.; s. Nr. 1608.
—. XIX., 1; Korbblütler: H. aurantiacum L.; s. Nr. 1722.
—. " " H. incisum Hoppe; s. Nr. 1723.
—. " " H. alpinum L.; s. Nr. 2514.
—. " " H. villosum L.; s. Nr. 2515.

2636. " " H. cydoniaefolium Vill. (H. strictum Fr.). Quittenblättriges Habichtskraut. St. aufr., beblätt., rauhharig; Aeste doldentraub., beblätt., sperrig-abstehend.; Bltr. fast häutig, die wenigen grundst. und die unteren stengelst. gestielt, obere halb-umfass.; Bl. gelb; Fr. braunrot; 4; 7 bis 8.

2637. XIX., 1; Korbblütler: H. lycopifolium Froel. Wolfsfußblättriges H. St. rauhharig, oben risp.-verästelt; Bltr. umfass., 3nervig, eif., in der Mitte eingeschn.-gezähnt, untere an der Basis verschmäl.; Köpfchen und Hüllen unten zott., drüsenharig; Hüllbltchn. an der Spitze kahl; Bl. gelb; 4; 7 bis 8; A., Bd., E.

2638. XIX., 1; Korbblütler: H. amplexicaule L. Stengelumfassendes H. Klebrig, gelb-drüsenharig; St. fast von der Basis an ästig und beblätt.; Bltr. grob-sägezähn., stengelst. mit abgerund. Basis umfass.; Hüllbltchn. meist langzugesp.; Bl. gelb; 4; 7 bis 8.

Varirt: H. cerinthoides Vill. (H. intybaceum Hoppe, Sturm; Bltr. schmal-lanzettl., stengelst. herzf.), H. pulmonarioides Vill. (Stglbltr. eif., sitz. oder halb-umfass.), H. pseudocerinthe Hegetschw. (Bltr. drüsig-gewimp.; Köpfchen wenige), H. macrophyllum Froel. (Bltr. breit-eif., gezähnt, drüsig-gewimp.; St. sperrig-ästig).

2639. XIX., 1; Korbblütler: H. albidum Vill. (H. intybaceum Jacq.). Weißliches H. Drüsig-schmierig; St. 1- bis 3köpf.; Bltr. lineal-lanzettl., grob-gezähnt, sitz.; Blütenst. nach oben verdickt; Hülle nach außen mit 3 bis 4 absteh., größeren Bltchn.; Bl. gelb, wie die ganze Pfl. balsamisch-riechend; 4; 7 bis 8; A., Vogesen.

2640. XIX., 1; Korbblütler: H. flexuosum W. et K. Bogiges H. St. hin- und hergebog., beblätt., 1- bis 3köpf.; Bltr. etwas zott., grundst. schmal-lanzettl., geschweift-schwach-gezähnt, Zähne langharig, mit schwarzdrüs. Spitze, stengelst. 3 bis 4, sitz.; Hülle zott.; Blütenst. beschuppt; Bl. goldgelb; 4; 7 bis 8.

Varirt: angustifolium Kitt. (schmalblättr., 1- bis 2köpf.), latifolium Kitt. (breitblättr.; grundst. Bltr. 2 bis 4,

breit-lanzettl., gestielt: H. dentātum Hoppe' oder fast sitz.: H. bupleuroïdes Bell.).

2641. XIX., 1; Korbblütler: H. candolleï Froel. Candolle's H. Zottig; St. ästig, hin- und hergebog.; Aeste verläng., beblätt., 1köpf.; Bltr. lanzettl., schwach-gezähnt, graugrün, oberf. weiß-schülferig; Hülle sehr zott., Bltchn. stumpf; Bl. gelb; 4; 7 bis 8; Ty.

2642. XIX., 1; Korbblütler: H. pilōsum Schleich. Langhariges H. Zottig; St. beblätt., oben langharig, filz. und drüsig, 1- bis 2köpf.; Bltr. lanzettl.-spitz, etwas gezähnt, schwachzott.; Kronsaum kurzharig; Bl. gelb; 4; 7 bis 8; Allgäu.

2643. XIX., 1; Korbblütler: H. graminifolĭum DC. (H. bupleuroïdes Gmel.). Grasblättriges H. Fast kahl, blaugrün; St. ästig, beblätt.; Aeste an der Spitze schupp. und behart; Bltr. lineal., unterf. fast kahl, grundst. an der Basis etwas gewimp.; Bl. gelb; 4; 7 bis 8.

Varirt: linearifolĭum Froel. (grundst. Bltr. stielverschmäl., Blütenst. oben verdickt), polyphȳllum Schleich. (Spr.; St. dicht-beblätt., wenigköpf.; Bltr. lanzett-lineal., gezähnt), glaberrĭmum Spr. (St. rispig-ästig, vielköpf.; Bltr. verläng.-lanzettl., ganzrand.), macrocephălum Froel. (Köpfchen wenige, sehr groß).

—. XIX., 1; Korbblütler: Crepis incarnāta Less.; s. Nr. 834.

—. " " C. grandiflōra Willd. enum.; s. Nr. 2526.

2644. XIX., 1; Korbblütler: C. aurĕa Cass. (Leontŏdon aurĕum L.). Safrangelbe Grundfeste. Wrzstock walzenf.; Schaft 1köpf., meist blattlos, an der Spitze nebst der Hülle schwarz-zott.; Bl. gold- oder safrangelb; Schließfr. kurz-geschnäb.; 4; 7 bis 8.

—. XIX., 1; Korbblütler: Mulgedĭum alpīnum Less.; s. Nr. 2528.

2645. XIX., 1; Korbblütler: Serratŭla rhapontĭcum DC. fl. fr. (Centaurēa rhapontĭca L., Rhapontĭcum scariōsum DC. prodr.). Klettenblättrige Scharte. Bltr. oberf. kahl, unterf. graufilz.; St. 1köpf.; äußere Hüllbltchn. in ein längl., oft rundl., häutiges Anhängsel sich endigend; Bl. purpurrot; 4; 7 bis 8; südl. A.

—. XIX., 1; Korbblütler: Cardŭus personāta Jacq.; s. Nr. 2516.

2646. XIX., 1; Korbblütler: C. arctioïdes Willd. (Arctĭum carduëlis L.). Rotspitzige Distel. St. wenig-ästig, dornig-kraus-geflügt.; Aeste verläng., fast blattlos, filz.,

1köpf.; Blattlappen borſtig-gewimp., kahl; Blütenköpfchen einzeln, aufr., rot; Hüllblſchn. kahl, die inneren gefärbt; 4; 7 bis 8; Kä., Kr.

2647. XIX., 1; Korbblütler: Saussurĕa alpīna DC. (Serratŭla alp. L.). Alpen-Soſſüree. Blr. flach, unterſ. zott.-filz., untere eilanzettl., obere ellipt.- oder lineal-lanzettl., ſcharfzähn. oder ganzrand.; Blütenköpfe eif., dicht-doldentraub.; Hüllblſchn. glänz.-wollig; Bl. purpurn; 4; 7 bis 8; Ty., Sg., Kä., St., Kr.

2648. XIX., 1; Korbblütler: S. discŏlor DC. (Serratŭla disc. Willd.). Zweifarbige S. Blr. unterſ. dicht-ſchneeweiß-filz., untere herzf., grob-gezähnt, obere faſt ſitz., ganzrand.; Hülle zott., faſt walzenf.; Bl. purpurn; 4; 7 bis 8; Kä., St., Oe. u. ſ. w.

2649. XIX., 1; Korbblütler: Carlīna acanthifolĭa All. Akantus-blättrige Eberwurz. Stengellos; grundſt. Blr. beiderſ. etwas ſteifharig, Fiedern eck.-gezähnt; Köpfchen 1, ſehr groß; Bl. ſchwefelgelb, braun werdend; 4; 7 bis 8; Kr. (Platnik).

2650. XIX., 1; Korbblütler: C. lanata L. Wollige E. St. 1- bis 4köpf., wollig; Blr. lanzettl., buchtig-dornzähn.; innere Hüllblſchn. an der Baſis ſchmäler und kahl, vorn dornig, purpurrot; Bl. weißl.; ☉; 7 bis 8; Kr. (Luſin piccolo).

—. XIX., 1; Korbblütler: Adenostўles albifrons Rchb.; ſ. Nr. 2520.

2651. XIX., 1; Korbblütler: A. alpīna Bl. et Fing. (Cacalĭa alp. L., Ad. glabra DC. prodr.). Aechter Alpendoſt. Blr. nieren-herzf., dopp.-gezähnt, beiderſ. kahl; Blattſt. an der Baſis nicht geöhrt; Blütenköpfe doldentraub., faſt gleichhoch; Bl. 3 bis 5 in jedem Köpfchen, meiſt nur mit 4 Antheren, rötl., 4theil.; 4; 7 bis 8; A.

2652. XIX., 2; Korbblütler: Senecĭo lyratifolĭus Rchb. Leierblättriges Kreuzkraut. St. nebſt den Blrn. faſt kahl oder flockig; untere Blr. mit ſchwach-geflüg., etwas gezähn., rinnigem Stiele und 3 bis 6 kleineren Seitenlappen, letztere vorn nach abwärts mit kleinerem Einſchnitt und außerdem noch gezähnt; ſtengelſt. Blr. mit mehrtheil. Oehrchen umfaſſ.; Blütenäſte lang, dünn, nackt; Deckblſchn. meiſt auf den Stiel herabgedr.; Bl. blaßgelb; 4; 7 bis 8; Oe., Ty., Schweiz.

2653. XIX., 2; Korbblütler: S. doronĭcum L. (Solidāgo doron. L.). Gebirgs-K. Wrzſtock ſchief, dick; St. aufr., einfach, 1- bis 8köpf., nebſt den Blrn. flockig, verkahlend; Hülle

weitglock., kahl; Stralbl. viele; Fr. kahl; Bl. pomeranzengelb; 4; 7 bis 8.

Varirt: glabrēscens Kitt. (fast völlig kahl, 1- bis 3-köpf., Bltr. klein-gezähnt), polycephălus DC., S. apennīnus Tausch, S. orientālis Ten.; etwas flock., 3- bis 8köpf., Bltr. grob-gezähnt; fette Form), rotundifolĭus Lapeyr. (untere Bltr. rundl.-eif., St. wenigköpf.), tomentōsus Lap. (wolliggrau, wenigköpf.).

—. XIX., 2; Korbblütler: S. alpīnus Scop.; s. Nr. 2517.

—. " " Cinerarĭa crispa Jacq.; s. Nr. 1623.

—. " " Doronĭcum pardaliānches L.; s. Nr. 707.

2654. XIX., 2; Korbblütler: Aronĭcum scorpioīdes L. Alpen-Fallkraut (Schwindelkraut). Gegliedert-rauh-spitzharig; St. einfach, 1köpf.; Bltr. entfernt- und mehr oder weniger deutl. gezähnt und gewimp., grundst. gestielt, stengelst. umfass.; Bl. groß, gelb, zuweilen ohne Stral; 4; 7 bis 8.

Varirt: A. bauhīni Rchb. (St. nebst den Bltr. rauhharig; grundst. Bltr. sehr lang-gestielt, eif.), A. glaciāle Rchb. (St. gefüllt, nur unter den Köpfchen leer; Pfl. rauhharig; Bltr. steif; Gletscherform), A. scorpioīdes Koch (Hare der Blütenst. stumpf, genähert, geglied.; St. voll, weichharig; A. latifolĭum Rchb.: untere Stglbltrstiele geöhrt, Bltr. breit, Pfl. hoch; A. scorpioīdes Rchb.: Blattst. ohne Ohrläppchen), A. doronĭcum Rchb. (St. hohl, nebst den Bltrn. langglied.-rauhharig; A. clusĭi Koch).*)

—. XIX., 2; Korbblütler: Antennarĭa alpīna Gaertn.; s. Nr. 1724.

2655. XIX., 2; Korbblütler: Artemisĭa lanāta Willd. Wolliger Beifuß. Rasenbildend; Blütenstgl. höchst einfach; Bltr. grauseidenharig, untere gestielt, 3lapp., Lappen vieltheil.; Köpfchen kug., traubenst.; Hüllbltchn. eif., filz.; Bl. gelb; 4; 7 bis 8; Ty.

2656. XIX., 2; Korbblütler: Pyrĕthrum hallēri Willd. (Chrysanthĕmum atrātum L., Chr. coronopifolĭum Vill., Chr. ceratophylloīdes Koch synop.). Schwarzköpfige Bertramwurz. Untere Bltr. gestielt, obere sitz., an der Basis ganzrand., vorn breiter, eingeschn.-ungleich-grobsägezähn., auch ungleich-eingeschn.; Fiederlappen vorwärts-gerichtet, eif., ganz oder 2spalt., stachelsp. oder langzugesp.; Stral weiß; Scheibe gelb; 4; 7 bis 8; A.

*) Decandolle zieht A. glaciale und bauhini zu seinem A. scorpioides, während Koch diese zu seinem A. clusii (Tausch) bringt!

—. XIX., 2; Korbblütler: Leucanthĕmum atrātum DC.; ſ. Nr. 1725.

2657. XIX., 2; Korbblütler: Anthĕmis alpīna L. (Ptarmĭca oxylŏba DC.). Alpen-Hundskamille. St. aufr., einfach, walzenf., an der Baſis kahl; Bltr. 10- bis 12parig-fiedertheil.; Spreublttchn. häutig, lineal-längl., angefreſſen, braun-gefleckt; Bl. weiß; 4; 7 bis 8; De., Kr., Kä., St., Ty. *)

2658. XIX., 2; Korbblütler: Erigĕron alpīnus L. Alpen-Berufkraut. Kleine Raſen bildend; St. kahl oder wenig behart, einfach, oben 1- bis 2-, ſelten 3köpf., beblätt.; Bltr. 1nervig; Stralbl. von faſt dopp. Scheibenblütenlänge; Stral purpurn oder weißl.; 4; 7 bis 8.

Varirt: F. uniflōrus L. (grundſt. Bltr. ſpatelf., ſtengelſt. lineal., ſpitzl.; Hüllblttchn. weißzott.; ♀ ſämmtl. zungenf.), E. glabrātus Hoppe (grundſt. Bltr. oft ſpatelf.; St. 1-köpf.; ♀ wie bei vor.; Stral weißl.), E. oligocephălus Kitt. (St. 2- bis 3köpf.), E. grandiflōrus Hoppe (St. 1-köpf.; Hülle ſtarkzott.; Köpfchen dopp. ſo groß als gewöhnlich).

2659. XIX., 2; Korbblütler: Aster alpīnus L. Alpen-Aſter. St. einfach, 1köpf.; Bltr. behart, ſtumpf oder ſtumpfl., ganzrand., grundſt. ablängl.-ſpatelf., ſtengelſt. lanzettl.; Stral ſehr lang, himmelblau; 4; 7 bis 8; ↕; A. **)

—. XIX., 2; Korbblütler: Homogўne discŏlor Cass.; ſ. Nr. 1726.

—. XIX., 2; Korbblütler: H. alpīna Cass.; ſ. Nr. 868.

—. XIX., 3; „ Centaurēa montāna L.; ſ. Nr. 1526.

2660. XX., 1; Orchidee: Chamōrchis alpīna Rich. (Ophrys alp. L.). Alpen-Zwergſtändel. Knollen eif.; grundſt. Bltr. lineal.; St. nackt; Aehre kurz, mehrblüt.; Bl. gelblichgrün; Lippchen eif., beiderſ. 1zähn.; 4; 7 bis 8.

—. XXI., 3; Halbgras: Carex firma Host; ſ. Nr. 1730.

—. „ „ C. capillāris L.; ſ. Nr. 1731.

—. „ „ C. ferrugině Scop.; ſ. Nr. 1732.

—. XXII., 2; Weide: Salix lappōnum L.; ſ. Nr. 1733.

—. „ „ S. glauca L.; ſ. Nr. 1734.

—. XXII., 7; Dickblattpfl.: Rhodiŏla roseă L.; ſ. Nr. 1625.

—. XXII., 12; Zapfenfrüchtler: Junipĕrus nana Willd.; ſ. Nr. 883.

---

*) Ohne Zweifel gehören auch Ptarmica barrellieri et schouwii DC. hierher!

**) A. hirsutus Host iſt eine ſtark-behaarte Form, welche in Böhmen (Gletſchberg) vorkommt!

a. Auf den höchsten Alpen:

—. II., 1; Rachenblümler: Veronica aphylla L.; s. Nr. 1735.

2661. III., 1; Baldrianpfl.: Valeriana saliunca All. Piemontesischer Baldrian. ♀; Wrzstock dick, mehrköpf.; St. aufsteig. oder aufr., kahl, walzenf.; Bltr. kahl, stengelst. wenige, lineal., an der Basis etwas gezähnt; Gabelrispe gedrängt-doldentraubig; Bl. rötl., wohlriech.; 4; 7 bis 8; St. u. s. w.

2662. III., 2; Graspfl.: Avena distichophylla Vill. Fächerblättriger Hafer. Wrz. kriech.; Bltr. schmal, flach oder zsgerollt-rinnig, steiflich, langzugesp., an den Sprossen starr; Rispe gelappt; Aehrchen 2- bis 3blüt.; Axe kurz, wollharig; 4; 7 bis 8; Ty., St., Kä., Schweiz.

—. III., 2; Graspfl.: A. airoides Koel.; s. Nr. 1736.

2663. „ „ Festuca scheuchzeri Gaud. (F. pulchella Schrad.). Scheuchzer's Schwingel. Wrz. faserig-auslauf.; Halm beblätt.; Bltr. lineal-, langzugesp., flach, kahl, an der Randbasis schärfl.; Aeste hardünn, nicht scharf, zu 1 bis 2 in Wirteln, der kürzere 1- bis 3-, der andere 3- bis 7ährig; Aehrchen buntfarb., glänz.; 4; 7 bis 8.

—. III., 2; Graspfl.: F. spadicea L.; s. Nr. 1737.

2664. „ „ F. rhaetica Suter (F. poaeformis Host, F. pilosa Hall. fil.). Rhätischer S. Wrz. faserig; Halme rasig, am Grunde von Blattsch. umgeben; Bltr. rinnig-gefalt., borstenf.; Rispe offen, aufr., untere Wirteläste zu 5 bis 6; Fruchtk. an der Spitze kahl; 4; 7 bis 8.

—. III., 2; Graspfl.: Koeleria hirsuta Gaud.; s. Nr. 1738.

—. „ „ Sesleria microcephala DC.; s. Nr. 1739.

2665. „ „ S. sphaerocephala Ard. Kugelährige Sesleria. Wrzstock mehrköpf., Köpfe mit weißen Blattsch. dicht-bedeckt; Bltr. schmal-lineal., rinnig, stumpfl.; Aehre halbkugelf.; unteres Blütenscheidchen an der Spitze ausgerand., kurzgrannig; 4; 7 bis 8; St., Kä., Ty. u. s. w.

2666. III., 2; Graspfl.: S. disticha Pers. (Poa dist. Scop., Orčochlöe dist. Lk.). Zweizeilige S. Wrzstock mehrköpf., dicht-rasig; Bltr. rinnig-borstenf.; Aehre eikegelf., 2zeil., hüllenlos; unteres Blütensch. grannenlos bis kurzbegrannt; 4; 7 bis 8; Kä., St., Ty.

—. V., 1; Schlüsselblümler: Soldanella pusilla Baumg.; s. Nr. 1740.

—. V., 1; Schlüsselblümler: Primula minima L.; s. Nr. 2521.

2667. V., 1; Schlüsselblümler: Gregoria vitaliana Dub. (Aretia vit. Gaud., Koch). Vitalis-Gregorie. St. zalr., rasig, gestreckt, ligend, holz.; Bltr. lineal., dachzieg.-rosettig, ganzrand., am Rande sternf.-weichharig; Blütenst. 1blüt.; Kelchlappen spitz; Kronlappen gewöhnlich ganz; Bl. gelb; 4; 7 bis 8; Ty.

—. V., 1; Schlüsselblümler: Androsăce alpina Lmk.; s. Nr. 1741.

—. V., 1; Schlüsselblümler: A. obtusifolia All.; s. Nr. 1630.

—. " " A. carnĕa L.; s. Nr. 2522.

2668. " " Phyteuma pauciflōrum L. Armblütiger Teufelskrallen. Bltr. lanzettl. oder verk.-längl.; Deckbltchn. breit-eif., vorn mit 1 oder 2 Zähnen, gewimp., spitz, kürzer als das rundl., armblüt. Köpfchen; Bl. blau; Narben 3; 4; 7 bis 8; Oe., St., Kä., Ty.

2669. V., 1; Veilchenpfl.: Viŏla calcarāta L. Langsporniges Veilchen. Stämmchen ligend; Bltr. eif. bis ellipt., geschweift-gekerbt; Bl. violet, die 3 unteren Bltr. an der Basis gelbl., dunkler-geadert, oder alle blaßgelb; Sporn pfriemf., aufsteig., vielmal länger als die Kelchanhänge; 4; 7; Bay., Ty., Kr.

2670. V., 2; Enzianpfl.: Gentiāna froelichĭi Wulff. Rinnenblättriger Enzian. Grundst. Bltr. rosettenf.-gehäuft, rinnenf., stumpf, stengelst. in eine lockere Scheide verwachs.; K. auf 1/3-5spalt., lineal.-gelappt; Kr. trichter-glock., 5spalt., Röhre viermal länger als der Saum, himmelblau, nicht punkt.; Narben keulig; 4; 7; Kr.

2671. V., 2; Enzianpfl.: G. pumĭla Jacq. Zwerg-E. Rasenbildend; St. aufr., kant.; Bltr. in grundst. Rosetten; K. 5kant., 5spalt., Lappen lineal-zugesp.; Krlappen eif., die Randfalten schwach-geschweift, an den Winkeln mit vorgezog., 2spitz. Zahne; Bl. tiefblau; 4; 7.

Varirt: G. elongāta Haenke (Stgl. länger, dünner).

2672. V., 2; Enzianpfl.: G. bavarĭca L. (G. prostrāta Whlbg.). Bayerscher E. St. ohne grundst. Bltrrosette; stengelst. Bltr. verk.-eif. oder ellipt., abgerund.-stumpf, je 2 an der Basis in eine kurze Scheide zsgewachs.; K. 5kant., schmalflügelkielig, Lappen schmallanzettl., in den Spaltwinkeln durch eine weiße Haut verbunden; Kronsaum wenig kürzer, als die Röhre, Lappen verk.-eif., stumpf oder kurz-zugesp.; Griff. tief-2spalt.; Kr. azurblau, an den Falten weiß; ⊙; 7 bis 8.

Varirt: G. imbricāta Schleich (untere Bltr. rundl.-eif., gedrängt, sich deckend).

2673. V., 2; Enzianpfl.: G. prostrāta Hanke (G. nutans Burg). Ligender E. Bltr. verk.-eif., randhäut., gekielt, gehäuft; Bl. einzeln, gipfelſt., himmelblau, weißröhrig; K. 1/3-ungleich-5ſpalt., Lappen lanzettl.; Kronröhre etwas bauchig; Kronlappen lanzettl., faſt 1/3 ſo lang, als die Röhre; Griff. tief-2ſpalt.; ⊙; 7 bis 8; Sg., Kä.

2674. V., 2; Enzianpfl.: G. nivālis L. Schnee-E. Bltr. der grundſt. Roſette verk.-eif., ſtengelſt. undeutl.-5nervig, an der Baſis zſgewachſ., obere größer; K. gekielt-5kant., röhrig, 1/3-5ſpalt., Lappen lineal-lanzettl., 3kielig; Kronſaum von 1/3 Röhrenlänge, 5ſpalt., Lappen eif.; Bl. himmelblau; 2; 7 bis 8.

2675. V., 2; Enzianpfl.: G. nana Wulf. Zwerg-E. Bltr. verk.-eif., auch längl., ſtumpf, 3- bis 5nervig; Blütenſt. rundl., geſtreift; K. tief-5-, ſelten 4ſpalt., Lappen längl., faſt gleich; Kronſaum 5-, ſelten 4ſpalt., von 1/3 Röhrenlänge; Schlund gebärt.; Bl. violet; ⊙; 7 bis 8.

2676. V., 2; Doldenpfl.: Astrantĭa minor L. Kleine Aſtrantie. Grundſt. Bltr. 7- bis 9theil.-gefing., Bltchn. längl.-lanzettl., tief-ſpitz-ſägezähn.; Hüllbltchn. weiß, grünſpitz; Bl. rötl.; 2; 7 bis 8; Kä., Kr., Ty.

2677. V., 2; Doldenpfl.: Bupleurum stellātum L. Sternblütiges Haſenöhrchen. St. meiſt nackt; grundſt. Bltr. lanzett-lineal., auch lineal., ſpitz, ſtiel-verſchmäl., ſtengelſt. 1 oder fehlend, ſitz.; Hüllbltchn. lanzett-eif., umfaſſ., ſpitz; Hüllchenbltchn. bis zur Hälfte ſchalenartig-verwachſ.; Bl. gelb; Fruchthauptrippen häutig-geflüg.; 2; 7 bis 8.

2678. V., 2; Doldenpfl.: Laserpitĭum hirsūtum Lmk. Rauhhariges Laſerkraut. Bltr. vielfach-zſgeſetzt, auf der Spindel rauhharig, Bltchn. tief-fiederſpalt., Fetzen ſchmallineal., ganzrand., nebſt den Doldenſtralen gewimp.; Bl. groß, weiß; Fr. eif.; Scheibe kegelf.; Griff. ſperrig-abſteh.; 2; 7 bis 8; Ty.

—. VI., 1; Semede: Juncus trifĭdus L., ſ. Nr. 1742.

—. " " Luzŭla spicāta Desv.; ſ. Nr. 1743.

2679. VI., 3; Zeitloſenpfl.: Tofieldĭa boreālis Whbg. Nordiſche Torflilie. Blütenhüllchen ein einzelnes, 3lapp. Deckbltchn. an der Baſis des Blütenſtielchens; oberſte Blütenſt. ohne Deckbltchn.; Kbltchn. verk.-eif.; Bl. blaßgelb oder weißl., in eif., kopf. Aehre; 2; 7 bis 8.

—. X., 2; Steinbrechpfl.: Saxifrăga pedemontāna All.; ſ. Nr. 1744.

2680. X., 2; Steinbrechpfl.: S. crustāta Vest. Kruſten-

blättriger Steinbrech. Rosettenbltr. gehäuft, lineal-zungenf., ganzrand. oder knorp.-stumpf-gekerbt, mit starken Kalkkrusten in den Randgrübchen, an der Basis gewimp.; Bl. weiß; Blbltr. verk.-eilängl., stumpf; Kelchlappen eif.; 4; 7 bis 8.*)

2681. X., 3; Nelkenblütler: Stellaria cerastoïdes L. (Dichödon cer. Bartl.). Hornkrautähnlicher Vogelmeier. St. kahl, mit einer Harleiste; Bltr. ellipt. oder längl., kurzzugesp., kahl, sitz.; Bl. gipfelst., zu 2 bis 3, weiß; Deckbltchn. krautig, kahl; Kbltchn. am Rande kahl; Blbltr. halb-2spalt.; Kapf. 6zähn., Zähne abgerund.-stumpf; 4; 7 bis 8.

2682. X., 3; Nelkenblütler: Alsine rubella Whlbg. (A. sedorides Froel., Arenaria quadrivalvis R. Br.) Rötliche Silene. Bltr. 4zeil., lanzettl., spitz, kahl, 3nervig; Blütenst. gipfelst., einzeln, kurz; K. regelm.-5blättr.; Kr. 5blättr., weiß; Stbgf. 10; Griffel meist 4; Blbltr. ellipt., stumpf; 4; 7 bis 8; Allgäu.

—. X., 5; Nelkenblütler: Viscaria alpina A. Mey.; s. Nr. 1745.

2683. X., 6; Rosenpfl.: Sibbaldia procumbens L. Legende Sibbaldie. Wrz. vielköpf.; St. niederlig., rasenf.; Bltr. gestielt, 3zäl., Bltchn. verk.-keilf., abgestutzt, 3- bis 5zähn.; Bl. in gipfelst., mehrblüt., deckblättr. Zymen; gelb; 4; 7 bis 8.

2684. XII., 3; Rosenpfl.: Sieversia reptans Spr. (Geum rept. L.). Rankende Sieversie. Wrzhals mit langen Ausläufern; Bltr. unterbrochen-gefied., Endbltchn. 3- bis 5spalt.; K. fast so lang als die gelbe Kr.; Fruchtschweife grade, zott.; 4; 7 bis 8.

2685. XII., 3; Rosenpfl.: Potentilla frigida Vill. Alpen-Fingerkraut. Wrz. dick, mehrköpf.; St. niederlig., aufsteig., zott., armblüt.; Bltr. 3fing., Bltchn. eif., grob- und stumpfsägezähn., zott.; Nebenbltr. eilanzettl.; Bl. klein, gelb; Blütenboden kurzharig; Fr. kahl, glatt; 4; 7 bis 8; Ty.

—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Ranunculus parnassifolius L.; s. Nr. 1746.

—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: R. seguieri Vill.; s. Nr. 1708.

2686. XIV., 2; Rachenblümler: Pedicularis rostrata L. Schnabelförmiges Läusekraut. St. niedrig, schaft-

*) S. hostii Tausch (S. elatior M. et K.) ist die höhere, reichblütige Form mit stärker gekerbten, größeren Blättern!

artig; Bltr. gefied.; Bl. deutl. gestielt, rosenrot; K. röhrig, 5spalt., Lappen oben blattartig, an der Spitze zurückgekr., kurz-zott.; Kronröhre kürzer als die Lippen; Deckbltr. in Gestalt kleiner Bltr.; Kapf. rundl.; Helm hakenf.; 4; 7 bis 8; †.*)

—. XIV., 2; Geisblattpfl.: Linnaea boreālis Gronov.; f. Nr. 2165.

2687. XV., 1; Kreuzblütler: Draba frigĭda Sauter. Kaltes Hungerblümchen. St. 1- bis 2blättr., zott.; Bltr. sternharig-graulich; Griff. sehr kurz oder fehlend; Schötchen längl. bis lineal-lanzettl., kahl; Narbe fast 2lapp.; Bl. weiß; 4; 7 bis 8.**)

2688. XV., 1; Kreuzblütler: D. carinthiăca Hoppe. Kärnthener H. St. 1- bis 2blättr., unten nebst den Bltrn. sternharig-zott., oben kahl; Bltr. längl.-lanzettl., sternharig; Stbgf. von halber Kronlänge; Schötchen lanzettl., kahl; Griff. kurz, verk.-kegelf.; Bl. weiß; 4; 7.

—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum argentĕum L.; f. Nr. 1747.

—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Trifolĭum alpīnum L.; f. Nr. 1748.

2689. " " T. norĭcum Wulff. Norischer Klee. St. aufsteig., einfach, walzenf., nebst den Blattst. zott.; Blthn. eif., ellipt. bis längl.-lanzettl.; Aehren kug., sitz., von 2 Bltrn. gestützt, etwas seitl. geneigt; Kelchröhre walzenf., zott., 10nervig; Kelchzähne pfriemf., fast gleichlang, von halber Kronlänge, rot; Bl. weiß; 4; 7; St., Kä., Kr., Ty.

2690. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum sphaerocephălum Rchb. (H. furcātum Hoppe). Kugelköpfiges Habichtskraut. Meist auslauf.; Schaft fast blattlos oder 1blättr., ästig, 1- bis 5köpf.; unterste Bltr. spatelf., obere verk.-lanzettl., fast ganzrand., grün; Köpfchen kug.; Bl. außen etwas rötl.; 4; 7 bis 9.

2691. XIX., 1; Korbblütler: H. barbātum Hegetschw. Gebärtetes H. St. beblätt., einfach, 1- bis 2köpf., zwiebelharig-zott., filz. und schwach-drüsenharig; Bltr. lanzettl.,

---

*) P. jacquini Koch unterscheidet sich blos durch die gewimp. Unterlippe, die schwächere Behaarung oder Kahlheit, sowie durch Kleinheit aller Theile; nördl. Kalkalpenform.

**) Die Dr. traunsteineri scheint ein Bastard von Dr. tomentosa und D. carinthiaca zu sein und ist oben kahl; Schötchen mit deutlichem Griffel. — Fehlt der Griffel und ist die Pflanze zwerghaft, so hat man Dr. joannis Host vor sich!

weißzott.; Hülle stark-mäusegrauzott.; Bl. gelb; 4; 7 bis 8.

2692. XIX., 1; Korbblütler: H. piliferum Hoppe (H. schradēri Schleich.). Hariges H. St. einfach, 1- bis 2köpf., meist 1blättr., unten schwach-zott., oben stärker-zott., einzeln-drüsenharig; Bltr. ganzrand., äußere grundst. spatelf., stumpf bis abgestutzt, in den geflüg. Stiel herablauf.; Hülle starkzott., Bltchn. dachig, spitz; Köpfchen bauchig, goldgelb; 4; 7 bis 9; Ty.

2693. XIX., 2; Korbblütler: Senecio uniflōrus All. Einköpfiger Baldgreis. Graufilzig; untere Bltr. stiel-verschmäl., stengelst. sitz., lanzett-lineal., ganzrand., zuweilen armsägezähn.; Köpfchen 1 bis 3, langgestielt; Hülle filz.; Hüllbltchn. spitz, unter dem Filze der Spitze brandig; Bl. goldgelb; Fr. weichharig; 4; 7 bis 9; Wallis, Ty. (?).

2694. XIX., 2; Korbblütler: Artemisia mutellina L. Kleiner Beifuß. Rasenbildend; St. krautig, einfach; Bltr. weißl.-seidenharig, untere 3theil., obere gefing.-fiederspalt.; Blütenköpfchen blattachselst., längl., oberste sitz., untere gestielt, zus. scheinbar eine an der Basis unterbrochene Aehre bildend; Bl. gelb; 4; 7 bis 8; Kr., Kä., Sg., Ty.

2695. XIX., 2; Korbblütler: A. spicāta Jacq. Aehriger B. (weißer Genip). St. in Rasen, einfach, grau-seidenharig; Bltr. glänzend-grau, gestielt, grundst. 3theil., fing.-vielspalt., stengelst. fiederspalt.; Köpfchen blattachselst., eine beblätt. Aehre bildend; Bl. gelb; Kr. und Eierstöcke behart; 4; 7 bis 8; Sg., Kä., St., Ty.

2696. XIX., 2; Korbblütler: Achillēa moschāta Wulff. Bisamgarbe (Frauenkraut, wahres Genip). St. fast kahl, aufr., einfach; Bltr. einfach-kammf.-fiederspalt., mit geflüg., ganzrand. Spindel, Fiedern lanzett-lineal., ganzrand. oder am Außenrande 1- bis 2zackig; Hüllchen am Rande purpurbraun; Bl. weiß; 4; 7 bis 9; Ty., Kä., St., Sg.*).

Varirt: A. impunctāta Hoppe (Bltr. nicht punkt.).

2697. XIX., 2; Korbblütler: A. clavēnnae L. Bittere G. (weißer Speik, Weißrauch). Angedrückt-graufilz., selten nur behart; grundst. Bltr. in den Stiel verschmäl., eingeschn.-grobsägezähn., auch fiederspalt., mit breit-geflüg.,

*) Die Bisamgarbe, romanisch Iva, dient zu dem magenstärkenden „Genipi" der Schweizer. Eine Handvoll dieses Krautes in eine Flasche Branntwein geworfen, reicht hin, um demselben einen sehr angenehmen Geschmack zu geben. Das angenehm riechende Kraut kommt auch zu dem sogenannten „Schweizerthee". In Italien bereitet man aus den blühenden Spitzen einen Tischlikör!

ganzer Blattspindel; Fiedern 3 bis 7, längl., fast stumpf, ganzrand. oder vorn 2- bis 3spalt.; Spreubltchn. an der Spitze gezähnt; Bl. weiß: 4; 7 bis 9.

Varirt: A. denundāta Hoppe (fast kahl).

—. XXI., 3; Halbgras: Elȳna spicāta Schrad.; s. Nr. 1728.

2698. „ „ Cobresĭa caricīna Willd. Seggenartige Kobresie. Halm aufr., rundl., nackt; Rispe mit wechselst., vielblüt. Aehren; Wrz. faserig; Bltr. schmal, steif, gerinnelt, scharfrand.; ♂ mit 1 äußeren, ♀ mit 2 Blütenscheidchen; Stbgf. 3; Griff. 1; Narben 3; 4; 7 bis 8; Ty., Kä.

—. XXI., 3; Halbgras: Carex lagopīna Whlbg.; s. Nr. 1749.

—. „ „ C. heleonāstes Ehrh.; s. Nr. 700.

2699. „ „ C. curvŭla All. Krummblättrige Segge. Wrz. faserig; Bltr. fadenf., gerinnelt, gebogen, steif; Halm aufr. oder aufst., borstenf., rundl., gestreift, glatt; Aehrchen angedr.-sitz., in eine längl. Aehre zsgehäuft, an der Spitze ♂; Fr. eif., 3kant.; 4; 7 bis 8; Ty., Kä., St.

2700. XXI., 3; Halbgras: C. nigra All. Schwarze S. Wrz. faserig, auslauf.; Blattsch. nicht gespalt.; Bltr. schmallineal., flach, gekielt; Halm aufr., 3kant., glatt; Aehrchen 3 bis 6, eif., gleichsam in ein Köpfchen zsgedrängt, die 1 bis 2 gipfelst. unten ♂, selten ganz ♂, die übr. ♀; 4; 7 bis 8; Kä., St., Ty.

2701. XXI., 3; Halbgras: C. irrigŭa Sm. Gletscher-S. Wrz. ausläufertreibend; Bltr. lineal., flach, oben langzugesp. und schärfl.; Halm aufr., 3kant.; alle Aehrchen gestielt, ♂ gipfelst., zilindr., die übr. (2 bis 3) ♀, eif., überhäng.; Fr. kreiself., etwas zsgedr.; 4; 7; Ty., Kä.

—. XXII., 2; Weide: Salix reticulāta L.; s. Nr. 1751.

2702. „ „ S. herbacĕa L. Krautartige Weide. Bltr. verk.-eirundl., fast abgestutzt, sägezähn., kahl, beiderf. glänz.; Nebenbltr. eif.; ♀ Kätzchen 2- bis 5blüt.; Kapf. eilanzettl., kahl, drüsig; Zweige kraut., rötl.; Kapf. rötl., glänz.; ♄; 7 bis 8.

b. Auf steinigen Plätzen und Triften der höchsten Alpen:

2703. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Anemōne baldēnsis L. Erdbeerfrüchtiges Windröschen. Grundst. Bltr. 3zäl., Bltchn. 3theil., Zipf. keilf.- 2- bis 3spalt.; Hüllbltr. auf kurzem, breitscheidenf. Stiele dopp.-3theil.-fiedertheil.; Bl. einzeln, aufr., sternf., weiß, außen violet; 4; 7 bis 8.

c. Auf Grasrainen der höchsten Alpen:

—. IV., 1; Rosenpfl.: Alchemilla pubescens M. B.; s. Nr. 1756.

d. An sonnigen, steinigen Abhängen der höchsten Alpen:

2704. X., 3; Nelkenblütler: Alsine recurva Whlbg. Sichelblättrige Lärchennelke. Stämmchen ligend, holz.; grüne Stgl. aufsteig.; Bltr. schmal-lineal., pfriemf., halbrund, 3nervig, untere der nichtblüh. Triebe zurückgekr., nach einer Seite gewendet; Kbltchn. lanzettl., schmal-hautrandig; Blbltr. ellipt., auch eif., weiß; 4; 7 bis 8; Ty., St., Kä.

e. Auf feuchten, steinigen Stellen der höchsten Alpen:

—. III., 1; Baldrianpfl.: Valeriana elongata L.; s. Nr. 1754.

f. Auf nassen, feuchten Stellen der höchsten Alpen:

2705. III., 1; Baldrianpfl.: V. supina L. Niedriger Baldrian. Wrzstock kriech., knot., mehrköpf.; St. aufsteig., aufw.-behart, gestreift; Bltr. fleisch., gewimp., ungetheilt, stengelst. längl., verk.-eif.; Gabelrispe gedrängt, doldentraub.; Bl. rötl., 3- bis 4männig; 4; 7 bis 8.

—. V., 2; Enzianpfl.: Gentiana bavarica L.; s. Nr. 2672.

g. In Felsenspalten der höchsten Alpen:

2706. XII., 3; Rosenpfl.: Potentilla clusiana Jacq. Klusisches Fingerkraut. Stämmchen mehrköpf.; St. meist 3blüt.; grundst. Bltr. 5-, stengelst. 3fing., Bltchn. längl.-lanzettl., an der Spitze zigeneigt-3zähn., weichharig, zott.-gewimp.; Bl. weiß; Stbgf. kahl, oft rot; Fr. ganz zott.; 4; 7 bis 8.

h. An Felsen der höchsten Alpen:

—. XII., 3; Rosenpfl.: Potentilla nivea L.; s. Nr. 1755.

i. Auf Sumpfwiesen der höchsten Alpen:

—. XXI., 3; Halbgras: Carex irrigua Sm.; s. Nr. 2701.

k. Auf Torfwiesen der höchsten Alpen:

—. VI., 3; Zeitlosenpfl.: Tofieldia borealis Whlbg.; s. Nr. 2679.

l. An der Schneegrenze:

—. V., 2; Enzianpfl.: Gentiana prostrata Haenke; s. Nr. 2673.

—. XII., 3; Rosenpfl.: Potentilla frigida Vill.; s. Nr. 2685.

2707. XV., 1; Kreuzblütler: Draba wahlenbergĭi Hartm. Wahlenberg's Hungerblümchen. St. nackt, oft 1- oder 2blättr., kahl; Bltr. der Köpfe längl. bis längl.-lanzettl., ganzrand., lang-gewimp., stengelst. lanzettl., sitz.; Bl. weiß; Schötchen kahl; Griff. fast fehlend; Narbe nicht ausgerand., niedergedr.; 4; 7 bis 8.

Varirt: D. fladnitziēnsis Wulff. (Bltr. lang-gewimp.), D. lapponĭca Whlbg. (innere Rosettenbltr. fein-behart), Dr. laevigāta Hoppe (Bltr. sämmtl. kahl).

2708. XIX., 2; Korbblütler: Leontopodĭum alpīnum Cass. (Gnaphalĭum leont. Scop.). Hochalpen-Edelweiß (Löwenfuß, Katzendälpli). Wrz. schwarzbraun, mehrköpf.; grundst. Bltr. verk.-lineal-lanzettl., wie die stengelst. 1nervig, unters. und am Rande filz., spinnwebig; Stglbltr. lanzettl., umfass.; Deckbltr. in einem sternf.-ausgebreit. Kranze, dick-weißwollig; Bl. grünlichweiß; 4; 7 bis 9. *)

2709. XIX., 2; Korbblütler: Achillēa nana L. Zwerggarbe. Langharig, fast wollig; Bltr. fiederspalt., mit gleichbreiter Spindel, Fiedern lineal.-lanzettl., 2spalt. oder eingeschn., fast fiederspalt., genähert; Spreubltchn. braunspitz.; Bl. weiß; 4; 7 bis 8; Ty.

—. XXII., 2; Weide: Salix herbacĕa L.; s. Nr. 2702.

m. Auf und an Gletschern:

2710. II., 1; Rachenblümler: Paederōta zannichelĭi Brign. Zannichel's Päderote. Bltr. kurz-gestielt, herz-eif., sägezähn., untere rundl.-stumpf, obere eif.-zugesp.; Kr. von halber Kronlänge, kahl; Kronoberl. ungetheilt; Stbgf. kürzer, als die gelbe Kr.; 4; 7; Kr.

2711. IV., 1; Rosenpfl.: Alchemīlla pentaphўlla L. Fünfblättriger Sinau. Wrzkopf auslauf.; Bltr. 5theil., Lappen eingeschn., gezähnt, nebst dem St. und den kaum gezähnten Nebenbltrn. kahl; Bl. geknäuelt, grünl.; 4; 7 bis 8; Ty.

—. V., 1; Primelpfl.: Primŭla minĭma L., s. Nr. 2521.

—. „ „ Androsăce alpīna Lmk.; s. Nr. 1741.

—. V., 2; Enzianpfl.: Gentiāna nana Wulff.; s. Nr. 2675.

—. „ „ G. prostrāta Haenke; s. Nr. 2673.

—. X., 2; Steinbrechpfl.: Saxifrăga biflōra All.; s. Nr. 1759.

*) Das Edelweiß der Gemsjäger ist eine wahre Alpenpflanze und eben so schwer zu erreichen, wie die Alpen zu ersteigen. Sie kommt nur auf hohen Kalkalpen, nach Sendtner zw. 5333 und 7000′ vor und ist bei allen Alpenreisenden ihrer schönweißen Farbe und ihres wolligen Ueberzugs wegen eine Hauptzierde am Hute.

—. X., 3; Nelkenblütler: Stellaria cerastoides L.; s. Nr. 2681.
—. XII., 3; Rosenpfl.: Potentilla frigida Vill.; s. Nr. 2685.
2712. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Ranunculus glacialis L. Gletscher-Hahnenfuß. St. aufr., 1- bis 3blüt.; grundst. Bltr. 3zäl. oder handf.-3- bis 5theil., oft nur 3- bis 5-spalt., Bltchn. oder Lappen ganz oder 3- bis 5spalt. bis 3- bis 5theil., Zipf. verk.-lanzettl.; Krbltr. verk.-eif., leicht-ausgerand., weiß, zuletzt rötl.; Fr. glatt, häutig-kielig; 4; 7 bis 8; †.

Varirt: R. gelidus Hffmgg. (Bltr. handf.-3theil.; Pfl. kleiner, weißblumig), R. glacialis L. (Bltr. handf.-5theil. oder 5lapp.; Bl. schwach-rötl.), R. roseus Hegetschw. Bltr. 3zäl.; Bl. groß, rosenrot), R. albus Be. (K. weiß-harig und braunborstig; Bltr. gelbharig, fast kahl).

2713. XIX., 1; Korbblütler: Crepis jubata Koch. Bemähnte Grundfeste. St. aufr., meist 2blättr., 1köpf.; Bltr. ablang oder längl.-lanzettl., stengelst. sitz.; Hüllbltchn. dachig-übereinanderlig.; Bl. goldgelb; Pappus schneeweiß; 4; 7 bis 8; Ty.
2714. XIX., 2; Korbblütler: Senecio carniolicus Willd. Krainer Baldgreis. Spinnwebig-graufilz.; Bltr. längl., keilf. in den rinnigen Blattst. zulauf., oben eingeschn.-stumpfsägezähn.; Köpfchen in lockerer, einfacher Traube; Hülle trichterf.; Hüllbltchn. ellipt.-lanzettl., am Seitenrande schwachhäutig, vorn purpurschwarz; Bl. gelb; Fr. kahl; 4; 7 bis 8.
2715. XIX., 2; Korbblütler: Artemisia glacialis L. Gletscher-Beifuß. Rasig; St. einfach, aufr.; Bltr. grau-seidenharig, untere 3theil., vielspalt.-eingeschn., stengelst. entfernt, an der Spitze eingeschn.-handf.-gespalt.; Köpfchen in einen gedrängt-kug., gipfelst. Büschel gesammelt; Bl. gelb; 4; 7 bis 8; Ty.
2716. XXI., 3; Halbgras: Carex bicolor All. Zweifarbige Segge. Wrz. auslauf.; Bltr. schmal-lanzettl. bis lineal., rinnig, scharf; Halme glatt, rund, gestreift; Aehrchen 1 bis 4, gestielt, fast gleichlang, aufr., längl., stumpf, gipfelst. unten ♂, oben ♀, 2farbig; 4; 7; Kä., Ty., Schweiz.

Varirt: C. uniflora Be. (1ährig; Blütensch. fehlend).

n. Auf Grasplätzen der höchsten Alpenjoche:

—. IV., 1; Rosenpfl.: Alchemilla fissa Schumm.; s. Nr. 2548.
2717. XIX., 1; Korbblütler: Apargia taraxaci Hoffm. Alpen-Todtenblume. Wrz. ein schiefes, abgebiss., langfaseriges Rhizom; grundst. Bltr. längl., verk.-lanzettl., buchtig-grob-

zähn., auch schrotsägezähn.; Schaft aufr., 1fach, 1köpf., nach oben verdickt; Hüllblchn. am Rande weißfilz.; Deckschuppen, Hüllblchn. und Schaft grauharig und schwarzborstig; Bl. goldgelb; 4; 7 bis 8.

o. Auf höheren Alpen:

—. III., 2; Graspfl.: Festūca rhaetĭca Suter; s. Nr. 2664.

2718. X., 2; Steinbrechpfl.: Saxifrăga seguierĭi Spr. Seguier's Steinbrech. Bltr. der Rosette verk.-längl., fast spatelf., stumpf oder ausgerand., abgestorben braun, 5- bis 7nervig; Krbltr. so groß als die eif. Kelchlappen, schwefelgelb; 4; 7 bis 8; Ty.

—. X., 2; Steinbrechpfl.: S. androsacĕa L.; s. Nr. 1752.

—. X., 5; Dickblattpfl.: Sedum repens Schleich.; s. Nr. 2523.

2719. XII., 3; Rosenpfl.: Potentīlla grandiflōra L. Großblumiges Fingerkraut. Wrzstock wenigköpf.; St. aufsteig., aufr., nebst den Blattst. kurz-absteh.-weichharig, armblüt.; Bltr. 3fing., Bltchn. verk.-eif. oder ellipt., unters. zott., unterste tief-stumpfsägezähn., oberste eingeschn.-spitzsägezähn.; Bl. gelb; 4; 7 bis 8; Ty.

—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum angustifolĭum Hoppe; s. Nr. 1753.

2720. XIX., 1; Korbblütler: H. glandulifĕrum Hoppe. Schwarzdrüsiges Habichtskraut. Graugrün; St. schaftartig, blattlos oder 1- bis 2schupp., 1köpf., filz., drüsig- und schwarz-zwiebelharig; grundst. Bltr. sitz., spitz, fast ganzrand., zottig; Hülle langzott.; Bl. gelb; 4; 7 bis 8.

p. Auf Urgebirgs-Alpen:

—. II., 1; Rachenblümler: Veronĭca bellidioīdes L.; s. Nr. 1629.

—. III., 1; Baldrianpfl.: Valeriāna celtĭca L.; s. Nr. 1760.

—. V., 1; Schlüsselblümler: Soldanēlla minĭma Hoppe; s. Nr. 1761.

2721. V., 1; Schlüsselblümler: Primŭla glutinōsa L. fil. Klebriger Himmelsschlüssel (Speik). Bltr. verk.-längl.-lanzettl., hinten ganzrand., vorn spitzl.-sägezähn., schmierig-klebrig, sonst wie die Blütenst. kahl; Bl. auf der nickenden Dolde sitz., violet, wohlriech.; K. fast von Kronröhrenlänge; Kzähne stumpf; 4; 7; Ty., Kä., St., Sg.

2722. V., 1; Schlüsselblümler: P. integrifolĭa L. (P. candolleāna Rchb.). Ganzblättriger H. Bltr. verk.-eilängl., stumpf, am nicht knorp. Rande zott.; Blütenst. wenigblüt., zott.; Krlappen verk.-herzf.; Bl. pfirsichblütrot, am Schlunde zott.; 4; 7 bis 8; Ty.

—. V., 1; Schlüsselblümler: Gregoria vitaliana Dub.; s. Nr. 2667.
—. V., 1; Schlüsselblümler: Androsace obtusifolia All.; s. Nr. 1630.
—. V., 1; Schlüsselblümler: A. alpina Lmk.; s. Nr. 1741.
—. „ Glockenblümler: Campanula barbata L.; s. Nr. 1762.
—. X., 1; Heidepfl.: Rhodothamnus chamaecistus Rchb.; Nr. 838.
—. X., 1; Heidepfl.: Rhododendron ferrugineum L.; s. Nr. 1763.
2723. X., 3; Nelkenblütler: Silene alpestris Jacq. Alpen-Leimkraut. Wrz. 1- bis mehrköpf.; St. kahl, oben klebrig-schmierig, 2- bis 3theil.-gabelästig; Stglbltr. lineallanzettl., an der Basis gewimp., alle Bltr. durchscheinend-punkt.; Krbltr. 4zähn., weiß; 4; 7 bis 8.
—. X., 3; Nelkenblütler: Alsine aretioides M. et K.; s. Nr. 1764.
2724. XI., 5; Dickblattpfl.: Sempervivum braunii Funk. Braun's Hauswurz. Rosettenbltr. beiders. drüsenharig, am Rande lang- und schwach-gewimp.; Krbltr. lineal-lanzettl., 2- bis 3mal so lang als die Kelchlappen, weißgelbl., grün-rückennervig; Stbf. an der Basis zigedr., weiß; 4; 7 bis 8.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Pediculāris portenschlagii Saut.; s. Nr. 1765.
2725. XIV., 2; Rachenblümler: P. asplenifolia Foerke. Farnkrautähnliches Läusekraut. Blattfiedern übereinandergreif.; K. langglock., zott., Lappen oben blattartig, zurückgekr.-spitz., stachelsp., glieder-zott.; Krröhre nicht von Saumlänge; Helm langzugesp., geschnäb.; Bl. rosenrot; 4; 7; +; Oe., Kä., St. *)
—. XV., 1; Kreuzblütler: Draba aizoides L.; s. Nr. 285.
—. XV., 2; „ Cardamine resedifolia L.; s. Nr. 2513.
2726. XVII., 4; Hülsenpfl.: Oxytropis cyanea M. B. (O. triflora Hoppe). Armblütige Fahnwicke. Stengellos, fast grauharig; Bltr. mehrparig-gefied., Bltchn. eilanzettl.; Blattst. und der kaum längere Schaft aufr.-behart; Aehre kurz, 1- bis 5-, meist aber 3blüt.; Fahne von dopp. Schiffchenlänge; Hülse aufr.; Bl. dunkelblau; 4; 7 bis 8.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracium flexuosum W. et K.; s. Nr. 2640.

*) Diese Pflanze wächst auch in Asien auf dem Himalaya-Gebirge!

—. XIX., 1; Korbblütler: Hypochoeris uniflōra Vill.; s. Nr. 1766.

2727. XIX., 1; Korbblütler: Cirsĭum pauciflōrum Spr. Klettenblättrige Krebsdistel. St. beblätt., 1- bis 4köpf., an der Spitze nickend; Bltr. unters. spinnwebig, kahl werdend, eif., eingeschn. und gezähnt, ungleich-dornig-gewimp.; Hüllbltchn. lanzettl., weichstachelsp.; Bl. purpurn; 4; 7 bis 8; St.

—. XXI., 3; Halbgras: Carex nigra All.; s. Nr. 2700.

2728. " " C. gebhardĭi Hoppe. Gebhard's Segge. Halm niederlig., aufsteig., dünn, 3kant., gestreift; Bltr. schmal-lineal., gekielt, flach, am Rande schärfl.; Aehrchen eif., auch längl., 5 bis 9, oben ♀; Fr. längl., gestreift; Blütenscheidchen eirundl., plötzl. kurz-spitz.-zsgezog., fast stumpf; 4; 7 bis 8; Ty., Kä.

q. Auf den höchsten Urgebirgsalpen:

—. III., 2; Grasp fl.: Koelerĭa hirsūta Gaud.; s. Nr. 1738.

—. V., 1; Schlüsselblümler: Androsăce obtusifolĭa All.; s. Nr. 1630.

—. V., 2; Enzianpfl.: Gentiāna nana Wulff.; s. Nr. 2675.

2729. " " G. frigĭda Haenke. Durchscheinender Enzian. St. kant.; Bltr. lineal-längl., stumpf, fast nervenlos, rosettenf.-gehäuft; Bl. gipfelst., zu 1 bis 2, weiß, blaßblau-gestreift und -punkt.; K. röhrig-glock., 5-spalt., Lappen lanzettl., stumpfl.; Kr. 5spalt., trichter-glock.; 4; 7 bis 9; St., Kr.

2730. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus glaciālis Haenke. Eisnelke. St. meist 1blüt.; Bltr. lineal., stumpf, knorp.-feinsägezähn.; Kelchdeckschuppen 2, lanzettl.; Krbltr. keilf., von $1\frac{1}{2}$facher Kelchlänge; Bl. obers. einfarbig rosenrot, unters. grünl.; 4; 7 bis 8.

—. X., 2; Steinbrechpfl.: Saxifrăga oppositifolĭa L.; s. Nr. 1631.

—. X., 2; Steinbrechpfl.: S. biflōra All.; s. Nr. 1759.

—. XI., 5; Dickblattpfl.: Sempervīvum montānum L.; s. Nr. 2524.

—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Callianthĕmum coriandrifolĭum Rchb.; s. Nr. 1767.

2731. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Ranuncŭlus crenātus W. et K. Gekerbter Hahnenfuß. St. meist 1blüt. und 1blättr., kahl; Bltr. rundl.-herz- oder nierenf., ganz oder vorn schwach-3spalt., gekerbt, stengelst. lineal.; Blütenst. gefurcht; K. kahl; Blbltr. verk.-eif., weiß; 4; 7 bis 8; †; St.

—. XV., 1; Kreuzblütler: Draba wahlenbergii Hartm.; ſ. Nr. 2707.

2732. XIX., 2; Korbblütler: Senecio incānus L. Weißfilziges Kreuzkraut. Angedr.-graufilz.; Bltr. geſtielt, tief-fiederſpalt., Fiedern längl., ſtumpfzähn., obere aufgebogen; Blütenköpfchen gedrängt-doldentraub.; Hüllbltchn. ellipt., ſehr ſtumpf, vorn gebärtet und brandig; Fr. kahl oder feinweichharig; Stral goldgelb; 4; 7 bis 8; St., Kä., Ty.

—. XIX., 2; Korbblütler: S. carniolicus Willd.; ſ. Nr. 2714.

—. „ „ Achillēa nana L.; ſ. Nr. 2709.

—. XXI., 3; Halbgras: Carex lagopina Whlbg.; ſ. Nr. 1749.

r. Auf Felſen der höchſten Urgebirgsalpen:

2733. V., 1; Borretſchpfl.: Eritrichium nanum Schrad. (Myosōtis nana Vill.). Zwerg-Schopfvergißmeinnicht. Wrz. horizontal, hinten abgebiſſ.; St. aufſteig., oft kleine, grauzottenharige Raſen bildend; Bltr. der nichtblüh. Aeſte gedrängt, ſpatelf., am Rande borſt.-gewimp., die der blüh. Zweige verk.-eif. bis ellipt.; Bl. 1 bis 5, in gipfelſt., gedrängter Skorpionzyme; Bl. blau; Fr. aus 4 geſond., 3kant. Schließfr. beſtehend; 4; 7 bis 8; St., Kr., Ty.

—. V., 2; Enzianpfl.: Gentiāna frigida Haenke; ſ. Nr. 2729.

—. „ „ G. nana Wulff.; ſ. Nr. 2675.

2734. XII., 3; Roſenpfl.: Potentilla nitida L. Rotblumiges Fingerkraut. St. kurz, meiſt 1blüt.; Bltr. büſchelig-gehäuft, 3fing., Bltchn. ellipt., an der Spitze grad-3zähn., beiderſ. ſeidenfilz.; Nebenbltr. ſchmal; Stbf. und Griff. kahl, rot; Bl. roſenrot, ſelten weiß; Fr. zott.; 4; 6 bis 7; Ty., Kä., Kr.

s. Auf Sand der höheren Urgebirgsalpen:

2735. X, 3; Nelkenblütler: Arenaria biflōra L. Zweiblütiges Sandkraut. St. ligend, aufſteig., faſt völlig kahl; Bltr. verk.-eif., ſtumpf, an der Baſis gewimp.; Bl. zu 1 bis 3, auf kurzen, blattachſelſt., dicht- und klein-beblätt. Zweigen gipfelſt.; Krbltr. länger, als der K., weiß; Kapſ. halb-3klapp., Klappen 2ſpalt.; 4; 7 bis 8.

t. In Felſenritzen der höheren Ur- und Kalkgebirgsalpen:

2736. XV., 1; Kreuzblütler: Draba tomentōsa Whlbg. Filziges Hungerblümchen. St. 1- bis 3blättr., feinſternharig; Bltr. filz., hinten gewimp.; Krbltr. deutl.-ausgerand., weiß; Schötchen eif. oder längl., feinharig und gewimp.; Narbe faſt ſitz.; 4; 7 bis 8.

u. Auf steinigen Wiesen der höchsten Urgebirgsalpen:

—. III., 2; Graspfl.: Koelerĭa hirsūta Gaud.; s. Nr. 1738.

v. Auf Grasplätzen der höchsten Urgebirgsalpen:

—. III., 2; Graspfl.: Sesleria distĭcha Pers.; s. Nr. 2666.

w. Auf nassen Stellen der höchsten Urgebirgsalpen:

—. XIV., 2; Rachenblümler: Pediculāris rostrāta L.; s. Nr. 2686.

x. An Felsen der Urgebirgsalpen:

2737. XI., 5; Dickblattpfl.: Sempervīvum arachnoidĕum L. Spinngeweb-Hauswurz. Rosettenblr. drüsig-weichharig, auch kahl, am Rande gewimp., an der Spitze spinnwebig-behart; Krblr. längl.-lanzettl., unters. und am Rande behart, rosenrot, mit purpurnem Mittelnerv; 4; 6 bis 8.
Varirt: S. villōsum (behartere Form, graugrün), S. doellianum C. B. Lehm. (kahlere Form, Blr. blaßgrün).

y. An feuchten, felsigen Stellen der Urgebirgsalpen:

—. X., 2; Steinbrechpfl.: Saxifrăga bryoides L.; s. Nr. 2532.

—. X., 3; Nelkenblütler: Silēne pumilĭo Wulff.; s. Nr. 1768.

2738. „ „ Alsine sedoides Fenzl (Cherleria sed. L.). Polsterbildende Alsine. St. ligend, holz.; Aeste polsters. Rasen bildend; Blr. lineal., rinnig, stumpf, verdickt-knorpelrand.; Bl. polygam., gipfelst., einzeln, weiß; 4; 7 bis 8.

—. X., 5; Dickblattpfl.: Sedum annŭum L.; s. Nr. 1356.

2739. XI., 5; „ Sempervīvum wulffenĭi Hoppe. Wulffen's Hauswurz. Blr. kahl, nur an der Basis gewimp.; Krblr. lineal., langzugesp., 3mal länger als die des K., 12 bis 18, gelb bis grünl., an der Basis rötl.; 4; 7 bis 8.

z. An steinigen Stellen der Urgebirgsalpen:

2740. X., 3; Nelkenblütler: Arenaria ciliāta L. Gefranstes Sandkraut. St. ligend, aufsteig., rückw.-kurzharig; Blr. verk.-eif., kurz-zugesp., an der Basis gewimp.; Bl. weiß; Blütenst. gipfelst.; Krblr. länger als der K.; Kaps. halb-6klapp.; 4; 7 bis 8.

a[1]. Auf Geröll der Urgebirgsalpen:

2741. XV., 1; Kreuzblütler: Hutchinsĭa brevicaulis Hoppe (Noccaea brevic. Rchb.). Kurzstengelige Hutchinsie. St. einfach, nackt; Blr. gefied.; Schirmähre zur Fruchtzeit

doldenf., kurz-kegelf.; Bl. weiß; Schötchen verk.-eilängl.; 4; 7 bis 8.

b¹. Auf naſſen Stellen der Urgebirgsalpen:

—. XIV., 2; Rachenblümler: Pediculāris asplenifolĭa Flörke; ſ. Nr. 2725.

c¹. Auf Kalkalpen:

—. IV., 1; Wegerichpfl.: Plantāgo atrata Hoppe; ſ. Nr. 1671.

2742. V., 1; Schlüſſelblümler: Androsăce bryoïdes DC. (Aretĭa helvetĭca L.). Mosartiger Mannsharniſch. Dicht-raſenf., äſtig, glänz.-dichtzott., Hare kurz, zurückgelegt; Bltr. verk.-längl., lanzettl., faſt ſeidenglänz., ſtengel-anliegend; Blütenſt. 1blüt., gipfelſt.; Krröhre kaum länger, als der ſpitzgezähnte K.; Bl. weiß, gelbſchlundig; 4; 7 bis 8.

—. V., 1; Glockenblümler: Campanŭla pulla L.; ſ. Nr. 1769.

2743. V., 2; Doldenpfl.: Heraclēum aspĕrum M. B. Rauher Bärenklau. Bltr. einfach, eingeſchn.-handf.-5- bis 7ſpalt., unterſ. weichharig, auf den Adern kurzharig, ſtengelſt. zuweilen 3zäl.; Hüllbltr. borſtenf.; Dolde ſehr groß, ſtralend; Eierſtock kurzharig, ſcharf; Bl. weiß; 4; 7 bis 8; Bay., St., Ty.

—. V., 2; Doldenpfl.: Chaerophȳllum cicutarĭa Vill.; ſ. Nr. 1107.

2744. V., 2; Doldenpfl.: Ch. elĕgans Gaud. Zierlicher Kälberkropf. St. unter den beharten Gelenken nicht merklich angeſchwollen; Bltr. dopp.-gefied., Fiedern fiederſpalt., Lappen lanzettl., eingeſchn.-geſägt; Hüllchenbltchn. völlig häutig, wie die weißen Krbltr. gewimp.; Griff. aufr.-abſteh., mehrmals länger als die Scheibe; Fruchtſäulchen bis zur Baſis 2theil.; 4; 7 bis 8; †; Ty.

Varirt: Ch. verticillātum Schl. (unter der zſgeneigten Fruchtdolde 2 bis 4 acceſſoriſche, wirtelf.-geſtellte Döldchen).

—. VI., 1; Semede: Luzŭla flavēscens Gaud.; ſ. Nr. 696.

—. „ „ L. glabrāta Hoppe; ſ. Nr. 1770.

—. „ „ L. nivĕa Desv.; ſ. Nr. 1771.

—. X., 1; Heidepfl.: Rhodothāmnus chamaecīstus Rchb.; ſ. Nr. 838.

—. X., 2; Steinbrechpfl.: Saxifrăga burseriāna L.; ſ. Nr. 839.

2745. „ „ S. squarrōsa Sieb. Sperriger Steinbrech. Untere Bltr. dachzieg.-gehäuft, ſtumpf, kaum ſtachelſp., knorpelrand., oberſ. 7grubig, aufr., an der Spitze bogig-abſteh.; Blütenſtgl. zerſtreut-drüſenharig; Bl. 2 bis 6, weiß, nervig; 4; 7 bis 8; Ty., St., Kr.

—. X., 3; Nelkenblütler: Silēne linicōla Gmel.; ſ. Nr. 1530.
—. „ „ Alsīne laricifolĭa Whlbg.; ſ. Nr. 2617.
—. XIII., 1; Sonnenröslein: Helianthĕmum alpēstre Rchb.; ſ. Nr. 1591.
2746. XIV., 2; Rachenblümler: Pediculāris incarnāta Jacq. Fleiſchfarbenes Läuſekraut. Bltr. tief-fiederſpalt., Fiedern ſchmal-lanzettl.; K. röhrig, 5ſpalt., zott., Lappen langharig, lanzett-lineal., ſpitz, ganzrand., grade; St. ſchwarzbraun-beblätt.; Bl. fleiſchrot; Helm ſtark ſichelf.; ☉; 7 bis 8; ♯.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Draba aizoīdes L.; ſ. Nr. 285.
—. „ „ D. stellāta Jacq.; ſ. Nr. 1772.
—. „ „ Hutchinsĭa alpīna R. Br.; ſ. Nr. 842.
—. XV., 2; „ Arăbis pumĭla Jacq.; ſ. Nr. 1714.
—. „ „ A. bellidifolĭa Jacq.; ſ. Nr. 1715.
2747. „ „ A. coerulĕa Wulff. Blaublühende Gänſekreſſe. St. kurzharig; Bltr. glänz., vorn 3- bis 5zähn., grundſt. aufr., verk.-eif., ſtengelſt. halb-umfaſſ.; Bl. blau; Schoten aufr., meiſt grade; Narbe faſt 4lapp.; 2; 7 bis 8.
2748. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum speciōsum Lk. Großköpfiges Habichtskraut. St. beblätt., äſtig; Aeſte wenigköpf., an der Spitze verdickt; Bltr. lederartig, beiderſ. zugeſp., gezähnt, gewimp., flockig; Hülle zott., locker-dachig, äußere Bltchn. zum theil auf den verdickten, graufilz. Stiel herabgerückt; Bl. goldgelb; 2; 7 bis 8.
—. XIX., 1; Korbblütler: Crepis alpēstris Tausch; ſ. Nr. 2433.
2749. „ „ C. montāna Rchb. (Hieracĭum montānum Jacq., Hypochoeris montāna L., Soyēra mont. Monn.). Berg-Grundfeſte. St. einfach, meiſt 1köpf., oben verdickt; Hülle dachig, von ſchwärzl. Haren rauh; Bl. gelb; Fr. ſchnabellos; Blütenboden behart; 2; 7 bis 8.
2750. XIX., 1; Korbblütler: Cirsĭum spinosissĭmum Scop. Vieldornige Wegdiſtel. St. zott.; Köpfchen gehäuft in den Winkeln kleiner Deckbltchn.; Bltr. umfaſſ., buchtig-fiederſpalt., Fiedern 3ſpalt.- und dornig-gezähnt, ungleich-dornig-gewimp.; Hüllbltchn. lanzettl., aufr., langdornig; Bl. gelblichweiß bis ockergelb; 2; 7 bis 8.
—. XIX., 2; Korbblütler: Senecĭo rupēstris W. et K.; ſ. Nr. 843.
—. XXI., 3; Halbgras: Carex tenŭis Host; ſ. Nr. 1774.
—. „ „ C. sempervĭrens Vill.; ſ. Nr. 844.

d¹. Auf Kalkfelsen:

2751. V., 1; Glockenblümler: Campanŭla zoysĭi Wulf. Zoysen's Glockenblume. St. 1- bis 3blüt.; Bltr. ganzrand., unterste eif. oder ellipt., untere stengelst. verk.-eilängl., obere längl.; Bl. nickend, himmelblau, mit 4 tiefblauen Streifen; Kronsaum 1/4-5spalt., Lappen fast 3eck., innen zott.; Kapf. kreiself., nickend; 4; 7 bis 8; St., Kr. u. s. w.

—. XII., 3; Rosenpfl.: Potentĭlla caulēscens L.; s. Nr. 1777.

—. XV., 1; Kreuzblütler: Cochlearĭa saxatĭlis Lmk.; s. Nr. 1778.

—. XIX., 1; Korbblütler: Crepis alpēstris Tausch; s. Nr. 2433.

e¹. Auf den höchsten Kalkalpen:

2752. X., 2; Steinbrechpfl.: Saxifrăga stenopetăla Gaud. Blattloser Steinbrech. Stämmchen ligend, locker-ästig; Bltr. keilf., 3- bis 5spalt., selten ungetheilt; Blütenstgl. 1 bis 3, blattlos, 1blüt.; Krbltr. fast 3mal schmäler, als die 3eck. Kelchlappen, zitrongelb; 4; 7 bis 8.

—. XV., 1; Kreuzblütler: Petrocallis pyrenaĭca R. Br.; s. Nr. 1779.

—. XV., 1; Kreuzblütler: Draba sautēri Hoppe; s. Nr. 1780.

f¹. Auf steinigen, felsigen Abhängen der höchsten Kalkalpen:

2753. XIX., 1; Korbblütler: Crepis jacquīni Tausch (C. chondrilloĭdes Froel., DC., Hieracĭum chondr. L.). Schweinssalatblättriger Pippau. St. aufr., beblätt., meist wenigköpf., nebst den lineal-lanzettl. Bltrn. etwas filz. oder kahl; Blütenst. und Hülle graufilz., schwarzharig; Hüllbltchn. 2reih.; Bl. gelb, Zähne orange; 4; 7 bis 8.

Variirt: vulgāris Kitt. (rauhhüllig), norĭca Froel. (Hülle grauflock.), rhaetĭca Froel. (Hülle schwarzborstig, am Rande graufilz.), integrifolĭa Froel. (Bltr. lineal., ganzrand.).

g¹. Auf grasigen Jochen der höchsten Kalkalpen:

2754. XIX., 1; Korbblütler: C. hyoseridifolĭa Tausch (Soyēra hyos. Vill., Hieracĭum hyoseridifolĭum Vill.). Gletscher-Grundfeste. St. beblätt., 1köpf.; Hülle dicht-grau- und schwarz-gliederharig; Hüllbltchn. dachig; Bl. gelb; 4; 7 bis 8; Kr., Ty., St., Bay.

h¹. Auf naſſen Stellen der Kalkalpen:

—. XIV., 2; Rachenblümler: Pediculāris rostrāta L.; ſ. Nr. 2686.

i¹. Auf Geröll der Kalkalpen:

2755. X., 5; Nelkenblütler: Cerastĭum ovātum Hoppe. Eiblättriges Hornkraut. Raſenbildend; Stämmchen ligend, wurzelnd; St. oben drüſenhaarig; Bl. gabel- und gipfelſt.; Blütenſt. aufr., nach der Blütezeit faſt wagr.-abſteh.; Deckbltr. eif., an der Baſis gewimp., nebſt den kahlſpitz. Kbltchn. breit-randhäutig; Bl. weiß; 4; 7 bis 8; De., Kä., St.

Varirt: C. lanceolātum Rchb. (Bltr. lanzettl.).

—. XV., 1; Kreuzblütler: Cochlearĭa saxatĭlis Lmk.; ſ. Nr. 1778.

—. XV., 1; Kreuzblütler: Aethionēma saxatĭle R. Br.; ſ. Nr. 846.

2756. XV., 1; Kreuzblütler: Thlaspi rotundifolĭum Gaud. (Ibēris rotundifolĭa L.). Rundblättriges Hellerkraut. Wrz. mehrköpf.; Köpfe ligend; St. einfach; Bltr. kaum etwas gezähnt, grundſt. verk.-eirund, ſtengelſt. eif., an der Baſis herzf., mit umfaſſ. Oehrchen; Bl. lila oder pfirſichblütrot; Schötchen faſt verk.-4ſeit.-piramidenf., ſehr ſchmal-geflügelt; 4; 7 bis 8.

k¹. An felſigen Stellen der Kalkalpen:

—. III, 1; Baldrianpfl.: Valeriāna saxatĭlis L.; ſ. Nr. 1775.

—. X., 2; Steinbrechpfl.: Saxifrăga caesĭa L.; ſ. Nr. 1776.

—. XII., 3; Roſenpfl.: Potentĭlla caulēscens L.; ſ. Nr. 1777.

—. XV., 1; Kreuzblütler: Cochlearĭa saxatĭlis Lmk.; ſ. Nr. 1778.

2757. XIX., 1; Korbblütler: Saussurĕa pygmaea Spr. Zwerg-Soſſüree. St. einfach, niedrig, wenigblättr., filz.-rauh, 1köpf.; Bltr. meiſt grundſt., lineal., faſt ganzrand., unterſ. rauhharig; Hüllbltchn. langzugeſp.; Autherenſchwänze ſtark gebärt.; Bl. purpurn; 4; 7 bis 8; De., Sg., St., Kr.

l¹. An ſchattigen Felſen der Kalkalpen:

—. X., 3; Nelkenblütler: Moehringĭa muscōsa L.; ſ. Nr. 1666.

m¹. An Bächen auf Kalkalpenwieſen:

—. V., 2; Doldenpfl.: Heraclēum aspĕrum M. B.; ſ. Nr. 2743.

n¹. Auf Weiden der Kalk- und Voralpen:

2758. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus alpīnus L. Alpen-Nelke. St. aufr., kahl, 1blüt.; Bltr. lineal-lanzettl.,

oberſte faſt ſpatelf., ſämmtl. ſtumpf, kahl; Bl. geruchlos, oberſ. fleiſchrot, am Schlunde blaſſer, purpurn-gefleckt, unterſ. blaſſer oder grünlichweiß; 4; 7 bis 9; Oe., St., Kä., Ty.

o¹. In Wäldern der Kalkalpen:

—. XIX., 1; Korbblütler: Aposĕris foetĭda Less.; ſ. Nr. 491.

p¹. Auf Felſen und Geröll der Kalk- und Voralpen:

—. XV., 1; Kreuzblütler: Cochlearĭa saxatĭlis Lmk.; ſ. Nr. 1778.

—. XV., 1; Kreuzblütler: Thlaspi rotundifolĭum Gaud.; ſ. Nr. 2756.

q¹. Auf Schieferalpen.

—. X., 2; Steinbrechpfl.: Saxifrăga burseriāna L.; ſ. Nr. 839.

—. X., 5; Dickblattpfl.: Sedum annŭum L.; ſ. Nr. 1356.

r¹. Auf und an Felſen:

—. II., 1; Rachenblümler: Paederōta agerĭa L.; ſ. Nr. 1792.

—. „ „ P. zannichelĭi Brign.; ſ. Nr. 2710.

—. „ „ P. bonarōta L.; ſ. Nr. 1793.

—. III., 1; Baldrianpfl.: Valeriāna montāna L.; ſ. Nr. 1153.

2759. III., 2; Graspfl.: Agrōstis alpīna Scop. Alpen-Windhalm. Wrz. faſerig, raſenbildend; Halm aufr.; Bltr. ſchmal-lineal., flach oder rinnig; Riſpe eilängl., mit ſparſamen, lockeren, abſteh., ſcharfen Aeſten, rötl. oder violet bis blau; Blattſch. tief-gefurcht; 4; 7 bis 8.

2760. III., 2; Graspfl.: Calămagrōstis argentĕa DC. (Arŭndo speciōsa Schrad., Agrōstis calamagr. L., Lasĭagrōstis calam. Lk.). Silberfarbenes Reitgras. Bltr. lineal., glatt, oberſ. ſcharf; Riſpe locker, aufr., gelblichgrün; Blütenſch. zugeſp.; Granne an der Baſis auswärts-gebrochen; 4; 7 bis 8; Ty., Kr.

2761. III., 2; Graspfl.: Avēna sempervĭrens Vill. Immergrüner Hafer. Wrz. büſchelf.; Bltr. faſt zſgerollt, innen geſtreift, ſteif, ſehr lang; Riſpe gleichdick, langäſtig, nickend, während der Blüte offen, endl. zſgezogen; Aehrchen 2- bis 4blüt., violet, gelb und weiß; gipfelſt. Blütchen meiſt unfruchtbar; 4; 7 bis 8.

2762. III., 2; Graspfl.: Festūca pumĭla Vill. Niedriger Schwingel. Wrz. faſerig; Halme in Raſen; Bltr. zſgerollt, fadenf., ſchlaff; Blatthäutchen längl.; Riſpe offen, eif., aufr., endl. zſgezog.; untere Aeſte zu 1 bis 2; Fruchtk. an der Spitze behart; 4; 7 bis 8.

—. IV., 1; Krapppfl.: Galĭum lucĭdum All.; ſ. Nr. 1794.

—. V., 1; Glockenblümler: Campanŭla spicāta L.; ſ. Nr. 1795.
2763. V., 2; Doldenpfl.: Bupleurum ranunculoïdes L. Ranunkelblütiges Haſenöhrchen. St. aufr., beblätt.; Bltr. lineal-lanzettl., ſtengelſt. halb-umfaſſ., herzf.; Hüllbltchn. 1 bis 3, eilanzettl., ſitz.; Bl. gelb; Fruchthauptrippen erhaben-ſcharf; 4; 7 bis 8; Kr., Sg., Ty.
—. VI., 2; Knöterichpfl.: Oxyrĭa reniformis Hook; ſ. Nr. 1796.
—. X., 2; Steinbrechpfl.: Saxifrăga aïzoon Jacq.; ſ. Nr. 2534.
—. X., 3; Nelkenblütler: Silēne rupēstris L.; ſ. Nr. 2536.
—. X., 5; Dickblattpfl.: Sedum anacampsĕros L.; ſ. Nr. 1797.
—. XI., 5; „ Sempervīvum hirtum L.; ſ. Nr. 2537.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Tozzĭa alpīna L.; ſ. Nr. 2545.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Arăbis alpīna L.; ſ. Nr. 788.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum humĭle Host; ſ. Nr. 1798.
—. „ „ H. rupēstre All.; ſ. Nr. 1799.
—. „ „ H. pallēscens W. et K.; ſ. Nr. 2543.
—. „ „ H. staticaefolĭum All.; ſ. Nr. 1809.
2764. „ „ H. glaucum All. (H. saxatĭle Jacq.). Blaugrünes Habichtskraut. Kahl, blaugrün; St. geſpreizt-äſtig, oben nackt; Bltr. lederartig, lineal-lanzettl., oberſ. etwas borſtig; Blütenſt. durch herabgebr. Hüllbltchn. ſchuppig, nebſt den letzteren etwas ſchülferig; 4; 7 bis 8; A., Oe., Mä.
—. XIX., 1; Korbblütler: Leontŏdon berinĭi Roth; ſ. Nr. 1800.

s[1]. In Felſenſpalten:

—. X., 3; Nelkenblütler: Alsīne lanceolāta M. et K.; ſ. Nr. 1805.

t[1]. An feuchten, naſſen Felſen:

—. IV., 1; Krapppfl.: Galĭum boreāle L.; ſ. Nr. 2081.
—. V., 1; Schlüſſelblümler: Cortūsa matthiōli L.; ſ. Nr. 854.
—. X., 2; Steinbrechpfl.: Saxifrăga cernŭa L.; ſ. Nr. 2580.
2765. „ „ Zahlbrucknēra paradōxa Rchb. (Saxifrăga parad. Sternb.). Wunderliche Zahlbrucknere. Wrzſtock kriech., fadenf.-verläng.-ſchuppig; St. ligend, aufſteig., gliederharig; Blattſcheibe herz-nierenf., 5- bis 7-lapp.; Blütenſt. einzeln, gipfelſt.; Bl. grün, innen die Kbltchn. gelbl.; Antheren ſtalgrau; 4; 7 bis 8; Kä., St.
—. X., 3; Nelkenblütler: Silēne acaulis L.; ſ. Nr. 1802.
—. „ „ Alsīne sedoïdes Fenzl; ſ. Nr. 2738.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Tozzĭa alpīna L.; ſ. Nr. 2545.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Arăbis hallēri L.; ſ. Nr. 783.

u¹. Auf Felsen der höheren Alpen:

2766. X., 2; Steinbrechpfl.: Saxifrăga sedoīdes L. Mauerpfefferähnlicher Steinbrech. St. ligend, äſtig; Blütenſtgl. wenigblättr.; Bltr. rinnig-breit- und kurzgeſtielt, ungetheilt, lanzettl. bis lineal-lanzettl., zugeſp.; Bl. zitrongelb; 4; 7 bis 8; Kä., St., Kr., Ty.
Varirt: S. hohenwarthĭi Sternb. (Blütenſtgl. beblätt.; Kronblattſpitzen braun).

v¹. Zwiſchen Geſtein:

—. V., 1; Wegdornpfl.: Rhamnus rupēstris Scop.; ſ. Nr. 1811.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Arăbis alpīna L.; ſ. Nr. 788.

w¹. An felſigen Stellen:

—. X., 5; Dickblattpfl.: Sedum annŭum L.; ſ. Nr. 1356.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Erysĭmum odorātum Ehrh.; ſ. Nr. 1542.

x¹. An ſteinigen, felſigen Stellen:

—. II., 1; Rachenblümler: Veronīca saxatĭlis L.; ſ. Nr 856.

y¹. An ſteinigen Stellen:

—. V., 1; Zauberpfl.: Thesĭum rostrātum M. et K.; ſ. Nr. 1810.

z¹. Auf Steingeröll:

—. V., 2; Doldenpfl.: Libanōtis cretēnsis Gaertn.; ſ. Nr. 1812.
—. X., 2; Steinbrechpfl.: Saxifrăga bryoīdes L.; ſ. Nr. 2532.
—. X., 3; Nelkenblütler: Moehringĭa polygonoīdes M. et K.; ſ. Nr. 1806.
—. XIII., 1; Mohnpfl.: Papāver alpīnum L.; ſ. Nr. 1757.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Ranuncŭlus glaciālis L.; ſ. Nr. 2712.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Thlaspi rotundifolĭum Gaud.; ſ. Nr. 2756.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Arăbis coeruleă Wulff.; ſ. Nr. 2747.
—. „ „ A. alpīna L.; ſ. Nr. 788.
—. „ „ Erysĭmum odorātum Ehrh.; ſ. Nr. 1542.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum glaucum All.; ſ. Nr. 2764.

a². Auf Geröll der Alpengewäſſer:

—. IV., 1; Krapppfl.: Galĭum helvetĭcum Weigel; ſ. Nr. 2790.
—. V., 5; Leinpfl.: Linum viscōsum L.; ſ. Nr. 1691.
—. X., 2; Steinbrechpfl.: Zahlbrucknēra paradōxa Rchb.; ſ. Nr. 2765.

—. X. 2; Steinbrechpfl.: Saxifrăga patens Gaud.; ſ. Nr. 1807.
2767. „ „ S. aïzoïdes L. Immergrüner Steinbrech. „ Blr. lanzett-lineal. bis lineal., ſtachelſp., entfernt-borſtig-gewimp., oberſ. gewölbt, vor der Spitze 1-punktig; Kelchlappen ſchmalhäutig; Bl. gelb, pomeranzen-gelb-gefleckt; 2|; 7 bis 8.
—. XII., 3; Roſenpfl.: Dryas octopetăla L.; ſ. Nr. 2541.
—. XVI., 2; Tamariskenpfl.: Myricarĭa germanĭca L.; ſ. Nr. 1808.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum staticaefolĭum All.; ſ. Nr. 1809.
2768. XIX., 2; Korbblütler: Erigĕron droebachēnsis Mill. (E. angulōsus Gaud.). Kantiges Berufkraut. St. aufr. oder aufſteig., wenig-behart, äſtig; Aeſte 1-, ſelten 2- bis 3köpf.; Blr. kahl, unterſte faſt 3nervig, lanzettl., ſtengelſt. 1nervig, lineal-lanzettl.; Stral hellpurpurn; ⊙; 7 bis 8.

b². Auf Kies der Alpenbäche:

—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: Epilobĭum alpīnum L.; ſ. Nr. 2510.
—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: E. origanifolĭum Lam.; ſ. Nr. 2547.
—. X., 2; Steinbrechpfl.: Saxifrăga aïzōon Jacq.; ſ. Nr. 2534.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Cardamĭne asarifolĭa L.; ſ. Nr. 1835.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum graminifolĭum DC.; ſ. Nr. 2643.
—. XIX., 1; Korbblütler: Leontŏdon berinĭi Roth; ſ. Nr. 1800.

c². Auf Flußkies der Voralpen:

—. X., 2; Nelkenblütler: Gypsophīla repens L.; ſ. Nr. 2482.

d². Auf Geröll der Gießbäche:

—. III., 2; Graspfl.: Avēna distichophўlla Vill.; ſ. Nr. 2662.

e². An Bächen unter Gebüſch:

—. V., 2; Doldenpfl.: Pleurospērmum austriăcum Hoffm.; ſ. Nr. 2557.

f². An Alpengewäſſern:

—. III., 2; Graspfl.: Avēna distichophўlla Vill.; ſ. Nr. 2662.
—. „ „ Poa cenisĭa All.; ſ. Nr. 2503.
—. „ „ P. alpīna L.; ſ. Nr. 1814.
—. „ „ Brachypodĭum poa R. et Sch.; ſ. Nr. 1536.

2769. IV., 4; Najadenpfl.: Potămogēton praelōngus Wulff. Geſtrecktes Laichkraut. Blr. gleichf., halb-umfaſſ., wechſelſt., längl.-lanzettl. oder ellipt., gefaltet-randig, ſtumpf, an der Spitze ſchief-eingezog.-kapuzenf., untergetauchte kraus, ſchön ſmaragdgrün; Fr. zſgedr., ſcharfleiſtig; 4; 7 bis 8.*)

—. V., 1; Schlüſſelblümler: Cortūsa matthiōli L.; ſ. Nr. 854.

—. VI., 1; Semede: Juncus alpīnus Vill.; ſ. Nr. 1831.

—. XIV., 2; Rachenblümler: Bartschĭa alpīna L.; ſ. Nr. 1612.

2770. „ „ Linarĭa alpīna Mill. Alpen-Leinkraut. Kahl; Blütenſt. kahl; Blr. lineal-lanzettl., an der Baſis verſchmäl.-herablauf., 3nervig, ſtumpf, ganzrand., meiſt zu 4; Kelchlappen lanzettl., ſtumpfl.; Sporn faſt grade; Bl. rötlichblau, mit orangegelbem Gaumen; ⊙; 7 bis 8; ☨.

—. XXII., 2; Weide: Salix arbuscŭla L.; ſ. Nr. 1830.

g². Auf Steinfeldern und Geröll:

2771. III., 2; Graspfl.: Poa minor Gaud. Kleines Riſpengras. Wrz. büſchelig; Halme in Raſen, aus geknieter Baſis aufſteig., etwas zſgedr., kahl; Blr. ſchmal-lineal., kurz, rinnig; Riſpe längl., locker, nickend; Aeſte hardünn; Blütenſch. ſchwach-gekielt, ſtumpf; 4; 7 bis 8.

h². Auf moſigen Felſen und Steinen:

—. II., 1; Rachenblümler: Veronīca alpīna L.; ſ. Nr. 1801.

i². Auf faulem Holze:

—. X., 4; Nelkenblütler: Sagīna bryoīdes Froel.; ſ. Nr. 1834.

k². An Quellen:

—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: Epilobĭum alpīnum L.; ſ. Nr. 2510.

—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: E. origanifolĭum Lam.; ſ. Nr. 2547.

l². An feuchten, naſſen Stellen:

—. V., 2; Enzianpfl.: Gentiāna utriculōsa L.; ſ. Nr. 941.

—. X., 2; Steinbrechpfl.: Saxifrăga aspĕra L.; ſ. Nr. 1803.

—. „ „ S. aïzoīdes L.; ſ. Nr. 2767.

—. „ „ S. mutāta L.; ſ. Nr. 1804.

2772. „ „ S. stellāris L. Sternblumiger Steinbrech. Untere Blr. gehäuft, ſitz., an der Spitze

*) P. decipiens Nolte iſt eine ſchöne, nördliche Abart mit rötlichen Nebenblättern und kurzen Aehrenſtielen; bleibt, als Baſtard, unfruchtbar!

gezähnt; St. blattlos, aufr.; Bl. langeſtielt; Krbltr. lanzettl., ſpitz, flach-abſteh., faſt genagelt, weiß, an der Baſis mit 2 gelben Flecken; 4; 7 bis 8; St., Kä., Sg., Ty., Bay., Schwarzwald, Vogeſen.

Varirt: subacaulis Kitt. (faſt ſtengellos), latifolĭa Be. (breitblättr.), angustifolĭa Be. (ſchmalblättr.), chlorāntha Hegetschw. (grünblumig), leucanthĕmifolĭa Lapeyr. (3 Krbltr. eilanzettl., gelbfleck., lang-benagelt, 2 lanzettl., kurzgenagelt).

—. X., 3; Nelkenblütler: Moehringĭa heterophўlla Doll.; ſ. Nr. 1532.

—. XIV., 2; Rachenblümler: Pediculāris tuberōsa L.; ſ. Nr. 1828.

—. XIV., 2; Rachenblümler: Bartschĭa alpīna L.; ſ. Nr. 1622.

2773. XIX., 2; Korbblütler: Achillēa atrāta L. Schwarzhüllige Garbe. St. weichharig; grundſt. Bltr. fiederſpalt., 3theil. oder einfach, Fetzen ſchmallineal., zugeſp.; Spreublttchn. ſchwarzſpitz.; Bl. groß, ſchmutzigweiß; 4; 7 bis 8.

Varirt: A. clusiāna Tausch (Fiedern mit mehr als 5 Fetzen).

—. XXII., 2; Weide: Salix arbuscŭla L.; ſ. Nr. 1830.

m². An ſumpfigen Stellen:

—. XIX., 1; Korbblütler: Willemetĭa apargioīdes Less.; ſ. Nr. 1829.

n². An torfigen Stellen:

2774. X., 2; Steinbrechpfl.: Saxifrăga hieracifolĭa W. et K. Habichtskrautblättriger Steinbrech. Bltr. grundſt., eilängl. oder verk.-längl., geſchweift-gezähnt, ſehr fein-roſtig-drüſenharig; Aeſte gabelzweigig, doldentraub.; Kbltr. wagr.-abſteh.; Bl. grünlich, klein; 4; 7 bis 8; St., Kr.

o². Auf Morboden und Torfmoren:

—. III., 1; Halbgras: Eriophŏrum capitātum Host; ſ. Nr. 872.

—. V., 1; Schlüſſelblümler: Soldanēlla montāna Willd.; ſ. Nr. 496.

—. VI., 1; Semede: Juncus filifōrmis L.; ſ. Nr. 1790.

—. „ „ J. alpīnus Vill.; ſ. Nr. 1831.

—. „ „ J. squarrōsus L.; ſ. Nr. 1141.

2775. „ „ J. stygĭus L. Hochalpen-Seme. Halm ſteif, 1- bis 2blättr., walzenf.; Bltr. borſtenf., rinnig; Spirre höchſt einfach, gipfelſt., mit 1 bis 3 aufr.,

2= bis 3blüt. Köpfchen; Stbf. kürzer als die Antheren; Kelchlappen lanzettl., weißrand., braunspitz.; 4; 7 bis 8; Bay., St., Sg., Ty.

—. VI., 3; Zeitlosenpfl.: Tofieldĭa calyculāta Whlbg.; s. Nr. 1832.

—. XIV., 2; Rachenblümler: Pediculāris sceptrum carolīnum L.; s. Nr. 1056.

—. XX., 1; Orchidee: Malāxis monophȳllos Sw.; s. Nr. 1142.

—. XXI., 3; Halbgras: Carex microglōchin Whlbg.; s. Nr. 875.

—. XXII., 2; Weide: Salix myrtilloïdes L.; s. Nr. 881.

p². An Abhängen:

—. X., 2; Steinbrechpfl.: Saxifrăga vandellĭi Sternb.; s. Nr. 859.

—. XII., 3; Rosenpfl.: Geum sudetĭcum Tausch; s. Nr. 1573.

—. XXI., 3; Halbgras: Carex incūrva Lightf.; s. Nr. 1729.

2776. „ „ C. foetĭda All. Stinkende Segge. Halm 3kant., an der Spitze scharf; Bltr. breit=lineal., zugesp.; Aehrchen in ein eif. oder rundl. Köpfchen vereinigt, an der Spitze ♂; Fr. ellipt., eif., nervig, zugesp., Schnabel 2zähn., glatt; 4; 7 bis 8; Sg., südl. A.*)

q². An feuchten Abhängen:

—. V., 1; Borretschpfl.: Cerīnthe glabra Rchb.; s. Nr. 1813.

r². In engen, schattigen Alpenthälern:

—. II., 1; Nachtkerzenpfl.: Circaea alpīna L.; s. Nr. 1062.

s². Auf Feldern in den Alpen:

2777. XIX., 1; Korbblütler: Cardŭus platylēpis Rchb. et Saut. Breitschuppige Distel. St. einfach oder ästig, fast bis zu den Köpfchen dornig=geflügt.; Bltr. herablauf., unters. auf den Rippen filz., längl., bucht=fiederspalt.; Fiederzähne kurzdornig; Köpfchen sitz. oder kurzgestielt, kug., aufr., 1 oder 2 bis 4, gipfelst. aufr., seitenst. absteh.; Bl. purpurn; 4; 7 bis 8; südl. A.

*) C. tripartita DC. (C. microstylis Gay), in der westlichen Schweiz zu hause, wahrscheinlich auch in Südtyrol, unterscheidet sich durch bogige Halme, 3= bis 5ährige Blütenköpfchen, scharfkielige, begrannte Blütenscheiden und Blütenscheidchen, die fast so lang sind, als die kurzgeschnäbelte Frucht. — Beide Arten variren mit in eine kleine, gelappte, unterbrochene Aehre gestellten Aehrchen: C. lobata Auct. pl.

t². An Sennhütten und Kühruhen:

—. VI., 3; Knöterichpfl.: Rumex alpinus L.; ſ. Nr. 1697.

u². An ſonnigen, trocknen Orten:

2778. V., 2; Doldenpfl.: Ligusticum seguieri Koch (Selinum seg. L. fil.). Seguier's Leckermaul (Liebſtöckel). St. walzenf., geſtreift, äſtig; untere Bltr. vielfach-zſgeſetzt, Läppchen lanzett-lineal., ſpitz, ſtachelſp.; Dolde gipfelſt., ſehr groß; Hülle fehlend oder 1- bis 3blättr.; Bl. weiß; 4; 7 bis 8; Kr. *)

v². Auf Alpenkämmen:

2779. V., 2; Doldenpfl.: Neogaya simplex Meisn. (Gaya simpl. Gaud., Laserpitium simpl. L.). Einfache Neogaye (Gaye). Wrzſtock braunſchopfig; St. einfach, blattlos, geſtreift; grundſt. Bltr. 3fach-fiedertheil., Fetzen lineal., zugeſp., kahl, etwas fleiſchig; Doldenſtralen höchſt feinkant., ſchärfl.; Bl. weiß oder roſenrot; 4; 7; Kä., Sg., Ty.

w². Auf unfruchtbaren Hügeln:

—. XIX., 2; Korbblütler: Achillea tomentosa L.; ſ. Nr. 1839.

x². Auf Grashügeln:

2780. XVII., 4; Hülſenpfl.: Phaca oroboides DC. (Astragalus orob. Hornem.). Erbſenartiges Knollenkraut. St. aufſteig., 4kant.; Bltr. meiſt 6parig-gefied.; Fahne von faſt dopp. Schiffchenlänge; Flügel ungetheilt, kürzer als die Fahne; Hülſe im K. kurzgeſtielt; Bl. hell-indigblau, an der Baſis gelblichweiß, geruchlos; 4; 7 bis 8; St.

y². Auf Grasplätzen und Alpentriften:

—. III., 2; Graspfl.: Poa alpina L.; ſ. Nr. 1814.

—. V., 1; Glockenblümler: Campanula alpina Jacq.; ſ. Nr. 1815.

—. V., 5; Leinpfl.: Linum alpinum L.; ſ. Nr. 1692.

—. VI., 1; Lilienpfl.: Ornithogalum pyrenaicum L.; ſ. Nr. 1817.

—. VI., 1; Lilienpfl.: Lilium carniolicum Bernh.; ſ. Nr. 864.

2781. „ „ Lloydia serotina Rchb. Späte Alplilie. Zwiebel verläng., ſtockig, dickſchalig; grundſt. Bltr.

*) L. ferulaceum unterſcheidet ſich durch an der Spitze fiederſpaltige Hüllblättchen!

fadenf., rinnig; Schaft aufr., oben mit Deckbltchn. ohne Bl.; Bl. gipfelst., einzeln, klein, weiß; 4; 7 bis 9.

2782. X., 5; Nelkenblütler: Spergella glabra Rchb. (Sagina gl. Koch). Kahler Fünfling. Bltr. kahl; Blütenst. vor der Blütezeit hakenf.-gebog.; Kbltchn. längl.; Krbltr. von dopp. Kelchlänge, weiß; Bl. groß; 4; 6 bis 7; Ty.

—. XII., 3; Rosenpfl.: Sieversia montana Spr.; s. Nr. 2552.

2783. „ „ Potentilla minima L. (P. brauneana Hoppe). Kleinstes Fingerkraut. Wrzstock dick, mehrköpf.; St. 1blüt.; Bltchn. stumpf-5- bis 7zähn., am Rande und unters. auf den Adern absteh.-weichharig; Nebenbltr. längl.-lanzettl.; Bl. gipfelst., gelb; 4; 7 bis 8.

—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Ranunculus thora L.; s. Nr. 1818.

2784. XV., 2; Kreuzblütler: Arabis vochinensis Spr. Wocheiner Gänsekresse. Auslauf., weich-glieder- und sternharig; Bltr. stumpf, ganzrand., gabelharig-gewimp.; Schote nebst den Stielchen absteh., grade, von dopp. Stiellänge; Klappen mit Mittelnerv und Adern; Griff. deutl. abgesondert; Bl. weiß; 4; 7; Kr., Kä.

—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Trifolium patens Schreb.; s. Nr. 1816.

2785. XVII., 4; Hülsenpfl.: Oxytropis lapponica Gaud. (Phaca lapp. Whlbg.). Lappländer Fahnwicke. Kurzsteng., aufsteig., harig; Bltr. 9- bis 10parig-gefied.; Blütenst. zur Fruchtzeit noch einmal so lang, als das Blatt; Aehren kurz, 6- bis 12blüt.; Hülse häng.; Bl. violet; 4; 7 bis 8; Vintschgau.

—. XIX., 1; Korbblütler: Leontodon squamosus Lmk.; Nr. 2553.

z². Auf sonnigen Rasenplätzen:

—. XII., 3; Rosenpfl.: Potentilla aurea L.; s. Nr. 1650.

a³. Auf feuchten Grasplätzen:

—. XV., 2; Kreuzblütler: Arabis hallëri L.; s. Nr. 783.

b³. Auf fetten Grasplätzen:

—. VI., 1; Lilienpfl.: Asphodelus albus Mill.; s. Nr. 866.

—. X., 5; Nelkenblütler: Spergella saginoides Rchb.; s. Nr. 1643.

c³. Auf trocknen, grasigen Plätzen:

2786. XIV., 1; Lippenblümler: Hormīnum pyrenaïcum L. Alpen-Scharlei (Drachenmaul). St. aufr.; grundst. Bltr. gestielt, rosettenf.-gehäuft, eif., sägig-tief-gekerbt, kahl,

stengelst. schuppenf., ei- bis herzf., zugesp., wie der St. weichharig; Bl. purpurviolet; 4; 7 bis 8; Sg., Ty. u. s. w.

d³. Auf Geröll der Grasplätze:

2787. III., 2; Graspfl.: Agrōstis rupēstris All. Felsen-Windhalm. Wrz. faserig, rasenbildend; Halm aufr.; Bltr. borstenf.; Blatthäutchen verläng., ellipt.; Rispe schmal, lockerästig, rötl. oder violet bis blau, Zweiglein sperrig-auseinanderst., Stiele glatt; 4; 7 bis 8.

—. III., 2; Graspfl.: Avēna distĭchophўlla Vill.; s. Nr. 2662.

—. „ „ Poa minor Gaud.; s. Nr. 2771.

—. V., 1; Zauberpfl.: Thesĭum rostrātum M. et K.; s. Nr. 1810.

—. XIV., 2; Rachenblümler: Tozzĭa alpīna L.; s. Nr. 2545.

e³. Auf steinigen Grasplätzen:

—. XIV., 2; Rachenblümler: Erinus lanceolātus Kitt.; s. Nr. 865.

f³. Auf feuchten Grasplätzen:

2788. XIV., 2; Rachenblümler: Pediculāris verticillāta L. (P. lanāta Pall.). Wirteliges Läusekraut. St. einfach, rauhharig, aufr., meist mehre; grundst. Bltr. gefied., stengelst. zu 4 wirtelig, fiederspalt.; Oberl. kürzer als die Unterl.; Kr. purpurrot; 4; 7 bis 8.*)

g³. Auf Alpenwiesen:

—. III., 2; Graspfl.: Agrōstis alpīna Scop.; s. Nr. 2759.

—. „ „ Phleum alpīnum L.; s. Nr. 1819.

—. „ „ Phl. michelĭi All.; s. Nr. 1820.

—. „ „ Festūca spadicĕa L.; s. Nr. 1737.

2789. „ „ F. varĭa Haenke. Bunter Schwingel. Wrz. faserig; Halme in Rasen; Bltr. rinnig-gefalt., fast fadenf.; Blatthäutchen längl.; Rispe längl., während der Blütezeit absteh., später mehr oder weniger zsgezog.; Aeste zu 1 bis 2 in Wirteln; Aehrchen 5- bis 8blüt.; unteres Blütensch. lanzettl.; 4; 7 bis 8.

Varirt: F. flavēscens Bell. (Aehrchen grünlichgelb), F. eskĭa Ramond (starke, starrere Form).

—. III., 2; Graspfl.: Koelerĭa hirsūta Gaud.; s. Nr. 1738.

2790. IV., 1; Krapppfl.: Galĭum helvetĭcum Weigel (G. baldēnse Spr.). Schweizer Labkraut. Bltr. unten zu 4

*) Die Blätter dieser Pflanze werden von den ostasiatischen Kurilen als Thee benutzt!

bis 5, am mittl. St. zu 6 bis 8, oben gegenſt., mittl. verk.-längl., faſt ſpatelf., ſtumpf, ſtachelſp., am Rande ſchärfl., unterſte verk.-eif., obere lanzettl.; St. ſcharf-4kant.; Kronlapp. eif., ſtumpfl.; Fr. glatt, kahl; Bl. weiß; 4; 7 bis 8.

—. V., 2; Doldenpfl.: Meum athamantĭcum Jacq.; ſ. Nr. 2554.

2791. V., 2; Doldenpfl.: Heraclēum austriăcum L. Oeſterreichiſcher Bärenklau. Bltr. kurz-rauhharig, gefied. und 3zäl., Bltchn. ſitz., eilanzettl.; Dolde lang-ſtralend; Fruchtk. weichharig; Fr. rundl., verk.-eif.; Bl. weiß; 7 bis 8.

Varirt: H. siifolĭum Rchb. (ſtumpfblättrig).

2792. V., 5; Bleiwurzpfl.: Armerĭa alpīna Hoppe. Alpen-Nelkengras. Bltr. weißrand., lineal-lanzettl. oder lineal.-ſpitz, kahl, meiſt 3nervig; Blütenſt. um die Hälfte kürzer, als die flockig geſtreifte Kröhre; Krbltr. ausgerand., roſa oder bläulichrot; Blütentheile größer; 4; 7 bis 8.

—. VI., 1; Semede: Juncus triglūmis L.; ſ. Nr. 1791.

2793. „ „ Luzŭla lutĕa Desv. Gelbe Afterſeme. Bltr. lanzettl., zugeſp., kahl; Spirre zſgeſetzt, armäſtig, nickend, Zweiglein abwechſ.-ungleichlang; Kelchlappen längl., eilanzettl., ſtachelſp., 3nervig, ſo lang als die eirunde, 3kant. Kapſ.; 4; 7 bis 8.

—. VI., 1; Lilienpfl.: Antherĭcum liliastrum L.; ſ. Nr. 1821.

—. VI., 3; Zeitloſenpfl.: Verātrum album L.; ſ. Nr. 1822.

2794. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Thalĭctrum lucĭdum L. Glänzende Wieſenraute. Wrzkörper kriech. oder geglied., faſerig; St. gefurcht; Bltr. 2- bis 3fach-gefied., Bltchn. lineal., glänz.; Aehrchen der oberen Blattſch. längl.-eif., zugeſp., gezähnelt; Riſpe längl., piramidal.; Bl. aufr.; Fr. grade; 4; 7.

Varirt: Th. galioīdes Nestl. (Th. angustifolĭum L. z. Th.; Bltchn. glänz., lineal., ungetheilt oder das endſt. 3ſpalt.), Th. lucĭdum Lk. (Bltchn. lederig, lineal-längl., endſt. 2- bis 3theil.), Th. laserpitifolĭum Willd. (größere, keilblättr. Form; Bltchn. 3-, auch die ſeitl. meiſt 2- bis 3ſpalt., endſt. bis 3theil.), Th. bauhīni Crtz. (St. oben dicht-beblätt., Bltchn. lineal-lanzettl., unterſ. weichharig).

—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Ranuncŭlus pyrenaeus L.; ſ. Nr. 1823.

—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum prenanthoīdes Vill.; ſ. Nr. 2551.

—. XIX., 1; Korbblütler: Crepis montāna Rchb.; ſ. Nr. 2749.

2795. „ „ Cirsĭum erisithăles Scop. (C.

glutinōsum Lam., Cnicus erisith. L.). Klebrige Wegdiſtel. St. einfach, unten beblätt., an der Spitze blattlos und nickend, 1 bis 3köpf.; Hüllblтchn. lanzettl., klebrig; Bl. gelblich, zuweilen weiß oder rot angelaufen; 2; 7 bis 8.

2796. XIX., 1; Korbblütler: C. spinosissĭmo-erisithăles Facch. (C. flavēscens Koch). Baſtard. St. bis zur nick., mehrköpf. Spitze beblätt.; Bltr. oberſ. zerſtreut-behart, unterſ. auf der Mittelrippe zott., tief-fiederſpalt.; Bl. gelblich; 2; 7 bis 8; Ty.

—. XIX., 2; Korbblütler: Cinerarĭa longifolĭa Jacq.; ſ. Nr. 1824.

—. XIX., 3; Korbblütler: Centaurēa phrygĭa L.; ſ. Nr. 2163.

2797. „ „ C. vochinēnsis Bernh. (C. nigrēscens Koch non Willd., C. transalpīna Schleich., DC. prodr.). Wocheiner Flockenblume. St. kant., graufilz., ſperrig-äſtig; Aeſte oben verdickt; Bltr. gliederharigfilz., untere längl., buchtig-gezähnt, obere ellipt., eiſ. bis eilanzettl.; Hüllblтchn. aufr., ellipt., glänzendgrün, mit eiſ.-3eck., ſchwarzem, kammf.-gefied. Anhängſel, Fiedern hin- und hergebog.; Bl. purpurrot; 2; 7 bis 8; Kr.

—. XX., 1; Orchidee: Orchis masculă L.; ſ. Nr. 799.

—. „ „ Anacamptis pyramidālis Rich.; ſ. Nr. 481.

—. XX., 1; Orchidee: Nigritēlla angustifolĭa Rich.; ſ. Nr. 1826.

2798. XX., 1; Orchidee: N. fragrans Saut. (N. suaveŏlens Koch, Orchis suav. Vill.). Starkriechender Schwarzſtändel. Lippchen aufw.-ſteh., eiſ., undeutl.-3ſpalt.; Sporn walzenf., dünn, gekrümmt, faſt ſo lang als das ſpindelf. Ovarium; Aehre eilängl.; Bl. purpur- oder roſenrot; 2; 7 bis 8; Ty., Kä., Sg., Bay.

h³. Auf den höchſten Wieſen:

—. III., 2; Graspfl.: Festūca spadiceă L.; ſ. Nr. 1737.

—. VI., 1; Semede: Luzŭla lutĕa Desv.; ſ. Nr. 2793.

2799. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Thalictrum alpīnum L. Alpen-Wieſenraute. St. einfach, faſt nackt; Blütentraube gipfelſt.; Blütenſt. bei der Fruchtreife zurückgekr., faſt häng.; Blütchen grünl., oft rötl. überlaufen; kleinſte Art; 2; 7 bis 8.

i³. Auf feuchten Alpenwieſen:

—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: Aconītum stoerkeānum Rchb.; ſ. Nr. 1168.

—. XIX., 1; Korbblütler: Crepis succisaefolĭa Tausch; ſ. Nr. 2713.

—. XIX., 1; Korbblütler: Cirsĭum pauciflōrum Spr.; ſ. Nr. 2727.

—. XIX., 1; Korbblütler: C. palūstri-rivulāris Schiede; ſ. Nr. 1827.

k³. Auf Sumpfwieſen der Alpen:

—. V., 2; Enzianpfl.: Sweertĭa perēnnis L.; ſ. Nr. 2560.

l³. Auf ſteinigen Alpenwieſen:

—. III., 2; Graspfl.: Festūca varĭa Haenke; ſ. Nr. 2789.

m³. Auf Waldwieſen der Alpen:

—. V., 2; Doldenpfl.: Myrrhis odorāta Scop.; ſ. Nr. 490.

n³. Auf Alpwieſen an Bächen:

—. V., 2; Doldenpfl.: Heraclēum aspĕrum M. B.; ſ. Nr. 2743.

o³. Auf höher gelegenen Alpenweiden:

—. XIX., 2; Korbblütler: Leontopodĭum alpīnum Cass.; ſ. Nr. 2708.

p³. Auf Bergwieſen der Alpen:

2800. X., 5; Nelkenblütler: Lychnis flos jovis Lam. Schirmtraubige Lichtnelke. Wollig; St. aufr., einfach, oben gegenſt.-kurzäſtig; Bltr. längl.-lanzettl., eilanzettl. oder lanzettl., graufilz.; Bl. gabel- und gipfelſt., purpurn; K. faſt wollig; Krbltr. faſt halb-2ſpalt.; 2; 6 bis 7; Ty.

q³. In der Waldregion:

2801. X., 2; Steinbrechpfl.: Saxifrăga retūsa Gouan. Abgeſtutzter Steinbrech. Stämmchen dicht-raſig; Aeſte dichtbeblätt.; Bltr. fleiſch., ſitz., gegenſt., 4reih. ſich deckend, rinnig-3kant., oberſ. am Rande 3- bis 5grubig; Bl. 1 bis 3, ſitz. oder ſehr kurz-geſtielt, rötl. oder roſenrot; Kelchlapp. kahl, glatt; Griff. und Stbgf. lang-hervorrag.; 2; 7 bis 8; St.

2802. XIX., 2; Korbblütler: Senecĭo cacaliāster Lam. (S. croatĭcus W. et K., Cacalĭa saracenĭca L.). Peſtwurzartiges Kreuzkraut. Wrz. kriech.; St. geſtreift-kant., kahl; Bltr. beiderſ. etwas weichharig, untere ellipt.-lanzettl., halb-umfaſſ., obere ſitz.; Spitze der Sägezähne verdickt, grade; Deckbltchn. nebſt den Blütenſt. und walzenf. Hüllen klein-drüſenharig; Bl. gelb; Fr. kahl; 2; 7 bis 8; Ty.

r³. In ſchattigen Wäldern:

—. XV., 2; Kreuzblütler: Dentaria pentaphyllos L.; ſ. Nr. 1833.

s³. An Waldrändern:

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Coronilla emĕrus L.; ſ. Nr. 773.
—. XIX., 2; Korbblütler: Cinerarĭa alpēstris Hoppe; ſ. Nr. 1174.

t³. In hohen Gebirgswäldern:

—. V., 1; Schlüſſelblümler: Soldanella montāna Willd.; ſ. Nr. 496.
—. VI., 3; Zeitloſenpfl.: Verātrum nigrum L.; ſ. Nr. 2152.

u³. In Hainen:

—. XIX., 3; Korbblütler: Centaurēa phrygĭa L.; ſ. Nr. 2163.

v³. In feuchten Nadelholzwäldern:

2803. XIX., 2; Korbblütler: Achillēa macrophylla L. Großblättrige Garbe. St. einfach, aufr., walzenf., geſtreift, faſt kahl; Bltr. einfach-tief-fiederſpalt., Fiedern genähert, lanzettl., eingeſchn.-ungleich-ſcharf-ſägezähn., obere zufließend; Bl. weiß; 2; 7 bis 8.

w³. An ſteinigen Abhängen:

2804. XVII., 4; Hülſenpfl.: Astragălus leontīnus Wulf. Linzer Stragel. St. ligend, behart; Blthn. eif., ellipt. bis längl.-lanzettl., obere ſtachelſp., unterſ. angedr.-behart; Nebenbltr. den Bltrn. gegenſt., verwachſ.; Fahne eif., von 1/3 Flügellänge; Bl. violet, an der Baſis weiß; Hülſe im K. ſitz., rauhharig; 2; 7 bis 8.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum humĭle Host; ſ. Nr. 1798.
2805. XIX., 1; Korbblütler: H. longifolĭum Schleich. (H. cerinthoïdes Willd.). Langblättriges Habichtskraut. Blaugrün, zott.; St. ſteif, aufr., wenigköpf., unten ſchwachzott.; Bltr. faſt ganzrand., grundſt. eilanzettl., ſtengelſt. lanzettl., ſitz.; Hülle bauchig, langharig, faſt zott., faſt drüſenlos; Krzähne kaum behart; Bl. gelb; 2; 7 bis 8; Ty.

x³. Auf Geröll der höheren Alpen:

2806. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolĭum pallēscens Schreb. Blaukelchiger Klee. St. ausgebreit., ligend, nicht wurzelnd, nebſt den Bltrn. kahl; Blthn. verk.-eif., auch ellipt., an der Baſis keilig; Aehren ſcheinbar gipfelſt., in Wirklich-

keit blattachſelſt.; Blütenſt. bei voller Blüte von Kelchlänge; K. von 1/3 Kronlänge, kurzglock., Röhre häutig, 5nervig; Bl. weiß, endl. gelb; Hülſe 2ſamig; 4; 7 bis 9.

y3. Auf Voralpen:

—. V., 1; Borretſchpfl.: Echinospērmum deflexum Lehm.; ſ. Nr. 1520.
—. V., 1; Glockenblümler: Campanŭla rhomboidālis L.; ſ. Nr. 2487.
—. V., 2; Doldenpfl.: Critămus pastinacifolĭa Rchb.; ſ. Nr. 1782.
—. V., 2; Doldenpfl.: Heraclēum alpīnum L.; ſ. Nr. 2146.
—. „ „ Chaerophўllum cicutarĭa Vill.; ſ. Nr. 1107.
—. XII., 3; Roſenpfl.: Rosa glandulōsa Bell.; ſ. Nr. 1784.
—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: Aconītum lycoctŏnum L.; ſ. Nr. 2153.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Thalĭctrum angustifolĭum Jacq.; ſ. Nr. 1217.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Ranuncŭlus phthora Crtz.; ſ. Nr. 1785.
—. XVII., 3; Bitterling: Polygăla chamaebūxus L.; ſ. Nr. 1030.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Vicĭa oroboïdes Wulff.; ſ. Nr. 1786.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum speciōsum Lk.; ſ. Nr. 2748.
—. XIX., 1; Korbblütler: Crepis blattarioïdes Vill.; ſ. Nr. 1787.
2807. XIX., 2; Korbblütler: Senecĭo arachnoidĕus Sieb. (S. scopolĭi Hoppe, S. lanātus Scop. non L., Cinerarĭa arachnoidĕa Rchb.). Wolliger Baldgreis. Flockigwoll.; St. aufr., einfach, 1köpf.; Hülle und Blütenſt. woll., mit wenigen Deckblttchn.; Zungenblümchen 15 bis 30; Schließfr. kahl; Stralbl. gelb; 4; 7 bis 8; Kr.

z3. Auf kalkigen Voralpen:

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Astragălus vesicarĭus L.; ſ. Nr. 1789.

a4. Auf buſchigen Kalkvoralpen:

—. VIII., 1; Seidelpfl.: Daphne cneōrum L.; ſ. Nr. 848.

b4. Auf Felſen und in Wäldern der Voralpen:

2808. XIV., 1; Lippenblümler: Melīssa grandiflōra L. Großblumige Meliſſe. St. zott.; Bltr. lang-geſtielt, grobſägezähn., beiderſ. behart; Zymen einſeitswendig, geſtielt,

deckblättr., 3- bis 5blüt.; K. flockig, die Zähne gewimp.; Bl. rosenrot; 4; 7 bis 8; Kr., Ty.

c¹. Auf Wiesen der Voralpen:

—. V., 2; Doldenpfl.: Chaerophyllum hirsūtum L.; s. Nr. 2130.

—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Ranunculus aconitifolius L.; s. Nr. 1709.

—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Trollius europaeus L.; s. Nr. 798.

2809. XIX., 1; Korbblütler: Cirsium oleracĕo-rivulāre Schiede (DC.; C. praemōrsum Koch, C. semipectinātum Rchb., Cnicus praemōrsus Michl.). Abgebissene Wegdistel. Deckbltr. bräunl., schmal, lanzettf.; Deckbltr. groß, dornig-gezähnt; Bl. gelb; 4; 7 bis 8.

—. XIX., 2; Korbblütler: Cineraria aurantiăca Hoppe; s. Nr. 1788.

2810. XIX., 2; Korbblütler: C. pratēnsis Hoppe (Senecio prat. DC.). Wiesen-Aschenpflanze. Etwas spinnwebig-wollig; grundst. Bltr. langgestielt, ausgeschweift-gezähnelt, längl.-eif., untere stengelst. längl., obere sitz., verk.-lanzettl.; Bl. gelb; 4; 6 bis 7; Sg.

Varirt: C. capitāta Hoppe (Blütenköpfe ohne Stralbl.).

d¹. Auf Waldwiesen der Voralpen:

2811. V., 2; Doldenpfl.: Laserpitium archangelica Wulff. Angelikablättriges Laserkraut. St. gefurcht, nebst den Blattst. zott.-rauh; Bltr. 3zäl.-mehrfach-zgesetzt, Bltchn. ei-, an der Basis keilf., ungleich-gesägt, Endbltchn. 3lapp., seitl. ganz oder 2lapp.; Hüllbltchn. lineal-lanzettl., rauhharig; Bl. weiß, unterseits oft rötl.; Fr. eif.; 4; 7 bis 8; Kr., Mä., Schl.

e¹. Auf Sumpfwiesen der Voralpen:

—. III., 2; Graspfl.: Calamagrōstis montāna Host; s. Nr. 1102.

—. VI., 1; Semede: Juncus filiformis L.; s. Nr. 1790.

f¹. An Bächen in Voralpengegenden:

—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Ranunculus aconitifolius L. s. Nr. 1709.

g¹. An feuchten Stellen der Voralpen:

—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: Epilobium trigōnum Schrk.; s. Nr. 1647.

h¹. Auf Humus der Voralpen:

—. XIX., 2; Korbblütler: Doronĭcum austriăcum Jacq.; ſ. Nr. 1529.

i¹. In Wäldern der Voralpen:

—. V., 1; Schlüſſelblümler: Cyclămen europaeum L.; ſ. Nr. 288.
—. VI., 1; Lilienpfl.: Lilĭum martăgon L.; ſ. Nr. 1013.

k¹. In Alpengegenden:

—. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygŏnum vivipārum L.; ſ. Nr. 1837.

B¹. Auf Heiden: §. 504.

—. III., 2; Graspfl.: Aira flexuōsa Schrk.; ſ. Nr. 1097.
—. „ „ A. canēscens L.; ſ. Nr. 1507.
—. „ „ Avēna pratēnsis L.; ſ. Nr. 1171.
—. „ „ Triodĭa decūmbens P. B.; ſ. Nr. 1652.
—. „ „ Festūca duriuscŭla L. sp.; ſ. Nr. 1133.
—. IV., 1; Krapppfl.: Galĭum sylvēstre Poll.; ſ. Nr. 1005.
—. „ „ G. saxatĭle L.; ſ. Nr. 1640.
—. VIII., 1; Preiſelpfl.: Vaccinĭum vitis idaea L.; ſ. Nr. 514.
—. XII., 3; Roſenpfl.: Tormentīlla erēcta L.; ſ. Nr. 1082.
—. XIII., 1; Sonnenröslein: Helianthĕmum vulgāre Gaertn.; ſ. Nr. 1120.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum bohemĭcum L.; ſ. Nr. 1028.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Ornithŏpus perpusīllus L.; ſ. Nr. 516.
—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperĭcum humifūsum L.; ſ. Nr. 2134.
—. XVIII., 2; Hartheupfl.: H. pulchrum L.; ſ. Nr. 1089.
—. XIX., 1; Korbblütler: Thrincĭa hirta Roth; ſ. Nr. 1840.
—. XIX., 2; „ Cinerarĭa spathulaefolĭa Gmel.; ſ. Nr. 1172.
—. XIX., 2; Korbblütler: Arnĭca montāna L.; ſ. Nr. 1634.
—. „ „ Filāgo arvēnsis L.; ſ. Nr. 2344.

a. Auf feuchten, ſandigen Heiden:

—. V., 1; Paronychienpfl.: Illecēbrum verticillātum L.; ſ. Nr. 1483.

b. Auf gebirgigen, waldigen Heiden:

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Genīsta sericēa Wulff.; ſ. Nr. 1841.

c. Auf Heiden unter Gebüsch:

—. XX., 1; Orchidee: Horminum monorchis R. Br.; s. Nr. 1842.

d. Auf Torfheiden:

—. VIII., 1; Heidepfl.: Tetralix septentrionalis E. Mey.; s. Nr. 2561.

§. 505. **C[1]. An trocknen Stellen:**

—. IV., 1; Krapppfl.: Galium mollugo L.; s. Nr. 1006.
—. V., 1; Nachtschattenpfl.: Solanum melanocerasum Willd.; s. Nr. 2317.
—. V., 1; Nachtschattenpfl.: S. miniatum Bernh.; s. Nr. 2268.
2812. „ Paronychienpfl.: Paronychia capitata Lmk. Kopfförmige Paronychie. St. niederlig., aufsteig., fadenf.; Bltr. ellipt. oder lanzettl., zugesp., gekielt, behart; Nebenbltr. lanzettl., spitz, häutig; Bl. in den Winkeln der obersten Bltr., in deckblättr. Aehre oder kopfständ., grünl.; Krbltr. eilanzettl., nur antherenlose Stbf.; 4; 7 bis 8; Kr.
—. V., 1; Paronychienpfl.: Herniaria glabra L.; s. Nr. 1476.
—. V., 2; Doldenpfl.: Eryngium campestre L.; s. Nr. 2271.
—. „ „ Peucedanum oreoselinum Mnch.; s. Nr. 2463.
—. V., 2; Doldenpfl.: Pastinaca opaca Bernh.; s. Nr. 2445.
—. X., 2; Nelkenblütler: Dianthus deltoides L.; s. Nr. 1111.
—. „ „ D. plumarius L.; s. Nr. 2428.
—. X., 3; „ Melandrium pratense Roehl.; s. Nr. 1113.
—. X., 5; Dickblattpfl.: Sedum acre L.; s. Nr. 1298.
—. XII., 1; Mirtenpfl.: Myrtus communis L.; s. Nr. 1849.
—. XII., 3; Rosenpfl.: Potentilla verna L.; s. Nr. 166.
—. „ „ P. rupestris L.; s. Nr. 434.
—. „ „ P. argentea L.; s. Nr. 464.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Thymus serpyllum L.; s. Nr. 2068.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Sisymbrium officinale Scop.; s. Nr. 1361.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Erucastrum obtusangulum Rchb.; s. Nr. 1362.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: *Geranium sibiricum L.; s. Nr. 2259.
—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Ononis columnae All.; s. Nr. 1717.
—. „ „ O. natrix L.; s. Nr. 1844.
—. „ „ O. reclinata L.; s. Nr. 1845.
—. „ „ Genista ovata W. et K.; s. Nr. 1582

—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracium praealtum W. et Grab.; ſ. Nr. 1846.
—. XIX., 1; Korbblütler: Crepis tectorum L.; ſ. Nr. 1366.
—. „ „ Tragopogon major Jacq.; ſ. Nr. 1337.
—. XIX., 1; Korbblütler: Carduus nutans L.; ſ. Nr. 2289.
—. XIX., 2; Korbblütler: Xeranthemum radiātum Lmk.; ſ. Nr. 1847.
2813. XIX., 2; Korbblütler: X. inapertum Willd. Geſchloſſene Spreublume (Papierblume). Hülle längl.-eiſ., innere Hüllblttchn. $1\frac{1}{2}$mal ſo lang, als die Blümchen, etwas länger als die äußeren, glatten, ſtachelſp. und kaum abſteh.; ♂ 30 bis 40; ♀ Randbl. 1 bis 3; Bl. rötl. bis weiß; ☉; 7 bis 8; ↕; Ty.
—. XIX., 2; Korbblütler: Filago arvensis L.; ſ. Nr. 2344.
—. „ „ Gnaphalium luteo-album L.; ſ. Nr. 2411.
—. XIX., 2; Korbblütler: *Artemisia absinthium L.; ſ. Nr. 2314.
—. „ „ A. vulgāris L.; ſ. Nr. 2205. *)
2814. „ „ A. pontica L. Römiſcher Beifuß. St. aufr., oberw. riſpig, faſt rutenf.; Bltr. unterſ. weißl.-filz., dopp.-gefied., lineal.-zipf., an der Baſis des Stielchens geöhrt; Köpfchen faſt kug., graulich-behart; Bl. gelb; 4; 7 bis 8; ♈.
—. XIX., 3; Korbblütler: *Centaurea diffusa Lmk.; ſ. Nr. 1850.
—. XXI., 5; Spitzklettenpfl.: Xanthium macrocārpum DC.; ſ. Nr. 2305.

D[1]. Auf Aengern: §. 506.

—. XII., 3; Roſenpfl.: Potentilla anserina L.; ſ. Nr. 578.
—. XIX., 2; Korbblütler: Senecio barbareaefolius Krock.; ſ. Nr. 2203.
—. XIX., 2; Korbblütler: Achillea millefolium L.; ſ. Nr. 2101.
—. „ „ Bellis perennis L.; ſ. Nr. 2.

E[1]. Auf Grasplätzen und Triften: §. 507.

—. III., 2; Graspfl.: Phleum pratense L.; ſ. Nr. 1248.
—. IV., 1; Wegerichpfl.: Plantago media L.; ſ. Nr. 1282.
—. „ „ P. lanceolāta L.; ſ. Nr. 1252.
—. „ Kardenpfl.: Scabiosa arvensis L.; ſ. Nr. 1283.

*) Ehemals wurde die Wurzel als Zaubermittel und gegen das Ermüden an die Füße gelegt; daher der Name Beifuß!

—. V., 1; Borretſchpfl.: Cerinthe minor L.; ſ. Nr. 1198.
—. V., 2; Doldenpfl.: Pimpinella saxifraga L.; ſ. Nr. 2176.
—. „ „ Seseli colorātum Ehrh.; ſ. Nr. 2495.
—. „ „ Pastināca opāca Bernh.; ſ. Nr. 2455.
—. V., 5; Leinpfl.: Linum cathartĭcum L.; ſ. Nr. 1854.
—. VI., 3; Knöterichpfl.: Rumex pratēnsis M. et K.; ſ. Nr. 1208.
—. VI., 3; Knöterichpfl.: R. acetosēlla L.; ſ. Nr. 1296.
—. X., 2; Nelkenblütler: Gypsophīla murālis L.; ſ. Nr. 2234.
—. X., 3; „ Silēne otītes Smith; ſ. Nr. 461.
—. „ „ Stellaria graminea L.; ſ. Nr. 388.
—. „ „ Arenaria serpyllifolĭa L.; ſ. Nr. 1259.
—. „ „ Spergularĭa rubra Presl.; ſ. Nr. 576.
—. XI., 2; Roſenpfl.: Agrimonĭa eupatorĭa L.; ſ. Nr. 1114.
—. „ „ A. procēra Wallr.; ſ. Nr. 1115.
2815. XII., 3; „ Geum hispĭdum Fr. (G. strictum Ait.?). Borſtige Nelkenwurz. Bl. aufr.; Krbltr. breitverk.-eif.; K. zurückgeſchl.; Bl. gelb; Griff. rötl.; 4; 7; Pr.
—. XII., 3; Roſenpfl.: Tormentīlla erēcta L.; ſ. Nr. 1082.
—. „ „ Potentīlla anserīna L.; ſ. Nr. 578.
—. „ „ P. mixta Nolte; ſ. Nr. 2276.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Ranuncŭlus acris L.; ſ. Nr. 399.
—. „ „ R. bulbōsus L.; ſ. Nr. 465.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Thymus serpyllum L.; ſ. Nr. 2088.
—. „ „ Prunēlla vulgāris L.; ſ. Nr. 2277.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Scrophularĭa canīna L.; ſ. Nr. 687.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Senebiēra coronŏpus Poir.; ſ. Nr. 2258.
—. XVI., 1; Schnabelpfl.: Geranĭum pratēnse L.; ſ. Nr. 1844.
—. „ „ G. molle L.; ſ. Nr. 539.
—. „ „ Erodĭum cicutarĭum l'Herit.; ſ. Nr. 217.
—. XVI., 5; Pappelroſenpfl.: Malva sylvēstris L.; ſ. Nr. 1225.
—. XVII., 3; Bitterling: Polygăla vulgāris L.; ſ. Nr. 467.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Onōnis spinōsa L.; ſ. Nr. 1321.
—. „ „ O. hircīna Jacq.; ſ. Nr. 1322.
—. „ „ Genīsta tinctorĭa L.; ſ. Nr. 1124.
—. „ „ Anthȳllis vulnerarĭa L.; ſ. Nr. 721.
—. „ „ Medicāgo lupulīna L.; ſ. Nr. 468.
—. „ „ Trifolĭum pratēnse L.; ſ. Nr. 1032.
—. „ „ T. stellātum L.; ſ. Nr. 1475.
—. „ „ T. repens L.; ſ. Nr. 597.
—. „ „ T. filiförme L.; ſ. Nr. 599.

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: T. procūmbens L.; ſ. Nr. 1329.
—. „ „ Lotus corniculātus L.; ſ. Nr. 1239.
—. „ „ Ervum tetraspērmum L.; ſ. Nr. 1125.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum stolonifĭōrum W. et K.; ſ. Nr. 1569.
—. XIX., 1; Korbblütler: H. sabīnum Sebast. et Muram.; ſ. Nr. 2110.
—. XIX., 1; Korbblütler: H. umbellātum L.; ſ. Nr. 2095.
—. „ „ Taraxăcum officināle Mnch.; ſ. Nr. 59.
—. XIX., 1; Korbblütler: Leontŏdon vulgāris Kitt.; ſ. Nr. 1079.
—. „ „ Thrincĭa hirta Roth; ſ. Nr. 1840.
—. XIX., 2; „ Senecĭo jacobaea L.; ſ. Nr. 2075.
—. „ „ Filāgo arvēnsis L.; ſ. Nr. 2344.
—. „ „ Achillēa millefolĭum L.; ſ. Nr. 2101.
—. „ „ Bellis perēnnis L.; ſ. Nr. 2.

a. Auf trocknen Triften und Grasplätzen:

2816. III., 2; Graspfl.: Agrōstis canīna L. (Trichodĭum canīnum Schrad.). Hunds-Windhalm (Hunds-Straußgras). Untere Bltr. zſgefalt.-borſtl.; Blatthäutchen längl.; Riſpe ausgebreit., eif.; Aeſte rauh, während der Bl. ausgeſpreizt, ſpäter zſgezog.; Unterſpelze unter der Rückenmitte begrannt, an der Spitze feinkerbig; 4; 7 bis 8.
—. III., 2; Graspfl.: Melīca ciliāta L.; ſ. Nr. 1103.
—. „ „ Triodĭa decūmbens P. B.; ſ. Nr. 1652.
—. „ „ Bromus erēctus Huds.; ſ. Nr. 1276.
—. „ „ Festūca rubra L.; ſ. Nr. 1184.
—. „ „ Poa annŭa L.; ſ. Nr. 14.
—. IV., 1; Kardenpfl.: Scabiōsa columbarĭa L.; ſ. Nr. 2080.
—. V., 1; Glockenblümler: Campanŭla bononiēnsis L.; ſ. Nr. 2224.
—. V., 2; Doldenpfl.: Eryngĭum campēstre L.; ſ. Nr. 2271.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Medicāgo falcāta L.; ſ. Nr. 1324.
—. „ „ Bucĕras monspeliăcum All.; ſ. Nr. 1325.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolĭum angustifolĭum L.; ſ. Nr. 1855.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: T. incarnātum L.; ſ. Nr. 648.
—. „ „ T. elĕgans Savi; ſ. Nr. 1543.
—. „ „ Astragălus hypoglōttis L.; ſ. Nr. 753.
—. XIX., 1; Korbblütler: Cirsĭum acaule All.; ſ. Nr. 2097.

b. Auf feuchten Grasplätzen und Triften:

2817. II., 1; Rachenblümler: Gratiŏla officinālis L. Gebräuchliches Gnadenkraut (Erdgalle, Bergfanikel, Heckenisop, wilder Aurin, Fisch-, Nieß-, Purgir-, Gicht-, Gottesgnaden- oder Altemannskraut). Blr. gegenst., sitz., lanzettl.; Blütenst. blattachselst., 1blüt.; Bl. weiß oder rötlich; 4; 7 bis 8; ✕; ∓; ♃.

—. III., 2; Graspfl.: Agrōstis canīna L.; s. Nr. 2816.

—. „ „ Pipthatĕrum multiflōrum P. B.; s. Nr. 1851.

—. III., 2; Graspfl.: Festūca pratēnsis Huds.; s. Nr. 1852.

—. „ „ Poa annŭa L.; s. Nr. 14.

—. „ „ Cynosūrus cristātus L.; s. Nr. 1853.

—. „ „ Lolĭum perēnne L.; s. Nr. 1281.

2818. „ „ L. boucheānum Kunth (L. italĭcum A. Br., L. multiflōrum Poir.). Italisches Raigras (italischer Lolch). Sprossenblr. zigerollt-rinnig; Aehrchen 5- bis 10blüt., 2- bis 3mal so lang als die Blütenscheiden, längl.-lanzettl.; 4; 7 bis 8.

—. V., 1; Schlüsselblümler: Lysimachĭa nummularĭa L.; s. Nr. 1008.

—. V., 1; Enzianpfl.: Erythraea pulchēlla Fr.; s. Nr. 1856.

2819. VI., 1; Weiderichpfl.: Peplis portŭla L. Gemeine Bachburgel (Afterquendel, Pappel, Zipfelkraut). St. niederlig., vieläſtig, mit wurzelnden Aesten; Blr. gegenst., verk.-eif.; Bl. einzeln, achselst., sehr klein, rötlichweiß; St. rot angelaufen; ☉; 7 bis 8.

—. VI., 3; Knöterichpfl.: Rumex sanguinĕus L.; s. Nr. 1014.

—. X., 4; Nelkenblütler: Sagīna procūmbens L.; s. Nr. 635.

—. XII., 3; Rosenpfl.: Potentīlla reptans L.; s. Nr. 1301.

2820. XIV., 1; Lippenblümler: Mentha pulegĭum L. (Pulegĭum vulgāre Mill.). Polei (Poleiminze, Flohkraut, Herzengleich, -bleiche). Blr. gestielt, eif., stumpf, schwachsägezähn., kurz-steifharig; Blütenst. und der röhrige K. fast filz.; Bl. in blattachselst., kug. Quirlen, purpurn, außen zott.; 4; 7 bis 8; ♃; ✕.*)

—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Astragălus sulcātus L.; s. Nr. 1857.

2821. XIX., 2; Korbblütler: Pulicarĭa dysenterĭca Gaertn. (Inŭla dysent. L.). Ruhr-Flöhkraut (Flohkraut-Alant, Christinchenkraut, Dummbart, Odenskopp, Gold-

*) Die alten Griechen benutzten diese Pflanze zu dem heiligen Tranke (Wasser, Gerstenmehl und Polei), den man bei den eleusinischen Festen genoß! Polei ist noch heute namentlich im Peloponnes Kulturpflanze.

oder Dürrwurz, Hundsblüte, Badekraut, falſches Fallkraut). St. zott., ebenſträuß.; Bltr. mit breiter, tiefherzf. Baſis umfaſſ.; Stral länger, als die Scheibe; Bl. goldgelb; 4; 7 bis 9; ×; ♃ (früher).

Varirt: Dysenterĭca vulgāta (ſchlank=aufſteig., ſteif, grade; Köpfchen kleiner; Blütenſt. wenige, armf.), D. squarrōsa (Aeſte bogig, ſperrig=abſteh.; Bltr. und Blütenköpfe groß).

c. Auf ſandigen Triften:

—. X., 3; Nelkenblütler: Silēne viscōsa Pers.; ſ. Nr. 1297.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Onōnis repens L.; ſ. Nr. 1320.
—. „ „ Astragălus arenarĭus L.; ſ. Nr. 1187.

d. Auf feuchten Sandtriften:

—. IV., 4; Leinpfl.: Radiŏla millegrāna Sm.; ſ. Nr. 2413.
—. V., 1; Paronychienpfl.: Illecĕbrum verticillātum L.; ſ. Nr. 1483.
—. V., 2; Enzianpfl.: Cicendĭa filifōrmis Rchb.; ſ. Nr. 2412.
—. XI., 1; Weiderichpfl.: Lythrum hyssopifolĭa L.; ſ. Nr. 2394.
—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperĭcum humifūsum L.; ſ. Nr. 2134.

e. Auf feuchten, torfigen Triften:

—. VIII., 1; Enzianpfl.: Chlora perfoliāta L.; ſ. Nr. 894.

f. Auf ſalzigen Triften:

2822. X., 3; Nelkenblütler: Spergularĭa salīna Presl. (Lepigŏnum medĭum Whlbg., Arenarĭa marīna Roth, A. rubra var. b. marīna L., Sp. marīna Grisb.). Salz=Schuppenmiere (mittlerer Knörrich). Bltr. ſtumpfl., fleiſch., beiderſ. gewölbt; Blütenſt. und K. drüſenharig; Bl. blaßrot; Kapſ. wenig länger als der K.; Samen ungeflüg. oder die unterſten weiß=geflüg.; ☉ und ♂; 7 bis 8.

2823. XIX., 2; Korbblütler: Artemisĭa rupēstris L. Felſen=Beifuß. Nichtblüh. St. ligend, blütentrag. aufſtreb., einfach=traubig oder äſtig=riſp.; Riſpe ſchmal, rutenf.; Bltr. kahl, dopp.=gefied., obere und blütenſtänd. ſämmtl. einfach, kammf.=fiederſpalt.; Köpfchen faſt kug., erbſengroß; 4; 7 bis 9; Sa., Ha., Th., Kr., Ty.

g. Auf Waldtriften:

—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum pyrenaĭcum L.; ſ. Nr. 477.
—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperĭcum quadrangŭlum Fr.; ſ. Nr. 2069.

h. Auf Bergtriften:

—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum sylvatĭcum L.; ſ. Nr. 422.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Erodĭum moschātum Ait.; ſ. Nr. 540.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum bifūrcum M. B.; ſ. Nr. 1608.

i. An grasigen Orten:

—. X., 3; Nelkenblütler: Stellarĭa longifolĭa Fr.; ſ. Nr. 2216.
—. X., 4; „ Sagīna apetăla L.; ſ. Nr. 604.
2824. XII., 3; Roſenpfl.: Potentĭlla hirta L. Rauhhariges Fingerkraut. St. aufſteig. oder aufr., rauhharig und etwas filz.; Bltr. 7- bis 5zäl., Bltchn. aus verk.-eif., abgerund. Spitze allmälig-keilf.-zilauf., bei den ſtengelſt. lineal-ablang-keilig in die Baſis verlauf., oben eingeſchn.-ſägezähn., drüſen-rauhharig; Nebenbltr. eif.; Bl. gipfelſt., groß, gelb; Fr. ſtark-leiſtig; 2|; 7 bis 8; Kr.

k. In Auen:

—. V., 2; Doldenpfl.: Trinĭa kitaibelĭi M. B.; ſ. Nr. 2054.

l. Auf ſonnigen Grasplätzen:

—. XIII., 1; Sonnenröslein: Helianthĕmum vulgāre Gaertn.; ſ. Nr. 1120.

m. Auf ſchattigen Grasplätzen:

—. V., 2; Doldenpfl.: Peucedănum officināle L.; ſ. Nr. 2438.

n. Auf feuchten, buſchigen Grasplätzen:

—. XII., 3; Roſenpfl.: Tormentĭlla reptans L.; ſ. Nr. 1068.

o. Auf Grasplätzen am Meere:

—. XIX., 1; Korbblütler: Tragopōgon floccōsus W. et K.; ſ. Nr. 1858.

p. Auf Grasplätzen in den Alpen und Gebirgen:

—. XII., 3; Roſenpfl.: Sieversĭa montāna Spr.; ſ. Nr. 2552.
—. XIX., 1; Korbblütler: Leontŏdon squamōsus Lmk.; ſ. Nr. 2553.

q. Auf Grasplätzen der ſubalpinen Striche:

—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum floribūndum W. et Gr.; ſ. Nr. 896.

F¹. Auf Weiden: §. 508.

—. IV., 1; Wegerichpfl.: Plantāgo lanceolāta L.; ſ. Nr. 1252.
2825. V., 1; Rachenblümler: Verbāscum adulterīnum Koch (V. thapsifōrmi-nigrum Schiede). Aſter-Wollkraut. St. oberw. ſcharfkant.; Bltr. geferbt, oberſ. weichharig; unterſ. ſchwach-graufilz.; Büſchel der Traube 5- bis 7blüt.; Staubb. der längeren Stbf. längl., herablauf.; Blkr. groß, gelb; Wolle der Stbf. violet; ☉; 7 bis 8.
—. V., 1; Enzianpfl.: Erythraea centaurĭum Rich.; ſ. Nr. 1009.
—. V., 5; Leinpfl.: Linum cathartĭcum L.; ſ. Nr. 1854.
—. VI., 3; Knöterichpfl.: Rumex acetōsa L.; ſ. Nr. 1074.
—. X., 3; Nelkenblütler: Silēne inflāta Sm.; ſ. Nr. 1178.
—. X., 5; „ Cerastĭum viscōsum L.; ſ. Nr. 684.
—. XII., 2; Roſenpfl.: Spiraea filipendŭla L.; ſ. Nr. 1019.
—. XII., 3; „ Potentilla anserīna L.; ſ. Nr. 578.
—. „ „ Rubus fruticōsus L.; ſ. Nr. 1119.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Ranuncŭlus acris L.; ſ. Nr. 399.
—. „ „ R. bulbōsus L.; ſ. Nr. 465.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Prunēlla vulgāris L.; ſ. Nr. 2277.
—. „ „ Pr. grandiflōra Jacq.; ſ. Nr. 2439.
—. „ „ Betonĭca officinālis L.; ſ. Nr. 1027.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum columbīnum L.; ſ. Nr. 675.
—. XVII., 3; Bitterling: Polygăla vulgāris L.; ſ. Nr. 467.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Onōnis spinōsa L.; ſ. Nr. 1321.
—. „ „ *Medicāgo satīva L.; ſ. Nr. 1323.
—. „ „ M. lupulīna L.; ſ. Nr. 468.
—. „ „ Trifolĭum pratēnse L.; ſ. Nr. 1032.
—. „ „ T. repens L.; ſ. Nr. 597.
—. „ „ T. hybrĭdum L.; ſ. Nr. 469.
—. „ „ T. filifōrme L.; ſ. Nr. 599.
—. „ „ T. procūmbens L.; ſ. Nr. 1329.
—. „ „ Lotus corniculātus L.; ſ. Nr. 1239.
—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperĭcum perforātum L.; ſ. Nr. 2068.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum auricŭla L.; ſ. Nr. 1334.
—. „ „ Crepis virens L.; ſ. Nr. 1415.
—. „ „ Lactūca salīgna L.; ſ. Nr. 2283.
—. „ „ Taraxăcum officināle Mnch.; ſ. Nr. 59.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hypochoeris glabra L.; ſ. Nr. 1416.

2826. XIX., 1; Korbblütler: Oporinĭa autumnālis Don (Leontŏdon aut. L., Apargĭa aut. Willd.). Herbſt-Haſenlattich. St. 1- bis mehrköpf., blattlos; Blütenſt. allmälig-verdickt, oberw. ſchuppenf.; Bltr. buchtig- oder fiederſpalt.-gezähnt, kahl oder einfach-behart; Bl. gelb; 4; 7 bis 10; ×.

Variirt: O. runcināta Kitt. (Bltr. faſt ſchrotſägef.), O. paludōsa Kitt. hb. (Bltr. langgeſtielt, lanzett.-lineal., geſchweift-gezähnt; St. nebſt den Blütenſt. und Hüllen kurzſteifhaarig), O. pratēnsis Less. (Hülle braunhaarig), O. monocephăla (Apargĭa taraxăci Sm.; Schaft 1köpf.).

—. XIX., 1; Korbblütler: Leontŏdon vulgāris Kitt.; ſ. Nr. 1079.

—. XIX., 1; Korbblütler: Thrincĭa hirta Roth; ſ. Nr. 1840.

—. " " Cirsĭum acaule All.; ſ. Nr. 2079.

—. " " C. heterophўllo-rivulāre; ſ. Nr. 1871.

—. XIX., 2; Korbblütler: Senecĭo viscōsus L.; ſ. Nr. 1341.

—. " " S. jacobaea L.; ſ. Nr. 2075.

—. " " S. erucaefolĭus Huds.; ſ. Nr. 2100.

—. " " Arnĭca montāna L.; ſ. Nr. 1634.

—. " " Filāgo montāna L.; ſ. Nr. 2401.

—. " " Gnaphalĭum lutĕo-album L.; ſ. Nr. 2411.

—. XIX., 2; Korbblütler: Leucanthĕmum vulgāre Lmk.; ſ. Nr. 1130.

—. XIX., 2; Korbblütler: Inŭla hirta L.; ſ. Nr. 2295.

—. " " Bellis perēnnis L.; ſ. Nr. 2.

—. XIX., 3; " Centaurēa scabiōsa L.; ſ. Nr. 1131.

a. Auf feuchten Weiden:

—. III., 2; Graspfl.: Agrōstis stolonifĕra L.; ſ. Nr. 2154.

—. " " Arrhenathērum avenacĕum P. B.; ſ. Nr. 1382.

—. III., 2; Graspfl.: Briza mĕdĭa L.; ſ. Nr. 1859.

—. " " Poa triviālis L.; ſ. Nr. 1860.

—. " " P. annŭa L.; ſ. Nr. 14.

—. " " Cynosūrus cristātus L.; ſ. Nr. 1853.

—. " " Nardus stricta L.; ſ. Nr. 898.

—. " " Lolĭum perēnne L.; ſ. Nr. 1281.

—. IV., 1; Schlüſſelblümler: Centuncŭlus minĭmus L.; ſ. Nr. 1350.

—. V., 1; Schlüſſelblümler: Lysimachĭa vulgāris L.; ſ. Nr. 1862.

—. V., 1; Schlüsselblümler: L. nummularia L.; s. Nr. 1008.
—. VI., 1; Semede: Juncus communis E. Mey.; s. Nr. 1512.
—. „ „ J. atratus Krock.; s. Nr. 2136.
—. „ „ J. capitatus Weigel; s. Nr. 1510.
—. „ „ J. compressus Jacq.; s. Nr. 1863.
—. X., 4; Nelkenblütler: Sagina procumbens L.; s. Nr. 635.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Pedicularis sylvatica L.; s. Nr. 899.
—. XV., 2; Kreuzblümler: Nasturtium sylvestre R. Br.; s. Nr. 1487.
—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Tetragonolobus siliquosus L.; s. Nr. 1347.
—. XIX., 1; Korbblütler: Cirsium rivulare All.; s. Nr. 1864.
—. „ „ C. palustre Scop.; s. Nr. 1059.
—. XXI., 3; Halbgras: Carex flava L.; s. Nr. 901.

b. Auf trocknen Weiden:

—. III., 2; Graspfl.: Avena pratensis L.; s. Nr. 1171.
—. „ „ Poa annua L.; s. Nr. 14.
—. IV., 1; Kugelblütler: Globularia vulgaris L.; s. Nr. 701.
—. „ Kardenpfl.: Scabiosa columbaria L.; s. Nr. 2080.
—. X., 3; Nelkenblütler: Silene viscosa Pers.; s. Nr. 1297.

c. Auf trocknen, sandigen Weiden:

—. XIV., 1; Lippenblümler: Prunella alba Pall.; s. Nr. 1597.

d. Auf magern Weiden:

—. XIX., 1; Korbblütler: Hypochoeris radicata L.; s. Nr. 1126.

e. Auf unfruchtbaren Weiden:

—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranium rotundifolium L.; s. Nr. 560.

f. Auf salzhaltigen Weiden:

2827. XIX., 2; Korbblütler: Senecio aquaticus Huds. Wasser-Kreuzkraut. Obere Bltr. mit getheilten Oehrchen umfass., seitenst. Fiedern längl., auch lineal., schief aus der Mittelrippe ausgehend; St. oben zsgesetzt-doldentraub., mit aufr.-abstehenden Aesten und Zweigen; Deckbltchn. auf den verdickten, zott. Blütenst. hinabgerückt; Bl. goldgelb; 4; 7 bis 8.
—. XIX., 2; Korbblütler: Artemisia rupestris L.; s. Nr. 2823.

g. Auf fetten Weiden:

—. XIV., 1; Lippenblümler: Mentha sylvēstris L.; ſ. Nr. 2218.

§. 509. **G¹. Auf Wieſen:**

—. II., 1; Lippenblümler: Salvĭa pratēnsis L.; ſ. Nr. 1101.
—. III., 1; Schwertelpfl.: Gladiŏlus palūstris Gaud.; ſ. Nr. 368.
—. IV., 1; Wegerichpfl.: Plantāgo medĭa L.; ſ. Nr. 1282.
—. „ „ P. lanceolāta L.; ſ. Nr. 1252.
—. „ Kardenpfl.: Scabiōsa arvēnsis L.; ſ. Nr. 1283.
—. „ Krapppfl.: Galĭum verum L.; ſ. Nr. 1105.
—. „ „ G. boreāle L.; ſ. Nr. 2081.
—. V., 1; Schlüſſelblümler: Lysimachĭa vulgāris L.; ſ. Nr. 1862.
—. V., 1; Enzianpfl.: Erythraea centaurĭum Rich.; ſ. Nr. 1009.
—. V., 1; Glockenblümler: Campanŭla rotundifolĭa L.; ſ. Nr. 1288.
—. V., 2; Enzianpfl.: Gentiāna obtusifolĭa Willd.; ſ. Nr. 2502.
—. V., 2; Doldenpfl.: Astrantĭa major L.; ſ. Nr. 1157.
—. „ „ Eryngĭum planum L.; ſ. Nr. 1865.
—. „ „ Pimpinēlla magna L.; ſ. Nr. 2157.
—. „ „ Silaus pratēnsis Bess.; ſ. Nr. 1866.
2828. „ „ Peucedănum vettēri Vis. Vetter's Harſtrang. Bltr. 3- bis 4fach-3zäl.-gefied.; Bl. weiß; Fr. von der Länge ihrer Stielchen; 4; 7 bis 8; Kr.
2829. V., 2; Doldenpfl.: P. schottii Bess. Schott's H. St. walzenf., gerippt, etwas äſtig; Bltr. dunkelgraugrün, gefied., Fiedern ſitz., fiedertheil., Lappen lineal., ſpitz; Hülle und Hüllchen fehlend; Bl. gelblichweiß; 4; 7; Kr.*)
2830. V., 2; Doldenpfl.: P. chabraei Rchb. (Selīnum chabr. Jacq.). Kümmelblättriger H. St. gefurcht; Bltr. beiderſ. glänz., gefied., Fiedern aller Bltr. ſitz., vielſpalt. oder die oberſten Bltr. ungetheilt, Zipf. lineal., an der Baſis kreuzſtänd.; Hüllchen 1- bis 3blättr.; Doldenſtralen innen kurzharig; Bl. gelblichweiß oder grünl.; 4; 7 bis 8; Rhein-, Blies-, Saar- und Moſelthal, Regensburg, Wien.

*) Die Form mit einfachen Fiedern und 5blättrigem Hüllchen iſt P. petraeum Noë!

—. V., 2; Doldenpfl.: Pastināca satīva L.; ſ. Nr. 2058.
—. „ „ Heraclēum sphondylĭum L.; ſ. Nr. 1867.
—. „ „ Daucus carōta L.; ſ. Nr. 1294.
—. V., 5; Leinpfl.: Linum cathartĭcum L.; ſ. Nr. 1854.
—. VI., 3; Knöterichpfl.: Rumex pratēnsis M. et K.; ſ. Nr. 1208.
—. VI., 3; Knöterichpfl.: R. obtusifolĭus L.; ſ. Nr. 2104.
—. „ „ R. patientĭa L.; ſ. Nr. 2273.
—. „ „ R. acetōsa L.; ſ. Nr. 1074.
—. X., 3; Nelkenblütler: Stellarĭa graminĕa L.; ſ. Nr. 388.
—. X., 5; „ Lychnis flos cucŭli L.; ſ. Nr. 462.
—. „ „ Cerastĭum vulgātum L. spec.; ſ. Nr. 463.
—. X., 5; Schnabelpfl.: *Oxălis stricta Jacq.; ſ. Nr. 1260.
—. XII., 3; Roſenpfl.: Potentīlla recta L.; ſ. Nr. 439.
—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: Aquilegĭa vulgāris L.; ſ. Nr. 1179.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Thalĭctrum vulgāre Kitt.; ſ. Nr. 579.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Th. simplex L.; ſ. Nr. 1600.
—. „ „ Th. lucĭdum L.; ſ. Nr. 2794.
—. „ „ Ranuncŭlus acris L.; ſ. Nr. 399.
—. „ „ R. bulbōsus L.; ſ. Nr. 465.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Prunēlla vulgāris L.; ſ. Nr. 2277.
—. XIV., 1; Lippenblümler: P. grandiflōra Jacq.; ſ. Nr. 2439.
—. „ „ Betonĭca officinālis L.; ſ. Nr. 1027.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Alectorolŏphus major Rchb.; ſ. Nr. 1485.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Nasturtĭum pyrenaĭcum R. Br.; ſ. Nr. 905.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum pratēnse L.; ſ. Nr. 1244.
—. XVI., 5; Pappelroſenpfl.: Althaea pallĭda W. et K.; ſ. Nr. 1374.
—. XVII., 3; Bitterling: Polygăla vulgāris L.; ſ. Nr. 467.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Onōnis hircīna Jacq.; ſ. Nr. 1322.
—. „ „ *Medicāgo sativa L.; ſ. Nr. 1323.
—. „ „ Medicāgo lupulīna L.; ſ. Nr. 468.
—. „ „ Trigonēlla coerulĕa Ser.; ſ. Nr. 1868.
—. „ „ Melilōtus officinālis L.; ſ. Nr. 1326.
—. „ „ Trifolĭum pratēnse L.; ſ. Nr. 1032.
—. „ „ T. repens L.; ſ. Nr. 597.
—. „ „ T. filiförme L.; ſ. Nr. 599.

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: T. procūmbens L.; ſ. Nr. 1329.
—. „ „ Lotus corniculātus L.; ſ. Nr. 1239.
—. „ „ Tetragonolŏbus siliquōsus L.; ſ. Nr. 1347.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Coronīlla varĭa L.; ſ. Nr. 1331.
—. „ „ Vicĭa cracca L.; ſ. Nr. 1228.
—. „ „ V. grandiflōra Scop.; ſ. Nr. 1412.
—. „ „ V. pannonĭca Jacq.; ſ. Nr. 1468.
—. „ „ V. angustifolĭa Roth; ſ. Nr. 1230.
—. „ „ Lathўrus pratēnsis L.; ſ. Nr. 1240.
—. „ „ L. ochracĕus Kitt.; ſ. Nr. 833.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum pilosēlla L.; ſ. Nr. 1181.
—. „ „ H. stoloniflōrum W. et K.; ſ. Nr. 1569.
—. „ „ H. auricŭla L.; ſ. Nr. 1334.
—. „ „ Crepis setōsa Hall. fil.; ſ. Nr. 2282.
—. „ „ C. virens L.; ſ. Nr. 1415.
—. „ „ Hypochoeris glabra L.; ſ. Nr. 1416.
—. „ „ Scorzonēra hispanĭca L.; ſ. Nr. 1870.
—. „ „ Picris hieracioĭdes L.; ſ. Nr. 2241.
—. „ „ Oporinĭa autumnālis Don; ſ. Nr. 2826.
—. XIX., 1; Korbblütler: Leontŏdon vulgāris Kitt.; ſ. Nr. 1079.
—. XIX., 1; Korbblütler: Cichorĭum intўbus L.; ſ. Nr. 1338.
—. XIX., 2; „ Leucanthĕmum vulgāre Lam.; ſ. Nr. 1130.
—. XIX., 2; Korbblütler: Achillēa millefolĭum L.; ſ. Nr. 2101.
—. XIX., 2; Korbblütler: Bellis perēnnis L.; ſ. Nr. 2.
—. XIX., 3; „ Centaurēa scabiōsa L.; ſ. Nr. 1131.
—. „ „ C. jacēa L.; ſ. Nr. 1343.
—. XX., 1; Orchidee: Listēra ovāta R. Br.; ſ. Nr. 1061.

a. Auf feuchten, naſſen Wieſen:

—. II., 1; Rachenblümler: Veronĭca longifolĭa L.; ſ. Nr. 2212.
—. „ „ V. serpyllifolĭa L.; ſ. Nr. 424.
—. „ „ V. scutellāta L.; ſ. Nr. 1875.
—. III., 1; Halbgras: Cypērus flavēscens L.; ſ. Nr. 1143.
2831. „ „ C. fuscus L. Schwarzbraunes Zipergras. Wrz. faſerig; St. 3kant.; Blütenhülle 2- bis 3blättr., Blthn. viel länger als die Spirre; Bltr. flach, ſcharfrand.; Narben 3; Nüßchen ellipt.; ⊙; 7 bis 10.
Varirt: C. virēscens Vahl (Hoffm.; Bälge blaßgelb, grün-rückenſtreifig).

—. III., 1; Halbgras: Schoenus ferruginĕus L.; ſ. Nr. 914.
—. „ „ Sch. nigrĭcans L.; ſ. Nr. 915.
—. „ „ Scirpus palūstris L.; ſ. Nr. 1876.
—. „ „ Sc. baeothrўon Ehrh.; ſ. Nr. 1877.
2832. „ „ Sc. setacĕus L. Borſtenförmige Binſe. Halm fadenf.; Aehrchen einzeln, zu 2 oder 3; Hüllblatt vielmal kürzer, als der Halm; Narben 3; Nuß längsrippig, Borſten meiſt fehlend; Bälge ſtumpf, ſtachelſp.; Spirre trugſeitenſt.; ☉; 7 bis 9.*)
2833. III., 1; Halbgras: Sc. holoschoenus L. (Isolĕpis holosch. R. et Sch.). Knopfgrasartige Binſe (Kugelbinſe, Zartriet). Bltr. halbſtielrund, rinnig; Bälge abgeſtutzt, ſtachelſp.; Narben 3; Nuß kahl; Spirre trugſeitenſt.; Köpfchen kug., dicht-zſgeballt; ☉; 7 bis 8.
Varirt: Holoschoenus vulgāris Lk. (Spirrenſtiel äſtig; Griff. eingeſchloſſ.), H. filiformis Rchb. (Spirre einfach, wenigköpf.; Narben eingeſchloſſ.; Bltr. und Halmſpitze fadenf.), H. exsĕrens Rchb. (wenigköpf.; Narben dick, vorragend).
2834. III., 1; Halbgras: Sc. radĭcans Schkhr. Wurzelnde B. Unfruchtb. Halme zur Blütezeit länger, als die fruchtb.; Spirre mehrfach-zſgeſetzt; Aehrchen einzeln, längl.-rautenf., langgeſtielt, nur die mittelſt. ſitz.; Bälge auf dem Rücken abgerund., ohne Stachelſp.; unter der Fr. 5 bis 6 ſehr lange, an der Spitze hakerige Borſten; 4; 7 bis 9.
—. III., 1; Baldrianpfl.: Valeriāna officinālis L.; ſ. Nr. 998.
—. „ Schwertelpfl.: Gladiŏlus imbricātus L.; ſ. Nr. 1045.
—. III., 2; Graspfl.: Agrōstis stolonifĕra L.; ſ. Nr. 2154.
—. „ „ Calamagrōstis halleriāna DC.; ſ. Nr. 1878.
—. III., 2; Graspfl.: C. stricta Nutt.; ſ. Nr. 1879.
2835. „ „ C. lanceolāta Roth (Arūndo calamagrōstis L.). Lanzettförmiges Rohr. Riſpe abſteh.; Klappen ſchmal-lanzettl., zugeſp.; Hare länger als die Spelzen; Granne endſt., grade, aus einer ſehr kurzen Ausrandung hervortretend, wenig länger, als dieſe; 4; 7 bis 8.
Varirt: C. gaudiniāna Rchb. (Riſpe blaſſer, dünner; ſchmächtige Hainform).
—. III., 2; Graspfl.: Alopecūrus geniculātus L.; ſ. Nr. 1880
—. „ „ A. utriculātus Pers.; ſ. Nr. 916.

*) Sc. clathratus Rchb. hat einzelne Aehrchen, die meiſt kürzer ſind, als das ſehr kurze Hüllblatt; Nuß ſchwach-querwellig-gegittert; Sa. (Naumburg).

—. III., 2; Graspfl.: Crypsis alopecuroïdes Schrad.; ſ. Nr. 1881.
—. III., 2; Graspfl.: Catabrōsa aquatĭca P. B.; ſ. Nr. 1882.
—. „ „ Aira caespitōsa L.; ſ. Nr. 1237.
—. „ „ Hierochlŏa boreālis R. et Sch.; ſ. Nr. 1883.
—. III., 2; Graspfl.: Holcus lanātus L.; ſ. Nr. 371.
—. „ „ Arrhenathērum avenacĕum P. B.; ſ. Nr. 1382.
—. III., 2; Graspfl.: Festūca pratēnsis Huds.; ſ. Nr. 1852.
—. „ „ F. arundinacĕa Schreb.; ſ. Nr. 1884.
—. „ „ Poa triviālis L.; ſ. Nr. 1860.
—. „ „ P. sudetĭca Haenke; ſ. Nr. 1046.
—. „ „ P. serotĭna Ehrh.; ſ. Nr. 1885.
—. „ „ Glycerĭa distans Whlbg.; ſ. Nr. 1886.
—. „ „ Brachypodĭum loliacĕum R. et Sch.; ſ. Nr. 1887.
—. III., 2; Graspfl.: Nardus stricta L.; ſ. Nr. 898.
—. „ „ Hordĕum secalĭnum Schreb.; ſ. Nr. 1861.
—. „ „ Lolĭum perēnne L.; ſ. Nr. 1281.
—. „ „ L. boucheānum Kunth; ſ. Nr. 2818.
—. IV., 1; Wegerichpfl.: Plantāgo lanceolāta L.; ſ. Nr. 1252.
—. „ Schlüſſelblümler: Centuncŭlus minĭmus L.; ſ. Nr. 1350.
2836. IV., 1; Kardenpfl.: Scabiōsa austrālis Wulff. Südlicher Abbiß. Faſt kahl; Wrz. ſchief-abſteig., kriech., nicht abgebiſſen; Köpfchen kug., zuletzt eif.; beſonderes Hüllchen mit ſtumpf-4lapp. Mdg.; Kſaum ohne Borſten; Bl. himmelblau; 2; 7 bis 8; St., Kä., Kr., Ty. u. ſ. w.
Varirt: Sc. repens Brignioli (Wrz. auslaufend).
—. IV., 1; Krapppfl.: Galĭum uliginōsum L.; ſ. Nr. 1889.
—. „ Roſenpfl.: Alchemīlla vulgāris L.; ſ. Nr. 416.
—. „ „ Sanguisōrba officinālis L.; ſ. Nr. 1658.
—. V., 1; Schlüſſelblümler: Lysimachĭa punctāta L.; ſ. Nr. 1890.
—. V., 1; Schlüſſelblümler: L. nummularĭa L.; ſ. Nr. 1008.
—. „ Borretſchpfl.: Symphўtum officināle L.; ſ. Nr. 548.
—. „ „ Myosōtis palūstris With.; ſ. Nr. 1891.
—. „ Sperrkrautpfl.: Polemonĭum coerulĕum L.; ſ. Nr. 1200.
—. V., 1; Enzianpfl.: Erythraea pulchēlla Fr.; ſ. Nr. 1856.
—. „ Glockenblümler: Wahlenbergĭa hederacĕa Rchb.; ſ. Nr. 2113.
—. V., 1; Veilchenpfl.: Viŏla persicifolĭa Schkhr.; ſ. Nr. 426.

—. V., 2; Enzianpfl.: Gentiāna obtusifolĭa Willd.; ſ. Nr. 2502.
—. V., 2; Doldenpfl.: Cicūta virōsa L.; ſ. Nr. 1892.
2837. „ „ Helosciadĭum repens Koch (Sium rep. L., Jacq.). Kriechender Scheiberich (Sumpfſchirm). Blattfiedern rundl.-eif., ungleich-gezähnt oder gelappt; Hüllbltr. eilanzettl., 2 bis 5; Döldchen armblüt.; Bl. weiß; 4; 7 bis 9; ſehr zerſtreut; †.
2838. V., 2; Doldenpfl.: Sium latifolĭum L. (Eusĭum latif. Endl.). Breitblättriger Merk (Waſſermerk, -paſtinak, -eppig, -peterlein, Gänſekreſſe, Froſchpeterlein). Wrz. faſerig; St. kant., gefurcht; Bltr. gefied., Bltchn. an der Baſis auf der innern Seite ſchmäler; Bl. weiß; 4; 7 bis 8; ⋕.
2839. V., 2; Doldenpfl.: S. angustifolĭum L. (Berŭla angustifolĭa Koch). Schmalblättriger M. (Berle). St. rundl., geſtreift; Bltr. gefied.; Dolden kurzgeſtielt; Bl. weiß; Wrz. faſerig, am Halſe auslauf.; 4; 7 bis 8; †.
—. V., 2; Doldenpfl.: Oenanthe fistulōsa L.; ſ. Nr. 1893.
—. „ „ Oe. lachenalĭi Gmel.; ſ. Nr. 1894.
—. „ „ Oe. peucedanifolĭa Poll.; ſ. Nr. 1895.
—. „ „ Oe. pimpinelloĭdes L.; ſ. Nr. 1896.
—. „ „ Cnidĭum venōsum Koch; ſ. Nr. 2135.
—. „ „ Angelĭca sylvēstris L.; ſ. Nr. 2115.
—. „ „ Archangelĭca officinālis Hoffm.; ſ. Nr. 1646.
—. V., 2; Doldenpfl.: Peucedănum palūstre Mnch.; ſ. Nr. 2160.
—. V., 2; Doldenpfl.: P. officināle L.; ſ. Nr. 2438.
—. VI., 1; Semede: Juncus commūnis E. Mey.; ſ. Nr. 1512.
—. „ „ J. obtusiflōrus Ehrh.; ſ. Nr. 1527.
—. „ „ J. alpīnus Vill.; ſ. Nr. 1831.
—. „ „ J. lamprocārpos Ehrh.; ſ. Nr. 1897.
—. „ „ J. capitātus Weig.; ſ. Nr. 1510.
—. „ „ J. comprēssus Jacq.; ſ. Nr. 1863.
—. „ Lilienpfl.: Hemerocāllis flava L.; ſ. Nr. 1898.
2840. VI., 3; Junkaginee: Triglōchin palūstre L. Sumpf-Dreizack (Salzbinſe, -gras). Wurzel faſerig; Schaft dopp. ſo lang als die ſchmallineal., gerinnelten, kahlen, grundſt. Bltr.; Fr. lineal., nach der Baſis verſchmäl., in 3 Kapſ. zerfallend; ☌; 7 bis 8.
—. VI., 3; Knöterichpfl.: Rumex maritĭmus L.; ſ. Nr. 1899.
2841. „ „ R. palūstris L. Sumpf-Ampfer. Fruchtklapp. lanzettl., ſchmal, in eine längl.-lineal., ganzrand. Spitze verſchmäl.; Klappenränder beiderſ. mit 2 bis 3

graden, pfrieml. Zähnen, die kürzer als die Klappen breit sind; obere Bltr. genähert, sich aber nicht berührend; ♂; 7 bis 8.*)

2842. VI., 3; Knöterichpfl.: R. aquatĭcus L. (R. hydrolapăthum β. Fr.). Waſſer-A. (Dockenblätter, Butterwecken-kraut). Untere Bltr. herz-eif., beiderſ. ſtumpf, obere herz-lanzettl., wie die oberſten lanzettl.-ſpitzlich; St. eckig; Wirtel vielblüt.; Bl. rotgrün; innere Zipf. der Fruchthülle herzeif., häutig, ganzrand. oder etwas gezähnelt; 4; 7 bis 8.

2843. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygŏnum amphibĭum L. Waſſer-Knöterich (Rüttig, Sommerlocken, Flohpfeffer, Floh-K.). Bl. 5männig, in eine dichte, eif. oder ellipt., ährenf. Traube geſtellt, purpurrot; Bltr. längl.-lanzettl.; Wrzſtock kriech.; Fr. zſgedr.; 4; 7 bis 9.

Varirt: P. natans Mnch. (St. mit den Bltrn. ſchwimmend; Bltr. geſtielt, aus breiter, ungleichſ., ei- oder herzf. Baſis lanzettl., kahl), P. repens (St. kriech.; Zweige aufſteig.; Bltr. kurz-geſtielt, eilanzettl., unterſ. behart), P. erēctum (St. aufſteig., aufr.; Bltr. ſehr kurz-geſtielt oder ſitz., lanzettl., beiderſ. behart).

—. VIII., 1; Knöterichpfl.: P. persicarĭa L.; ſ. Nr. 2182.
—. „ „ P. hydropĭper L.; ſ. Nr. 2117.
—. „ Nachtkerzenpfl.: Epilobĭum hirsūtum L.; ſ. Nr. 1053.
—. X., 3; Nelkenblütler: Stellarĭa glauca With.; ſ. Nr. 1054.
—. „ „ St. graminĕa L.; ſ. Nr. 388.
—. „ „ St. crassifolĭa Ehrh.; ſ. Nr. 1900.
—. XI., 1; Weiderichpfl.: Lythrum hyssopifolĭa L.; ſ. Nr. 2394.
—. XII., 2; Roſenpfl.: Spiraea ulmarĭa L.; ſ. Nr. 1055.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Clemātis integrifolĭa L.; ſ. Nr. 1901.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Thalĭctrum flavum L.; ſ. Nr. 1902.
—. „ „ Ranuncŭlus flammŭla L.; ſ. Nr. 1903.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: R. scelerātus L.; ſ. Nr. 1904.
—. „ „ Trollĭus europaeus L.; ſ. Nr. 798.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Mentha arvēnsis L.; ſ. Nr. 2213.
—. „ „ M. pulegĭum L.; ſ. Nr. 2820.

*) Eine Uebergangsform zu R. conglomeratus Murr. iſt R. steinii Becker, mit an der Baſis herzförmigen oder abgerundeten unteren und lanzettlichen oberen Blättern!

—. XIV., 1; Lippenblümler: Scutellaria galericulata L.; ſ. Nr. 2122.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Sc. hastifolia L.; ſ. Nr. 2123.
2844. „ „ Sc. minor L. Kleiner Schildträger. Unterſte Blтr. kurz-geſtielt, herz-eif., an der Baſis mit 2 Zähnen, obere eilanzettl., ſämmtl. gekerbt oder ganzrand.; K. drüſenlos-behart; Krröhre grade, an der Baſis ein wenig bauchig; Bl. rötlich; 4; 7 bis 8.*)
—. XIV., 1; Lippenblümler: Stachys palustris L.; ſ. Nr. 1905.
2845. „ „ Teucrium scordium L. Knoblauch-Gamander (Lachenknoblauch, Schorſekenthee). Blтr. ſitz., längl., lanzettl., grob-geſägt; Quirle 4blüt.; Bl. purpurn; K. zott., etwas bauchig; 4; 7 bis 9; ♃.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Pedicularis palustris L.; ſ. Nr. 919.
—. XIV., 2; Rachenblümler: P. sylvatica L.; ſ. Nr. 899.
—. „ „ Alectorolophus hirsutus All.; ſ. Nr. 1486.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Euphrasia odontites L.; ſ. Nr. 2308.
—. XIV., 2; Rachenblümler: E. serotina Lam.; ſ. Nr. 2309.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Nasturtium austriacum Crtz.; ſ. Nr. 1906.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranium palustre L.; ſ. Nr. 1057.
—. XVI., 5; Pappelroſenpfl.: Althaea officinalis L.; ſ. Nr. 2214.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Melilotus dentata Pers.; ſ. Nr. 2281.
—. „ „ Trifolium pannonicum L.; ſ. Nr. 1907.
—. „ „ T. hybridum L.; ſ. Nr. 469.
—. „ „ T. fragiferum L.; ſ. Nr. 1908.
—. „ „ Galega officinalis L.; ſ. Nr. 1349.
—. „ „ Astragalus sulcatus L.; ſ. Nr. 1857.
—. „ „ Lathyrus pratensis L.; ſ. Nr. 1240.
—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hypericum tetrapterum Fr.; ſ. Nr. 2128.
—. XIX., 1; Korbblütler: Crepis paludosa Mnch.; ſ. Nr. 1081.
2846. „ „ Sonchus palustris L. Sumpf-Gänſediſtel. Hauptwurzeln mit kurzen Nebenwrzln. ohne Adventivknoſpen; Blтr. gradſpitzig-geöhrt, untere ſchrotſägef., obere lanzettl. bis lanzett-lineal.; Bl. gelb; Fr. gelblich oder rotbraun; 4; 7 bis 8; ✕.

*) *Scutellaria columnae All., in Italien einheimiſch, iſt auf der Inſel Rügen an dem alten Burgwall Rugard zufällig verwildert!

—. XIX., 1; Korbblütler: Cirsĭum rivulāre All.; ſ. Nr. 1864.
—. „ „ C. acaule-oleracĕum Schiede; ſ. Nr. 2427.
—. XIX., 1; Korbblütler: C. palūstre Scop.; ſ. Nr. 1059.
—. „ „ C. setōsum M. B.; ſ. Nr. 2098.
—. „ „ C. cano-oleracĕum Naeg.; ſ. Nr. 3056.

2847. XIX., 1; Korbblütler: C. oleracĕum All. (Cnicus oleracĕus L., Cardŭus acanthifolĭus Lam.). Wieſenkohl (kohlartige Kratzdiſtel, Kohl-, Wieſen- oder Gelbdiſtel). Bltr. kahl oder zerſtreut-harig, untere umfaſſ.; Blütenköpfchen endſtänd., gehäuft, von großen, eif., gelbl. Deckbltrn. umhüllt; Bl. gelblichweiß; 4; 7 bis 8; ✕; ♆.*)

Varirt: C. sonchifolĭum Kitt. (Bltr. ſämmtl. ungetheilt).

2848. XIX., 1; Korbblütler: C. lanceolāto-oleracĕum Schultz (C. lachenalĭi Koch, C. bulbōso-oleracĕum Naeg. et C. oleracĕo-acaule Hampe [C. rigens Wallr., C. decolorātum Koch]). Baſtard. St. oben äſtig, bis zur Spitze beblätt.; Bltr. unterſ. etwas zott., dornig-gewimp., tiefſiederſpalt., Fiedern 2- bis 3ſpalt., Zipf. lanzettl., ſperrig, gezähnt, obere Bltr. ſitz., meiſt ungetheilt; Köpfchen geſtielt, von 2 bis 3 lineal. Deckbltchn. geſtützt; Bl. gelblichweiß; 4; 7 bis 8.

2849. XIX., 1; Korbblütler: C. palūstri-oleracĕum Schiede (Cnicus parviflōrus Heller, C. hybrĭdum et lactĕum Koch). Baſtard. St. bis zur Spitze beblätt.; untere Bltr. halb-herablauf., tief-ſiederſpalt., obere weniger herablauf., ungetheilt oder buchtig-gelappt; Blütenköpfe dichtſtehend; Deckbltr. lanzettl., von Köpfchenlänge; Bl. gelblichweiß oder ſchwach-rötl.; 4 (☉); 7 bis 9.

Varirt: C. parviflōrum DC. (Deckbltr. klein, lanzettlineal.; Köpfchen klein; Hüllbltchn. weichſtachelſp.), C. hybrĭdum Koch (zerſtreutharig; Deckbltr. länger, lanzettl.; Hüllbltchn. dornig-gewimp.).

2850. XIX., 1; Korbblütler: Eupatorĭum cannabĭnum L. Hanfartiger Waſſerdoſt (Kunigunden-, Hirſchwund-, Drachenblut-, Alp- oder Donnerkraut, Waſſerhanf, -ſenf, Hirſchdoſt, Tugendblume, Wetterklee, Hirſchgünſel). St.

*) Die Kohldiſtel verdient als Futterpflanze große Empfehlung, denn ſie wird von allen Vieharten gern gefreſſen, gibt früher wie der Klee viel für die Senſe, dauert über 10 Jahre, ohne im Ertrag nachzulaſſen. In Kurland ſammelt man die Blätter für abgeſetzte Kälber; in Rußland, beſonders aber in Sibirien, iſt ſie Kultur-Gemüſepflanze!

ſteif=aufr.; Bltr. geſtielt, 3= bis 5theil.; Köpfchen rötl., rötlichweiß bis bläulichrot; 4; 7 bis 8; ♃; †; ✕.

—. XIX., 2; Korbblütler: Senecĭo barbaraefolĭus Krock.; ſ. Nr. 2203.

—. XIX., 2; Korbblütler: Carpesĭum cernŭum L.; ſ. Nr. 2204.

—. „ „ Achillēa ptarmĭca L.; ſ. Nr. 2927.

—. „ „ Inŭla helenĭum L.; ſ. Nr. 2207.

2851. „ „ I. britannĭca L. Wieſen=Alant (Waſſer= oder gemeiner A., Odenskopp). St. zott.=wollig, 1= bis vielköpf.; äußere Hauptkelchbltchn. ſo lang, als die innern, die Scheibenbl. ein wenig überragend, aber weit kürzer als die Stralbl.; Bl. goldgelb; 4; 7 bis 8.

Varirt: I. oetteliāna Rchb. (Bltr. faſt kahl; Hüllbltchn. lanzettl.).

—. XX., 1; Orchidee: Orchis coryophŏra L.; ſ. Nr. 1909.

—. „ „ Gymnadenĭa conopsĕa R. Br.; ſ. Nr. 924.

—. XX., 1; Orchidee: Himantoglōssum virīde Rchb.; ſ. Nr. 1910.

—. XX., 1; Orchidee: Spirānthes aestivālis Rich.; ſ. Nr. 1060.

—. „ „ Listēra ovāta R. Br.; ſ. Nr. 1061.

—. XXI., 1; Giftmiſcher: Euphorbĭa lucĭda W. et K.; ſ. Nr. 1911.

—. XXI., 3; Halbgras: Carex boenninghausiāna Weihe; ſ. Nr. 1912.

—. XXI., 3; Halbgras: C. flava L.; ſ. Nr. 901.*)

—. „ „ C. oedēri Retz.; ſ. Nr. 691.

—. „ „ C. fulva Good.; ſ. Nr. 939.

—. „ „ C. laevigāta Sm.; ſ. Nr. 1913.

b. Auf naſſen, ſchwammigen Wieſen:

—. V., 4; Studentenröschen: Parnassĭa palūstris L.; ſ. Nr. 2500.

c. Auf Sumpfwieſen:

2852. IV., 1; Krapppfl.: Galĭum palūstre L. Sumpf=Lab=kraut. Bltr. meiſt 4ſtänd., lineal=längl., abgerund.=ſtumpf, ohne Stachelſp., 1nervig, am Rande rückw.=rauh; Riſpe ausgebreit.; Blütenſt. nach dem Verblühen grade; Bl. weiß; Fr. kahl, glatt; 4; 7 bis 9.

—. IV., 1; Krapppfl.: G. uliginōsum L.; ſ. Nr. 1889.

*) Die Form mit länglich=walzenförmigen ♀ Aehren und gelb=gerippten Früchten iſt C. marsoni Auerswald!

—. V., 2; Doldenpfl.: Cicūta virōsa L.; ſ. Nr. 1892.
—. „ „ Oenānthe silaïfolĭa M. B.; ſ. Nr. 1915.
—. „ „ Cnidĭum venōsum Koch; ſ. Nr. 2135.
—. „ „ Peucedănum palūstre Mnch.; ſ. Nr. 2160.
2853. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: Epilobĭum palūstre L. Sumpf-Weidenröschen. St. ſtielrund, glatt, kurzharig; Bltr. lanzettl. oder lineal., ganzrand. oder gezähnelt, mit keilf. Baſis ſitz.; Wrz. auslauf.; Bl. fleiſchfarben; 4; 7 bis 8.
—. X., 2; Nelkenblütler: Dianthus supērbus L.; ſ. Nr. 1016.
—. X., 3; „ Stellarĭa crassifolĭa Ehrh.; ſ. Nr. 1900.
—. X., 5; Nelkenblütler: Spergēlla nodōsa Rchb.; ſ. Nr. 2415.
—. XII., 3; Roſenpfl.: Comărum palūstre L.; ſ. Nr. 1843.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum palūstre L.; ſ. Nr. 1057.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Galēga officinālis L.; ſ. Nr. 1349.
—. „ „ Lathўrus palūstris L.; ſ. Nr. 3059.
—. XIX., 1; Korbblütler: Cirsĭum pannonĭco-palūstre Koch; ſ. Nr. 1916.
—. XIX., 2; Korbblütler: Hoppēa sibirĭca Rchb.; ſ. Nr. 1917.

d. Auf ſandigen Sumpfwieſen:

2854. VI., 1; Lilienpfl.: Allĭum suaveŏlens Jacq. Wohlriechender Lauch. Zwiebel längl., ſchief, mit Brut, braunhäutig, Häute an der Spitze zerfetzt; Schaft walzenf., an der Baſis beblätt.; Bltr. lineal., etwas rinnig; Stbgf. faſt dopp. ſo lang, als die lanzettl., ſpitzl. Kelchſtücke; Bl. rot, innen rötlichweiß; 4; 7 bis 9.

e. Auf Torfwieſen:

—. IV., 1; Enzianpfl.: Cicendĭa filiförmis Rchb.; ſ. Nr. 2412.
—. „ Krapppfl.: Galĭum boreāle L.; ſ. Nr. 2081.
—. V., 1; Borretſchpfl.: Myosōtis palūstris With.; ſ. Nr. 1891.
—. V., 2; Enzianpfl.: Gentiāna obtusifolĭa Willd.; ſ. Nr. 2502.
—. „ „ Sweertĭa perēnnis L.; ſ. Nr. 2560.
2855. V., 3 oder 5; Sonnenthaupfl.: Drosĕra rotundifolĭa L. Rundblättriger Sonnenthau (Sonnen-, Sofien-, Ohrlöffel-, Bull- oder Egelkraut, Siebau, Jungfernblüte, Gideon, Sonnenbraut, Hergottslöffel). Schaft aufr.; Bltr. kreisrund, lang-geſtielt; Bl. in einſeit. Aehre, weiß; 4; 7 bis 8.*)

*) Die Drüſen der Blätter ſind, wie bei allen Arten, purpurrot und morgens und bei ruhigem Wetter mit Thautröpfchen geziert — daher der Name!

2856. V., 3 oder 5; Sonnenthaupfl.: Dr. longifolĭa L. (z. Th.; Dr. anglĭca Huds.). Langblättriger S. Schaft aufr.; Bltr. lineal.-keilf., von halber Stengellänge; Bl. weiß; 4; 7 bis 8.

Varirt: Dr. anglĭca Sm. (Bltr. lineal-längl., spatelf.; Schaft von 2- bis 3facher Blattlänge), Dr. obovāta Koch (Bltr. verk.-eispatelf.; Schaft von dopp. Blattlänge).

—. V., 3 oder 5; Sonnenthaupfl.: Dr. intermedĭa Hayne; s. Nr. 1918.

—. VI., 3; Zeitlosenpfl.: Tofieldĭa calyculāta Whlbg.; s. Nr. 1832.

—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: Epilobĭum palūstre L.; s. Nr. 2853.

—. VIII., 1; Heidepfl.: Tetrălix septentrionālis E. Mey.; s. Nr. 2561.

2857. VIII., 1; Preiselpfl.: Oxycōccos palūstris Pers. (Schollēra oxyc. Roth, Vaccinĭum oxyc. L.). Mosbeere (Muttergottesкirsche, Kranich-, Kram- oder Affenbeere, Marienstrauch, -palm). St. mit fadenf., ligenden Aesten, kriech.; Bltr. eif., ziemlich spitz, unters. aschgrau; Bl. rosenrot, weißl.-geadert; Beere erbsengroß, rot, eßbar; ♄; 6 bis 7.

—. X., 1; Heidepfl.: Andromĕda polifolĭa L.; s. Nr. 804.

2858. X., 2; Steinbrechpfl.: Saxifrăga hircŭlus L. Goldblumiger Steinbrech (Bocksauge). Stämmchen niedergestreckt, fadenf.; St. aufr., beblätt.; Bltr. lanzettl., ganzrand.; Kelchzipf. zurückgeschl.; Krbltr. an der Basis 2schwielig, gelb; 4; 7 bis 9; S.-H., Ha., M., Po., Brd., Pf., Pr., W., Schl., Oberschwaben, Oberbayern.

—. X., 3; Nelkenblütler: Stellarĭa crassifolĭa Ehrh.; s. Nr. 1900.

—. X., 5; Nelkenblütler: Spergēlla nodōsa Rchb.; s. Nr. 2415.

—. „ Dickblattpfl.: Sedum villōsum L.; s. Nr. 1614.

—. XII., 3; Rosenpfl.: Comărum palūstre L.; s. Nr. 1243.

—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Trifolĭum spadicĕum L.; s. Nr. 1058.

2859. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperīcum elōdes L. (Elōdes palūstris Spach). Sumpf-Hartheu. St. niederlig. und aufstreb., rauhharig, wie die rundl.-eif., sitz. Bltr.; Bl. gelb; Kelchlappen eif. oder ellipt.; Bl. zitrongelb, grünnervig; 4; 7 bis 8.

2860. XIX., 2; Korbblütler: Cinerarĭa palūstris L. (Senecĭo pal. DC.). Sumpf-Aschenpflanze. Zottig; Bltr. lanzettl., halb-umfass., untere buchtig-gezähnt; Hüllbltchn. nicht

brandspitz.; Fr. kahl, ungleich=10ripp.; Köpfchen mit einem Blthn. gestützt; Bl. gelb; ☉; 7 bis 8.

—. XIX., 2; Korbblütler: Arnĭca montāna L.; s. Nr. 1634.

—. XX., 1; Orchidee: Lipāris loeselĭi Rich.; s. Nr. 1920.

f. Auf Morwiesen:

—. VIII., 1; Preiselpfl.: Oxycōccos palūstris Pers.; s. Nr. 2857.

—. XIV., 1; Lippenblümler: Betonĭca officinālis L.; s. Nr. 1027.

g. Auf mosigen Wiesen:

—. X., 5; Nelkenblütler: Spergēlla nodōsa Rchb.; s. Nr. 2415.

h. Auf Torfmos (Sphagnum):

—. V., 3 oder 5; Sonnenthaupfl.: Droseĕra rotundifolĭa L.; s. Nr. 2855.

i. An feuchten Gräben:

—. XV., 1; Kreuzblütler: Cochlearĭa armoracĭa L.; s. Nr. 1222.

k. Am Rande der Abzugsgräben:

—. XII., 3; Rosenpfl.: Comărum palūstre L.; s. Nr. 1243.

l. Auf salzhaltigen Wiesen:

2861. IV., 1; Wegerichpfl.: Plantāgo cornūti Gouan. Kornuti's Wegerich. Bltr. eilanzettl., ganzrand. oder wenig gezähnt, kahl, 5- bis 7nervig; Blütenst. aufr., tief=furchig; Aehre walzenf., dünn, verläng.; Deckbltr. von halber Kelchlänge; 4; 7 bis 8; Kr.

2862. IV., 1; Wegerichpfl.: P. coronŏpus L. Krähenfußartiger W. (Krähenfuß). Bltr. fiederspalt. oder fiederspalt=sägezähn., lineal.; Deckbltr. aus eif. Basis pfriemf.; seitenst. Kelchzipf. auf dem Rücken häutig=geflüg.; Aehre walzenf.; 4; 7 bis 9; Ha., W., S.=H., M., Po., Pr., Brd.

2863. V., 1; Schlüsselblümler: Samŏlus valerandi L. Salzbunge. Bltr. längl.=verk.=eif., unterste rosettig; Traube zuletzt verläng.; Bl. weiß; Blütenst. in der Mitte mit einem Deckblatte; 4; 7 bis 8.*)

2864. V., 2; Doldenpfl.: Bupleurum tenuissĭmum L. Feines Hasenöhrchen. St. sehr ästig; Bltr. lineal=lanzettl., nicht durchwachsen; endst. Dolden 3stral., seitenst. unvollst., alle

*) Ist wol die am weitesten verbreitete Pflanze der Erde, denn man findet sie in ganz Europa, in Asien, in Nordamerika, am Kap, in Neuholland und auch im innern und nördlichen Afrika!

von einer Hülle umgeben; Hüllchen lineal-lanzettl., zur Blütezeit die 4- bis 5blüt. Dölchen überragend; Fr. körnig-rauh; Bl. sehr klein, gelb; ⊙; 7 bis 8; Schl., Brd., Po., M., S.-H., Ha., Sa., Th., Hn., Bö., Pfalz.

—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Melilōtus dentāta Pers.; s. Nr. 2281.
—. „ „ Trifolĭum fragifĕrum L.; s. Nr. 1908.
—. XIX., 1; Korbblütler: Thrincĭa hirta Roth; s. Nr. 1840.
—. XIX., 2; „ Senecĭo aquatĭcus Huds.; s. Nr. 2827.

2865. XIX., 2; Korbblütler: Artemisĭa laciniāta L. (A. mertensiāna Wallr.). Geschlitzter Beifuß. Rasenbildend; nichtblüh. St. rasenf., blüh. aufstreb., ganz einfach, einfach-traubig oder aufr.-traubig-ästig; Bltr. zuletzt kahl, dopp.-fiederspalt., blütenst. ganzrand.; Köpfchen fast kug.; Bl. gelb; 2|; 7 bis 9; An., Th.

—. XXI., 5; Meldenpfl.: Atrĭplex oblongifolĭum W. et K.; s. Nr. 2303.

m. Auf kalkhaltigen Wiesen:

—. XIX., 1; Korbblütler: Cirsĭum tuberōsum All.; s. Nr. 1528.

n. Auf feuchten, kalkhaltigen Wiesen:

2866. VI., 1; Lilienpfl.: Allĭum acutangŭlum Schrad. (A. fallax Don). Scharfkantiger Lauch. Schaft oberw. scharfkant.; Bltr. durch den dickeren, hervorrag. Mittelnerv scharf-gekielt; Stbf. so lang als die Blütenhülle; Bl. rosenrot, selten weiß; 2|; 7 bis 8.

o. Auf fetten Wiesen:

—. XIV., 1; Lippenblümler: Mentha sylvēstris L.; s. Nr. 2218.

p. Auf einmähtigen Wiesen:

—. X., 3; Nelkenblütler: Silēne nutans L.; s. Nr. 1112.

q. Auf unfruchtbaren Wiesen:

2867. V., 2; Doldenpfl.: Ferŭla ferulago L. Birkwurz-Steckenkraut. St. walzenf., gestreift; Bltr. vielfach-zertheilt; Hülle vielblättr., Blthn. längl.-lanzettl., zurückgeschl.; Hüllchen vielblättr., Blthn. lineal., spitz, aufgebogen-sichelf.; Bl. gelb; 2|; 7 bis 8; Kr.

r. Auf trocknen Wiesen:

—. III., 2; Graspfl.: Andropōgon gryllus L.; s. Nr. 1872.
—. „ „ Agrōstis vulgāris With.; s. Nr. 2169.
—. „ „ Phleum pratēnse L.; s. Nr. 1248.

—. III., 2; Graspfl.: Phl. boehmēri Wibd.; f. Nr. 1577.
—. „ „ Avēna flavēscens L.; f. Nr. 1273.
—. „ „ A. pratēnsis L.; f. Nr. 1171.
—. „ „ Vulpĭa sciuroīdes Rchb.; f. Nr. 1274.
—. „ „ Bromus erēctus Huds.; f. Nr. 1276.
—. „ „ B. inērmis L.; f. Nr. 1277.
—. „ „ Festūca pratēnsis Huds.; f. Nr. 1852.
—. „ „ F. duriuscŭla L. sp.; f. Nr. 1133.
—. „ „ F. rubra L.; f. Nr. 1184.
—. „ „ Dactўlis glomerāta L.; f. Nr. 1104.
—. „ „ Briza medĭa L.; f. Nr. 1859.
—. „ „ Poa annŭa L.; f. Nr. 14.
—. „ „ Cynosūrus cristātus L.; f. Nr. 1853.
—. „ „ Lolĭum perēnne L.; f. Nr. 1281.
—. „ „ L. boucheānum Kunth; f. Nr. 2818.
—. IV., 1; Wegerichpfl.: Plantāgo lanceolāta L.; f. Nr. 1252.
—. „ Kardenpfl.: Scabiōsa columbarĭa L.; f. Nr. 2080.
—. „ Krapppfl.: Galĭum mollūgo L.; f. Nr. 1006.
—. „ Rosenpfl.: Poterĭum sanguisōrba L.; f. Nr. 509.
—. V., 1; Zauberpfl.: Thesĭum ramōsum Hayne; f. Nr. 1473.
—. „ „ Th. humĭle Vahl; f. Nr. 1474.
—. „ Glockenblümler: Campanŭla rapuncŭlus L.; f. Nr. 1010.
—. V., 1; Glockenblümler: C. bononiēnsis L.; f. Nr. 2224.
—. V., 2; Doldenpfl.: Carum verticillātum Koch; f. Nr. 1873.
—. „ „ Pimpinēlla saxifrăga L.; f. Nr. 2176.
—. „ „ Seselĭ colorātum Ehrh.; f. Nr. 2495.
—. „ „ Peucedănum cervarĭa Cuss.; f. Nr. 2132.
—. VI., 1; Lilienpfl.: Allĭum vineāle L.; f. Nr. 1392.
—. „ „ A. sphaerocephălum L.; f. Nr. 1393.
—. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus deltoides L.; f. Nr. 1111.
—. „ „ D. supērbus L.; f. Nr. 1016.
—. X., 3; „ Silēne inflāta Sm.; f. Nr. 1178.
—. XII., 2; Rosenpfl.: Spiraea filipendŭla L.; f. Nr. 1019.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Linarĭa elatīne Mill.; f. Nr. 2404.
—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Onōnis repens L.; f. Nr. 1320.
—. „ „ Genīsta tinctorĭa L.; f. Nr. 1184.
—. „ „ Cytĭsus sagittālis Koch; f. Nr. 445.
—. „ „ Anthўllis vulnerarĭa L.; f. Nr. 721.
—. „ „ Medicāgo falcāta L.; f. Nr. 1324.
—. „ „ Trifolĭum medĭum L.; f. Nr. 1033.
—. „ „ T. montānum L.; f. Nr. 485.
—. „ „ Astragălus hypoglōttis L.; f. Nr. 753.
—. „ „ A. austriăcus L.; f. Nr. 1567.

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Onobrÿchis satīva Lam.; ſ. Nr. 655.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hypochoeris radicāta L.; ſ. Nr. 1126.
—. XIX., 1; Korbblütler: Gelasĭa villōsa Cass.; ſ. Nr. 1874.
—. „ „ Tragopōgon major Jacq.; ſ. Nr. 1337.
—. XIX., 1; Korbblütler: Cirsĭum acaule All.; ſ. Nr. 2097.
2868. XIX., 2; „ Inŭla squarrōsa L. (I. bubonĭum Willd.). Knorpeliger Alant. St. aufr., ſchärfl., oben kurz-doldentraubig-äſtig, dicht-beblätt.; Blтr. ſitz., faſt halbumfaſſ., eif. oder ellipt.-lanzettl., netzaderig; äußere Hüllblтchn. zurückgekr.-ſpitzig; Bl. pomeranzengelb; Stral kaum von Hüllenlänge; 4; 7 bis 8; Kr.

s. Auf ſandigen Wieſen:

—. V., 5; Bleiwurzpfl.: Armerĭa vulgāris Willd.; ſ. Nr. 1295.

t. An Wieſenrändern:

—. V., 1; Rachenblümler: Verbāscum phoenicĕum L.; ſ. Nr. 2131.
—. X., 3; Nelkenblütler: Melandrĭum pratēnse Roehl.; ſ. ſ. Nr. 1113.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Astragălus glycyphўllos L.; ſ. Nr. 1035.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: A. cicer L.; ſ. Nr. 1330.
—. „ „ Lathўrus nissolĭa L.; ſ. Nr. 1414.

u. An naſſen Wieſenrändern:

—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperĭcum quadrangŭlum Fr.; ſ. Nr. 2069.

v. Auf hochgelegenen Wieſen:

—. II., 1; Lippenblümler: Salvĭa austriăca Ait.; ſ. Nr. 755.
—. XIX., 1; Korbblütler: Crepis praemōrsa Tausch; ſ. Nr. 512.

w. Auf Berg- und Gebirgswieſen:

—. III. 2; Graspfl.: Holcus mollis L.; ſ. Nr. 1132.
2869. „ „ Avēna planicūlmis Schrad. Blatthalmiger Hafer. Blтr. kahl, rauhrand., halmſt. lineal.-lanzettl.; Blattſch. 2ſchneid.; Riſpe zſgezog., lang, mit je 2 bis 4 Aeſten, wovon die längeren 2 bis 3 Aehrchen tragend, letztere nicht hängend; Aehrchen 4 bis 6blüt.; Achſe behart; 4; 7 bis 8; Sudeten.

—. III., 2; Graspfl.: Triodĭa decŭmbens P. B.; ſ. Nr. 1652.
—. „ „ Molinĭa coerulĕa Mnch.; ſ. Nr. 2112.
—. IV., 1; Kardenpfl.: Scabiōsa sylvatĭca L.; ſ. Nr. 2141.
—. V., 2; Zauberpfl.: Thesĭum pratēnse Ehrh.; ſ. Nr. 1609.
—. „ Veilchenpfl.: Viŏla lutĕa Sm.; ſ. Nr. 2505.
—. „ Glockenblümler: Campanŭla persicifolĭa L.; ſ. Nr. 1072.
—. V., 2; Doldenpfl.: Athamānta libanōtis L.; ſ. Nr. 2083.
—. „ „ Meum athamantĭcum Jacq.; ſ. Nr. 2554.
—. „ „ Chaerophўllum hirsūtum L.; ſ. Nr. 2130.
—. V., 2; Doldenpfl.: Pleurospērmum austriăcum Hoffm.; ſ. Nr. 2557.
—. V., 2; Doldenpfl.: Seseli colorātum Ehrh.; ſ. Nr. 2495.
—. VI., 1; Lilienpfl.: Allĭum schönoprāsum L.; ſ. Nr. 1654.
2870. „ „ A. victoriālis L. Allermannsharniſch (Siegwurz, neſtwurzeliger Lauch, Glücksmännchen, Alpknoblauch, Neunhemderwurz). Blr. kurz-geſtielt, lanzettl. oder ellipt., flach; Blütenſch. 1klapp.; Bl. gelblichweiß; Zwieb. netzſchalig, horizontal; 4; 7 bis 8; ☼.
—. X., 3; Nelkenblütler: Arenarĭa grandiflōra L.; ſ. Nr. 797.
—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: Delphinĭum elatum L.; ſ. Nr. 2496.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Trollĭus europaeus L.; ſ. Nr. 798.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Melampўrum cristātum L.; ſ. Nr. 1123.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Alectorolŏphus pulcher Schumm.; ſ. Nr. 2555.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum sanguinĕum L.; ſ. Nr. 486.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolĭum agrarĭum L.; ſ. Nr. 1084.
—. „ „ Vicĭa villōsa Roth; ſ. Nr. 673.
—. „ „ V. tenuifolĭa Roth; ſ. Nr. 1229.
—. „ „ Lathўrus sylvēstris L.; ſ. Nr. 1036.
—. „ „ L. albus Kitt.; ſ. Nr. 769.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hypochoeris maculāta L.; ſ. Nr. 2111.
—. XIX., 1; Korbblütler: Scorzonēra humĭlis L.; ſ. Nr. 479.
—. „ „ Serratŭla nitĭda Bess.; ſ. Nr. 2450.
—. „ „ Cirsĭum acaule - tuberōsum Schiede; ſ. Nr. 2497.
—. XIX., 1; Korbblütler: C. pannonĭcum DC.; ſ. Nr. 2498.
—. „ „ Cardŭus defloratus L.; ſ. Nr. 2074.

—. XIX., 2; Korbblütler: Cinerarĭa campēstris Retz.; ſ. Nr. 1136.
—. XIX., 2; Korbblütler: Pyrĕthrum macrophȳllum Willd.; ſ. Nr. 2499.
—. XIX., 2; Korbblütler: Inŭla germanĭca L.; ſ. Nr. 2296.
—. XIX., 3; „ Centaurēa sordĭda Willd.; ſ. Nr. 1610.
—. XIX., 3; Korbblütler: C. phrygĭa L.; ſ. Nr. 2163.
—. „ „ C. nigrēscens Willd.; ſ. Nr. 2556.
—. XX., 1; Orchidee: Orchis mascŭla L.; ſ. Nr. 799.
—. „ „ Gymnadenĭa odoratissĭma Rich.; ſ. Nr. 1655.
—. XX., 1; Orchidee: Nigritēlla globōsa Rchb.; ſ. Nr. 1137.
—. „ „ Leucōrchis albĭda Lindl.; ſ. Nr. 483.
—. „ „ Epipāctis latifolĭa Sw.; ſ. Nr. 2139.
—. XXI., 3; Halbgras: Carex rigĭda Good; ſ. Nr. 1656.

x. Auf ſonnigen Bergwieſen:

Vergl. §. 500, o.

y. Auf trocknen Bergwieſen:

Vergl. §. 500, p.

z. Auf feuchten oder naſſen Bergwieſen:

Vergl. §. 500, q; außerdem:
—. III., 2; Graspfl.: Avēna planicŭlmis Schrad.; ſ. Nr. 2869.
—. X., 5; Dickblattpfl.: Sedum villōsum L.; ſ. Nr. 1614.

a¹. Auf feuchten Gebirgswieſen:

Vergl. §. 501, p¹.

b¹. Auf Waldwieſen:

—. IV., 1; Roſenpfl.: Alchemĭlla vulgāris L.; ſ. Nr. 416.
—. V., 2; Doldenpfl.: Cnidĭum venōsum Koch; ſ. Nr. 2135.
—. „ „ Laserpitĭum pruthenĭcum L.; ſ. Nr. 2059.
—. V., 2; Doldenpfl.: Chaerophȳllum aromatĭcum L.; ſ. Nr. 1135.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Ranuncŭlus polyanthĕmos L.; ſ. Nr. 476.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum pyrenaĭcum L.; ſ. Nr. 477.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolĭum ochroleucum L.; ſ. Nr. 1140.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Tr. spadicĕum L.; ſ. Nr. 1058.
—. XIX., 1; Korbblütler: Scorzonēra humĭlis L.; ſ. Nr. 479.

—. XIX., 1; Korbblütler: Serratŭla tinctorĭa L.; ſ. Nr. 2073.
—. XIX., 2; „ Cinerarĭa campēstris Retz.; ſ. Nr. 1136.

c¹. An feuchten Stellen der Waldwieſen:

—. V., 2; Doldenpfl.: Hydrocotўle vulgāris L.; ſ. Nr. 2137

d¹. Auf Gebirgswaldwieſen:

—. V., 2; Doldenpfl.: Myrrhis odorāta Scop.; ſ. Nr. 490.

e¹. Auf Waldwieſen der Voralpen:

—. V., 2; Doldenpfl.: Laserpitĭum archangelĭca Wulff.; ſ. Nr. 2811.

§. 510. **H¹. An feuchten und ſumpfigen Orten:**

2871. II., 1; Waſſerſchlauchpfl.: Utricularĭa neglēcta Lehm. (U. spectabĭlis Madauss, U. major Schmiedel?). Ueberſehener Waſſerhelm (Waſſerſchlauch). Blütenſt. von 4- bis 5facher Deckblattlänge; Oberl. eif.-längl., ſtumpf oder ſchwach-ausgerand., 2- bis 3mal länger, als der rundl. Gaumen; Bl. gelb; Antheren frei; ♃; 7 bis 8; Norddeutſchl.

2872. II., 1; Waſſerſchlauchpfl.: U. pulchēlla C. B. Lehm. (U. bremĭi Heer). Zierlicher W. Unterl. kreisrund, flach; Kelchlappen faſt nierenf.; Gaumen braungeſtreift; wie U. minor L., aber ſtärker; ♃; 7 bis 8; Hanau, Frankf. a. M., Offenbach, Hennersdorf bei Görlitz (?).

—. II., 1; Rachenblümler: Veronĭca serpyllifolĭa L.; ſ. Nr. 424.
—. II., 1; Rachenblümler: V. scutellāta L.; ſ. Nr. 1875.
—. „ „ Gratĭola officinalis L.; ſ. Nr. 2817.*)
—. III., 1; Halbgras: Cypērus flavēscens L.; ſ. Nr. 1043.
—. „ „ C. fuscus L.; ſ. Nr. 2831.
2873. „ „ C. serotĭnus Rottb. (C. monti L. fil., Pycrĕus serot. P. B.). Spätes Zipergras. Halm 3kant., mit beblätt. Baſis; Hülle 3- bis 5blättr., ſehr lang; Spirre dopp.-zſgeſetzt, Aeſte ungleichlang, zu 2 bis 4; Zweige geſied.-vieläh rig; Fr. linſenf., braun; ♃; 7 bis 8; Kr.
2874. III., 1; Halbgras: Schoenus marĭscus L. (Cladĭum mar. R. Br., Cl. germanĭcum Schrad.). Deutſches Kopfgras (Schneide). Halm beblätt.; Spirre dopp.-

*) *Mimulus guttatus Fisch., aus Amerika ſtammend, findet ſich in der Grafſchaft Glatz an den Ufern der Neiße u. a. a. O. Schleſiens! (M. luteus L.)

zſgeſetzt; Bltr. flach, gekielt; Aehren kopfſ.-geknäuelt; Aehrchen muſchelbraun; Same ſchwarz, glatt; 4; 7 bis 8.

2875. III., 1; Halbgras: Scirpus dichotŏmus L. (Fimbristylis dichotŏma Vahl). Gabeläſtige Binſe (Franſenbinſe). Wrz. büſchelig; Halm 3kant., oben nackt, unten beblätt.; Bltr. ſchmal-lineal., flach; Dolde aus zalr. Aeſtchen zſgeſetzt; Fr. ſtrohgelb bis muſchelbraun; ☉; 7 bis 9; Ty.

Varirt: Sc. annŭus All. (Spirre einfach-3ährig), Sc. dichotŏmus Auct. (Spirre ungleich-mehräſtig-mehrährig), Sc. depauperātus (Spirre verkümmert-1ährig).

—. III., 1; Halbgras: Sc. palūstris L.; ſ. Nr. 1876.

—. „ „ Sc. ovātus Roth; ſ. Nr. 1921.

—. „ „ Sc. setacĕus L.; ſ. Nr. 2832.

—. „ „ Sc. lacūstris L.; ſ. Nr. 944.

2876. „ „ Sc. supīnus L. Niedrige B. Halm ſtielrund, einfach, fadenf.; grundſt. Blattſch. blattartig; Aehrchen 2 bis 10, büſchelig-gehäuft; Nuß querrunzelig; ☉; 7 bis 8; G. H., Bay., De. u. ſ. w.

—. III., 2; Graspfl.: Alopecūrus fulvus Sm.; ſ. Nr. 1922.

—. „ „ A. geniculātus L.; ſ. Nr. 1880.

2877. „ „ Crypsis aculeāta Ait. Stechendes Dorngras. Halm zſgedr., gerinnelt, aus den Blattſch. kurze, blüh. Aeſte treibend; Riſpe faſt kug., von kurzen, ſtachelſp.-ſcheidenart. Bltrn. umgeben; obere Blütenſch. 2-nervig; Bl. 2männig; ☉; 7 bis 8; Mä., De.

—. III., 2; Graspfl.: Poa triviālis L.; ſ. Nr. 1860.

—. „ „ P. serotĭna Ehrh.; ſ. Nr. 1885.

—. „ „ Glycerĭa distans Whlbg.; ſ. Nr. 1886.

—. „ „ Lolĭum multiflōrum Lam.; ſ. Nr. 1923.

—. IV., 1; Krapppfl.: Galĭum palūstre L.; ſ. Nr. 2852.

—. „ „ G. uliginōsum L.; ſ. Nr. 1889.

2878. „ „ G. rubioīdes L. Röteartiges Labkraut. St. aufr., ſteif, 4kant., nur an den Knieen behart; Bltr. zu 4, faſt gleichlang, ellipt.-lanzettl., ſteif, 3nervig, unterſ. und am Rande ſcharf; Wrz. kriech., rot; Bl. gelblichweiß; Fr. kahl; 4; 7 bis 8; Kr.*)

—. V., 1; Schlüſſelblümler: Lysimachĭa thyrsiflōra L.; ſ. Nr. 1145.

—. V., 1; Schlüſſelblümler: L. ciliāta L.; ſ. Nr. 1925.

—. „ „ L. nummularĭa L.; ſ. Nr. 1008.

*) Die echte G. rubioides L. iſt in wenigen Herbarien vorhanden; ſtatt deren meiſt eine gedrungene Form von G. boreale L.!

—. V., 1; Nachtschattenpfl.: Solānum dulcamāra L.; s. Nr. 1197.
—. V., 1; Borretschpfl.: Myosōtis palūstris With.; s. Nr. 1891.
—. V., 1; Borretschpfl.: M. caespitōsa Schultz; s. Nr. 1926.
—. „ Enzianpfl.: Lymnanthĕmum nymphaeoīdes Lk.; s. Nr. 1927.
2879. V., 1; Glockenblümler: Lobelĭa dortmānna L. Wasser-Lobelie (Schwanenhals). St. fast blattlos; Bltr. lineal., mit 2 Längshöhlen; Bl. weiß, kornblau mit bläul. Röhre, in gipfelst., armblüt., meist einseitswend. Aehre; ♃; 7 bis 8; ‡.
—. V., 2; Doldenpfl.: Hydrocotȳle vulgāris L.; s. Nr. 2137.
—. „ „ Cicūta virōsa L.; s. Nr. 1892.
—. „ „ Apĭum graveŏlens L.; s. Nr. 1928.
—. „ „ Helosciadĭum repens Koch; s. Nr. 2837.
2880. „ „ H. inundātum Koch (Sison inund. L.). Schwimmender Sumpfschirm (Scheiberich). Untergetauchte Bltr. harfein-getheilt, obere gefied.; Dolden 2stral.; Bl. weiß, nebst den Fr. sitz.; St. schwimmend; ♃; 7 bis 8; †.
2881. V., 2; Doldenpfl.: Oenānthe phellandrĭum Lmk. (O. aquatĭca Lmk., Phellandrĭum aquatĭcum L.). Fenchelartige Tropfwurz (Wasser- oder Roßfenchel, Pferdesamen, Froschpeterlein, Nidelbrot, klein Wodendung, Pferdekümmel, -sat, Roßkerbel). Wrz. spindelf., faserig; Bltr. dopp.- bis 3fach-gefied.; St. röhrig; Bl. weiß; ⊙ bis ♃; 7 bis 8; ℥; ‡.
—. V., 2; Doldenpfl.: Chaerophȳllum hirsūtum L.; s. Nr. 2130.
2882. V., 2; Seidenfrüchtler: Apocȳnum venĕtum L. Gemeiner Hundstod (Fliegenfalle, Mückenwürger, Hundskohl, -gift, -wolle). St. aufr., oben ästig; Bltr. gegenst., oftmals verschoben, kurz-gestielt, schief-ellipt.-lanzettl. bis lineal-lanzettl., stachelsp., lederig; Bl. in einer, zu einer deckblättr. Traube zsgesetzten Zyme, rosenrot; Kronröhre innen mit 5 spitzen Zähnchen; ♃; 7 bis 8; Triest.
—. V., 3; Geisblattpfl.: Sambūcus ebŭlus L.; s. Nr. 2084.
—. V., 3 oder 5; Sonnenthaupfl.: Drosĕra rotundifolĭa L.; s. Nr. 2855.
—. V., 3 oder 5; Sonnenthaupfl.: Dr. longifolĭa L.; s. Nr. 2856.
—. V., 3 oder 5; Sonnenthaupfl.: Dr. intermedĭa Hayne; s. Nr. 1918.

—. VI., 1; Aronpfl.: *Acŏrus calămus L.; ſ. Nr. 1929.
—. „ Semede: Juncus communis E. Mey.; ſ. Nr. 1512.
—. „ „ J. glaucus Ehrh.; ſ. Nr. 1930.
—. „ „ J. obtusiflōrus Ehrh.; ſ. Nr. 1527.
—. „ „ J. acutiflōrus Ehrh.; ſ. Nr. 2116.
2883. „ „ J. bottnĭcus Whlbg. (J. gerārdi Lois., J. bulbōsus L. z. Th.). Bottniſche Binſe. Wrzſtock kriech.; Halm oder Schaft walzenf., etwas zſgedr.; Bltr. lineal., rinnig; Bl. einzeln, genähert, faſt einſeitig; Kelchlapp. eilängl., ſtumpf; Blütenhüllbltr. faſt ſo lang, als die längl.-ovale, etwas 3ſeit Kapſ.; 2; 7 bis 8.
—. VI., 3; Knöterichpfl.: Rumex aquatĭcus L.; ſ. Nr. 2842.
2884. „ „ R. hydrolapăthum Huds. Fluß-Ampfer (Butter-A., -blätter, -weckenkraut). Bltr. lanzettl., beiderſ. verſchmäl., mit oberſ. flachem Stiele; innere Zipf. der Fruchthülle eif.-3eck., großſchwielig; 2; 7 bis 8.
2885. VI., 3; Knöterichpfl.: R. maxĭmus Schreb. (R. heterophȳllus Schultz). Rieſen-A. Untere Bltr. längl., ſpitz, an der Baſis ſchief-ei- oder herzf.; Blattſtiele oberſ. flach; innere Zipf. der Fruchthülle eckig-herzf.; 2; 7 bis 8.
—. VI., 5; Löffelpfl.: Alīsma ranunculoīdes L.; ſ. Nr. 1931.
2886. „ „ A. pernassifolĭum L. (Echinodŏrus parnassifolĭus Engelm.) Herzblattblättriger Froſchlöffel. Bltr. tief-herzeif.; Fr. einwärts-ſtachelſp., vielrillig; innere Kelchlappen blaßfleiſchrot; 2; 7 bis 8; †.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygŏnum amphibĭum L.; ſ. Nr. 2843.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: P. persicarĭa L.; ſ. Nr. 2182.
—. „ „ P. hydropīper L.; ſ. Nr. 2117.
—. „ Nachtkerzenpfl.: Epilobĭum tetragōnum L.; ſ. Nr. 2215.
—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: E. roseum Schr.; ſ. Nr. 2129.
2887. VIII., 4; Tännelpfl.: Elatīne alsināstrum L. Quirliger Tännel (Schäfer-T., kleiner Waſſerpfeffer). Bltr. quirlſt.; Bl. faſt ſitz.; Blkr. 8männig, 4blättr., grünlichweiß; Same faſt grade; ☉ bis 2; 7 bis 8.
—. X., 3; Nelkenblütler: Stellarĭa glauca With.; ſ. Nr. 1054.
—. „ „ St. longifolĭa Fr.; ſ. Nr. 2216.
—. „ „ St. uliginōsa Murr.; ſ. Nr. 489.
—. „ „ St. crassifolĭa Ehrh.; ſ. Nr. 1900.
—. X., 4; „ Sagīna apetăla L.; ſ. Nr. 604.
—. X., 5; „ Cerastĭum vulgātum L. spec.; ſ. Nr. 463.
—. XI., 1; Weiderichpfl.: Lythrum virgātum L.; ſ. Nr. 1932.

—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Thalictrum angustifolium Jacq.; ſ. Nr. 1217.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Ranunculus flammula L.; ſ. Nr. 1903.
2888. XIV., 2; Lippenblümler: Mentha aquatica L. Waſſer-Minze (Kröten- oder Fiſch-M., Waſſer-, Kröten- oder Roßbalſam, Brunnheilige, Waſſerpolei). Bltr. geſtielt, eif., ſpitz, ſägezähn.; Wirtel kopfig (kug.); Kröhre ſchwach-glock., Zähne aus breiter Baſis langzugeſp., gefurcht, grade vorgeſtreckt; Bl. blaßpurpurn oder lila, außen behart; Pfl. angenehm riechend; 4; 7 bis 8.
Varirt: M. hirsūta L. (M. dubia Vill.; rauhharig, Bltr. faſt ſitz.), M. citrāta (M. odorāta Sole, M. adopersa Mnch.; faſt völlig kahl), M. satīva L. (behart oder faſt kahl; Bl. in blattachſelſt., entfernten Quirlen).
—. XIV., 1; Lippenblümler: M. arvēnsis L.; ſ. Nr. 2213.
—. „ „ Scutellaria galericulāta L.; ſ. Nr. 2122.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Stachys sylvatica L.; ſ. Nr. 1026.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Pediculāris palūstris L.; ſ. Nr. 919.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Nasturtium palūstre DC.; ſ. Nr. 1933.
—. XV., 2; Kreuzblütler: N. sylvēstre R. Br.; ſ. Nr. 1487.
—. „ „ Barbaraea vulgāris R. Br.; ſ. Nr. 550.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Cardamine parviflōra L.; ſ. Nr. 1934.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Sisymbrium strictissimum L.; ſ. Nr. 1246.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranium palūstre L.; ſ. Nr. 1057.
—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperīcum elōdes L.; ſ. Nr. 2859.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracium auricula L.; ſ. Nr. 1334.
—. „ „ Carduus cripsus L.; ſ. Nr. 2099.
—. XIX., 2; „ Cineraria palūstris L.; ſ. Nr. 2860.
—. „ „ *Cotula coronopifolia L.; ſ. Nr. 2294.
—. „ „ Pallēnis spinōsa Cass.; ſ. Nr. 1935.
—. „ „ Pulicaria dysenterica Gaertn.; ſ. Nr. 2821.
—. XX., 1; Orchidee: Listēra ovāta R. Br.; ſ. Nr. 1061.
—. „ „ Lipāris löselii Rich.; ſ. Nr. 1920.
—. XXI., 1; Waſſerſternpfl.: Callitriche verna L.; ſ. Nr. 948.

—. XXI., 1; Giftmilcher: Euphorbĭa palūstris L.; ſ. Nr. 949.
—. „ Aronpfl.: Calla palūstris L.; ſ. Nr. 1146.
—. XXI., 3; Rohrkolbenpfl.: Typha latifolĭa L.; ſ. Nr. 1936.
—. „ „ T. angustifolĭa L.; ſ. Nr. 1937.
—. „ „ Sparganĭum simplex Sm.; ſ. Nr. 1938.
—. XXI., 3; Halbgras: Carex paradōxa Willd.; ſ. Nr. 928.
—. „ „ C. cyperoīdes L.; ſ. Nr. 1517.
—. „ „ C. heleonāstes Ehrh.; ſ. Nr. 700.
—. „ „ C. pseudo-cypērus L.; ſ. Nr. 1939.
2889. XXI., 4; Wegerichpfl.: Littorēlla lacūstris L. (L. uniflōra Aschrsn.). Teich-Strandling (Strändling). Ausläufertreibend; Bltr. ſchmal-lineal., halb-walzenf., grasartig; ♂ langgeſtielt, einzeln, ♀ am Grunde der ♂, meiſt 2 bis 4, weißl.; 4; 7 bis 8.
—. XXI., 5; Tannenwedelpfl.: Myrĭophўllum spicātum L.; ſ. Nr. 1940.

a. An feuchten, ſchattigen Stellen:

—. V., 1; Schlüſſelblümler: Lysimachĭa nummularĭa L.; ſ. Nr. 1008.
—. V., 1; Vorretſchpfl.: Myosōtis sparsiflōra Mik.; ſ. Nr. 953.
—. V., 2; Meldenpfl.: Chenopodĭum polyspērmum L.; ſ. Nr. 2233.
—. V., 2; Doldenpfl.: Aegopodĭum podagrarĭa L.; ſ. Nr. 1012.
—. V., 2; Doldenpfl.: Laserpitĭum pruthenĭcum L.; ſ. Nr. 2059.
—. V., 5; Leinpfl.: Linum cathartĭcum L.; ſ. Nr. 1854.
—. X., 5; Nelkenblütler: Malachĭum aquātĭcum Fr.; ſ. Nr. 1241.
2890. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Ranuncŭlus repens L. Kriechender Hahnenfuß. Ausläufertreibend; untere Bltr. 3zäl. oder dopp.-3zäl.; Bl. gelb; Fr. fein-eingeſtochen-punkt.; 4; 6 bis 8; †.
Varirt: R. pinnātus Kitt. hb. (Bltr. ſehr ſchmal-zerſchnitten, gleichſam 2ſpalt.-gefied.).
—. XIV., 1; Lippenblümler: Lamĭum maculātum L.; ſ. Nr. 190.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Sisymbrĭum strictissĭmum L.; ſ. Nr. 1246.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum sylvatĭcum Lmk.; ſ. Nr. 1038.

—. XX., 1; Orchidee: Listēra ovāta R. Br.; s. Nr. 1061.
—. XXI., 1; Giftmilcher: Euphorbĭa stricta Sm.; s. Nr. 1041.
—. XXI., 3; Halbgras: Carex laevigāta Sm.; s. Nr. 1913.
—. XXI., 5; Meldenpfl.: Atrĭplex angustifolĭum Sm.; s. Nr. 2159.
—. XXI., 5; Amarantblütige: Amarāntus blitum L.; s. Nr. 2247.

b. An feuchten, quelligen Orten:

2891. II., 1; Lippenblümler: Lycŏpus europaeus L. Gemeiner Wolfstrapp (Wolfsfuß, -bein, Zigeuner- oder Chinakraut, Sparfaden, Christuslanze, Waſſerandorn, -alant). Blr. eif.-längl., an der Baſis fiederſpalt.; Mittellapp. der Unterl. faſt quadratiſch, Seitenränder grade-vorgeſtreckt; unfruchtb. Stbf. fehlend; Bl. weiß, zuweilen rot-punkt.; Fr. 4kant.-keilf.; 4; 7 bis 9.*)
2892. II., 1; Lippenblümler: L. exaltātus L. fil. Hoher W. Untere Blr. im Umriſſe breit-eif., alle bis auf den Mittelnerv fiederſpalt.; unfruchtb. Stbf. vorhanden; Lappen der Unterl. eif.; Bl. blaß-lila; 4; 7 bis 9.
—. V., 3 oder 5; Sonnenthaupfl.: Drosĕra rotundifolĭa L.; s. Nr. 2855.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Arăbis hallēri L.; s. Nr. 783.

c. An Sumpfrändern:

—. II., 1; Lippenblümler: Lycŏpus exaltātus L. fil.; s. Nr. 2892.
—. X., 3; Nelkenblütler: Stellarĭa uliginōsa Murr.; s. Nr. 489.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Arăbis glastifolĭa Rchb.; s. Nr. 1942.
—. XIX., 2; Korbblütler: Achillēa ptarmĭca L.; s. Nr. 2927.

d. In ſchlammigen Sümpfen:

—. XXII., 10; Nixpfl.: Stratiōtes aloĭdes L.; s. Nr. 1943.

e. In ausgetrockneten Sümpfen:

—. VI., 1; Semede: Juncus tenageia Ehrh.; s. Nr. 1514.
—. VI., 3; Löffelpfl.: Alĭsma natans L.; s. Nr. 1944.

f. Auf ſalzigen Sümpfen:

—. V., 1; Schlüſſelblümler: Samŏlus valerāndi L.; s. Nr. 2863.
2893. XXI., 5; Meldenpfl.: Atrĭplex littorale L. Ufermelde.

*) Zigeuner ſollen mit dieſer Pflanze geſtohlene Kinder ſchwarzbraun färben!

Bltr. fleiſch., graugrün, lineal.-lanzettl., ſcharf-gezähnt oder ganzrand.; Aehren ſteif; Blütenhülle zur Fruchtzeit rauten-eif., gezähnt; K. beſtäubt; ☉; 7 bis 9.*)

I¹. An ſchattigen Orten: §. 511.

Vergl. §. 510, a.

K¹. An Quellen und quelligen Orten: §. 512.

—. III., 1; Fettkrautpfl.: Montĭa fontāna L.; ſ. Nr. 683.
—. III., 2; Graspfl.: Catabrōsa aquatĭca P. B.; ſ. Nr. 1882.
—. IV., 1; Krapppfl.: Galĭum palūstre L.; ſ. Nr. 2852.
—. V., 1; Schlüſſelblümler: Lysimachĭa nummularĭa L.; ſ. Nr. 1008.
—. V., 1; Schlüſſelblümler: L. nemŏrum L.; ſ. Nr. 1048.
—. „ Vorretſchpfl.: Myosōtis palūstris With.; ſ. Nr. 1891.
—. V., 2; Doldenpfl.: Sium latifolĭum L.; ſ. Nr. 2838.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygŏnum persicarĭa L.; ſ. Nr. 2182.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: P. hydropīper L.; ſ. Nr. 2117.
—. „ Nachtkerzenpfl.: Epilobĭum virgātum Fr.; ſ. Nr. 2121.
—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: E. tetragōnum L.; ſ. Nr. 2215.
—. X., 3; Nelkenblütler: Stellarĭa nemŏrum L.; ſ. Nr. 387.
—. „ „ St. glauca With.; ſ. Nr. 1054.
—. XII., 2; Roſenpfl.: Spiraea arūncus L.; ſ. Nr. 1151.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Mentha arvēnsis L.; ſ. Nr. 2213.
—. „ „ Scutellarĭa galericulāta L.; ſ. Nr. 2122.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Nasturtĭum officināle R. Br.; ſ. Nr. 954.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum palūstre L.; ſ. Nr. 1057.
—. XXI., 4; Wegerichpfl.: Littorēlla lacūstris L.; ſ. Nr. 2889.

a. An ſickernden Quellen:

—. V., 3 oder 5; Sonnenthaupfl.: Drosĕra rotundifolĭa L.; ſ. Nr. 2855.

b. An feuchten, quelligen Orten:

Vergl. §. 510, b.

*) A. marinum Deth. iſt eine kleinere Form mit breiten, buchtig-gezähnten Blättern!

§. 513. **L¹. Auf Moraſt- und Morboden:**

—. II., 1; Waſſerſchlauchpfl.: Utricularĭa neglēcta Lehm.; ſ. Nr. 2871.
—. III., 1; Halbgras: Schoenus comprēssus L.; ſ. Nr. 1945.
—. „ „ Sch. marīscus L.; ſ. Nr. 2874.
2894. „ „ Sch. albus L. (Rhynchospŏra alba Vahl). Weißes Kopfgras (Morſimſe, Schnabelriet). Wrz. faſerig; Halm beblätt.; Aehrchen weiß, faſt ebenſträußig-geknäuelt; Büſchel etwa ſo lang, als die Hülle; 4; 7 bis 8.
—. III., 1; Halbgras: Eriophŏrum capitātum Host; ſ. Nr. 872.
—. V., 1; Schlüſſelblümler: Anagāllis tenēlla L.; ſ. Nr. 1946.
—. VI., 1; Semede: Narthecĭum ossifrăgum Huds.; ſ. Nr. 1947.
—. VI., 3; Löffelpfl.: Alīsma ranunculoīdes L.; ſ. Nr. 1931.
—. „ Knöterichpfl.: Rumex palūstris Sm.; ſ. Nr. 2841.
—. X., 2; Steinbrechpfl.: Saxifrăga hircŭlus L.; ſ. Nr. 2858.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Pediculāris sceptrum carolīnum L.; ſ. Nr. 1056.
—. XIX., 1; Korbblütler: Scorzonēra humĭlis L.; ſ. Nr. 479.
—. XXI., 1; Giftmilcher: Euphorbĭa palūstris L.; ſ. Nr. 949.
—. XXI., 3; Rohrkolbenpfl.: Typha angustifolĭa L.; ſ. Nr. 1937.
—. XXI., 3; Halbgras: Carex paradōxa Willd.; ſ. Nr. 928.
—. XXII., 2; Weide: Salix myrtilloīdes L.; ſ. Nr. 881.

a. Auf Torfmoren:

—. II., 1; Waſſerſchlauchpfl.: Utricularĭa neglēcta Lehm.; ſ. Nr. 2871.
—. V., 1; Schlüſſelblümler: Anagāllis tenēlla L.; ſ. Nr. 1946.
—. V., 3 oder 5; Sonnenthaupfl.: Drosĕra longifolĭa L.; ſ. Nr. 2856.
—. V., 3 oder 5; Sonnenthaupfl.: Dr. intermedĭa Hayne; ſ. Nr. 1918.
—. VI., 1; Semede: Narthecĭum ossifrăgum Huds.; ſ. Nr. 1947.
—. VI., 5; Löffelpfl.: Alīsma ranunculoīdes L.; ſ. Nr. 1931.
—. X., 1; Heidepfl.: Ledum palūstre L.; ſ. Nr. 959.
—. X., 3; Nelkenblütler: Alsīne stricta Whlbg.; ſ. Nr. 1703.
—. XX., 1; Orchidee: Malāxis monophyllos Sw.; ſ. Nr. 1142.
—. XXII., 2; Weide: Salix myrtilloīdes L.; ſ. Nr. 881.

b. Auf Moorerde:

—. IV., 1; Aralienpfl.: Cornus suecica L.; ſ. Nr. 1007.

c. Auf Morwieſen:

Vergl. §. 509, f.

M¹. Auf Torfboden: §. 514.

—. III., 1; Halbgras: Schoenus ferruginĕus L.; ſ. Nr. 914.
—. „ „ Sch. fuscus L.; ſ. Nr. 958.
—. „ „ Scirpus multicaulis Sm.; ſ. Nr. 1948.
—. „ „ Sc. baeothrÿon Ehrh.; ſ. Nr. 1877.
—. V., 1; Borretſchpfl.: Myosōtis caespitōsa Schultz; ſ. Nr. 1926.
—. VI., 1; Semede: Juncus alpīnus Vill.; ſ. Nr. 1831.
—. „ „ J. uliginōsus Roth; ſ. Nr. 1050.
—. „ „ J. squarrōsus L.; ſ. Nr. 1141.
—. „ „ Narthecĭum ossifrăgum Huds.; ſ. Nr. 1947.
—. VI., 5; Löffelpfl.: Alīsma ranunculoīdes L.; ſ. Nr. 1931.
—. VIII., 1; Enzianpfl.: Chlora perfoliāta L.; ſ. Nr. 894.
2895. „ „ Ch. serotīna Koch. Spätblühender Bitterling. Stbltr. ei- oder eilanzettf., an der abgerund. Baſis verwachſen; Kelchzipf. lanzett-pfrieml., etwa von Blkrlänge; Krbltr. zieml. ſpitz, gelb; ☉; 7 bis 10.*)
—. XIV., 2; Rachenblümler: Pediculāris sceptrum carolīnum L.; ſ. Nr. 1056.
—. XIX., 1; Korbblütler: Scorzonēra humĭlis L.; ſ. Nr. 479.
—. XIX., 2; „ Cinerarĭa palūstris L.; ſ. Nr. 2860.
2896. XX., 1; Orchidee: Malāxis paludōsa Sw. Sumpf-Weichkraut (Weißſtändel). St. 5ſeit., unterwärts 3- bis 4blättr.; Lippe vertieft, zugeſp.; Bl. grünl.; 4; 7 bis 8.
—. XXI., 3; Halbgras: Carex heleonāstes Ehrh.; ſ. Nr. 700.

a. Auf Torfmoren:

Vergl. §. 513, a.

b. Auf Torfmoren in Gebirgen:

—. V., 1; Schlüſſelblümler: Soldanella montāna Willd.; ſ. Nr. 496.

c. Auf Torfwieſen:

Vergl. §. 509, e.

*) Iſt wol nur Abart von Chlora perfoliata L.!

d. Auf Salz-Torfboden:

—. VI., 1; Junkaginee: Triglochin maritimum L.; ſ. Nr. 1949.

e. Auf Torfmos (Sphagnum):

—. V., 3 oder 5; Sonnenthaupfl.: Drosĕra rotundifolĭa L.; ſ. Nr. 2855.

f. In Torfgruben:

2897. IV., 1; Nachtkerzenpfl.: Isnardĭa palūstris L. (Dantĭa pal. Karsch). Sumpf-Isnardie. St. an der Baſis wurzelnd; Bltr. gegenſt., eif., ſpitz; K. rot-linirt; Bl. einzeln, blattachſelſt., ſitz., grün; 4; 7 bis 8.

—. XXI., 5; Tannenwedelpfl.: Myrĭophўllum alterniflōrum DC.; ſ. Nr. 1546.

g. In Torfbrüchen:

—. V., 1; Paronychienpfl.: Illecĕbrum verticillātum L.; ſ. Nr. 1483.

§. 515. **N¹. Auf Schlamm:**

—. III., 1; Halbgras: Scirpus aciculāris L.; ſ. Nr. 1950.
—. " " Sc. radĭcans Schkhr.; ſ. Nr. 2834.
—. V., 1; Vorretſchpfl.: Myosōtis caespitōsa Schultz; ſ. Nr. 1926.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygŏnum persicarĭa L.; ſ. Nr. 2182.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: P. hydropīper L.; ſ. Nr. 2117.
2898. XIV., 2; Rachenblümler: Limosĕlla aquatĭca L. Gemeiner Schlammling (Sumpfkraut, -glöckchen). Wrz. mit fadenf. Ausläufern; Bltr. grundſt., ſpatel.-lineal., langgeſtielt; Schaft 1blüt.; Bl. klein, weißlich-fleiſchfarben; ☉; 7 bis 9.

a. Auf ſandigem Schlammboden:

—. XXI., 4; Wegerichpfl.: Littorĕlla lacūstris L.; ſ. Nr. 2889.

§. 516. **O¹. Auf überſchwemmten Stellen:**

2899. II., 1; Waſſerſchlauchpfl.: Utricularĭa minor L. Kleiner Waſſerſchlauch (Waſſerhelm, Waſſerfenchel). Bltr. gabelig-vielſpalt.; Unterl. eif., ſeitl.-zurückgerollt; Bl. blaßgelb; Kronoberl. ausgerand., von Gaumenlänge; 4; 7 bis 8.
—. III., 1; Halbgras: Scirpus aciculāris L.; ſ. Nr. 1950.
2900. IV., 4; Dickblattpfl.: Bulliardĭa aquatĭca DC. (B. prostrāta Koch, Tillaea aquat. L., T. prostr. Schkr.).

Wasser-Bulliarde. St. niederlig., wurzelnd, im Wasser aufr.; Bltr. lineal.; Bl. fast sitz., weiß, oft rötl.; ☉; 7 bis 8; Osnabr., Wittenb., Bö.

—. V., 3; Paronychienpfl.: Corrigiŏla littorālis L.; s. Nr. 1348.

—. VI., 1; Semede: Juncus tenageia Ehrh.; s. Nr. 1514.

—. VI., 3; Junkaginee: Triglochin palūstre L.; s. Nr. 2840.

—. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygŏnum amphibĭum L.; s. Nr. 2843.

—. VIII., 1; Knöterichpfl.: P. persicarĭa L.; s. Nr. 2182.

—. " " P. hydropīper L.; s. Nr. 2117.

—. VIII., 4; Tännelpfl.: Elatīne hydropīper L.; s. Nr. 1952.

2901. " " E. triāndra Schkr. Dreimänniger Tännel. Bltr. gegenst., lineal-längl., spatelf.; Bl. wechselst. in den Blattachseln sitz., 3männig, rötl. oder weiß; K. 2spalt.; Krbltr. 3; Samen leicht gekrümmt; ☉; 7 bis 8.

—. XI., 1; Weiderichpfl.: Lythrum hyssopifolĭa L.; s. Nr. 2394.

—. XII., 3; Rosenpfl.: Potentilla supīna L.; s. Nr. 1369.

2902. XIV., 2; Rachenblümler: Lindernĭa pyxidarĭa All. (Capraria gratioloides L.). Europäische Lindernie (Büchsenkraut). St. 4kant., fadenf., ligend oder schief-aufr.; Bltr. gegenst., längl.-eif, ganzrand.; Bl. blattachselst., einzeln, lila-rosenfarben, Unterl. hellgelb; ☉; 7 bis 8; Schl., Süddeutschl. u. s. w.

—. XV., 2; Kreuzblütler: Nasturtĭum palūstre DC.; s. Nr. 1933.

—. XXI., 4; Wegerichpfl.: Littorēlla lacūstris L.; s. Nr. 2889.

a. Auf überschwemmten Stellen in Wäldern:

—. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygŏnum minus Huds.; s. Nr. 2118.

P[1]. An und in Gräben, Bächen, Flüssen u. s. w.: §. 517.

2903. I., 1; Tannenwedelpfl.: Hippūris vulgāris L. Gemeiner Tannenwedel (Katzenwedel, -zagel, -hall, -helm, -steert, Roßschweif, Wasser-, Pferde- oder Katzenschwanz, Wassertännel). St. aufr., blütentrag. Theil außerhalb des Wassers; Bltr. lineal, wirtelig; Bl. blattachselst., sitz., sehr klein, grün; ♃; 7 bis 8.

Varirt: H. lacūstris Kunth (St. aufr., einfach, im Wasser), H. fluĭtans Kitt. (St. schwimmend, einfach oder an der Basis ästig; in Bächen und Flüssen), H. tetraphylla L. (Bltr. lanzettl., zu 4 bis 6 wirtelig; am ruhigen Meeresufer).

—. II., 1; Wasserschlauchpfl.: Utricularĭa vulgāris L.; s. Nr. 1953.

—. II., 1; Waſſerſchlauchpfl.: U. minor L.; ſ. Nr. 2899.
—. „ „ U. intermedĭa Hayne; ſ. Nr. 1951.
—. „ Rachenblümler: Veronĭca longifolĭa L. und zwar die Abart V. medĭa Schrad.; ſ. unter Nr. 2212.
—. II., 1; Rachenblümler: V. beccabūnga L.; ſ. Nr. 1954.
—. „ „ V. anagāllis L.; ſ. Nr. 1955.
—. „ „ V. scutellāta L.; ſ. Nr. 1875.
—. „ „ Gratĭŏla officinalis L.; ſ. Nr. 2817.
—. „ Lippenblümler: Lycŏpus europaeus L.; ſ. Nr. 2891.
—. „ „ L. exaltātus L. fil.; ſ. Nr. 2892.
—. III., 1; Halbgras: Cypērus flavēscens L.; ſ. Nr. 1143.
2904. „ „ C. longus L. Langes Zipergras. Halm 3kant., beblätt., oben ſcharf; Hülle 3- bis 6blätt., Bltchn. gekielt, länger als die zſgeſetzte, vieläſtige Spirre; Spirrenäſte am Gipfel doldig-verzweigt; Same ſchwarz; 4; 7 bis 8; Oe., Ty., Bodenſee.
—. III., 1; Halbgras: Scirpus palūstris L.; ſ. Nr. 1876.
—. „ „ Sc. aciculāris L.; ſ. Nr. 1950.
—. „ „ Sc. fluĭtans L.; ſ. Nr. 1956.
—. „ „ Sc. holoschoenus L.; ſ. Nr. 2833.
—. „ „ Sc. lacūstris L.; ſ. Nr. 944.
—. „ „ Sc. tabernaemontāni Gmel.; ſ. Nr. 1957.
—. „ „ Sc. trigōnus Roth; ſ. Nr. 1958.
—. „ „ Sc. sylvatĭcus L.; ſ. Nr. 367.
—. „ „ Sc. radĭcans Schkhr.; ſ. Nr. 2834.
2905. „ „ Sc. triquēter d. Aut.*) (Sc. pollichĭi Godr. et Gren., Sc. mucronātus Poll.). Dreikantige Binſe. Halm 3kant., mit etwas ausgehöhlten Flächen; Blütenbüſchel geſtielt oder ſitz.; Narben 2; ſonſt wie Nr. 944; Blütenſch. glatt oder punkt.; 4; 7 bis 8.
2906. III., 1; Halbgras: Sc. pungens Vahl (Sc. rothĭi Hoppe). Stechende B. Halm 3kant.; Spirre geknäult; Aehrchen ſämmtl. ſitz.; Narben 2; Nuß glatt, auf dem Rücken gewölbt; Bltr. 1 bis 2, gekielt, 3kant.-rinnig; Spirre zſgezog.; 4; 7 bis 8; Oſtſee (Swinemünde, Heringsdorf), Nordſee.
2907. III., 1; Halbgras: Sc. mucronātus L. Steifgeſpitzte B. Halm 3kant.; das größere Hüllblatt aufr., zuletzt wagr.-zurückgeſchl.; Narben 3; Nuß 3ſeit., querrunz.; Bälge ſtumpf, ſtachelſp.; 4; 7 bis 8.
2908. III., 1; Halbgras: Sc. michelianus L. (Isolĕpis micheliāna R. et Sch.). Micheliſche B. Halm 3kant., be-

*) Nicht Linné, deſſen Scirpus triqueter der Mittelmeerflora angehört!

blätt.; Köpfchen endſt., rundl., lappig; Bälge lanzettl.; Fr. fein-punkt., bräunlich-ſtrohgelb; ⊙; 7 bis 9; Wittenberg, Schl., Bö., Oe.

2909. III., 1; Halbgras: Sc. maritĭmus L. Meerſtrands-B. (Meerbinſe). Halm 3kant., beblätt.; Bälge ſtachelſp., 2ſpalt.; Narben 3; Spirre endſt., zſgeſetzt, von ſeitl., flachen Hüllblträn. umgeben; 4; 7 bis 8.

Varirt: Sc. digȳnus Godr. (Narben 2).

—. III., 1; Baldrianpfl.: Valeriāna officinālis L.; ſ. Nr. 998.

—. III., 2; Graspfl.: Baldingēra arundinacĕa L.; ſ. Nr. 1959.

—. „ „ Echinochlŏa crus-galli L.; ſ. Nr. 2329.

—. „ „ Alopecūrus fulvus Sm.; ſ. Nr. 1922.

—. „ „ A. geniculātus L.; ſ. Nr. 1880.

2910. „ „ Coleānthus subtīlis Seid. (Schmidtĭa utriculōsa Sternb.). Feinblütiges Scheidengras (Scheidenblütgras). Halm fadenf., von aufgeblaſ. Scheiden umgeben; Bltr. lineal., rinnig; Blatthäutchen ganz, verläng., ſpitz; ⊙; 7 bis 9; Bö. (Schlackenwald, Woſſeck).

—. III., 2; Graspfl.: Agrōstis stoloniferа L.; ſ. Nr. 2154.

—. „ „ Calamagrōstis epigaeos Roth; ſ. Nr. 2170.

—. III., 2; Graspfl.: C. lanceolāta Roth; ſ. Nr. 2835.

2911. „ „ C. littorĕa DC. (Arūndo pseudo-phragmītes Hall. fil., A. litt. Schrad.). Uferrohr. Bltr. ſchmal-lineal., rinnig, oberſ. ſcharf; Riſpe ſchlaff, gelappt; Granne ſo lang oder länger als die Hälfte ihrer Spelze, aus der kurzen Spalte hervortret.; 4; 7 bis 8.

Varirt: C. laxa Host (äußeres Blütenſcheidchen gezähnt).

—. III., 2; Graspfl.: Phleum arenarĭum L.; ſ. Nr. 1511.

—. „ „ Catabrōsa aquatĭca P. B.; ſ. Nr. 1882.

—. „ „ Aira caespitōsa L.; ſ. Nr. 1237.

2912. „ „ Phragmītes commūnis Trin. (Arūndo phragm. L., Phr. vulnĕrans Aschrsn.). Gemeines Schilf (Rohr, Schilf- oder Teichrohr, Pfeifenrohr, Waſſerfedergras). Bltr. lanzettl., langzugeſp.; Riſpe ausgebreit.; Aehrchen 4- bis 5blüt.; 4; 7 bis 8; ⚓.

—. III., 2; Graspfl.: Bromus inērmis L.; ſ. Nr. 1277.

—. „ „ Festūca arundinacĕa Schreb.; ſ. Nr. 1884.

2913. III., 2; Graspfl.: F. borealis M. et K. (Scolochlŏa festucacĕa Lk., Arūndo festuc. Willd., Donax bor. Trin., Graphephŏrum festucacĕum A. Gray, Fluminĭa arundinacĕa Fr.). Nördlicher Schwingel (Schwingelſchilf). Wrzſtock kriech.; Bltr. breit-lineal., rauhrand., an

der Basis mit einem braunen Fleck; untere Spelze 5nervig, an der Basis harbüschelig; 4; 7 bis 8.

—. III., 2; Graspfl.: Poa serotĭna Ehrh.; s. Nr. 1885.
—. „ „ Glyceria fluĭtans Scop.; s. Nr. 1960.
2914. „ „ Gl. aquatĭca Whlbg. (Poa aquat. L., Gl. spectabĭlis M. et K., Gl. altissĭma Mnch., Poa altiss. Mnch.). Größtes Mannagras (Wasserrispen-, Enten- oder Süßgras). Rispe gleichmäßig-ausgebreit., weitschweifig, sehr ästig; Bl. 7nervig; Wrz. kriech.; Blattsch. etwas zsgedr.; Aehrchen grünlichrot und weißgescheckt, glänz.; 4; 7 bis 8.

—. III., 2; Graspfl.: Koeleria glauca DC.; s. Nr. 689.
—. „ „ Brachypodĭum loliacĕum R. et Sch.; s. Nr. 1887.

—. III., 2; Graspfl.: Tritĭcum canīnum L.; s. Nr. 1047.
—. „ „ T. glaucum Desf.; s. Nr. 1961.
—. „ „ T. littorāle Host; s. Nr. 1962.
2915. „ „ T. rigĭdum Schrad. Starre Quecke. Aehrchen 5- bis 10blüt., untere entfernter und von der Spindel absteh., obere sich deckend, angedr.; Blütensch. 7nervig, stumpf; Spindel scharf; Pfl. blaugrün, steif; 4; 6 bis 7.

2916. III., 2; Graspfl.: Elўmus arenarĭus L. Sand-Hargras (Strandhafer). Bltr. zuletzt zsgerollt-starr; Aehre aufr., gedrungen; Aehrchen meist 3blüt., weichharig, in der Mitte der Aehre zu 3, so lang oder länger als die auf dem Kiele gewimp. Klappen; 4; 7 bis 9.

—. III., 2; Graspfl.: Lolĭum multiflōrum Lam.; s. Nr. 1923.
—. IV., 1; Najadenpfl.: Potamogēton natans L.; s. Nr. 1963.
—. „ „ P. rufēscens Schrad.; s. Nr. 1964.
—. „ „ P. heterophўllus Schreb.; s. Nr. 1965.
—. „ „ P. lucens L.; s. Nr. 1966.
—. „ „ P. praelōngus Wulff.; s. Nr. 2769.
—. „ „ P. perfoliātus L.; s. Nr. 1967.
—. „ „ P. crispus L.; s. Nr. 1968.
—. „ „ P. obtusifolĭus Koch; s. Nr. 1969.
—. „ „ P. pectinātus L.; s. Nr. 1970.
2917. „ „ P. comprēssus L. (P. complanatus Willd., P. zosterifolĭus Schumch.). Flachsstengeliges Laichkraut. St. geflüg.-plattgedr., ästig; Bltr. stumpf, kurz-stachelsp., vielnervig, mit 3 bis 5 stärkeren Nerven; Aehren 6- bis 15blüt.; 4; 7 bis 9.

2918. IV., 1; Najadenpfl.: P. pusīllus L. Kleines L. Bltr. zieml. spitz, kurz-stachelsp., 3- bis 5nervig; Blütenst. 2- bis

3mal länger als die 4- bis 8blüt., oft unterbroch. Aehre; Fr. schief-ellipt.; Nebenbltr. röhrig, umfass.; 4; 7 bis 8.

—. IV., 1; Kardenpfl.: Dipsăcus sylvēstris Mill.; s. Nr. 2172.
—. „ „ D. laciniātus L.; s. Nr. 2264.
—. „ „ D. fullōnum L.; s. Nr. 2263.
—. „ „ D. pilōsus L.; s. Nr. 2079.
—. „ „ Scabiōsa austrālis Wulff.; s. Nr. 2836.
—. „ Krapppfl.: Galĭum palūstre L.; s. Nr. 2852.
—. „ Nachtkerzenpfl.: Isnardĭa palūstris L.; s. Nr. 2897.
—. V., 1; Schlüsselblümler: Lysimachĭa thyrsiflōra L.; s. Nr. 1145.
—. V., 1; Schlüsselblümler: L. vulgāris L.; s. Nr. 1862.
—. „ „ L. nummulariă L.; s. Nr. 1008.
—. „ Rachenblümler: Verbăscum adulterīnum Koch; s. Nr. 2825.
—. V., 1; Nachtschattenpfl.: Solānum dulcamāra L.; s. Nr. 1197.
—. V., 1; Borretschpfl.: Symphўtum officināle L.; s. Nr. 548.
—. V., 1; Borretschpfl.: Anchūsa angustifolĭa Lehm.; s. Nr. 960.
—. V., 1; Borretschpfl.: Myosōtis palūstris With.; s. Nr. 1891.
—. „ „ M. caespitōsa Schultz; s. Nr. 1926.
—. „ Enzianpfl.: Lymnanthĕmum nymphaeoīdes Lk.; s. Nr. 1927.
—. V., 2; Meldenpfl.: Chenopodĭum album L.; s. Nr. 2231.
—. „ „ Ch. polyspērmum L.; s. Nr. 2233.
2919. „ „ Salsŏla kali L. Gemeines Salzkraut (Kali- oder Skorpionskraut). St. ausgebreit.-ästig; Bltr. pfrieml., dornspitz.; Bl. blattachselst., einzeln; Kelchanhänge ausgebreit.; ☉; 7 bis 10.
—. V., 2; Doldenpfl.: Eryngĭum planum L.; s. Nr. 1865.
—. „ „ Cicūta virōsa L.; s. Nr. 1892.
—. „ „ Apĭum graveŏlens L.; s. Nr. 1928.
2920. „ „ Helosciadĭum nodiflōrum Koch (Sium nodifl. L.). Knotenblütiger Scheiberich. St. an der Basis ligend, wurzelnd; Bltr. gefied., Fiedern elanzettl., gleichf.-stumpfl.-gesägt; Dolden den Bltrn. gegenst., mehrstralig; Bl. grünlichweiß; 4; 7 bis 8; †; Rh.
—. V., 2; Doldenpfl.: Aegopodĭum podagrariă L.; s. Nr. 1012.
—. „ „ Sium latifolĭum L.; s. Nr. 2838.
—. „ „ S. angustifolĭum L.; s. Nr. 2839.
—. „ „ Oenānthe phellandrĭum Lmk.; s. Nr. 2881.

—. V., 2; Doldenpfl.: Oe. fistulōsa L.; ſ. Nr. 1893.
2921. „ „ Cenolophĭum fischēri Koch. Fiſcher's Hohlrippe. Bltr. 3- bis 5fach-gefied., mit 3theil. End-zipf., Seitenzipf. ganzrand. oder 2theil.; Hülle meiſt 1-blättr., ſelten fehlend; Hüllchen vielblättr., mit lineal.-borſt. Bltchn.; Bl. weiß; 4; 7 bis 8; Pr.
—. V., 2; Doldenpfl.: Peucedănum palūstre Mnch.; ſ. Nr. 2160.
—. V., 2; Doldenpfl.: Chaerophўllum bulbōsum L.; ſ. Nr. 1106.
—. VI., 1; Aronpfl.: *Acŏrus calămus L.; ſ. Nr. 1929.
—. VI., 1; Semede: Juncus commūnis E. Mey.; ſ. Nr. 1512.
—. „ „ J. obtusiflōrus Ehrh.; ſ. Nr. 1527.
—. „ „ J. alpīnus Vill.; ſ. Nr. 1831.
—. „ „ J. lamprocārpos Ehrh.; ſ. Nr. 1897.
—. „ „ J. atrātus Krock.; ſ. Nr. 2136.
—. „ „ J. acutiflōrus Ehrh.; ſ. Nr. 2116.
—. „ „ J. uliginōsus Roth; ſ. Nr. 1050.
—. „ „ J. comprēssus Jacq.; ſ. Nr. 1863.
—. „ Lilienpfl.: Allĭum schoenoprāsum L.; ſ. Nr. 1654.
—. „ Weiderichpfl.: Peplis portŭla L.; ſ. Nr. 2819.
—. VI., 3; Knöterichpfl.: Rumex maritĭmus L.; ſ. Nr. 1899.
—. „ „ R. palūstris Sm.; ſ. Nr. 2841.
—. „ „ R. pulcher L.; ſ. Nr. 1256.
—. „ „ R. obtusifolĭus L.; ſ. Nr. 2104.
—. „ „ R. conglomerātus Murr.; ſ. Nr. 1052.
—. „ „ R. patientĭa L.; ſ. Nr. 2273.
—. „ „ R. hydrolapăthum Huds.; ſ. Nr. 2884.
—. „ „ R. maxĭmus Schreb.; ſ. Nr. 2885.
—. „ „ R. aquatĭcus L.; ſ. Nr. 2842.
—. VI., 5; Löffelpfl.: Alĭsma natans L.; ſ. Nr. 1944.
—. „ „ A. plantāgo L.; ſ. Nr. 1972.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygŏnum amphibĭum L.; ſ. Nr. 2843.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: P. persicarĭa L.; ſ. Nr. 2182.
—. „ „ P. hydropīper L.; ſ. Nr. 2117.
—. „ Nachtkerzenpfl.: *Oenothēra biēnnis L.; ſ. Nr. 2256.
—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: Epilobĭum hirsūtum L.; ſ. Nr. 1053.
—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: E. parviflōrum Schreb.; ſ. Nr. 2119.
—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: E. palūstre L.; ſ. Nr. 2853.
—. „ „ E. virgātum Fr.; ſ. Nr. 2121.

—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: E. tetragōnum L.; ſ. Nr. 2215.
—. „ „ E. roseum Schr.; ſ. Nr. 2129.
—. VIII., 4; Tännelpfl.: Elatīne hexāndra DC.; ſ. Nr. 1973.
—. „ „ E. triāndra Schkhr.; ſ. Nr. 2901.
—. „ „ E. hydropīper L.; ſ. Nr. 1952.
—. IX., 3; Waſſerlieſchpfl.: Butōmus umbellātus L.; ſ. Nr. 1974.
—. X., 2; Nelkenpfl.: Gypsophila murālis L.; ſ. Nr. 2234.
—. X., 3; „ Melandrium sylvēstre Roehl.; ſ. Nr. 428.
—. X., 3; Nelkenpfl.: Stellaria nemōrum L.; ſ. Nr. 387.
—. „ „ St. glauca With.; ſ. Nr. 1054.
—. „ „ St. uliginōsa Murr.; ſ. Nr. 489.
—. X., 5; „ Lychnis flos cucŭli L.; ſ. Nr. 462.
—. „ „ Malachium aquatĭcum Fr.; ſ. Nr. 1241.
—. „ „ Cerastium vulgātum L. spec.; ſ. Nr. 463.
—. „ „ C. viscōsum L.; ſ. Nr. 684.
—. XI., 1; Weiderichpfl.: Lythrum salicaria L.; ſ. Nr. 1242.
—. „ „ L. virgātum L.; ſ. Nr. 1932.
—. „ „ L. hyssopifolĭa L.; ſ. Nr. 2394.
—. XII., 2; Roſenpfl.: Spiraea salicifolĭa L.; ſ. Nr. 1100.
—. „ „ Sp. arūncus L.; ſ. Nr. 1151.
—. „ „ Sp. ulmaria L.; ſ. Nr. 1055.
—. XII., 3; „ Geum urbānum L.; ſ. Nr. 1077.
—. „ „ Potentilla supīna L.; ſ. Nr. 1369.
—. „ „ P. anserīna L.; ſ. Nr. 578.
—. „ „ P. norvegĭca L.; ſ. Nr. 1516.
—. „ „ P. reptans L.; ſ. Nr. 1301.
—. „ „ P. mixta Nolte; ſ. Nr. 2276.
—. „ „ *Rosa lucĭda Ehrh.; ſ. Nr. 1975.
—. XIII., 1; Nimfenpfl.: Nymphaea alba L.; ſ. Nr. 1976.
—. „ „ Nuphar lutĕum Sm.; ſ. Nr. 1977.
—. XIII., 2; Gichtroſenpfl.: Cimicifūga foetĭda L.; ſ. Nr. 2062.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Clemātis recta L.; ſ. Nr. 1121.
—. „ „ Ranuncŭlus hederacĕus L.; ſ. Nr. 344.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: R. aquatĭlis L.; ſ. Nr. 1978.
—. „ „ R. flammŭla L.; ſ. Nr. 1903.
—. „ „ R. acris L.; ſ. Nr. 399.
—. „ „ R. scelerātus L.; ſ. Nr. 1904.
2922. „ „ R. lingŭa L. Großer Hahnenfuß (Zungen- oder großer Sumpf-H., Sperrkraut). St. ſteif-aufr.; Bltr. lang-lanzettl., zugeſp.; Bl. groß, gold-

gelb; Fr. glatt, mit breitem, kurz-sichelf.-gekrümmtem Schnabel; 4; 7 bis 8; ☥.

—. XIV., 1; Lippenblümler: Mentha sylvēstris L.; s. Nr. 2218.
—. „ „ M. rotundifolĭa L.; s. Nr. 2187.
—. „ „ M. aquatĭca L.; s. Nr. 2888.
—. „ „ M. arvēnsis L.; s. Nr. 2213.
—. „ „ M. pulegĭum L.; s. Nr. 2820.
2923. „ „ M. nepetoīdes Lej. (M. aquatĭca-sylvēstris G. Mey.). Dickährige Minze. Bltr. gestielt, eif., gesägt; Adern längl.-walzl.; obere Deckbltr. lineal.-pfriemf.; Kzähne lineal.-borstenf., zur Fruchtzeit grade-vorgestreckt; Bl. violet oder lila; 4; 7 bis 8.

2924. XIV., 1; Lippenblümler: M. piperĭta L. Pfeffer-M. (Wohlgemut, Hausminze). Bltr. gestielt, längl., lanzettl. oder eif.-lanzettl., an der Basis und Spitze ganzrand.; Aehren längl.-walzenf.; Zymen winkelständ., gestielt; Kröhre glock., über der Basis etwas eingeschnürt; Kzähne plötzl. pfriemf.-verläng.-zugesp.; Bl. blaßrot; 4; 7 bis 8; ☿; ☲.*)

Varirt: M. officinālis Auct. (kahl, nur auf den Blattadern weichharig; ☲), M. langĭi Steud. (rauhharig, Blütenst. mit ab-, K. mit aufw.-gericht. Haren), M. crispa L. (Krauseminze; Aehren dick; Bltr. eif., blasig-runzel., eingeschn.-gesägt; ☲).

—. XIV., 1; Lippenblümler: Scutellarĭa galericulāta L.; s. Nr. 2122.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Sc. hastifolĭa L.; s. Nr. 2123.
—. „ „ Sc. minor L.; s. Nr. 2844.
—. „ „ Galeōpsis bifĭda Boenningh; s. Nr. 2191.
—. XIV., 1; Lippenblümler: G. versicŏlor Curtis; s. Nr. 2124.
—. „ „ Stachys ambigŭa Sm.; s. Nr. 1238.
—. „ „ St. palūstris L.; s. Nr. 1905.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Limosēlla aquatĭca L.; s. Nr. 2898.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Linderнĭa pyxidarĭa All.; s. Nr. 2902.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Scrophularĭa nodōsa L.; s. Nr. 1069.
2925. XIV., 2; Rachenblümler: Scr. aquatĭca L. (Scr. balbisĭi

*) Die Pfefferminze wird häufig in England und Süddeutschland, am häufigsten aber in Nordamerika (Ohio, Michigan, Newyork) kultivirt; letzteres gewinnt jährlich 10,000 Pfund Pfefferminzöl im Werte von 25,000 Dollar!

Hornem., Scr. crenāta Maly). Waſſer-Braunwurz (falſche Waſſerbetonie, Antonskraut). Bltr. kahl, ſtumpfgekerbt; Anſatz des 5. Stbfds. rundl.-nierenf., kaum ausgerand.; Bl. purpurbraun; Wrz. ſpindelf.; St. hohl, geflüg.-4kant.; Kelchlapp. rundl.-eif.; 4; 7 bis 9.

Varirt: S. balbisĭi Hornem. (untere Stglbltr. und Blattſt. mit 2 Oehrchen; Schuppe unter der Oberl. rundl.-nierenf., kaum ausgerand.; Bl. an der Baſis grün), S. neesĭi Wirtg. (Schuppe unter der Oberl. querlängl., 3mal breiter als lang; Bl. hellerrot-geſäumt), S. ehrhārti Stev. (Schuppe verk.-herzf.; Bl. grün, rotbraun-geſäumt).

—. XV., 1; Kreuzblütler: Cochlearĭa armoracĭa L.; ſ. Nr. 1222.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Senebiēra coronŏpus Poir.; ſ. Nr. 2258.
—. XV., 1; Kreuzblütler: S. didўma Pers.; ſ. Nr. 2323.
—. „ „ *Bunĭas orientālis L.; ſ. Nr. 1268.
—. XV., 2; „ Nasturtĭum officināle R. Br.; ſ. Nr. 954.
—. XV., 2; Kreuzblütler: N. austriăcum Crtz.; ſ. Nr. 1906.
—. „ „ N. amphibĭum R. Br.; ſ. Nr. 1979.
—. „ „ N. pyrenaĭcum R. Br.; ſ. Nr. 905.
—. „ „ N. sylvēstre R. Br.; ſ. Nr. 1487.
—. „ „ Cardamĭne impatĭens L.; ſ. Nr. 421.
—. „ „ C. parviflōra L.; ſ. Nr. 1934.
—. „ „ Erysĭmum cheiranthoĭdes L.; ſ. Nr. 1484.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Sisymbrĭum sophĭa L.; ſ. Nr. 591.
—. „ „ S. strictissĭmum L.; ſ. Nr. 1246.
—. „ „ Melănosinăpis commūnis Sch. et Sp.; ſ. Nr. 2375.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Sinăpis arvēnsis L.; ſ. Nr. 1465.
—. XVI., 5; Pappelroſenpfl.: Althaea officinālis L.; ſ. Nr. 2214.
—. XVI., 5; Pappelroſenpfl.: Malva moschāta L.; ſ. Nr. 1563.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Onōnis hircīna Jacq.; ſ. Nr. 1322.
—. „ „ Melilōtus alba Lmk.; ſ. Nr. 2197.
—. „ „ Trifolĭum fragifĕrum L.; ſ. Nr. 1908.
—. „ „ Lotus corniculātus L.; ſ. Nr. 1239.
—. „ „ Tetragonolŏbus siliquōsus L.; ſ. Nr. 1347.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Galēga officinālis L.; ſ. Nr. 1349.
—. „ „ Vicĭa angustifolĭa Roth; ſ. Nr. 1230.
—. „ „ Lathўrus pratēnsis L.; ſ. Nr. 1240.

—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperĭcum quadrangŭlum Fr.; ſ. Nr. 2069.
—. XVIII., 2; Hartheupfl.: H. tetraptĕrum Fr.; ſ. Nr. 2128.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum lycopifolĭum Froel.; ſ. Nr. 2637.
—. XIX., 1; Korbblütler: Crepis biēnnis L.; ſ. Nr. 1869.
—. „ „ Sonchus asper Hall.; ſ. Nr. 1263.
—. „ „ S. palūstris L.; ſ. Nr. 2846.
—. „ „ Picris hieracioīdes L.; ſ. Nr. 2241.
—. „ „ Leontŏdon vulgāris Kitt.; ſ. Nr. 1079.
—. XIX., 1; Korbblütler: Cirsĭum oleracĕum All.; ſ. Nr. 2847.
—. „ „ C. palūstre Scop.; ſ. Nr. 1059.
—. „ „ C. eriophŏrum Scop.; ſ. Nr. 2287.
—. „ „ Cardŭus nutans L.; ſ. Nr. 2289.
—. „ „ C. crispus L.; ſ. Nr. 2099.
2926. XIX., 2; „ Senecĭo paludōsus L. Sumpf-Baldgreis. Bltr. ſitz., verläng.-lanzettl.; Stralbl. meiſt 13; Bl. goldgelb; Fr. weichharig; Hülle kurzglock.; Wrz. friech.; Pfl. ſpinnwebig-wollig, verkahlend; 4; 7 bis 8.
—. XIX., 2; Korbblütler: S. saracenĭcus L.; ſ. Nr. 1980.
—. „ „ Gnaphalĭum uliginōsum L.; ſ. Nr. 2398.
—. XIX., 2; Korbblütler: G. lutĕo-album L.; ſ. Nr. 2411.
—. „ „ Tanacētum vulgāre L.; ſ. Nr. 2293.
—. „ „ Artemisĭa vulgāris L.; ſ. Nr. 2205.
—. „ „ Telekĭa cordifolĭa Kit.; ſ. Nr. 2564.
—. „ „ Pulicarĭa dysenterĭca Gaertn.; ſ. Nr. 2821.
2927. XIX., 2; Korbblütler: Achillēa ptarmĭca L. (Ptarmĭca vulgāris DC.). Bertram-Garbe (weißer Dorant, wilder Dragun, Wieſen- oder deutſcher Bertram, Nieß- oder Sumpfgarbe). Bltr. bis zur Mitte klein- und dicht-, über der Mitte tiefer- und entfernter-geſägt; äußere Hauptkelchblttchn. 3eck.-lanzettl.; Stral weiß; Scheibe gelblichweiß; 4; 7 bis 9; ♃; ✕.
Varirt: A. cartilaginĕa Ledeb. (Bltr. knorp., dichtbehart).
—. XIX., 2; Korbblütler: Inŭla montāna L.; ſ. Nr. 2566.
—. „ „ I. britannĭca L.; ſ. Nr. 2851.
—. „ „ I. salicīna L.; ſ. Nr. 2222.
—. „ „ I. helenĭum L.; ſ. Nr. 2207.
—. „ „ Bellis perĕnnis L.; ſ. Nr. 2.
2928. „ „ Aster salĭgnus Willd. (A. salici-

folius Scholler). Weidenblättrige Aster. St. fast kahl, mit ebensträuß. Aesten und Aestchen; Bltr. lanzettl., oberf. am Rande hin rauh, ganzrand. oder in der Mitte mit wenigen absteh. Sägezähnen; Hauptkelch angedr.-dachzieg.; Stral weiß, dann blaßlila; 4; 7 bis; ↕.

—. XIX., 5; Korbblütler: Echinops sphaerocephălus L.; s. Nr. 2246.

—. XXI., 1; Najadenpfl.: Caulinĭa fragĭlis Willd.; s. Nr. 1990.

2929. „ „ Zannichellĭa palūstris L. Sumpf-Zannichellie. St. fadenf.; Bltr. sehr schmal-lineal.; Griff. von halber Fruchtlänge; Fr. fast sitz.; ⊙ bis 4; 7 bis 10.

Varirt: Z. major Boenningh. (größere Z.; Bltr. zu 3, sehr lang; Schließfr. kurzgestielt, Rückenleiste stark, zshängend; St. langflutend), Z. gibberōsa Rchb. (doppelt-gekielte Z.; Schließfr. gestielt, beiderf. mit einer Leiste, weitschweif.-gezähnt; Bltr. harf.), Z. repens Boenningh. (kriechende Z.; Narbe ausgebreit.; Schließfr. fast ungestielt, auf dem Rücken fein-gekerbt; in seichten Gewässern rasenbildend, aus den Gelenken wurzelnd).

—. XXI., 1; Aronpfl.: Calla palūstris L.; s. Nr. 1146.

—. „ Wasserstrnpfl.: Callitrĭche verna L.; s. Nr. 948.

2930. „ „ C. stagnālis Scop. Kreuz-früchtiger Wasserstern. Griff. bleibend, aufr. oder absteh.; Fr. zsgedr.-kreisrund, mit breit-geflüg. Kanten; Bltr. sämmtl. verk.-ei- bis spatelf.; Theilfr. kreuzweis-gestellt; Bl häufig ♀; ⊙ bis ♂; 7 bis 8.

2931. XXI., 1; Wassersternpfl.: C. platycārpa Kütz. Platt-früchtiger W. Untere Bltr. lineal., obere verk.-eif.; Theilfr. in 2 Parallelen gestellt; Bl. meist ♀; ⊙ bis ♂; 7 bis 8.*)

2932. XXI. 1; Wassersternpfl.: C. autumnālis L. (C. decussāta Lk., C. virens Goldb., C. truncāta Aut.). Herbst-W. Bltr. spatelf., ganz oder öfters lineal., vorn ausgerand. bis 2spalt.; Staubf. kurz; Fr. kurz-gestielt; Theilfr. ungleichwinklig-kreuzweis; Fruchkanten flügelig-gekielt; ⊙ bis 4; 7 bis 10.

—. XXI., 1; Giftmilcher: Euphorbĭa stricta Sm.; s. Nr. 1041.

—. „ „ E. gerardiāna Jacq.; s. Nr. 1344.

—. „ „ E. lathўris L.; s. Nr. 2301.

---

*) Die C. hamulata Kütz. unterscheidet sich von der Form tieferer Gewässer dieser Art nur durch die Staubfäden, welche bei ihr kürzer sind, als die Deckblätter, bei C. platycarpa aber länger!

—. XXI., 1; Giftmilcher: E. virgāta W. et K.; ſ. Nr. 474.
2933. XXI., 2; Najadenpfl.: Ruppĭa maritĭma L. Meerſtrands-Ruppie. St. fadenf., ſchwimmend; Bltr. ſehr ſchmal-lineal.; gemeinſamer Fruchtſtiel lang, ſpiralig; Staubbeutelſäckchen längl.; Fr. ſchief-aufr.; 2; 7 bis 9.*)
—. XXI., 3; Rohrkolbenpfl.: Typha latifolĭa L.; ſ. Nr. 1936.
—. „ „ Sparganĭum simplex Sm.; ſ. Nr. 1938.
2934. XXI., 3; Rohrkolbenpfl.: Sp. ramōsum Huds. (Sp. erēctum var. a. L.). Aeſtiger Igelskopf (Igelkolbe, -knoſpe, Degenknopf, -kraut, Rindsknoſpe, Schwertelkraut). St. einen äſtigen Blütenſtand tragend; Bltr. an der Baſis 3-kant.; Narben lineal., ſchief; 2; 7 bis 8.
—. XXI., 3; Halbgras: Carex paradōxa Willd.; ſ. Nr. 928.
—. „ „ C. oedēri Retz.; ſ. Nr. 691.
—. „ „ C. pseudo-cypērus L.; ſ. Nr. 1939.
—. XXI., 4; Wegerichpfl.: Littorēlla lacūstris L.; ſ. Nr. 2889.
—. XXI., 5; Löffelpfl.: Sagittarĭa sagittaefolĭa L.; ſ. Nr. 1981.
—. „ Meldenpfl.: Atrĭplex roseum L.; ſ. Nr. 2327.
—. „ Tannenwedelpfl.: Myriophўllum spicātum L.; ſ. Nr. 1940.
2935. XXII., 1; Najadenpfl.: Najas major Roth. (N. marīna var. a. major L., N. fluviatĭlis Lam., Ittnēra najas Gmel. fl. bad.). Großes Nixkraut (Najade, Waſſermaid). St. gabelſpalt.; Bltr. lineal., ausgeſchweift-gezähnt; Blattſch. ganzrand.; ♀ Pfl. weichſtachelig; ☉; 7 bis 9.
—. XXII., 10; Nixenpfl.: Stratiōtes aloīdes L.; ſ. Nr. 1943.
—. XXIII., 1; Froſchbißpfl.: *Elodĕa canadēnsis Rich. et Mich.; ſ. Nr. 970.

a. Auf Flußgeröll:

—. III., 2; Graspfl.: Bromus inērmis L.; ſ. Nr. 1277.
—. V., 1; Paronychienpfl.: Herniarĭa hirsūta L.; ſ. Nr. 2389.
—. V., 3; „ Corrigiŏla littorālis L.; ſ. Nr. 1348.
—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: *Oenothēra muricāta L.; ſ. Nr. 1982.
—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: Epilobĭum rosmarīnifolĭum Haenke; ſ. Nr. 2509.
—. X., 2; Steinbrechpfl.: Saxifrăga patens Gaud.; ſ. Nr. 1807.
—. „ Nelkenblütler: Diānthus saxifrăga L.; ſ. Nr. 2400.
—. X., 3; „ Silēne nemorālis W. et K.; ſ. Nr. 1088.

*) Aehnlich iſt R. rostellata Koch, deren gemeinſamer Fruchtſtiel kurz, nicht ſpiralig-gedreht iſt; Staubbeutelſäckchen faſt kugelig; Frucht ſchief-geſchnäbelt; 2; 7 bis 9.

—. XV., 1; Kreuzblütler: Ibēris amāra L.; ſ. Nr. 1494.
—. XVI., 2; Tamariskenpfl.: Myricaria germanica L.; ſ. Nr. 1808.
—. XIX., 1; Korbblütler: Chondrilla prenanthoides Vill.; ſ. Nr. 2494.
—. XXI., 5; Spitzklettenpfl.: Xanthium macrocārpum DC.; ſ. Nr. 2305.

b. An ſandigen Ufern:

—. IV., 4; Dickblattpfl.: Bulliardia aquatica DC.; ſ. Nr. 2900
—. X., 2; Nelkenblütler: Saponaria officinalis L.; ſ. Nr. 2184.
2936. X., 3; „ Silēne tatarica Pers. (Cucubālus tatarĭcus L.). Tatariſches Leimkraut. Traube einſeitswendig, aufr.; Aeſte gegenſt., 1- bis 3blüt.; Bl. während des Aufblühens auf aufr. Stielchen nickend, weiß; St. mit lineal.-lanzettl. Bltrn. dicht-beſetzt; K. röhrig, etwas keulenf.; 4; 7 bis 8; Brd., Pſ., Pr.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Erysĭmum diffūsum Ehrh.; ſ. Nr. 746.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Ervum hirsūtum L.; ſ. Nr. 1227.

c. An lehmigen Flußufern:

—. XV., 2; Kreuzblütler: Diplotāxis viminĕa DC.; ſ. Nr. 1492.

d. An Ufern unter Gebüſch:

—. IV., 1; Krapppfl.: Asperŭla aparīne M. B.; ſ. Nr. 2223.
—. V., 1; Schnabelpfl.: Impatĭens noli tangĕre L.; ſ. Nr. 2114.
—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: Epilobĭum hirsūtum L.; ſ. Nr. 1053.
—. X., 5; Nelkenblütler: Cucubălus baccifĕrus L.; ſ. Nr. 2186.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Erysĭmum hieracifolĭum L.; ſ. Nr. 551.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Sisymbrĭum strictissĭmum L.; ſ. Nr. 1246.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Vicĭa tenuifolĭa Roth; ſ. Nr. 1229.
—. XIX., 1; Korbblütler: Eupatorĭum cannabīnum L.; ſ. Nr. 2850.

e. Auf Donauinſeln:

—. XI., 1; Weiderichpfl.: Lythrum virgātum L.; ſ. Nr. 1932.

f. In ausgetrockneten, ſteinigen Gräben und Flußbetten:

—. XIX., 2; Korbblütler: Micrŏpus erēctus L.; ſ. Nr. 1983.
2937. „ „ M. supīnus L. Zwerg-Falz-

blume. Angedr.-wollig; St. ausgebreit.-äſtig, ſelten aufr.; Bltr. ſpatelf., ſtumpf; Köpfchen in blattachſelſt. Knäueln, hirskorngroß; Hüllbltchn. auf dem Kiele ſtachelig; ⊙; 7 bis 8; Kr., Ty.

g. In klaren Bächlein:

—. III., 1; Fettkrautpfl.: Montĭa fontāna L.; ſ. Nr. 683.

h. In warmen Bächen:

—. III., 1; Halbgras: Cypērus badĭus Desf.; ſ. Nr. 2538.

§. 518. **Q[1]. In und an ſtehenden Gewäſſern (Seen, Teichen, Lachen u. ſ. w.):**

—. I., 1; Tannenwedelpfl.: Hippūris vulgāris L.; ſ. Nr. 2903.
—. II., 1; Piſtazienpfl.: Lemna minor L.; ſ. Nr. 965.
—. „ „ L. trisŭlca L.; ſ. Nr. 966.
—. „ „ L. gibba L.; ſ. Nr. 967.
—. „ „ L. polyrrhīza L.; ſ. Nr. 968.
—. „ „ L. arrhīza L.; ſ. Nr. 969.
—. „ Waſſerſchlauchpfl.: Utricularĭa vulgāris L.; ſ. Nr. 1953.
—. II., 1; Waſſerſchlauchpfl.: U. neglēcta Lehm.; ſ. Nr. 2871.
—. „ „ U. minor L.; ſ. Nr. 2899.
—. „ „ U. intermedĭa Hayne; ſ. Nr. 1951.
—. „ Rachenblümler: Veronīca beccabūnga L.; ſ. Nr. 1954.
—. „ „ V. anagāllis L.; ſ. Nr. 1955.
—. „ Lippenblümler: Lycŏpus europaeus L.; ſ. Nr. 2891.
—. „ „ L. exaltātus L. fil.; ſ. Nr. 2892.
2938. III., 1; Halbgras: Cypērus glomerātus L. Knäuel-ähriges Zipergras. Halm beblätt., 3kant.; Hülle ungleich-3- bis 6blättr., viel länger als die zſgeſetzte, 3- bis 6äſtige Spirre; Hüllbltr. gekielt; Aehrchen lineal.-längl., 10- bis 15blüt.; Blütenſcheidchen roſtrot, eilängl., ſpitz, gekielt, ſchwachnervig; 2[4]; 7 bis 9; St. (Zillier See).
—. III., 1; Halbgras: C. fuscus L.; ſ. Nr. 2831.
—. „ „ C. longus L.; ſ. Nr. 2904.
—. „ „ Schoenus marīscus L.; ſ. Nr. 2874.
—. „ „ Scirpus palūstris L.; ſ. Nr. 1876.
—. „ „ Sc. ovātus Roth; ſ. Nr. 1921.
—. „ „ Sc. aciculāris L.; ſ. Nr. 1950.
—. „ „ Sc. fluĭtans L.; ſ. Nr. 1956.
—. „ „ Sc. setacĕus L.; ſ. Nr. 2832.
—. „ „ Sc. holoschoenus L.; ſ. Nr. 2833.
—. „ „ Sc. lacūstris L.; ſ. Nr. 944.
—. „ „ Sc. tabernaemontāni Gmel.; ſ. Nr. 1957.

—. III., 1; Halbgras: Sc. trigōnus Roth; ſ. 1958.
—. „ „ Sc. mucronātus L.; ſ. Nr. 2907.
—. „ „ Sc. micheliānus L.; ſ. Nr. 2908.
—. „ „ Sc. maritĭmus L.; ſ. Nr. 2909.
—. „ „ Sc. sylvactĭcus L.; ſ. Nr. 367.
2939. „ „ *Sc. parvŭlus R. et Sch. (Sc. nanus Spr., Sc. humĭlis Wallr., Limnochloë parvŭla Rchb.). Zwergbinſe. Halm innen querwandig; Scheiden ſehr dünnhäutig, blattlos; Bälge ohne Stachelſp.; Pfl. zart, niedrig, kleine Raſen bildend; ☉; 7 bis 8; Sa. (ſalziger See), S.-H., Lübeck, M., Po., Kr.; Vaterland: Cap.
—. III., 2; Graspfl.: Coleānthus subtīlis Seid.; ſ. Nr. 2910.
—. „ „ Calamagrōstis epigeios Roth; ſ. Nr. 2170.
—. „ „ C. littorĕa DC.; ſ. Nr. 2911.
—. „ „ C. lanceolāta Roth; ſ. Nr. 2835.
—. „ „ Baldingēra arundinacĕa L.; ſ. Nr. 1959.
—. „ „ Alopecūrus fulvus Sm.; ſ. Nr. 1922.
—. „ „ Phragmītes commūnis L.; ſ. Nr. 2912.
—. „ „ Festŭca arundinacĕa Schreb.; ſ. Nr. 1884.
—. III., 2; Graspfl.: Glycerĭa fluĭtans Scop.; ſ. Nr. 1960.
—. „ „ Gl. aquatĭca Whlbg.; ſ. Nr. 2914.
—. „ „ Brachypodĭum loliacĕum R. et Sch.; ſ. Nr. 1887.
—. III., 2; Graspfl.: Tritĭcum glaucum Desf.; ſ. Nr. 1961.
—. IV., 1; Krapppfl.: Galĭum uliginōsum L.; ſ. Nr. 1889.
—. „ Waſſernußpfl.: Trapa natans L.; ſ. Nr. 1984.
—. „ Nachtkerzenpfl.: Isnardĭa palūstris L.; ſ. Nr. 2897.
—. IV., 4; Najadenpfl.: Potămogēton natans L.; ſ. Nr. 1963.
—. „ „ P. heterophȳllus Schreb.; ſ. Nr. 1965.
—. „ „ P. plantaginĕus du Croz; ſ. Nr. 1985.
—. „ „ P. lucens L.; ſ. Nr. 1966.
—. „ „ P. perfoliātus L.; ſ. Nr. 1967.
—. „ „ P. crispus L.; ſ. Nr. 1968.
—. „ „ P. comprēssus L.; ſ. Nr. 2917.
—. „ „ P. acutifolĭus Lk.; ſ. Nr. 1986.
—. „ „ P. obtusifolĭus Koch; ſ. Nr. 1969.
—. „ „ P. pusīllus L.; ſ. Nr. 2918.
—. „ „ P. pectinātus L.; ſ. Nr. 1970.
—. „ „ P. densus L.; ſ. Nr. 1987.
2940. „ „ P. trichoīdes Cham. et Schldl. Haarartiges Laichkraut. St. harſ., wenig zſgedr.; Bltr. ſitz., borſtenf., lineal, ſpitz, meiſt 1-, ſelten 3nervig, aderlos; Fr. halbkugelf.; 4; 7 bis 8.

2941. IV., 4; Najadenpfl.: P. marīnus L. (P. filiformis Pers.). Meer-L. Blr. faſt harf., 1nervig, ſehr ſpitz; Fr. verk.-eif., runzel., ungekielt, mit breiter, ſitz. Narbe gekrönt, viel kleiner als bei P. pectinātus L. (Nr. 1970); 4; 7 bis 8.
—. V., 1; Schlüſſelblümler: Lysimachĭa punctāta L.; ſ. Nr. 1890.
—. V., 1; Schlüſſelblümler: L. nummularĭa L.; ſ. Nr. 1008.
—. „ Nachtſchattenpfl.: Solānum dulcamāra L.; ſ. Nr. 1197.
—. „ Borretſchpfl.: Myosōtis palūstris With.; ſ. Nr. 1891.
—. „ „ M. caespitōsa Schultz; ſ. Nr. 1926.
—. „ Enzianpfl.: Lymnanthĕmum nymphaeoïdes Lk.; ſ. Nr. 1927.
—. V., 1; Glockenblümler: Lobelĭa dortmānna L.; ſ. Nr. 2879.
—. V., 2; Doldenpfl.: Helosciadĭum nodiflōrum Koch; ſ. Nr. 2920.
—. V., 2; Doldenpfl.: Aegopodĭum podagrarĭa L.; ſ. Nr. 1012.
—. V., 2; Doldenpfl.: Oenānthe phellandrĭum Lmk.; ſ. Nr. 2881.
—. V., 2; Doldenpfl.: Oe. fistulōsa L.; ſ. Nr. 1893.
—. „ „ Peucedānum palūstre Mnch.; ſ. Nr. 2160.
—. V., 2; Doldenpfl.: Chaerophўllum bulbōsum L.; ſ. Nr. 1106.
2942. V., 5; Sonnenthaupfl.: Aldrovānda vesiculōsa L. Blaſige Aldrovande. St. untergetaucht, fadenf., wenigäſtig; Blr. dicht-quirlſt.; Blattſt. etwas flach, am Ende breiter und beiderſ. mit einem par langen Wimpern, die eigentl. Platte bauchig-aufgetrieben; Blütenſt. blattachſelſt., einzeln, länger als der Blattſt.; Bl. klein, weiß; ☉; 7 bis 9; Schl., Etſch unterhalb Botzen, Bodenſee.
—. VI., 1; Aronpfl.: *Acŏrus calămus L.; ſ. Nr. 1929.
—. „ Semede: Juncus obtusiflōrus Ehrh.; ſ. Nr. 1527.
—. „ „ J. alpīnus Vill.; ſ. Nr. 1831.
—. „ „ J. uliginōsus Roth; ſ. Nr. 1050.
—. „ „ J. comprēssus Jacq.; ſ. Nr. 1863.
—. „ Weiderichpfl.: Peplis portŭla L.; ſ. Nr. 2819.
—. VI., 3; Knöterichpfl.: Rumex maritĭmus L.; ſ. Nr. 1899.
—. „ „ R. palūstris Sm.; ſ. Nr. 2841.
—. VI., 5; Löffelpfl.: Alīsma natans L.; ſ. Nr. 1944.
—. „ „ A. plantāgo L.; ſ. Nr. 1972.
—. „ „ A. parnassifolĭum L.; ſ. Nr. 2886.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygōnum amphibĭum L.; ſ. Nr. 2843.

—. VIII., 1; Knöterichpfl.: P. persicaria L.; ſ. Nr. 2182.
—. „ „ P. hydropiper L.; ſ. Nr. 2117.
—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: *Oenothēra biennis L.; ſ. Nr. 2256.
—. VIII., 4; Tännelpfl.: Elatine alsinastrum L.; ſ. Nr. 2887.
—. „ „ E. hexandra DC.; ſ. Nr. 1973.
—. „ „ E. triandra Schkhr.; ſ. Nr. 2901.
—. „ „ E. hydropiper L.; ſ. Nr. 1952.
—. IX., 3; Waſſerlieſchpfl.: Butomus unbellatus L.; ſ. Nr. 1974.
—. X., 2; Nelkenblütler: Gypsophila murālis L.; ſ. Nr. 2234.
—. X., 3; „ Melandrium sylvēstre Roehl.; ſ. Nr. 428.
—. X., 3; Nelkenblütler: Stellaria glauca With.; ſ. Nr. 1054.
—. „ „ St. uliginōsa Murr.; ſ. Nr. 489.
—. X., 5; „ Cerastium vulgātum L. spec.; ſ. Nr. 463.
—. XII., 3; Roſenpfl.: Geum urbānum L.; ſ. Nr. 1077.
—. „ „ Potentilla supīna L.; ſ. Nr. 1369.
—. „ „ P. norvegica L.; ſ. Nr. 1516.
—. XIII., 1; Nimfenpfl.: Nymphaea alba L.; ſ. Nr. 1976.
—. „ „ Nuphar lutēum Sm.; ſ. Nr. 1977.
2943. „ „ N. pumilum Sm. Kleine Fiſcherblume (Mummel, Nixblume). Bltr. faſt oval, tief-herzf., Lappen meiſt auseinandertretend, ſchwimmend; Narbe ſternf.-ſpitz-gezähnt oder eingeſchn., meiſt 10ſtral.; Staubb. faſt 4eck.; Bl. gelb; 4; 7 bis 8; Schl., Pr., Po., M., Hamburg, Sg. (Zellerſee), Bd. (Feldſee).*)
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Ranunculus hederacēus L.; ſ. Nr. 344.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: R. tripartītus DC.; ſ. Nr. 1988.
—. „ „ R. aquatilis L.; ſ. Nr. 1978.
—. „ „ R. flammula L.; ſ. Nr. 1903.
—. „ „ R. lingua L.; ſ. Nr. 2922.
—. „ „ R. acris L.; ſ. Nr. 399.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Mentha arvēnsis L.; ſ. Nr. 2213.
—. „ „ M. pulegium L.; ſ. Nr. 2820.
—. „ „ Scutellaria galericulāta L.; ſ. Nr. 2122.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Limosella aquatica L.; ſ. Nr. 2898.

*) N. minimum Spenn. unterſcheidet ſich nur durch ſchmälere Antheren. — N. intermedium Ledeb., bisher blos in Oſtpreußen gefunden, hat ſchwach-eingedrückte, 11- bis 14ſtralige Narben und iſt Baſtard.

—. XIV., 2; Rachenblümler: Lindernĭa pyxidarĭa All.; ſ. Nr. 2902.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Scrophularĭa aquatĭca L.; ſ. Nr. 2925.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Subularĭa aquatĭca L.; ſ. Nr. 1989.
—. XV., 2; „ Nasturtĭum officināle R. Br.; ſ. Nr. 954.
—. XV., 2; Kreuzblütler: N. austriăcum Crtz.; ſ. Nr. 1906.
—. „ „ N. amphibĭum R. Br.; ſ. Nr. 1979.
—. „ „ Cardamĭne impatĭens L.; ſ. Nr. 421.
—. „ „ C. parviflōra L.; ſ. Nr. 1934.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolĭum fragifĕrum L.; ſ. Nr. 1908.
—. „ „ Galēga officinālis L.; ſ. Nr. 1349.
—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperĭcum tetraptĕrum Fr.; ſ. Nr. 2128.
—. XIX., 1; Korbblütler: Cirsĭum palūstre Scop.; ſ. Nr. 1059.
—. XIX., 2; „ Senecĭo paludōsus L.; ſ. Nr. 2926.
—. „ „ Gnaphalĭum uliginōsum L.; ſ. Nr. 2398.
—. XIX., 2; Korbblütler: Artemisĭa vulgāris L.; ſ. Nr. 2205.
—. „ „ Pulicarĭa dysenterĭca Gaertn.; ſ. Nr. 2821.
—. XIX., 2; Korbblütler: Bellis perēnnis L.; ſ. Nr. 2.
—. XXI., 1; Najadenpfl.: Caulinĭa fragĭlis Willd.; ſ. Nr. 1990.
—. „ „ Zannichellĭa palūstris L.; ſ. Nr. 2929.

2944. XXI., 1; Najadenpfl.: Z. pedicellāta Whlbg. Langgeſtielte Zannichellie. Schließfr. langgeſtielt, an der Baſis abgeſtutzt, mit häutiger, ſparſam gekerbter Rückenleiſte; Griff. von Fruchtlänge; 4; 7 bis 9.*)

—. XXI., 1; Waſſerſternpfl.: Callitrĭche verna L.; ſ. Nr. 948.
—. „ „ C. platycārpa Kütz.; ſ. Nr. 2931.
—. „ „ C. autumnālis L.; ſ. Nr. 2932.
—. XXI., 2; Najadenpfl.: Ruppĭa maritĭma L.; ſ. Nr. 2933.
—. XXI., 3; Rohrkolbenpfl.: Typha latifolĭa L.; ſ. Nr. 1936.
—. „ „ T. angustifolĭa L.; ſ. Nr. 1937.
—. „ „ Sparganum ramōsum Huds.; ſ. Nr. 2934.

2945. XXI., 3; Rohrkolbenpfl.: Sp. natans L. Schwimmender Igelskopf. Blr. niederlig., völlig flach; gemeinſchaftl. Blütenſt. einfach, traubenartig, wenigblüt.; ♂

*) Iſt wol nur Abart von Z. palustris L.!

Köpfchen viele, oft 10 bis 12, ♀ oft fehlend; 4; 7 bis 9.*)

—. XXI., 3; Halbgras: Carex cyperoïdes L.; ſ. Nr. 1517.
—. „ „ C. pseudo-cyperus L.; ſ. Nr. 1939.
—. „ Nixenpfl.: Udora verticillata Spr.; ſ. Nr. 1991.
—. XXI., 4; Wegerichpfl.: Littorella lacustris L.; ſ. Nr. 2889.
—. XXI., 5; Löffelpfl.: Sagittaria sagittaefolia L.; ſ. Nr. 1981.
—. XXI., 5; Tannenwedelpfl.: Myriophyllum spicatum L.; ſ. Nr. 1940.
—. XXI., 5; Tannenwedelpfl.: M. alterniflorum DC.; ſ. Nr. 1546.

2946. XXI., 5; Tannenwedelpfl.: M. verticillatum L. Quirliges Tauſendblatt (Federkraut, Waſſergarbe, -feder, tauſendblatt, -garn, Teichfenchel, Federball, Fuchswedel, Sauſamen). Bltr. quirlig, tief-fiederſpalt.; Bl. in blattachſelſt. und ährenf. Quirlen; Deckbltr. ſämmtl. kammf.-fiederſpalt.; 4; 7 bis 8.

—. XXII., 1; Najadenpfl.: Najas major Roth; ſ. Nr. 2935.

2947. XXII., 8; Nixenpfl.: Hydrocharis morsus ranae L. Gemeiner Froſchbiß (Krötenbiß). Bltr. ſchwimmend, geſtielt, kreisrund, an der Baſis tief-herzf.; Bl. geſtielt; innere Kbltr. 3mal größer als die äußeren, weiß; 4; 7 bis 8.

—. XXIII., 1; Froſchbißpfl.: *Elodea canadensis Rich. et Mich.; ſ. Nr. 970.

a. In abgelaſſenen Teichen:

2948. III., 1; Halbgras: Cyperus glomeratus L. Geknäultes Zipergras. Halm 3kant.; Hülle 3- bis 6blättr., ſehr lang; Spirre gegen 9äſtig, Aeſte 3- bis 8ährig; Aehrchen ellipt.-lineal.-zſgedr., 9- bis 14blüt.; Blütenſch. rötl., grünkielig; Fr. längl., 3kant.; ⊙; 7 bis 8; St., Ty.

b. In Tümpeln, Lachen, Pfützen:

—. III., 1; Halbgras: Scirpus supinus L.; ſ. Nr. 2876.
—. IV., 4; Najadenpfl.: Potamogeton densus L.; ſ. Nr. 1987.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Limosella aquatica L.; ſ. Nr. 2898.
—. XXI., 1; Najadenpfl.: Caulinia fragilis Willd.; ſ. Nr. 1990.

*) Dieſe Pflanze wird in Nord- und Mitteldeutſchland nicht gefunden; vor Jahren ſoll ſie bei Berlin vorgekommen ſein!

—. XXI., 1; Wasserſternpfl.: Callitrĭche stagnālis Scop.; ſ. Nr. 2930.
—. XXII., 1; Najadenpfl.: Najas major Roth; ſ. Nr. 2935.

§. 519. **R[1]. An ſalzhaltigen Orten des Binnenlandes:**

—. III., 1; Halbgras: Schoenus rufus Huds.; ſ. Nr. 1992.
—. III., 2; Graspfl.: Glyceria distans Whlbg.; ſ. Nr. 1886.
—. „ „ Hordĕum secalīnum Schreb.; ſ. Nr. 1861.
—. IV., 1; Wegerichpfl.: Plantāgo maritĭma L.; ſ. Nr. 1993.
—. „ „ P. coronŏpus L.; ſ. Nr. 2862.
—. V., 1; Schlüſſelblümler: Samŏlus valerāndi L.; ſ. Nr. 2863.
—. „ „ Glaux maritĭma L.; ſ. Nr. 972.
—. „ Enzianpfl.: Erythraea linariaefolĭa Pers.; ſ. Nr. 1994.
—. V., 2; Doldenpfl.: Apĭum graveŏlens L.; ſ. Nr. 1928.
—. „ „ Bupleurum tenuissĭmum L.; ſ. Nr. 2864.
—. „ Meldenpfl.: Salsŏla kali L.; ſ. Nr. 2919.
—. VI., 1; Semede: Juncus bottnĭcus Whlbg.; ſ. Nr. 2883.
—. VI., 3; Junkaginee: Triglōchin maritĭmum L.; ſ. Nr. 1949.
—. X., 3; Nelkenblütler: Spergularĭa salīna Presl.; ſ. Nr. 2822.
2949. „ „ Sp. margināta Kitt. (Arenarĭa medĭa L., A. margin. DC., Alsīne marg. Rchb., Lepigŏnum marginātum Koch, Sp. margināta P. M. E., Sp. medĭa Grisb., Lep. marīnum Whlbg.). Berandeter Knörich. St. ligend, aufſteig., äſtig; Bltr. halbrund, lineal., fadenf., fleiſch., obere kurzzugeſp., kahl; Kapſ. länger als der K.; Same längl.-linſenf., mit angeſchwoll. Rande, weiß-geflüg.; Bl. weiß oder blaßrot; 4; 7 bis 8.
—. X., 4; Nelkenblütler: Sagīna maritĭma Sm.; ſ. Nr. 973.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Lepidĭum latifolĭum L.; ſ. Nr. 1995.
—. XVI., 5; Pappelroſenpfl.: Althaea officinālis L.; ſ. Nr. 2214.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Melilōtus dentāta Pers.; ſ. Nr. 2281.
—. XIX., 1; Korbblütler: Lactūca salīgna L.; ſ. Nr. 2283.
—. „ „ Thrincĭa hirta Roth; ſ. Nr. 1840.
—. XIX., 2; „ Senecĭo aquatĭcus Huds.; ſ. Nr. 2827.
—. XIX., 2; Korbblütler: Artemisĭa rupēstris L.; ſ. Nr. 2823.
—. „ „ A. laciniāta L.; ſ. Nr. 2865.
—. XXI., 5; Meldenpfl.: Atrĭplex longifolĭum W. et K.; ſ. Nr. 2303.
—. XXI., 5; Meldenpfl.: A. littorale L.; ſ. Nr. 2893.

a. Auf ſalzigen Triften:

Vergl. §. 507, f.

b. Auf salzhaltigen Weiden:

Vergl. §. 508, f.

c. Auf salzhaltigen Wiesen:

Vergl. §. 509, l.

8¹. Am Meeresstrande: §. 520.

—. I., 1; Tannenwedelpfl.: Hippūris vulgāris L. und zwar die Varietät: H. tetraphȳlla L.; ſ. unter Nr. 2903.
—. II., 1; Rachenblümler: Veronīca maritīma L.; ſ. unter Nr. 2212.
—. III., 1; Halbgras: Schoenus rufus Huds.; ſ. Nr. 1992.
—. „ „ Scirpus maritīmus L.; ſ. Nr. 2909.
—. III., 2; Graspfl.: Agrōstis stolonifĕra L.; ſ. Nr. 2154.
—. „ „ Calamagrōstis halleriāna DC.; ſ. Nr. 1878.
2950. III., 2; Graspfl.: C. baltĭca Lk. (Ammophĭla balt. Lk., Arūndo balt. Flügge, Psamma balt. R. et Sch.). Oſtſee-Reitgras (Oſtſee-Sandhalm). Riſpe lanzettl.; Klapp. lanzettl., pfrieml.-zugeſp.; Hare von halber Spelzenlänge; Bltr. eingerollt, lineal.; 4; 7 bis 8; Oſtſee.
2951. III., 2; Graspfl.: Polypōgon littorālis Sm. Meerſtrands-Bürſtengras. Wrz. kriech.; Halme an der Baſis ligend; Blütenſch. lineal-lanzettl., ſchärfl., wimperrand., begrannt; Blütenſcheidchen an der Spitze 2ſpalt., aus der Spalte begrannt; 4; 7 bis 8; wird fälſchlich als auf Norderney vorkommend angegeben.
—. III., 2; Graspfl.: Phleum arenarĭum L.; ſ. Nr. 1511.
—. „ „ Poa procūmbens Sm.; ſ. Nr. 1997.
—. „ „ Glycerĭa distans Whlbg.; ſ. Nr. 1886.
2952. „ „ Gl. maritīma Whlbg. (Poa marit. Huds., Festūca thalassĭca Kth., F. marit. C. Koch). See-Mannagras. Nichtblüh. Stgl. ausläuferartig und niederlig.; untere Aeſte meiſt zu 2, fruchttrag. zſgezog.; Bl. lineal.-längl.; 4; 7 bis 8; Oſt- und Nordſee.*)
—. III., 2; Graspfl.: Leptūrus filiformis Trin.; ſ. Nr. 1998.
—. „ „ Tritĭcum littorāle Host; ſ. Nr. 1962.
—. „ „ T. rigĭdum Schrad.; ſ. Nr. 2915.
—. „ „ T. acūtum DC.; ſ. Nr. 1999.
—. „ „ T. pungens Pers.; ſ. Nr. 2000.

*) Eine ſüdliche Form mit nichtkriechender Wurzel und ligenden Sproſſen iſt Gl. (Poa) festucaeformis Heynh.!

—. III., 2; Graspfl.: T. affĭne Deth.; ſ. Nr. 2001.
—. „ „ T. juncĕum L.; ſ. Nr. 2002.
2953. „ „ T. strictum Deth. (Agropўrum strict. Rchb., A. elymogĕnes Arndt). Steife Quecke. Halm dick, ſteif-aufr.; Aehrchen 5blüt., genähert; Klapp. 5nervig, ſpitz, länger als das halbe Aehrchen; Spindel weichharig; 4; 7; Oſtſee.
—. III., 2; Graspfl.: Elўmus arenarĭus L.; ſ. Nr. 2916.
—. „ „ Hordĕum secalĭnum Schreb.; ſ. Nr. 1861.
—. IV., 1; Wegerichpfl.: Plantăgo maritĭma L.; ſ. Nr. 1992.
—. „ „ P. coronŏpus L.; ſ. Nr. 2862.
—. „ „ P. arenarĭa W. et K.; ſ. Nr. 2384.
—. IV., 4; Najadenpfl.: Potamogēton marīnus L.; ſ. Nr. 2941.
—. V., 1; Schlüſſelblümler: Glaux maritĭma L.; ſ. Nr. 972.
2954. „ Windenpfl.: Convolvŭlus soldanēlla L. Meerſtrands-Winde. St. niederlig.; Bltr. nierenf.; K. mit eif., ſtumpfen Deckbltrn. geſtützt; Bl. groß, rötlichweiß; ⊙ (4); 7 bis 8; ↕; Nordernei, Wangerog, Kr.
—. V., 1; Enzianpfl.: Erythraea linariaefolĭa Pers.; ſ. Nr. 1994.
2955. V., 1; Enzianpfl.: E. spicāta Pers. Aehriges Tauſendgüldenkraut. Bltr. längl., 5nervig; Blütenſtand am St. vertheilt, ährig; Kelchlapp. ungleich, der äußere länger als die Kapſ.; Bl. roſenrot; ⊙; 7 bis 8; Trieſt.
2956. V., 2; Meldenpfl.: Beta maritĭma L. Meerſtrands-Runkelrübe. Wrz. vielſtengelig; St. niedergeſtreckt; Bltr. rauten-eif., kurz-zugeſp.; Narben lanzettl.; 4; 7 bis 8; Nordſee (?).
2957. V., 2; Meldenpfl.: Kochĭa hirsūta Nolte (Salsŏla hirs. L., Suaeda hirs. Rchb., Echinopsĭlon hirsūtus Moq. Tand.). Rauhharige Kochie (Stachelhar). Rauhharig; Bltr. lineal., ſtumpf; Bl. zu 2, blattachſelſt.; Anhängſel der fruchttrag. Blütenhülle kegelf.; ⊙; 7 bis 9; Holſtein.
—. V., 2; Meldenpfl.: Salsŏla kali L.; ſ. Nr. 2919.
2958. „ „ S. soda L. Langblättriges Salzkraut. St. kahl, aufſteig.-äſtig; untere Bltr. gegenſt., lineal., halbrund, kurz-ſtachelſp.; Bl. einzeln; Kelchlapp. vergröß., faſt trocken, mit einer Querfalte; ⊙; 7 bis 8; ⚓; Trieſt.
—. V., 2; Doldenpfl.: Eryngĭum maritĭmum L.; ſ. Nr. 2003.
—. „ „ Apĭum graveŏlens L.; ſ. Nr. 1928.
—. „ „ Bupleurum tenuissĭmum L.; ſ. Nr. 2864.
2959. V., 2; Doldenpfl.: Crithmum maritĭmum L. Meer-

ſtrands-Bazille. St. aufr., ſtrauchig, oben nebſt den Blrn. fleiſch., kahl, äſtig; Blattſt. ſcheidenf.; Blr. dopp.-fiedertheil., Lappen lanzettl. bis lineal-lanzettl., ſpitz, lederig; Dolde gipfelſt.; Döldchen klein; Bl. weiß; 4; 7 bis 8; Trieſt.

2960. V., 5; Bleiwurzpfl.: Statice limonium L. (St. behen Drej., St. pseudo-limonium Rchb.). Aechter Widerſtoß. St. mit aufr.-abſteh., faſt ebenſträuß. Aeſten; Blr. längl.-verk.-eif., ſtachelſp., kahl, 1nervig; Aeſtchen zuletzt zurückgebog.; Bl. einſeitig, aufr., himmelblau; 4; 7 bis 9; Oſt- und Nordſee, Adriameer.

Varirt: St. serotina Rchb. (Blr. eilanzettl.-ſpatelf., ſtachelſp.; Zymen locker; Deckblr. ausgeſchn.), St. scoparia Pall. (Blr. verk.-eiſpatelf.; Zymen zurückgekr.; Kr. von dopp. Kelchlänge), St. globulariaefolia Desf. (Blr. ſpatelf., kurz-zugeſp., ſtachelſp., knorpelrand.; Bl. locker; Deckblr. lineal., häutig), St. caspia Willd. (Blr. ſehr klein, ſpatelf., kurzzugeſp.; untere Aeſte des St. steril, im Zickzack gebog.), St. furfuracea Lagasc. (Rchb.; weichharig; Blr. ſehr klein, lanzett-ſpatelf., ſtumpf; Stiele ligend, nur die oberſten fruchtb.).*)

—. VI., 1; Semede: Juncus balticus Willd.; ſ. Nr. 2004.

—. „ „ J. alpinus Vill.; ſ. Nr. 1831.

2961. „ „ J. maritimus Lam. Meerſtrands-Seme. Grundſt. Blr. ſtielrund, ſtechend; Kapſ. von Blütenhüllenlänge, ellipſoidiſch, ſtachelſp.; Schaft ſteif, blaßgraugrün, blattlos; Spirre vielfach zſgeſetzt; Blütenſch. dopp., ſtechendſpitz; 4; 7 bis 8; Nord- und Oſtſee.

—. VI., 3; Junkaginee: Triglochin maritimum L.; ſ. Nr. 1949.

—. VI., 3; Knöterichpfl.: Rumex maritimus L.; ſ. Nr. 1899.

—. X., 3; Nelkenblütler: Honkenēja peploides Ehrh.; ſ. Nr. 2005.

—. X., 3; Nelkenblütler: Spergularia salina Presl.; ſ. Nr. 2822.

—. X., 3; Nelkenblütler: Sp. marginata Kitt.; ſ. Nr. 2949.

—. X., 4; „ Sagina maritima Sm.; ſ. Nr. 973.

—. XII., 3; Roſenpfl.: Rosa pimpinellifolia L.; ſ. Nr. 1211.

—. „ „ *R. lucida Ehrh.; ſ. Nr. 1975.

—. XIII., 1; Mohnpfl.: Glaucium luteum Scop.; ſ. Nr. 1502.

—. XIV., 1; Lippenblümler: Stachys maritima L.; ſ. Nr. 2006.

*) Sämmtliche Varietäten kommen nur am Adriameere vor!

—. XIV., 2; Rachenblümler: Linaria striata DC.; ſ. Nr. 2240.
2962. „ „ L. loeselii Schweigg. (L. maritima Rchb., L. odora Chavann., Antirrhinum odorum M. B.). Löſel's Frauenflachs. Kahl; Bltr. wechſelſt., entfernt; Bl. gelb; rötl. geſpornt; Samen flach, geflüg., glatt, halbmondf.; Kelchlapp. längl.-lanzettl., 3nervig; 4; 7 bis 8; Oſtſee.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Lepidium latifolium L.; ſ. Nr. 1995.
2963. XV., 1; Kreuzblütler: Cakile maritima Scop. (Bunias cakile L.). Gewöhnlicher Meerſenf. St. äſtig, aufſteig.; Bltr. fleiſch., fiederſpalt., bisweilen ungetheilt; Bl. hellviolet bis weiß, in verläng. Schirmähren; ☉; 7 bis 8; Oſt- und Nordſee.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolium vesiculosum Sav.; ſ. Nr. 2007.
2964. XVII., 4; Hülſenpfl.: *Pisum maritimum L. (Orobus maritimus Rchb., Lathyrus marit. Bigelow). Meerſtrands-Erbſe. Bltr. 4parig, Bltchn. ellipt.; Nebenbltr. pfeilf., ſpitz-öhrig; Bl. traubig, nickend, Fahne blaßviolet, Flüg. purpurn, Schiffchen weiß; Samen kant., klein, zalr.; 4; 7 bis 8; Oſtſee; Vaterland: Amerika.
—. XIX., 2; Korbblütler: Senecio livĭdus L.; ſ. Nr. 1503.
—. „ „ S. squalĭdus L.; ſ. Nr. 2008.
—. „ „ S. aquatĭcus Huds.; ſ. Nr. 2827.
—. „ „ Inŭla britannĭca L.; ſ. Nr. 2851.
2965. „ „ I. crithmoides L. Dickblättriger Alant. St. ſteif, aufr., kahl; Bltr. lineal., fleiſch., ſitz., an der Baſis unterhalb am St. mit halbmondf., ſchwarzem Eindruck; Köpfchen geſtielt, gipfelſt., aufr., einzeln, ſchmutzig-goldgelb; Fr. kahl; 4; 7 bis 8; Trieſt.
—. XXI., 1; Najadenpfl.: Zostēra marĭna L.; ſ. Nr. 2009.
—. „ „ Z. nana Roth; ſ. Nr. 2010.
—. „ „ Z. noltēi Hornem.; ſ. Nr. 2011.
—. „ „ Zannichellĭa palūstris L.; ſ. Nr. 2929.
—. „ „ Z. pedicellāta Whlbg.; ſ. Nr. 2944.
2966. „ „ Z. polycarpa Nolte. Kurzſchnäbelige Zannichellie (Teichfaden). Bltr. zu 2; Schließfr. auf einem gemeinſchaftl. Stiele zu 4 bis 8 ſitz., auf dem Rücken mit einem weitſchweifig-gezähnten Kiele; Narbe faſt ſitz.; 4; 7 bis 10; Oſt- und Nordſee.
—. XXI., 1; Giftmilcher: Euphorbĭa paralĭas L.; ſ. Nr. 2012.
2967. „ „ E. peplis L. Peplisartige Wolfsmilch. Bl. einzeln, zw. den Gabeln des ungleich-

gabelig-verzweigten Stgls. und in den Blattachseln; Bltr. fast sitz., gegenst., längl., vorn ganzrand.; Samen gekielt, glatt; ⊙; 7 bis 8; ‡; Triest.

—. XXI., 2; Najadenpfl.: Ruppĭa maritĭma L.; s. Nr. 2933.

2968. XXI., 3; Halbgras: Carex extēnsa Good. Ausgedehnte Segge. Wrz. faserig; ♀ Aehrchen 2 bis 4, längl.-eif., obere sitz., genähert, unteres etwas entfernt, eingeschlossen-gestielt; Deckbltr. länger als der Halm, zuletzt zurückgekr., weit-absteh.; ♃; 6 bis 7; Ost- und Nordsee, Triest.*)

—. XXI., 4; Wegerichpfl.: Littorēlla lacūstris L.; s. Nr. 2889.

—. XXI., 5; Meldenpfl.: Atrĭplex littorāle L.; s. Nr. 2893.

—. XXII., 1; Najadenpfl.: Najas major Roth; s. Nr. 2935.

a. Auf Sanddünen:

—. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus arenarĭus L.; s. Nr. 1501.

b. Auf Balasterde:

—. XIX., 1; Korbblütler: Cardŭus tenuiflōrus Sm.; s. Nr. 1340.

c. Auf Felsen:

—. X., 5; Nelkenblütler: Diānthus ciliātus Guss.; s. Nr. 1668.

d. Unter der Sat:

2969. V., 2; Doldenpfl.: Bupleurum semicomposĭtum L. Schwachdoldiges Hasenöhrchen. St. aufr., ästig, etwas gestreift; Bltr. längl.-spatelf., stumpf, stachelsp., 3-nervig; Hülle 5blättr., Bltchn. lanzettl., zugesp., ungleich; Hüllchen 5blättr., lanzettl., stachelsp., 3nervig; Dolden der Blattachseln klein, fast einfach; Bl. fast sitz., gelb; ⊙; 7 bis 8; Kr.

e. Auf Aeckern:

—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Trifolĭum alexandrīnum L.; s. Nr. 2013.

f. Auf Grasplätzen:

—. III., 2; Graspfl.: Hordĕum secalĭnum Schreb.; s. Nr. 1861.

—. V., 1; Windenpfl.: Convolvŭlus soldanēlla L.; s. Nr. 2954.

---

*) Scheint nördliche Meeresform von C. oederi Retz. (Nr. 691) zu sein. — C. balbisii Spr., welche an Salinen bei Triest vorkommt, ist nur rundhalmige Form von C. extensa Good. Ebenso scheint C. punctata Gaud., welche in den salzburger Alpen gefunden wurde, nur Alpenform derselben zu sein!

—. XIX., 1; Korbblütler: Tragopōgon floccōsus W. et K.; s. Nr. 1858.

g. Auf feuchten Wiesen:

—. III., 2; Graspfl.: Hordĕum secalīnum Schreb.; s. Nr. 1861.
—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Trifolĭum maritĭmum Huds.; s. Nr. 1545.
—. XVII., 4; Hülsenpfl.: T. alexandrīnum L.; s. Nr. 2013.

§. 521. **T[1]. Kulturpflanzen:**

a. In Gemüsegärten:

—. II., 1; Lippenblümler: Salvĭa officinālis L.; s. Nr. 2016.
—. V., 2; Doldenpfl.: Apĭum graveŏlens L.; s. Nr. 1928.
—. „ „ Petroselīnum satīvum Hoffm.; s. Nr. 1293.
—. V., 2; Doldenpfl.: *Anēthum graveŏlens L.; s. Nr. 2019.
—. „ „ Pastināca satīva L.; s. Nr. 2058.
—. „ „ Daucus carōta L.; s. Nr. 1294.
—. VI., 1; Spargelpfl.: Asparăgus officinālis L.; s. Nr. 1205.
—. „ Lilienpfl.: *Allĭum satīvum L.; s. Nr. 2021.
—. „ „ *A. ophĭoscorŏdon Don; s. Nr. 2022.
—. „ „ *A. ascalonĭcum L.; s. Nr. 2023.
—. „ „ *A. cepa L.; s. Nr. 2024.
—. „ „ A. oleracĕum L.; s. Nr. 2339.
—. „ „ A. schoenoprāsum L.; s. Nr. 1654.
2970. „ „ *A. porrum L. (Porrum commūne Rchb.). Gemeiner Lauch (Asch- oder Winterlauch, Lauchzwiebel, Porree). Bltr. flach; Dolde kapseltrag.; mittl. Harspitze der Stbf. von Stbflänge; Bl. hellpurpurn; ♂; 6 bis 7; ♆; Vaterland: Südeuropa.
2971. VI., 1; Lilienpfl.: *A. ampeloprāsum L. Sommer-L. Zwieb. plattkug., mit Wrzbrut; St. walzenf., bis zur Mitte beblätt.; Dolde kug., kapseltrag.; Stbgf. länger als der K.; mittl. Spitze der innern Stbf. von Länge des unteren Gliedes; Bl. blaßrot; 2; 7 bis 8; ♆.
2972. VI., 1; Lilienpfl.: *A. rotūndum L. Runder L. Bltr. flach; Dolde kapseltrag., kug.; Blütenhüllbltr. auf dem Rücken rauh, länger als die Stbf.; Bl. purpurn; 2; 7 bis 8; ♆.
—. VI., 3; Knöterichpfl.: Rumex patientĭa L.; s. Nr. 2273.
—. VIII., 1; Rautenpfl.: Ruta graveŏlens L.; s. Nr. 2569.
—. XI., 1; Fettkrautpfl.: Portulaca oleracĕa L.; s. Nr. 1269.
—. „ „ P. sativa Haw.; s. Nr. 2025.

—. XIII., 1; Kappernpfl.: Cappăris spinōsa L.; ſ. Nr. 1358.
—. XIV., 1; Lippenblümler: *Thymus vulgāris L.; ſ. Nr. 2026.
2973. XIV., 1; Lippenblümler: Saturēja hortēnsis L. Gemeines Bohnenkraut (Pfefferkraut, Kölle, Saturin, wilder Iſop, Ziperiginggis, Kalbsiſop, =zwiebel, =kümmel, Käſekraut). St. ſehr äſtig; Bltr. lineal=lanzettl., ſpitz; Ebenſträußchen meiſt 5blüt.; Bl. lila oder weiß, im Schlunde zott.; Pfl. gewürzhaft; ☉; 7 bis 9; ♆; ♃; Kr.
—. XIV., 1; Lippenblümler: S. montāna L.; ſ. Nr. 2464.
—. " " Dracocephălum moldavĭca L.; ſ. Nr. 2147.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Lepidĭum satīvum L.; ſ. Nr. 1223.
—. " " L. latifolĭum L.; ſ. Nr. 1995.
—. " " Cochlearĭa armoracĭa L.; ſ. Nr. 1222.
—. XV., 2; Kreuzblütler: *Raphănus satīvus L.; ſ. Nr. 2027.
—. " " Nasturtĭum officināle R. Br.; ſ. Nr. 954.
2974. XVII., 4; Hülſenpfl.: *Tetragonolŏbus purpurĕus Mnch. (Lotus tetragon. L.). Purpurblütige Spargelerbſe. Wrz. mehrſtengel.; Blütenſt. 1= bis 2blüt., von Blattlänge; Flüg. der Hülſe breit und am Rande hin= und hergebog.; Bl. purpurrot; ☉; 7 bis 8; ♆; Vaterland: Südeuropa.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: *Pisum ramulāre Moris.; ſ. Nr. 2028.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: *Phaseŏlus vulgāris L.; ſ. Nr. 1447.
—. " " *Ph. multiflōrus L.; ſ. Nr. 1448.
—. XIX., 1; Korbblütler: Scorzonēra hispanĭca L.; ſ. Nr. 1870.
—. XIX., 1; Korbblütler: Tragopōgon porrifolĭus L.; ſ. Nr. 989.
2975. XIX., 1; Korbblütler: *Cichorĭum endivĭa L. Endivien=Wegwarte (Endivie). Untere Bltr. längl., bucht.=geſchweift, blütenſt. breit=eif., mit herzf. Baſis umfaſſ.; Bl. blau oder weiß; ☉ und ♃; 7 bis 9; Vaterland: Oſtindien.
2976. XIX., 1; Korbblütler: *Lactūca satīva L. Garten=Lattich (Salat, Kopfſalat). Bltr. ganzrand. oder ſchrotſägef., auf der Mittelrippe unterſ. ſtachel., auch glatt; Riſpe ausgebreit., flach; Achänen braun; Schnabel weiß, von oder über Achänenlänge; Bl. gelb; ☉; 6 bis 8; ♆; ♃; Vaterland: ?
—. XXI., 5; Meldenpfl.: *Atrĭplex hortēnse L.; ſ. Nr. 2260.
—. XXI., 9; Kürbispfl.: *Cucŭmis satīvus L.; ſ. Nr. 2366.

2977. XXI., 9; Kürbispfl.: *C. melo L. (Citrullus vulgaris, Melo vulgaris Be.). Melone (Arbuſe). Bltr. 3- bis 5-theil.; Kr. glock., gelb; Beerenfr. groß, ſüß; ☉; 7 bis 10; ♆; Vaterland: Südaſien.

—. XXI., 9; Kürbispfl.: *Cucurbĭta pepō L.; ſ. Nr. 2367.

—. „ „ *C. melopĕpo L., ſ. Nr. 1576.

—. „ „ *C. maxĭma Duch.; ſ. Nr. 2030.

2978. „ „ *C. verrucōsa L. Warziger Kürbis. Bltr. herzf., tief-5lapp., Mittellapp. an der Baſis verſchmäl., gezähnelt; Kürbis warzig-erhaben, höckerig; Bl. gelb; ☉; 7 bis 10; ↕; ♆; Vaterland: Aſien.

—. XXII., 4; Meldenpfl.: *Spinacĭa oleracĕa L.; ſ. Nr. 556.

—. „ „ *Sp. inērmis Mnch.; ſ. Nr. 557.

b. In Blumen- und Luſtgärten, Anlagen u. dergl.

—. II., 1; Lippenblümler: Salvĭa officinālis L.; ſ. Nr. 2016.

—. V., 1; Sperrkrautpfl.: Polemonĭum coerulĕum L.; ſ. Nr. 1200.

—. V., 1; Glockenblümler: Campanŭla pyramidālis L.; ſ. Nr. 2227.

—. V., 1; Rebenpfl.: *Ampelōpsis quinquefolĭa R. et Sch.; ſ. Nr. 2174.

—. V., 3; Terebintenpfl.: *Rhus cotĭnus L.; ſ. Nr. 2017.

—. „ „ *Rh. toxicodēndron L.; ſ. Nr. 1064.

—. „ „ *Rh. typhīna L.; ſ. Nr. 2018.

2979. „ „ *Rh. coriarĭa L. Gerber-Sumach (Goldholz, Eſſigbaum). Bltr. 5- bis 7parig, Bltchn. ellipt.; Stiel am Ende geflüg.; Bl. diklniſch, in gedrängten Riſpen; Fr. eif., purpurn, zott.; ♄; 7 bis 8; ↕; ⫩; ♃; ⚓; Vaterland: Südeuropa.

—. VI., 1; Lilienpfl.: Lilĭum candĭdum L.; ſ. Nr. 2253.

—. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus barbātus L.; ſ. Nr. 2511.

—. „ „ D. caryophўllus L.; ſ. Nr. 1354.

—. „ „ D. plumarĭus L.; ſ. Nr. 2428.

—. X., 3; „ Silēne armerĭa L.; ſ. Nr. 2550.

—. XII., 1; Mirtenpfl.: Myrtus commūnis L.; ſ. Nr. 1849.

—. XII., 2; Roſenpfl.: Spiraea salicifolĭa L.; ſ. Nr. 1100.

—. XII., 3; „ *Rosa centifolĭa L.; ſ. Nr. 1212.

—. XIII., 1; Linde: Tilĭa parvifolĭa Ehrh.; ſ. Nr. 2061.

—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: *Nigēlla damascēna L.; ſ. Nr. 559.

—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: Aquilegĭa vulgāris L.; ſ. Nr. 1179.

—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: *Delphinium ajacis L.; ſ. Nr. 1398.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Adōnis autumnālis L.; ſ. Nr. 1302.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Lavandŭla spica L.; ſ. Nr. 2492.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Melissa officinālis L.; ſ. Nr. 2188.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Lunaria biennis Mnch.; ſ. Nr. 309.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Ibēris umbellāta L.; ſ. Nr. 1551.
—. XV., 2; „ Matthiōla incāna R. Br.; ſ. Nr. 108.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Coronilla emĕrus L.; ſ. Nr. 773.

c. In Plantagen, Obſtgärten u. dergl.:

—. XII., 2; Roſenpfl.: Mespĭlus germanĭca L.; ſ. Nr. 1018.
2980. XVIII., 1; Goldapfel: *Citrus medĭca Riss. Zedrat (echte Zitrone). Blattſt. nicht geflüg.; Bltr. eif., langzugeſp.; Bl. 30- bis 40männig, weiß; Fr. längl.-eif., ſpitzgenabelt, gelb; ♄; 7 bis 8; ⚓; ☿; ♌; Ty.; Vaterland: Afrika, Südaſien.*)
2981. XVIII., 1; Goldapfel: *C. limētta Riss. (C. medĭca bergamĭa). Bergamotte (Limette, Süßzitrone). Blattſt. ungeflüg.; Bltr. eif.-rundl., ſägezähn.; Bl. 30männig; Fr. kug., genabelt, ſüßmarkig, feſtrindig; Bl. klein, weiß; ♄; 7 bis 8; ♆; Ty.; Vaterland: Afrika, Südaſien.
2982. XVIII., 1; Goldapfel: *C. limonĭum Riss. (C. medĭca limonĭum). Limone (Sauerzitrone). Blattſt. etwas geflüg.; Bltr. längl., ſpitz, gezähnt; Bl. 30- bis 36männig, weiß; Fr. längl., dünnrindig, ſauermarkig; ♄; 7 bis 8; ♆; ⚓; ☿; Ty.; Vaterland: Nordafrika, Südaſien.**)

*) Malus medica oder assyrica bei Plinius, mediſcher oder aſſyriſcher Apfel, weil Zitronen in Medien und Aſſyrien häufig waren. Zur Zeit des Plinius zog man in Italien mitunter Zitronenbäume in Kübeln; aber andere Sorten oder Arten von Orangen werden nicht erwähnt; hundert Jahre nach Plinius wuchs der Zitronenbaum um Neapel und auf Sardinien häufig im freien Felde, aber die Frucht war noch nicht eßbar; noch hundert Jahre ſpäter, zu den Zeiten des Athenäus, war die Zitrone eßbar geworden.

**) Die Zitronen wurden erſt zur Zeit der erſten römiſchen Kaiſer nach Italien und Griechenland verpflanzt. Schon Athenäus erwähnt die noch jetzt bei den meiſten Völkern und auch bei uns bekannte Sitte, eine Zitrone in der Hand zu tragen, wenn Todten das letzte Geleit gegeben wird. — Die größte Orangerie, d. i. eine Sammlung von Zitronen- und Pomeranzenbäumen, befand ſich früher in Oranienburg, wo man i. J. 1835 auf 25 bis 30 Bäumen 80,000 reife Früchte zälen konnte. — Der Adams- oder Paradiesapfel hat Früchte, deren Schale einen oder mehre Eindrücke hat, als ob eingebiſſen

2983. XVIII., 1; Goldapfel: *C. vulgāris Riss. Pomeranze. Blattstiel geflüg.; Bltr. eilanzettl., zugesp., gekerbt; Bl. 20männig, weiß; Fr. kug., runzelig-dünnrindig, bitterscharfmarkig; ♄; 7 bis 8; ♆; ♃; ⚓; Ty.; Vaterland: Afrika, Südasien.

2984. XVIII., 1; Goldapfel: *C. aurantĭum Riss. Apfelsine (Pomeranze, Orange, Orangen-Agrume). Blattst. schwachgeflüg.; Bltr. eilängl., spitz; Bl. 20männig, weiß; Apfelfr. kug., ungenabelt, oben und unten eingedrückt, rotgelb, nicht buckelig; ♄; 7 bis 8; ♆; ♃; ⚓; Ty.; Vaterland: Afrika, Südasien.

Varirt: Aurantĭa amāra (Bigarrade, bittere Orange oder Pomeranze; Fr. kug., uneben, bitterfaftig), A. dulcis (süße Orange oder Pomeranze; Fr. kug., mehr ellipsoidisch, glatt, süßfaftig), A. sinēnsis (Apfelsine*); Fr. kug., glatt oder gestreift; Saft säuerlich-süß, sehr wohlschmeckend), A. hierochuntĭca Risso (Orange von Jericho; Fr. kugelrund, dünnschalig; Fleisch blutrot, sehr süß).**)

d. Als Beerenobst:

—. XII., 3; Rosenpfl.: Rubus idaeus L.; s. Nr. 396.

e. In Grasgärten:

2985. V., 2; Doldenpfl.: *Levistĭcum officinale Koch (Ligustĭcum levist. L., Levist. paludapifolĭum Aschrsn.). Gebräuchlicher Liebstöckel. St. gestreift; Bl. glänz., einfach- oder dopp.-gefied., mit breit-verk.-eif., spärl. eingeschn.-gezähnten Bltchn., Hülle und Hüllchen vielblättr., hautrand.; Bl. blaßgelb; ♃; 7 bis 8; ♃; ♆; Vaterland: Südeuropa.

---

wäre; daher halten sie die Juden für Früchte des „Baumes der Erkenntniß", von denen Eva und Adam speisten. Sie heißen deshalb auch Judenäpfel und werden von den Juden zur Ausschmückung bei ihren Laubhüttenfesten benutzt und theuer bezalt (à Stück 4 bis 20 Gulden).

*) Die Apfelsinen (Pomesinen) kommen aus Südeuropa zu uns, die wohlschmeckendsten von Malta, wohin der Baum durch die Portugiesen aus China gebracht wurde. In London werden jährlich etwa hundert Millionen Stück verkauft, von den Azoren 650 Millionen nach den brittischen Inseln ausgeführt.

**) Der erste Pomeranzenbaum kam im Jahre 1518 aus Ostindien nach Lissabon. Jetzt bildet die Orange in Spanien ganze Wälder. Die Orangen heißen auch „Hesperidenfrüchte", weil die Hesperiden, die Nimfen oder Töchter der Nacht, auf einer Insel am äußersten Rande der Erde in einem Garten mit goldenen Aepfeln wohnten, die ein furchtbarer Drache hütete, der aber von Herkules getödet wurde, um die Aepfel (Pomeranzen, nicht Quitten, wie Wallroth behauptet) nach Griechenland zum Eurysteus zu bringen!

f. Als Arzneigewächs:

—. V., 1; Wegdornpfl.: *Zizyphus vulgāris Lmk.; ſ. Nr. 2015.

g. In Weinbergen:

—. V., 1; Rebenpfl.: *Vitis vinifĕra L; ſ. Nr. 2014.

U[1]. Schmarotzer: §. 522.

a. Auf Leguminoſen, Ziſtineen, Galien, Labiaten:

—. XIV., 2; Braunſchupper: Orobānche cruēnta Bertol.; ſ. Nr. 2031.

b. Auf Cardŭus deflorātus:

—. XIV., 2; Braunſchupper: O. sautēri F. Schultz; ſ. Nr. 2032.

—. XIV., 2; Braunſchupper: O. scabiōsae Koch; ſ. Nr. 2034.

c. Auf Scabiōsa columbarĭa et sylvatĭca:

—. XIV., 2; Braunſchupper: O. scabiōsae Koch; ſ. Nr. 2034.

d. Auf Centaurēa scabiōsa:

—. XIV., 2; Braunſchupper: O. scabiōsae Koch; ſ. Nr. 2034.

e. Auf Labiaten, Helianthĕmum, Cytĭsus, Geranĭum:

—. XIV., 2; Braunſchupper: O. epithymum DC.; ſ. Nr. 2035.

f. Auf Rubiaceen, Pimpinēlla saxifrăga, Teucrĭum chamaedrys et montāna, Thymus:

—. XIV., 2; Braunſchupper: O. vulgāris Poir.; ſ. Nr. 2036.

g. Auf Artemisĭa campēstris:

2986. XIV., 2; Braunſchupper: O. arenarĭa Borkh. (Phelipaea aren. Walpers). Sand-S. K. pfrieml.-5zähn.; Zipf. der Lippen ſtumpf; Nabt der Staubb. wollharig; ſonſt wie Nr. 2045; 2; 7 bis 8.

—. XIV., 2; Braunſchupper: O. loricāta Rchb.; ſ. Nr. 2038.

—. " " O. caerulēscens Steph.; ſ. Nr. 2044.

h. Auf Picris hieracioīdes:

—. XIV., 2; Braunſchupper: O. loricāta Rchb.; ſ. Nr. 2038.

i. Auf Korbblütlern, Labiaten, Anemonen, Ziſtineen, Doldenpflanzen:

2987. XIV., 2; Braunſchupper: O. flava Mart. Gelbe Sommerwurz. Kbltchn. 1- oder ſchwach-3nervig, von halber

Krlänge; Kr. röhrig-glock., über den Rücken gekrümmt, Oberl. 2lapp., Lappen zurückgeschl.; Stbgf. fast in der halben Röhre eingefügt, bis zur Mitte dicht-behart; Narbe wachsgelb; 4; 7; Süddeutschl., A.

k. Auf Berbĕris vulgāris:

2988. XIV., 2; Braunschupper: O. lucōrum A. Br. Hain-S. Kbltchn. 2nervig, von Blkrröhrenlänge; Kr. glock., über den Rücken gekrümmt, Oberl. 2lapp., Lappen absteh.; Stbgf. nahe der Röhrenbasis eingefügt, bis zur Mitte dichtharig; Griff. hinten mit violeter Linie; Narbenlappen braungelb; 4; 7; Bay.

l. Auf Rubus caesĭus:

—. XIV., 2; Braunschupper: O. lucōrum A. Br.; s. Nr. 2988.

m. Auf Salvĭa glutinōsa und Teucrĭum montānum:

—. XIV., 2; Braunschupper: O. alpēstris Schultz; s. Nr. 2040.

n. Auf Trifolĭum:

2989. XIV., 2; Braunschupper: O. minor Sutton. Kleine S. Kbltchn. mehrnervig, aus eif. Basis plötzl. schmal-pfrieml. oder in 2 pfrieml. Zipf. gespalten; Blkr. röhrig, sanft gekrümmt, Lippen stumpf-gezähnelt, aderig, wellig, Oberl. 2-lapp., vorwärts-gericht.; Stbf. kahl, an der Basis zerstreut-behart; ♂; 7.

o. Auf Efeu:

—. XIV., 2; Braunschupper: O. minor Sutt.; s. Nr. 2988.
—. „ „ O. barbāta Poir.; s. Nr. 2042.

p. Auf Mören:

—. XIV., 2; Braunschupper: O. barbāta Poir.; s. Nr. 2042.

q. Auf Eryngĭum campēstre:

—. XIV., 2; Braunschupper: O. amethystĕa Thuill.; s. Nr. 2043.

r. Auf Achillēa, Artemisĭa:

—. XIV., 2; Braunschupper: O. caeruleă Vill.; s. Nr. 2045.

s. Auf Hanf, Tabak, Solānum nigrum et dulcamāra u. s. w.:

—. XIV., 2; Braunschupper: O. ramōsa L.; s. Nr. 2046.

t. In Tannenwäldern:

2990. XIV., 2; Braunſchupper: O. neottioïdes Saut. Vogelneſtwurzartige S. K. kürzer als die Blkrröhre, Zähne 1nervig, aus breit-eif. Baſis kurz-pfriemf.-zugeſp.; Blkr. röhrig, gekrümmt, Saum wellig, ſpitz-gezähnelt, Oberl. ungetheilt, Seitenlapp. der Unterl. längl.; ♂; 7 bis 8; Sg.

u. Auf Weidengebüſch:

—. V., 1; Windenpfl.: Cuscūta monogŷna Vahl; ſ. Nr. 2048.

v. Auf Neſſeln, Hanf, Hopfen, Weiden, Wicken, Schlehen u. ſ. w.:

2991. V., 1; Windenpfl.: C. europaea L. (C. major DC., C. vulgāris Pers.). Europäiſche Flachsſeide (Pflanzenſeide, Filzkraut, Kleben, Teufelszwirn, Range, Hopfenſeide, Leinwolle). St. äſtig; Blkrröhre von Saumlänge, Schuppen in derſelben aufr.-angedr.; Bl. rötlich, in kug. Knäueln; Eierſtock kegelf.; ⊙; 7 bis 9; ×.

Varirt: C. urticeārum (innere Kronſchuppen 2- bis 3-ſpalt.; Stbf. gleichbreit, von dopp. Antherenlänge), C. viciĕae Schönheit (innere Kronſchuppen vielſpalt.; Stbf. an der Baſis breiter, von Antherenlänge).

w. Auf Neſſeln, Hopfen, Weiden:

2992. V., 1; Windenpfl.: C. schkuhriāna Pfeiff. (C. major Bauh.). Schuppenloſe F. Innere Kronſchuppen völlig fehlend; Eierſtock rein eif.; ſonſt wie vor.; ⊙; 7 bis 8.

x. Auf Lein:

2993. V., 1; Windenpfl.: C. epilīnum Weihe (C. major Ziz. et Koch, C. vulgāris Presl.). Gemeine F. (Flachswürger, Teufelszwirn, Pflanzenſeide, Filzkraut, Kleben, Leinwolle, Leinſeide). St. meiſt einfach, fadenf., glatt; Blkrröhre von dopp. Saumlänge, mit aufr.-angedr. Schuppen; Bl. weiß; K. 5theil., ſtumpf, faſt länger als die kug.-napff., 1/3-5ſpalt. Blkr.; ⊙; 7 bis 8; ×.

y. Auf Quendel, Heide, Ginſter, Wicken, Gras u. ſ. w.:

—. V., 1; Windenpfl.: C. epithўmum Sm.; ſ. Nr. 2049.

z. Auf Colutĕa arborēscens u. a. Pflanzen:

2994. V., 1; Windenpfl.: C. planiflōra Ten. Flachblumige F. St. fadenf., glatt, äſtig; Kr. weitglock., über 1/2-tief-5ſpalt., mit 5, an die becherf. Röhre angedr. Schuppen; ⊙: 7; Ty.

a¹. Auf Baumwurzeln:

—. X., 1; Ohnblattpfl.: Monotrŏpa hypopĭtys L.; ſ. Nr. 2050.

—. XX., 1; Orchidee: Neottĭa nidus avis Rich.; ſ. Nr. 1071.

b¹. Auf Buchenwurzeln:

—. X., 1; Ohnblattpfl: Monotrŏpa hypophegĕa Wallr.; ſ. Nr. 2051.

Auguſt.

§. 523. **A. In Wäldern:**

—. III., 1; Baldrianpfl.: Valeriāna officinālis L.; ſ. Nr. 998.
—. III., 2; Graspfl.: Poa nemorālis L.; ſ. Nr. 1002.
—. „ „ Elўmus europaeus L.; ſ. Nr. 1004.
—. IV., 1; Kardenpfl.: Scabiōsa transylvanĭca L.; ſ. Nr. 2052.
—. „ Krapppfl.: Galĭum sylvēstre Poll.; ſ. Nr. 1005.
—. „ „ G. mollūgo L.; ſ. Nr. 1006.
—. V., 1; Nachtſchattenpfl.: Atrŏpa belladōnna L.; ſ. Nr. 2053.
—. „ Enzianpfl.: Erythraea centaurĭum Rich.; ſ. Nr. 1009.
—. V., 2; Doldenpfl.: Trinĭa kitaibelĭi M. B.; ſ. Nr. 2054.
—. „ „ Aegopodĭum podagrarĭa L.; ſ. Nr. 1012.
—. „ „ Bupleurum affīne Sadl.; ſ. Nr. 2055.
—. „ „ Athamānta sibirĭca L.; ſ. Nr. 2056.
—. „ „ Selīnum carvifolĭa L.; ſ. Nr. 2057.
—. „ „ Pastināca satīva L.; ſ. Nr. 2058.
—. „ „ Laserpitĭum prutheničum L.; ſ. Nr. 2059.
—. VI., 3; Knöterichpfl.: Rumex sanguinĕus L.; ſ. Nr. 1014.
—. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus supērbus L.; ſ. Nr. 1016.
—. XII., 3; Roſenpfl.: Tormentīlla erēcta L.; ſ. Nr. 1082.
—. „ „ Rubus idaeus L.; ſ. Nr. 396.
—. XIII., 2; Giftroſenpfl.: Cimicifŭga foetĭda L.; ſ. Nr. 2062.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Ranuncŭlus lanunigōsus L.; ſ. Nr. 1023.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Melīssa calamīntha L.; ſ. Nr. 2063.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Chaitūrus marrubiāstrum Rchb.; ſ. Nr. 2064.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Stachys sylvatĭca L.; ſ. Nr. 1026.
—. „ „ Betonĭca officinālis L.; ſ. Nr. 1027.

—. XIV., 2; Rachenblümler: Digitālis ambigŭa Murr.; ſ. Nr. 1024.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Melampўrum pratēnse L.; ſ. Nr. 2066.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum bohemĭcum L.; ſ. Nr. 1028.
—. XVII., 2; Erdrauchpfl.: Corydălis claviculāta Pers.; ſ. Nr. 1029.
2995. XVII., 4; Hülſenpfl.: Cytĭsus ramentacĕus Sieb. (C. fragrans Weld., C. weldēni Vis.). Zerſtückelter Geiſsklee. Bltr. gegenſt., lang-geſtielt, 3fing., nebſt den Stielen faſt völlig kahl; Bl. nebſt den K. gelb; Hülſe kahl; ♄; 8 bis 9; +; Kr.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolĭum pratēnse L.; ſ. Nr. 1032.
—. „ „ T. medĭum L.; ſ. Nr. 1033.
—. „ „ Lathўrus sylvēstris L.; ſ. Nr. 1036.
—. „ „ L. hetĕrophўllus L.; ſ. Nr. 2067.
—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperĭcum perforātum L.; ſ. Nr. 2068.
—. XVIII., 2; Hartheupfl.: H. quadrangŭlum Fr.; ſ. Nr. 2069.
—. „ „ H. montānum L.; ſ. Nr. 1037.
—. „ „ H. hirsūtum L.; ſ. Nr. 2070.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum sylvatĭcum Lamk.; ſ. Nr. 1038.
—. XIX., 1; Korbblütler: H. tridentātum Fr.; ſ. Nr. 2071.
2996. „ „ H. boreāle Fr. (H. sylvēstre Tausch, H. sabaudum L. flor. suec.). Nördliches Habichtskraut. Obere Bltr. eif.-lanzettl., faſt ſitz., untere ſitz. oder kurzgeſtielt; Köpfchen an der Baſis eif., nackt, kahl oder behart; Hüllblthn. angedr.; Narbe braun, endl. ſchwärzl.; Bl. gelb; 2♃; 8 bis 10; häufig.
—. XIX., 1; Korbblütler: Lactūca murālis Gaertn.; ſ. Nr. 2072.
—. XIX., 1; Korbblütler: L. quercīna L.; ſ. Nr. 1039.
—. „ „ Serratŭla tinctorĭa L.; ſ. Nr. 2073.
—. „ „ Cardŭus defloratus L.; ſ. Nr. 2074.
—. XIX., 2; „ Senecĭo jacobaea L.; ſ. Nr. 2075.
—. „ „ Gnaphalĭum sylvatĭcum L.; ſ. Nr. 3051.
—. XIX., 2; Korbblütler: Carpesĭum abrotanoĭdes L.; ſ. Nr. 2076.
—. XIX., 2; Korbblütler: Solidāgo virgo-aurĕa L.; ſ. Nr. 2077.
2997. „ „ *S. procēra Soland. Schlanke Goldrute. St. aufr., rauhharig; Bltr. lanzettl., ſäge-

zähn., 3nervig, oberſ. ſcharf, unterſ. zott.; Blütentrauben vor der Blüte nickend; Köpfchen ſehr klein; Stral kurz; Bl. gelb; 4; 8 bis 9; Pogelwald b. Müllheim, Plauen im Oberrheinkr.; Vaterland: Nordamerika.

2998. XIX., 2; Korbblütler: Galatella cana Nees. (Aster canus W. et K.). Grauharige Galatelle. Grau-weichwollig; St. von der Mitte an doldentraub.-äſtig; Bltr. lanzettlängl., weichſtachelſp., ganzrand., 3nervig, punkt.; Stralbl. violet oder lila, faſt dopp. ſo lang als die gelben Scheibenbl.; 4; 8; Mä. (Faſanwäldchen b. Mönitz).

—. XXI., 1; Giftmilcher: Euphorbia stricta Sm.; ſ. Nr. 1041.

—. XXII., 3; Zauberpfl.: Osyris alba L.; ſ. Nr. 1044.

a. In feuchten Wäldern:

—. II., 1; Rachenblümler: Veronica serpyllifolia L.; ſ. Nr. 424.

—. II., 1; Nachtkerzenpfl.: Circaea alpina L.; ſ. Nr. 1062.

2999. III., 2; Graspfl.: Leersia oryzoides Swarz (Phalaris oryz. L., Oryza clandestina A. Br.). Reisartige Leerſie (wilder Reis). Bltr. ſehr rauh; Riſpe abſteh.; Aeſte ſchlängelig; Aehrchen 3männig, halboval, gewimp.; Blattſch. zum theil Riſpe verſchließ.; 4; 8 bis 9.

—. III., 2; Graspfl.: Molinia coerulea Mnch.; ſ. Nr. 2112.

— „ „ Triticum caninum L.; ſ. Nr. 1047.

—. V., 1; Schlüſſelblümler: Lysimachia nemorum L.; ſ. Nr. 1048.

—. V., 1; Glockenblümler: Wahlenbergia hederacea Rchb.; ſ. Nr. 2113.

—. V., 1; Schnabelpfl.: Impatiens noli tangere L.; ſ. Nr. 2114.

—. V., 2; Doldenpfl.: Angelica sylvestris L.; ſ. Nr. 2115.

—. VI., 1; Semede: Juncus acutiflorus Ehrh.; ſ. Nr. 2116.

—. „ „ J. uliginosus Roth; ſ. Nr. 1050.

—. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygonum hydropiper L.; ſ. Nr. 2117.

—. VIII., 1; Knöterichpfl.: P. minus Huds.; ſ. Nr. 2118.

—. „ Nachtkerzenpfl.: Epilobium parviflorum Schreb.; ſ. Nr. 2119.

—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: E. montanum L.; ſ. Nr. 2120.

—. „ „ E. virgatum Fr.; ſ. Nr. 2121.

—. X., 2; Nelkenblütler: Dianthus superbus L.; ſ. Nr. 1016.

—. XIV., 1; Lippenblümler: Scutellaria galericulata L.; ſ. Nr. 2122.

—. XIV., 1; Lippenblümler: Sc. hastifolia L.; ſ. Nr. 2123.

—. XIV., 1; Lippenblümler: Galeōpsis versicŏlor Curt.; ſ. Nr. 2124.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum palūstre L.; ſ. Nr. 1057.
—. „ „ G. robertiānum L.; ſ. Nr. 431.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolĭum spadicĕum L.; ſ. Nr. 1058.
—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperĭcum montānum L.; ſ. Nr. 1037.
—. XIX., 1; Korbblütler: Cirsĭum palūstre Scop.; ſ. Nr. 1059.
—. XIX., 2; „ Senecĭo doria L.; ſ. Nr. 2126.
—. XX., 1; Orchidee: Spirānthes aestivālis Rich.; ſ. Nr. 1060.

b. In lichten Wäldern:

—. II., 1; Lippenblümler: Salvĭa glutinōsa L.; ſ. Nr. 2106.
—. IV., 1; Krapppfl.: Galĭum boreāle L.; ſ. Nr. 2081.
—. V., 1; Rachenblümler: Verbascum thapsus L.; ſ. Nr. 2107.
—. VI., 3; Knöterichpfl.: Rumex acetōsa L.; ſ. Nr. 1074.
—. VIII., 1; Heidepfl.: Callūna vulgāris Salisb.; ſ. Nr. 1075.
—. „ Nachtkerzenpfl.: Epilobĭum angustifolĭum L.; ſ. Nr. 2085.
—. XII., 3; Roſenpfl.: Geum urbānum L.; ſ. Nr. 1077.
—. „ „ Rubus idaeus L.; ſ. Nr. 396.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Melīssa clinopodĭum Benth.; ſ. Nr. 2108.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Galĭum pubēscens Bess.; ſ. Nr. 2109.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum murōrum L.; ſ. Nr. 447.
—. „ „ H. rigĭdum Hoffm.; ſ. Nr. 2094.
—. „ „ Hypochoeris maculāta L.; ſ. Nr. 2111.
—. XIX., 2; Korbblütler: Senecĭo sylvatĭcus L.; ſ. Nr. 1080.

c. In ſchattigen Wäldern:

—. II., 1; Nachtkerzenpfl.: Circaea alpīna L.; ſ. Nr. 1062.
—. III., 2; Graspfl.: Bromus asper Murr.; ſ. Nr. 1063.
—. „ „ Tritĭcum canīnum L.; ſ. Nr. 1047.
—. VI., 3; Knöterichpfl.: Rumex obtusifolĭus L.; ſ. Nr. 2104.
—. X., 1; Heidepfl.: Chimaphīla umbellāta Nutt.; ſ. Nr. 1066.
—. XII., 3; Roſenpfl.: Tormentīlla reptans L.; ſ. Nr. 1068.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Scrophularĭa nodōsa L.; ſ. Nr. 1069.
—. XX., 1; Orchidee: Epipogĭum gmelīni Rich.; ſ. Nr. 2105.

d. In ſonnigen Wäldern:

—. V., 2; Doldenpfl.: Peucedānum cervarĭa Cuss.; ſ. Nr. 2132.

e. In trocknen Wäldern:

—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Trifolium agrarium L.; s. Nr. 1084.

f. Auf trocknen Waldplätzen:

—. V., 1; Rachenblümler: Verbascum phoeniceum L.; s. Nr. 2131.

g. An feuchten, schattigen Waldstellen:

—. II., 1; Nachtkerzenpfl.: Circaea lutetiana L.; s. Nr. 2127.
—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: Epilobium angustifolium L.; s. Nr. 2085.
—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: E. montanum L.; s. Nr. 2120.

h. In steinigen, rauhen Wäldern:

—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Cytisus austriacus L.; s. Nr. 1093.

i. An steinigen Waldstellen:

—. XIV., 2; Rachenblümler: Antirrhinum majus L.; s. Nr. 1091.

k. An sumpfigen Waldstellen:

—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hypericum tetrapterum Fr.; s. Nr. 2128.

l. Auf Mor- und Torfboden in Wäldern:

—. VI., 1; Semede: Juncus squarrosus L.; s. Nr. 1141.

m. Auf sandigen Stellen lichter Waldungen:

—. V., 1; Glockenblümler: Jasione perennis Lmk.; s. Nr. 1096.

n. Auf Mergel- und Thonboden:

—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Trifolium ochroleucum L.; s. Nr. 1140.

o. Auf Waldblößen:

—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: Epilobium angustifolium L.; s. Nr. 2085.
—. X., 2; Nelkenblütler: Dianthus armeria L.; s. Nr. 2133.
—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Trifolium agrarium L.; s. Nr. 1084.

p. An Meilerstellen:

—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: Epilobium angustifolium L.; s. Nr. 2085.

q. An Gräben:

—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: E. roseum Schrk.; s. Nr. 2129.

r. An Bächen:

—. V., 2; Doldenpfl.: Chaerophyllum hirsūtum L. Nr. 2130.

s. An ſandigen, naſſen Waldſtellen:

—. V., 1; Schlüſſelblümler: Lysimachĭa nemŏrum L.; ſ. Nr. 1048.

t. Auf feuchten Waldäckern:

—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperĭcum humifūsum L.; ſ. Nr. 2134.

u. Auf Waldtriften:

—. V., 1; Glockenblümler: Jasiōne perēnnis Lmk.; ſ. Nr. 1096.
—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperĭcum quadrangŭlum Fr.; ſ. Nr. 2069.

v. Auf Grasplätzen an Waldrändern:

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolĭum agrarĭum L.; ſ. Nr. 1084.

w. Auf Waldwieſen:

—. III., 2; Graspfl.: Holcus mollis L.; ſ. Nr. 1132.
—. „ „ Molinĭa coerulĕa Mnch.; ſ. Nr. 2112.
—. V., 2; Doldenpfl.: Cnidĭum venōsum Koch; ſ. Nr. 2135.
—. „ „ Laserpitĭum pruthenĭcum L.; ſ. Nr. 2059.
—. VI., 1; Semede: Juncus atrātus Krock.; ſ. Nr. 2136.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygŏnum bistōrta L.; ſ. Nr. 1139.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Melampўrum pratēnse L.; ſ. Nr. 2066.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum sanguinĕum L.; ſ. Nr. 486.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolĭum ochroleucum L.; ſ. Nr. 1140.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: T. spadicĕum L.; ſ. Nr. 1058.
—. XIX., 1; Korbblütler: Serratŭla tinctorĭa L.; ſ. Nr. 2073.

x. Auf feuchten Waldwieſen:

—. V., 2; Doldenpfl.: Hydrocotўle vulgāris L.; ſ. Nr. 2137.

y. In Bergwäldern:

—. XIV., 2; Rachenblümler: Euphrasĭa lutĕa L.; ſ. Nr. 2138.
—. XX., 1; Orchidee: Epipāctis latifolĭa Sw.; ſ. Nr. 2139.

z. In ſchattigen Bergwäldern:

—. II., 1; Nachtkerzenpfl.: Circaea intermedĭa Ehrh.; ſ. Nr. 2140.

a¹. In lichten Bergwäldern:

—. IV., 1; Kardenpfl.: Scabiōsa sylvatĭca L.; ſ. Nr. 2141.
—. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus superbus L.; ſ. Nr. 1016.
—. X., 5; Dickblattpfl.: Sedum telephĭum L.; ſ. Nr. 2142.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Ervum sylvatĭcum Peterm.; ſ. Nr. 1148.

b¹. In Gebirgswäldern:

—. III., 1; Baldrianpfl.: Valeriāna montāna L.; ſ. Nr. 1153.
—. IV., 1; Krappfl.: Asperŭla tinctorĭa L.; ſ. Nr. 2143.
—. „ „ Galĭum sylvatĭcum L.; ſ. Nr. 2144.
—. „ „ G. aristātum L.; ſ. Nr. 1154.
—. V., 1; Nachtſchattenpfl.: Atrŏpa belladōnna L.; ſ. Nr. 2053.
—. V., 2; Doldenpfl.: Astrantĭa major L.; ſ. Nr. 1157.
—. „ „ Heraclĕum sibirĭcum L.; ſ. Nr. 2145.
—. „ „ H. alpīnum L.; ſ. Nr. 2146.
—. „ „ Laserpitĭum latifolĭum L.; ſ. Nr. 1158.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Dracocephălum moldavĭca L.; ſ. Nr. 2147.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Stachys alpīna L.; ſ. Nr. 1160.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Digitālis purpurĕa L.; ſ. Nr. 1170.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Scrophularĭa scopolĭi Hoppe; ſ. Nr. 2148.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Lathўrus heterophўllus L.; ſ. Nr. 2067.
—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperĭcum pulchrum L.; ſ. Nr. 1029.
—. XIX., 1; Korbblütler: Prenānthes purpurĕa L.; ſ. Nr. 2149.
—. XIX., 2; Korbblütler: Senecĭo nemorēnsis L.; ſ. Nr. 2150.

c¹. In feuchten Gebirgswäldern:

—. V., 1; Schlüſſelblümler: Cyclămen europaeum L.; ſ. Nr. 288.
—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: Aconītum stoerkeānum Rchb.; ſ. Nr. 1168.
—. XXI., 1; Giftmilcher: Euphorbĭa procēra M. B.; ſ. Nr. 1169.

d¹. In ſteinigen Gebirgswaldungen:

—. XIV., 2; Nachenblümler: Digitālis purpurĕa L.; ſ. Nr. 1170.

e¹. In ſchattigen Gebirgswäldern:

—. II., 1; Nachtkerzenpfl.: Circaea alpīna L.; ſ. Nr. 1062.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum lucĭdum L.; ſ. Nr. 504.

f¹. In ſchattigen, moſigen Gebirgswaldungen:

—. IV., 1; Krapppfl.: Galĭum rotundifolĭum L.; ſ. Nr. 2151.

g¹. In hohen Gebirgswäldern:

—. V., 1; Schlüſſelblümler: Soldanēlla montāna Willd.; ſ. Nr. 496.
—. VI., 3; Zeitloſenpfl.: Verātrum nigrum L.; ſ. Nr. 2152.

h¹. Am Rande der Gebirgswälder:

—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: Aconītum lycoctŏnum L.; ſ. Nr. 2153.

i¹. Auf Bergweiden in Wäldern:

—. XX., 1; Orchidee: Epipăctis latifolĭa Sw.; ſ. Nr. 2139.

k¹. An Waldrändern:

—. III., 1; Baldrianpfl.: Valeriāna officinālis L.; ſ. Nr. 998.
—. III., 2; Graspfl.: Calamagrōstis montāna Host; ſ. Nr. 1102.
—. III., 2; Graspfl.: Dactўlis glomerāta L.; ſ. Nr. 1104.
—. „ „ Brachypodĭum pinnātum P. B.; ſ. Nr. 2078.
—. IV., 1; Kardenpfl.: Dipsăcus pilŏsus L.; ſ. Nr. 2079.
—. „ „ Scabiōsa columbarĭa L.; ſ. Nr. 2080.
—. „ Krapppfl.: Galĭum sylvēstre Poll.; ſ. Nr. 1005.
—. „ „ G. mollūgo L.; ſ. Nr. 1006.
—. „ „ G. boreāle L.; ſ. Nr. 2081.
—. V., 1; Nachenblümler: Verbāscum nigrum L.; ſ. Nr. 2082.
—. „ Nachtſchattenpfl.: Atrŏpa belladōnna L.; ſ. Nr. 2053.
—. „ Borretſchpfl.: Echĭum vulgāre L.; ſ. Nr. 1108.
—. „ „ Campanŭla trachelĭum L.; ſ. Nr. 1109.
—. V., 2; Doldenpfl.: Athamānta libanōtis L.; ſ. Nr. 2083.
—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: Epilobĭum angustifolĭum L.; ſ. Nr. 2085.
—. X., 2; Nelkenblütler: Dianthus carthusianōrum L.; ſ. Nr. 459.

—. X., 2; Nelkenblütler: D. seguierĭi Vill.; ſ. Nr. 2086.
—. „ „ D. deltoīdes L.; ſ. Nr. 1111.
—. X., 3; „ Melandrĭum pratēnse Roehl.; ſ. Nr. 1113.
—. X., 5; Nelkenblütler: Cerastĭum vulgātum L. spec.; ſ. Nr. 463.
—. XI., 2; Roſenpfl.: Agrimonĭa eupatorĭa L.; ſ. Nr. 1114.
—. „ „ A. procēra Wallr.; ſ. Nr. 1115.
—. XII., 3; „ Rubus idaeus L.; ſ. Nr. 396.
—. XIII., 1; Sonnenröslein: Helianthĕmum vulgāre Gaertn.; ſ. Nr. 1120.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Origănum vulgāre L.; ſ. Nr. 2087.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Thymus serpyllum L.; ſ. Nr. 2088.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Lamĭum album L.; ſ. Nr. 169.
—. „ „ Teucrĭum scorodonĭa L.; ſ. Nr. 2090.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Melampyrum pratēnse L.; ſ. Nr. 2066.
—. XVI., 5; Pappelroſenpfl.: Lavatēra thuringiăca L.; ſ. Nr. 2092.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Medicāgo lupulīna L.; ſ. Nr. 468.
—. „ „ Trifolĭum hybrĭdum L.; ſ. Nr. 469.
—. „ „ T. agrarĭum L.; ſ. Nr. 1084.
—. „ „ Lathyrus platyphyllus Retz.; ſ. Nr. 2093.
—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperīcum hirsūtum L.; ſ. Nr. 2070.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum murōrum L.; ſ. Nr. 447.
—. „ „ H. rigĭdum Hoffm.; ſ. Nr. 2094.
—. „ „ H. umbellātum L.; ſ. Nr. 2095.
3000. „ „ H. virēscens Sond. Grünliches Habichtskraut. St. dicht-beblätt.; Bltr. ſitz., eif. oder lanzettl., in der Mitte gezähnt, unterſ. oft 3nervig; Köpfchen in zſgezog. Doldentrauben, deren Stiele an der Baſis beblätt. ſind; Hauptkelch kahl, während der Bl. kreiſelf.; innere Hüllblttchn. weißrand.; Bl. gelb; 24; 8 bis 9; Hamb., S.-H.*).
—. XIX., 1; Korbblütler: Chondrilla juncĕa L.; ſ. Nr. 2096.
—. „ „ Hypochoeris radicāta L.; ſ. Nr. 1126.
—. „ „ Lampsāna communis L.; ſ. Nr. 1128.

*) Bildet den Uebergang von H. tridentatum Fr. zu H. sabaudum All.!

—. XIX., 1; Korbblütler: Cirsĭum acaule All.; ſ. Nr. 2097.
—. „ „ C. setōsum L.; ſ. Nr. 2098.
—. „ „ Cardŭus crispus L.; ſ. Nr. 2099.
—. XIX., 2; „ Senecĭo sylvatĭcus L.; ſ. Nr. 1080.
—. „ „ S. erucaefolĭus Huds.; ſ. Nr. 2100.
—. „ „ Leucanthĕmum vulgāre Lmk.; ſ. Nr. 1130.
—. XIX., 2; Korbblütler: Achillēa millefolĭum L.; ſ. Nr. 2101.
—. „ „ Solidāgo virgo-aurĕa L.; ſ. Nr. 2077.
—. „ „ Bellis perēnnis L.; ſ. Nr. 2.
—. XIX., 3; „ Centaurēa scabiōsa L.; ſ. Nr. 1131.
—. XXI., 4; Neſſelpfl.: Urtĭca dioĭca L.; ſ. Nr. 2102.
—. „ „ U. urens L.; ſ. Nr. 1234.
—. XXII., 5; „ Humŭlus lupŭlus L.; ſ. Nr. 2103.

l¹. In trocknen, ſteinigen Wäldern:

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Cytĭsus austriăcus L.; ſ. Nr. 1093.
—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperĭcum pulchrum L.; ſ. Nr. 1089.

m¹. In Wäldern der Ebene:

—. III., 1; Halbgras: Cypērus flavēscens L.; ſ. Nr. 1043.
—. III., 2; Graspfl.: Calamagrōstis sylvatĭca DC.; ſ. Nr. 1144.

B. In Hainen: §. 524.

—. II., 1; Rachenblümler: Veronĭca officinālis L.; ſ. Nr. 997.
—. III., 1; Baldrianpfl.: Valeriāna officinālis L.; ſ. Nr. 998.
—. III., 2; Graspfl.: Agrōstis stolonifĕra L.; ſ. Nr. 2154.
—. „ „ Poa nemoralis L.; ſ. Nr. 1002.
—. „ „ Tritĭcum canīnum L.; ſ. Nr. 1047.
—. IV., 1; Krapppfl.: Galĭum sylvēstre Poll.; ſ. Nr. 1005.
—. „ „ G. aparīne L.; ſ. Nr. 2155.
—. V., 2; Doldenpfl.: Aegopodĭum podagrarĭa L.; ſ. Nr. 1012.
—. V., 2; Doldenpfl.: Pimpinēlla magna L.; ſ. Nr. 2157.
—. „ „ Cnidĭum venōsum Koch; ſ. Nr. 2135.
—. „ „ Selīnum carvifolia L.; ſ. Nr. 2057.
—. VI., 1; Semede: Juncus acutiflōrus Ehrh.; ſ. Nr. 2116.
—. XII., 3; Roſenpfl.: Geum urbānum L.; ſ. Nr. 1077.
—. „ „ Tormentilla erēcta L.; ſ. Nr. 1082.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Clemātis vitālba L.; ſ. Nr. 2158.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Lamĭum album L.; ſ. Nr. 169.
—. „ „ Galeōpsis versicŏlor Curt.; ſ. Nr. 2124.

—. XIV., 1; Lippenblümler: Stachys sylvatĭca L.; ſ. Nr. 1026.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Teucrĭum scorodonĭa L.; ſ. Nr. 2090.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum sanguinĕum L.; ſ. Nr. 486.
—. XVI., 5; Pappelroſenpfl.: Lavatēra thuringiăca L.; ſ. Nr. 2092.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum pilosēlla L.; ſ. Nr. 1181.
—. XIX., 1; Korbblütler: H. sylvatĭcum Lmk.; ſ. Nr. 1038.
—. „ „ H. umbellātum L.; ſ. Nr. 2095.
—. „ „ H. boreāle Fr.; ſ. Nr. 2996.
—. „ „ Lactūca murālis Gaertn.; ſ. Nr. 2072.
—. XIX., 2; Korbblütler: Senecīo erucaefolĭus Huds.; ſ. Nr. 2100.
—. XXI., 4; Neſſelpfl.: Urtīca dioĭca L.; ſ. Nr. 2102.
—. „ „ U. urens L.; ſ. Nr. 1234.
—. XXI., 5; Meldenpfl.: Atrĭplex angustifolĭum Sm.; ſ. Nr. 2159.

a. Am Rande der Haine:

—. XIV., 1; Lippenblümler: *Leonūrus cardiăca L.; ſ. Nr. 1182.

b. In feuchten Hainen:

—. V., 2; Doldenpfl.: Peucedănum palūstre Mnch.; ſ. Nr. 2160.
—. XII., 2; Roſenpfl.: Spiraea carpīnifolĭa Willd.; ſ. Nr. 2161.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum robertiānum L.; ſ. Nr. 431.

c. In feuchten, ſchattigen Hainen:

—. II., 1; Nachtkerzenpfl.: Circaea lutetiāna L.; ſ. Nr. 2127.

d. In graſigen Hainen:

—. XIX., 3; Korbblütler: Centaurēa nigra L.; ſ. Nr. 2162.

e. In lichten Hainen:

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolĭum agrarĭum L.; ſ. Nr. 1084.

f. In trocknen, ſteinigen Hainen:

—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperīcum pulchrum L.; ſ. Nr. 1089.

g. In Gebirgshainen:

—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: Aconītum lycoctŏnum L.; ſ. Nr. 2153.

—. XIX., 3; Korbblütler: Centaurēa phrygĭa L.; ſ. Nr. 2163.

C. In Nadelwäldern: §. 525.

—. X., 3; Nelkenblütler: Silēne chlorāntha Ehrh.; ſ. Nr. 2164.

—. XIV., 2; Braunſchupper: Orobānche neottioīdes Saut.; ſ. Nr. 2990.

—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum pilosĕlla L.; ſ. Nr. 1181.

a. In Kiefernwaldungen:

—. X., 4; Nelkenblütler: Spergēlla subulāta Rchb.; ſ. Nr. 1188.

—. XI., 5; Dickblattpfl.: Sempervīvum sobolifĕrum Sims.; ſ. Nr. 2167.

b. Auf Humus:

—. X., 1; Heidepfl.: Chimaphīla umbellāta Nutt.; ſ. Nr. 1066.

c. Auf verweſten Nadeln im Moſe:

—. XX., 1; Orchidee: Goodyēra repens R. Br.; ſ. Nr. 2166.

d. In ſchattigen, feuchten, moſigen Nadelwäldern:

—. XIV., 2; Geisblattpfl.: Linnaea borealis Gronov.; ſ. Nr. 2165.

D. In Gebüſchen, Hecken, Zäunen u. dergl.: §. 526.

—. II., 1; Rachenblümler: Veronīca officinālis L.; ſ. Nr. 997.

—. „ Lippenblümler: Salvĭa sylvēstris L.; ſ. Nr. 2168.

—. „ „ S. verticillāta L.; ſ. Nr. 1191.

—. III., 2; Graspfl.: Agrōstis vulgāris With.; ſ. Nr. 2169.

—. „ „ Calamagrōstis epigeios Roth; ſ. Nr. 2170.

—. „ „ C. sylvatĭca DC.; ſ. Nr. 1144.

—. „ „ Arrhenathērum avenacĕum P. B.; ſ. Nr. 1382.

—. III., 2; Graspfl.: Brachypodĭum pinnātum P. B.; ſ. Nr. 2078.

—. III., 2; Graspfl.: Tritĭcum canīnum L.; ſ. Nr. 1047.

3001. „ „ Bromus longiflōrus Willd. Langblütige Treſpe. Bltr. breit-lineal., fein-gewimp.; Riſpe aufr., etwas nickend, Aeſte wagr.-abſt., 1- bis 2ährig; Aehrchen eilanzettl., 7- bis 10blüt., glänz.; Blütenſcheidchen papierartig, mit 1/3 kürzerer Granne; 2; 7 bis 8.

—. IV., 1; Neſſelpfl.: Parietaria officinālis L.; ſ. Nr. 2171.
—. „ Kardenpfl.: Dipsăcus officinālis L.; ſ. Nr. 2172.
—. „ „ D. laciniātus L.; ſ. Nr. 2264.
—. „ „ D. fullōnum L.; ſ. Nr. 2263.
—. „ „ D. pilōsus L.; ſ. Nr. 2079.
—. „ Krapppfl.: Galium sylvēstre Poll.; ſ. Nr. 1005.
—. „ „ G. mollūgo L.; ſ. Nr. 1006.
—. „ „ G. aparīne L.; ſ. Nr. 2155.
—. „ „ *Rubia tinctōrum L.; ſ. Nr. 2173.
—. V., 1; Nachtſchattenpfl.: Hyoscyămus niger L.; ſ. Nr. 1195.
—. „ „ Physālis alkekēngi L.; ſ. Nr. 1196.
—. „ „ Solānum dulcamāra L.; ſ. Nr. 1197.
—. „ „ *Lycium barbărum L.; ſ. Nr. 1204.
—. „ Borretſchpfl.: Cynoglōssum officināle L.; ſ. Nr. 1287.
—. „ „ Echium vulgāre L.; ſ. Nr. 1108.
—. „ Glockenblümler: Campanŭla rotundifolia L.; ſ. Nr. 1288.
—. V., 1; Glockenblümler: C. rapuncŭlus L.; ſ. Nr. 1289.
—. „ „ C. trachelium L.; ſ. Nr. 1109.
—. „ „ C. bononiēnsis L.; ſ. Nr. 2224.
3002. „ „ C. rapunculoides L. Kriechende Glockenblume. St. ſtumpfkant., von kurzen, zurückſteh. Haren ſchärfl.; Bltr. ungleich-geſägt, kurzharig, untere langgeſtielt, längl., obere lanzettl.; Traube endſt., einſeitswendig; Kzipf. lanzettl.; Bl. nick., rötl.-lila; Wrz. kriech.; 4; 7 bis 9; ×; ♆.
—. V., 1; Glockenblümler: Phyteuma canēscens W. et K.; ſ. Nr. 2220.
—. V., 1; Glockenblümler: Jasione montāna L.; ſ. Nr. 1290.
—. „ Bleiwurzpfl.: Plumbāgo europaea L.; ſ. Nr. 3012.
—. „ Veilchenpfl.: Viŏla tricŏlor L.; ſ. Nr. 525.
—. „ Rebenpfl.: *Ampelōpsis quinquefolia R. et Sch.; ſ. Nr. 2174.
—. V., 2; Seidenfrüchtler: Vincetoxicum officināle Mnch.; ſ. Nr. 2175.
—. V., 2; Doldenpfl.: Astrantia major L.; ſ. Nr. 1157.
—. „ „ Aegopodium podagrăria L.; ſ. Nr. 1012.
—. „ „ Pimpinēlla magna L.; ſ. Nr. 2157.
—. „ „ P. saxifrăga L.; ſ. Nr. 2176.
—. „ „ Bupleurum gerărdi Jacq.; ſ. Nr. 2177.
—. „ „ B. affine Sadl.; ſ. Nr. 2055.
3003. „ „ B. falcātum L. Sichelförmiges Haſenöhrchen. St. oberw. äſtig; untere Bltr. ellipt. oder längl., in den Blattſt. verſchmäl., obere lanzettl., an

beiden Enden spitz, sämmtl. nicht durchwachsen; Dolden 6- bis 10stral.; Hüllchen lanzettl., harspitz; Fruchtthälchen nicht körnig; 4; 8 bis 10.*)

—. V., 2; Doldenpfl.: Aethūsa cynapĭum L.; s. Nr. 2178.
—. „ „ Cnidĭum monniēri Cuss.; s. Nr. 2179.
—. „ „ Peucedănum alsatĭcum L.; s. Nr. 1202.
—. „ „ Torĭlis hetĕrophўlla Guss.; s. Nr. 1245.
—. „ „ T. infēsta Rchb.; s. Nr. 2180.
—. „ „ T. helvetĭca Gmel.; s. Nr. 2372.
—. „ „ Conĭum maculātum L.; s. Nr. 2181.
—. VI., 1; Spargelpfl.: Asparăgus acutifolĭus L.; s. Nr. 1206.
—. VI., 3; Knöterichpfl.: Rumex pratēnsis M. et K.; s. Nr. 1208.
—. VI., 3; Knöterichpfl.: R. obtusifolĭus L.; s. Nr. 2104.
—. „ „ R. sanguinĕus L.; s. Nr. 1014.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygŏnum persicarĭa L.; s. Nr. 2182.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: P. dumetōrum L.; s. Nr. 2183.
—. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus seguierĭi Vill.; s. Nr. 2086.
—. „ „ Saponarĭa officinālis L.; s. Nr. 2184.
—. „ „ Vaccarĭa pyramidāta Fl. Wett.; s. Nr. 2185.
—. X., 3; Nelkenblütler: Silēne inflāta Sm.; s. Nr. 1178.
—. „ „ Melandrĭum pratēnse Roehl.; s. Nr. 1113.
—. X., 3; Nelkenblütler: Cucubălus baccifĕrus L.; s. Nr. 2186.
—. X., 5; „ Cerastĭum vulgātum L. spec.; s. Nr. 463.
—. X., 5; Dickblattpfl.: Sedum telephĭum L.; s. Nr. 2142.
—. XI., 2; Rosenpfl.: Agrimonĭa eupatorĭa L.; s. Nr. 1114.
—. XII., 3; „ Geum urbānum L.; s. Nr. 1077.
—. „ „ Rubus idaeus L.; s. Nr. 396.
—. XIII., 1; Mohnpfl.: Chelidonĭum majus L.; s. Nr. 534.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Clemătis viticēlla L.; s. Nr. 535.
—. „ „ Cl. vitālba L.; s. Nr. 2158.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Origănum vulgāre L.; s. Nr. 2087.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Ballōta nigra L.; s. Nr. 1219.
—. „ „ P. alba L.; s. Nr. 1220.
—. „ „ Melĭssa officinālis L.; s. Nr. 2188.

*) Die Form B. trifidum Ten. mit obersten Blättern, welche viel kürzer als die Blütenzweige sind, und mit 3blättriger Hülle, ist in Deutschland nicht selten!

—. XIV., 1; Lippenblümler: M. clinopodĭum Benth.; ſ. Nr. 2108.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Marrubĭum vulgāre L.; ſ. Nr. 2192.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Mentha rotundifolĭa L.; ſ. Nr. 2187.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Betonĭca officinālis L.; ſ. Nr. 1027.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Nepĕta catarĭa L.; ſ. Nr. 1218.
—. „ „ N. nepetēlla L.; ſ. Nr. 2189.
—. „ „ Galeōpsis tetrăhit L.; ſ. Nr. 2190.
—. „ „ G. bifĭda Bönningh.; ſ. Nr. 2191.
—. „ „ G. versicŏlor Curtis; ſ. Nr. 2124.
—. „ „ Lamĭum maculātum L.; ſ. Nr. 190.
—. XIV., 1; Lippenblümler: L. album L.; ſ. Nr. 169.
—. „ „ L. purpurĕum L.; ſ. Nr. 10.
—. „ „ L. incīsum Willd.; ſ. Nr. 206.
—. „ „ Teucrĭum scorodonĭa L.; ſ. Nr. 2845.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Stachys sylvatĭca L.; ſ. Nr. 1026.
—. „ „ *Leonūrus cardiăca L.; ſ. Nr. 1182.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Linarĭa vulgāris Desf.; ſ. Nr. 2193.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Scrophularĭa nodōsa L.; ſ. Nr. 1069.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Lepidĭum ruderāle L.; ſ. Nr. 1224.
—. „ „ Capsēlla bursa pastōris Vent.; ſ. Nr. 3.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum dissēctum L.; ſ. Nr. 538.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: G. divaricātum Ehrh.; ſ. Nr. 2194.
—. „ „ G. molle L.; ſ. Nr. 539.
—. XVI., 5; Pappelroſenpfl.: Althaea hirsūta L.; ſ. Nr. 2195.
—. „ „ A. cannabĭna L.; ſ. Nr. 2196.
—. „ „ Malva sylvēstris L.; ſ. Nr. 1225.
—. „ „ Lavatēra thuringiăca L.; ſ. Nr. 2092.
—. XVII., 2; Erdrauchpfl.: Fumarĭa capreolāta L.; ſ. Nr. 541.
—. XVII., 2; Erdrauchpfl.: Corydălis claviculāta Pers.; ſ. Nr. 1029.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Melilōtus alba Lmk.; ſ. Nr. 2197.

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolium ochroleucum L.; ſ. Nr. 1140.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Vicĭa cracca L.; ſ. Nr. 1228.
—. „ „ V. tenuifolĭa Roth; ſ. Nr. 1229.
—. „ „ Lathўrus tuberōsus L.; ſ. Nr. 2198.
—. „ „ L. platyphўllos Retz.; ſ. Nr. 2093.
—. „ „ L. heterophўllus L.; ſ. Nr. 2067.
—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperĭcum perforātum L.; ſ. Nr. 2068.
—. XVIII., 2; Hartheupfl.: H. montānum L.; ſ. Nr. 1037.
—. „ „ H. hirsūtum L.; ſ. Nr. 2070.
—. XIX., 1; Korbblütler: Helminthĭa echioīdes Gaertn.; Nr. 1232.
—. XIX., 1; Korbblütler: Lampsăna communis L.; ſ. Nr. 1128.
—. XIX., 1; Korbblütler: Lappa minor DC.; ſ. Nr. 2199.
—. „ „ L. major Gaertn.; ſ. Nr. 2200.
—. „ „ L. tomentōsa Lmk.; ſ. Nr. 2201.
—. „ „ Carduus crispus L.; ſ. Nr. 2099.
—. „ „ C. acanthoīdes L.; ſ. Nr. 1233.
—. „ „ Onopōrdon acanthĭum L.; ſ. Nr. 2202.
—. XIX., 2; Korbblütler: Senecĭo erucaefolĭus Huds.; ſ. Nr. 2100.
—. XIX., 2; Korbblütler: S. barbăreaefolĭus Krock.; ſ. Nr. 2203.
—. XIX., 2; Korbblütler: Carpesĭum cernŭum L.; ſ. Nr. 2204.
—. „ „ Artemisĭa vulgāris L.; ſ. Nr. 2205.
—. „ „ Matricarĭa inodōra L.; ſ. Nr. 2206.
—. „ „ Achillēa millefolĭum L.; ſ. Nr. 2101.
—. „ „ Inŭla helenĭum L.; ſ. Nr. 2207.
—. „ „ Solidāgo virgo-aurĕa L.; ſ. Nr. 2077.
—. „ „ Bellis perēnnis L.; ſ. Nr. 2.
—. XIX., 4; „ *Calendŭla officinālis L.; ſ. Nr. 2208.
—. XX., 5; Oſterluzeipfl.: Aristolochĭa clematitis L.; ſ. Nr. 2209.
—. XXI., 4; Neſſelpfl.: Urtĭca dioĭca L.; ſ. Nr. 2102.
—. „ „ U. urens L.; ſ. Nr. 1234.
—. XXI., 5; Meldenpfl.: Atrĭplex hastātum L.; ſ. Nr. 2210.
—. XXI., 5; Meldenpfl.: A. patŭlum L.; ſ. Nr. 2211.
—. „ „ A. angustifolĭum Sm.; ſ. Nr. 2159.
—. XXII., 5; Neſſelpfl.: Humŭlus lupŭlus L.; ſ. Nr. 2103.

a. Unter Weidengebüsch:

—. IV., 1; Krapppfl.: Galium spurium L.; s. Nr. 2217.
—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: Epilobium parviflorum Schreb.; s. Nr. 2119.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Mentha sylvestris L.; s. Nr. 2118.
—. XIX., 2; Korbblütler: *Solidago glabra Desf.; s. Nr. 2219.
—. „ „ Inula salicina L.; s. Nr. 2222.

b. In trocknen Gebüschen:

—. X., 2; Nelkenblütler: Dianthus armeria L.; s. Nr. 2133.

c. An feuchten, nassen Stellen:

—. II., 1; Rachenblümler: Veronica longifolia L.; s. Nr. 2212.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygonum hydropiper L.; s. Nr. 2117.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: P. minus Huds.; s. Nr. 2118.
—. „ Nachtkerzenpfl.: Epilobium montanum L.; s. Nr. 2120.
— VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: E. tetragonum L.; s. Nr. 2215.
—. X., 5; Nelkenblütler: Malachium aquaticum Fr.; s. Nr. 1241.
—. XI., 1; Weiderichpfl.: Lythrum salicaria L.; s. Nr. 1242.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Mentha arvensis L.; s. Nr. 2213.
—. „ „ Stachys ambigua Sm.; s. Nr. 1238.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranium pratense L.; s. Nr. 1244.
—. „ „ G. robertianum L.; s. Nr. 431.
—. XVI., 5; Pappelrosenpfl.: Althaea officinalis L.; s. Nr. 2214.
—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Lotus corniculatus L.; s. Nr. 1239.
—. „ „ Lathyrus pratensis L.; s. Nr. 1240.
—. „ „ L. sylvestris L.; s. Nr. 1036.
—. XIX., 2; Korbblütler: Senecio doria L.; s. Nr. 2126.

d. In Gebüsch auf Sandboden:

—. XIV., 2; Rachenblümler: Digitalis ambigua Murr.; s. Nr. 1024.

e. Unter Gebüsch an fließenden Gewässern:

—. IV., 1; Krapppfl.: Asperula aparine M. B.; s. Nr. 2223.
—. V., 1; Schnabelpfl.: Impatiens noli tangere L.; s. Nr. 2114.

f. An Hecken neben Gärten:

—. V., 2; Meldenpfl.: *Chenopodium ambrosioides L.; s. Nr. 1247.

E. In Gärten (Baum- und Grasgärten, auf Gartenland): §. 527.

—. III., 2; Graspfl.: Andropōgon ischaemum L.; ſ. Nr. 2261.
—. „ „ Setaria verticillata P. B.; ſ. Nr. 1249.
—. „ „ S. viridis P. B.; ſ. Nr. 2249.
—. „ „ Digitaria sanguinalis Scop.; ſ. Nr. 1250.
—. „ „ D. ciliāris Koel.; ſ. Nr. 1251.
—. IV., 1; Krapppfl.: Galium spurium L.; ſ. Nr. 2217.
—. V., 1; Schlüſſelblümler: Anagallis arvensis L.; ſ. Nr. 55.
—. „ Nachtſchattenpfl.: *Datūra stramonium L.; ſ. Nr. 1253.
—. V., 1; Nachtſchattenpfl.: *Solanum nigrum L.; ſ. Nr. 1254.
—. „ Borretſchpfl.: *Borrāgo officinālis L.; ſ. Nr. 2250.
—. „ Glockenblümler: Campanula rapunculoides L.; ſ. Nr. 3002.
—. V., 1; Veilchenpfl.: Viola tricolor L.; ſ. Nr. 525.
—. V., 2; Meldenpfl.: Blitum virgātum L.; ſ. Nr. 2251.
—. „ „ Chenopodium rubrum L.; ſ. Nr. 2228.
— „ „ Ch. hybridum L.; ſ. Nr. 2229.
—. „ „ Ch. album L.; ſ. Nr. 2231.
—. „ „ *Ch. ambrosioides L.; ſ. Nr. 1247.
—. „ „ Ch. vulvaria L.; ſ. Nr. 2232.
—. „ „ Ch. polyspermum L.; ſ. Nr. 2233.
3004. „ „ Ch. ficifolium Sm. Feigenblättriger Gänſefuß. Untere Bltr. faſt ſpießf.-3lapp., mit verläng., längl.-lanzettl., ſtumpfen, faſt ganzrand. Mittellappen, obere lineal.-lanzettl., ganzrand.; Samen glänz., fein-eingedr.-punkt.; St. ſchön-geſtreift, kantig, dick; ⊙; 8; ✕.
3005. V., 2; Meldenpfl.: Corispermum hyssopifolium L. Iſopblättriger Wanzenſame. K. 2blättr.; Fr. rundl.-eif., geflüg., Flüg. nicht durchſicht., am Rande durchſcheinend, an der Spitze 2zähn.; obere Deckbltr. eif., mit häutigem Rande von der halben Breite des grünen Mittelfeldes; Pfl. filz.; ⊙; 8 bis 9; De., Darmſtadt.
—. V., 2; Doldenpfl.: Critāmus falcaria Rchb.; ſ. Nr. 2252.
—. „ „ Aegopodium podagraria L.; ſ. Nr. 1012.
—. „ „ Aethūsa cynapium L.; ſ. Nr. 2178.
—. „ „ Conium maculātum L.; ſ. Nr. 2181.
—. VI., 3; Knöterichpfl.: Rumex pulcher L.; ſ. Nr. 1256.
—. „ „ R. crispus L.; ſ. Nr. 2254.
—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: *Oenothēra biennis L.; ſ. Nr. 2256.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygonum aviculāre L.; ſ. Nr. 2255.

—. VIII., 1; Knöterichpfl.: P. convolvŭlus L.; ſ. Nr. 1257.
—. X., 2; Nelkenblütler: Saponarĭa officinālis L.; ſ. Nr. 2184.
—. X., 3; „ Silēne noctiflōra L.; ſ. Nr. 2257.
—. „ „ Stellarĭa medĭa Vill.; ſ. Nr. 4.
—. X., 5; Schnabelpfl.: *Oxălis stricta Jacq.; ſ. Nr. 1260.
—. „ „ *O. corniculāta L.; ſ. Nr. 1261.
—. XI., 1; Fettkrautpfl.: Portulāca oleracĕa L.; ſ. Nr. 1269.
—. XI., 2; Roſenpfl.: Agrimonĭa eupatorĭa L.; ſ. Nr. 1114.
—. XII., 3; „ Geum urbānum L.; ſ. Nr. 1077.
—. XIII., 1; Mohnpfl.: Chelidonium majus L.; ſ. Nr. 534.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Lamĭum album L.; ſ. Nr. 169.
—. „ „ L. purpurĕum L.; ſ. Nr. 10.
—. „ „ L. amplexicaule L.; ſ. Nr. 214.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Thlaspi arvēnse L.; ſ. Nr. 215.
—. „ „ Capsella bursa pastōris Vent.; ſ. Nr. 3.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Senebiēra coronŏpus Poir.; ſ. Nr. 2258.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Arăbis thaliana L.; ſ. Nr. 58.
—. „ „ Sisymbrĭum sophia L.; ſ. Nr. 591.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: *Geranĭum sibirĭcum L.; ſ. Nr. 2259.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: G. rotundifolĭum L.; ſ. Nr. 560.
—. „ „ Erodĭum cicutarĭum l'Herit; ſ. Nr. 217.
—. XVI., 5; Pappelroſenpfl.: Althaea officinālis L.; ſ. Nr. 2214.
—. XVII., 2; Erdrauchpfl.: Fumarĭa officinalis L.; ſ. Nr. 561.
—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperĭcum perforātum L.; ſ. Nr. 2068.
—. XIX., 1; Korbblütler: Sonchus oleracĕus L.; ſ. Nr. 1262.
—. „ „ S. asper Hall.; ſ. Nr. 1263.
—. „ „ Taraxăcum officināle Mnch.; ſ. Nr. 59.
—. XIX., 1; Korbblütler: Lampsăna communis L.; ſ. Nr. 1128.
—. XIX., 2; Korbblütler: Senecĭo vulgaris L.; ſ. Nr. 218.
—. „ „ Achillēa millefolĭum L.; ſ. Nr. 2101.
—. „ „ Bellis perēnnis L.; ſ. Nr. 2.
—. XIX., 4; „ *Calendŭla officinālis L.; ſ. Nr. 2208.
—. XXI., 1; Giftmilcher: *Euphorbĭa peplus L.; ſ. Nr. 1265.
—. „ „ E. helioscopia L.; ſ. Nr. 222.
—. XXI., 4; Neſſelpfl.: Urtica dioĭca L.: ſ. Nr. 2102.

—. XXI., 4; Neſſelpfl.: U. urens L.; ſ. Nr. 1234.
—. „ „ U. pilulifĕra L.; ſ. Nr. 1266.
—. XXI., 5; Meldenpfl.: Atrĭplex hastātum L.; ſ. Nr. 2210.
—. „ „ *A. hortēnse L.; ſ. Nr. 2260.
—. „ „ A. patŭlum L.; ſ. Nr. 2211.
—. „ „ A. angustifolĭum Sm.; ſ. Nr. 2159.
—. „ Amarantblütige: Amarāntus blitum L.; ſ. Nr. 2247.
—. XXII., 8; Giftmilcher: Mercuriālis annŭa L.; ſ. Nr. 1267.

F. An Wegen, Straßen, Dämmen, Ackerrändern u. dergl.: §. 528.

—. II., 1; Rachenblümler: Veronīca arvēnsis L.; ſ. Nr. 64.
—. „ „ V. agrēstis L.; ſ. Nr. 224.
—. „ „ V. polīta Fr.; ſ. Nr. 61.
—. „ Lippenblümler: Salvĭa sylvēstris L.; ſ. Nr. 2168.
—. „ „ S. verticillāta L.; ſ. Nr. 1191.
—. III., 2; Graspfl.: Agrōstis vulgāris With.; ſ. Nr. 2169.
—. „ „ Digitarĭa glabra R. et Sch.; ſ. Nr. 1272.
—. „ „ D. sanguinālis Scop.; ſ. Nr. 1250.
—. „ „ Bromus stenophўllus Lk.; ſ. Nr. 1275.
—. „ „ B. erēctus Huds.; ſ. Nr. 1276.
—. „ „ Dactўlis glomerāta L.; ſ. Nr. 1104.
—. „ „ Poa comprēssa L.; ſ. Nr. 1278.
—. „ „ P. annŭa L.; ſ. Nr. 14.
3006. „ „ Molinĭa serotĭna M. et K. (Diplāchne serot. Lk., Festūca serot. L.). Späte Molinie. Wrz. kriech.; Halm bis zur Riſpe mit Blattſch. bedeckt; Riſpenäſte abſteh.; Aehrchen angedr., 2- bis 5blüt.; unteres Blütenſcheidchen 5nervig, kurz-begrannt; 4; 7 bis 9; Kr., Ty.
—. III., 2; Graspfl.: Brachypodĭum pinnātum P. B.; ſ. Nr. 2078.
—. III., 2; Graspfl.: Tritĭcum repens L.; ſ. Nr. 1279.
—. „ „ Hordĕum murīnum L.; ſ. Nr. 1280.
—. „ „ Lolĭum perēnne L.; ſ. Nr. 1281.
—. IV., 1; Wegerichpfl.: Plantāgo major L.; ſ. Nr. 2262.
—. „ „ P. medĭa L.; ſ. Nr. 1282.
—. „ „ P. lanceolāta L.; ſ. Nr. 1252.
—. „ Kardenpfl.: Dipsăcus laciniātus L.; ſ. Nr. 2264.
—. „ „ D. sylvēstris Mill.; ſ. Nr. 2172.
—. „ „ D. fullōnum L.; ſ. Nr. 2263.
—. „ „ Scabiōsa columbarĭa L.; ſ. Nr. 2080.
—. „ „ Sc. arvēnsis L.; ſ. Nr. 1283.
—. „ Roſenpfl.: Alchemilla alpīna L.; ſ. Nr. 1284.

—. IV., 1; Krapppfl.: Asperŭla cynanchĭca L.; ſ. Nr. 2265.
—. „ „ Galĭum sylvēstre Poll.; ſ. Nr. 1005.
—. „ „ Galĭum mollūgo L.; ſ. Nr. 1006.
—. „ „ *Rubĭa tinctōrum L.; ſ. Nr. 2173.
—. V., 1; Rachenblümler: Verbāscum lychnītis L.; ſ. Nr. 2266.
—. V., 1; Rachenblümler: V. mönchĭi Schultz; ſ. Nr. 2267.
—. „ „ V. nigrum L.; ſ. Nr. 2082.
—. „ „ V. blattarĭa L.; ſ. Nr. 1285.
—. „ Nachtſchattenpfl.: Hyoscyămus niger L.; ſ. Nr. 1195.
—. „ „ *Lycĭum barbărum L.; ſ. Nr. 1204.
—. „ „ *Datūra stramonĭum L.; ſ. Nr. 1253.
—. V., 1; Nachtſchattenpfl.: *Solānum nigrum L.; ſ. Nr. 1254.
—. „ „ S. miniatum Bernh.; ſ. Nr. 2268.
3007. „ „ *S. humīle Bernh. Niedriger Nachtſchatten. St. rundl.; Aeſte ſchwachkant., kaum behart; Bltr. rautenecſ., geſchweift-gezähnt, faſt kahl; Bl. weißl.; Beere grüngelb; ☉; 7 bis 10; ☩.
—. V., 1; Borretſchpfl.: Echĭum vulgāre L.; ſ. Nr. 1108.
—. „ „ *Borrāgo officinālis L.; ſ. Nr. 2250.
—. „ „ Echinospērmum squarrōsum Rchb.; ſ. Nr. 2226.
—. V., 1; Borretſchpfl.: Cynoglōssum officināle L.; ſ. Nr. 1287.
—. V., 1; Glockenblümler: Campanŭla rotundifolĭa L.; ſ. Nr. 1288.
—. V., 1; Glockenblümler: C. rapunculoīdes L.; ſ. Nr. 3002.
—. „ „ C. trachelĭum L.; ſ. Nr. 1109.
—. „ „ Jasiōne montāna L.; ſ. Nr. 1290.
—. „ Veilchenpfl.: Viŏla tricŏlor L.; ſ. Nr. 525.
—. V., 2; Seidenfrüchtler: Vincetoxĭcum officināle Mnch.; ſ. Nr. 2175.
—. V., 2; Meldenpfl.: Blitum virgātum L.; ſ. Nr. 2251.
—. „ „ Chenopodĭum bonus henrĭcus L.; ſ. Nr. 1291.
—. V., 2; Meldenpfl.: Ch. rubrum L.; ſ. Nr. 2228.
—. „ „ Ch. glaucum L.; ſ. Nr. 1292.
—. „ „ Ch. hybrĭdum L.; ſ. Nr. 2229.
—. „ „ Ch. murāle L.; ſ. Nr. 2230.
—. „ „ Ch. urbĭcum L.; ſ. Nr. 2269.
—. „ „ Ch. album L.; ſ. Nr. 2231.
—. „ „ Ch. opulifolĭum Schrad.; ſ. Nr. 2270.
—. „ „ Ch. vulvarĭa L.; ſ. Nr. 2232.

—. V., 2; Doldenpfl.: Conĭum maculatum L.; ſ. Nr. 2181.
—. „ „ Eryngĭum campēstre L.; ſ. Nr. 2271.
—. „ „ Critămus falcarĭa Rchb.; ſ. Nr. 2252.
—. „ „ Peucedănum cervarĭa Cuss.; ſ. Nr. 2132.
—. „ „ Pimpinēlla saxifrāga L.; ſ. Nr. 2176.
—. „ „ Pastināca satīva L.; ſ. Nr. 2058.
—. „ „ Tordylĭum maxĭmum L.; ſ. Nr. 2272.
—. „ „ Bupleurum falcātum L.; ſ. Nr. 3003.
—. „ „ B. gerardi Jacq.; ſ. Nr. 2177.
—. „ „ B. affīne Sadl.; ſ. Nr. 2055.
—. V., 5; Bleiwurzpfl.: Armerĭa vulgaris Willd.; ſ. Nr. 1295.
—. „ Leinpfl.: Linum austriăcum L.; ſ. Nr. 2274.
—. VI., 3; Knöterichpfl.: Rumex pulcher L.; ſ. Nr. 1256.
—. „ „ R. crispus L.; ſ. Nr. 2254.
—. „ „ R. patientĭa L.; ſ. Nr. 2273.
—. „ „ R. acetosēlla L.; ſ. Nr. 1296.
—. VIII., 1; „ Polygŏnum aviculāre L.; ſ. Nr. 2255.
—. „ Nachtkerzenpfl.: * Oenothēra biēnnis L.; ſ. Nr. 2256.
—. X., 2; Nelkenblütler: Saponarĭa officinālis L.; ſ. Nr. 2184.
—. „ „ Dianthus carthusianōrum L.; ſ. Nr. 459.
—. X., 2; Nelkenblütler: D. prolĭfer L.; ſ. Nr. 2275.
—. „ „ Vaccarĭa pyramidāta Fl. Wett.; ſ. Nr. 2185.
—. X., 2; Paronychienpfl.: Scleränthus annŭus L.; ſ. Nr. 574.
—. X., 3; Nelkenblütler: Stellarĭa medĭa Vill.; ſ. Nr. 4.
—. „ „ Silēne inflāta Sm.; ſ. Nr. 1178.
—. „ „ Spergularĭa rubra Presl.; ſ. Nr. 576.
—. X., 5; Dickblattpfl.: Sedum acre L.; ſ. Nr. 1298.
—. XI., 1; Fettkrautpfl.: Portulāca oleracĕa L.; ſ. Nr. 1269.
—. XI., 2; Roſenpfl.: Agrimonĭa eupatorĭa L.; ſ. Nr. 1114.
—. XI., 3; Waupfl.: Resēda luteŏla L.; ſ. Nr. 1299.
—. „ „ R. lutĕa L.; ſ. Nr. 1372.
—. „ „ R. phyteuma L.; ſ. Nr. 1300.
—. XII., 3; Roſenpfl.: Potentīlla anserīna L.; ſ. Nr. 578.
—. „ „ P. mixta Nolte; ſ. Nr. 2276.
—. „ „ P. reptans L.; ſ. Nr. 1301.
—. XIII., 1; Mohnpfl.: Chelidonĭum majus L.; ſ. Nr. 534.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Adōnis autumnālis L.; ſ. Nr. 1302.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Origănum vulgāre L.; ſ. Nr. 2087.
—. „ „ Thymus serpyllum L.; ſ. Nr. 2088.
—. „ „ Prunēlla vulgāris L.; ſ. Nr. 2277.
—. „ „ Nepĕta cataria L.; ſ. Nr. 1218.

—. XIV., 1; Lippenblümler: N. nepetēlla L.; ſ. Nr. 2189.
—. " " Lamĭum album L.; ſ. Nr. 169.
—. " " *Leonūrus cardiăca L.; ſ. Nr. 1182.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Chaitūrus marrubiāstrum Rchb.; ſ. Nr. 2064.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Galeōpsis ochroleuca Lmk.; ſ. Nr. 2238.
—. XIV., 1; Lippenblümler: G. tetrăhit L.; ſ. Nr. 2190.
—. " " G. pubēscens Bess.; ſ. Nr. 2109.
—. " " Stachys recta L.; ſ. Nr. 1303.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Marrubĭum vulgāre L.; ſ. Nr. 2192.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Ballōta nigra L.; ſ. Nr. 1219.
—. " " Teucrĭum chamaedrys L.; ſ. Nr. 2239.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Linarĭa vulgaris Desf.; ſ. Nr. 2193.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Berterŏa incāna DC.; ſ. Nr. 1305.
—. " " Thlaspi arvēnse L.; ſ. Nr. 215.
—. " " Senebiēra coronŏpus Poir.; ſ. Nr. 2258.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Lepidĭum graminifolĭum L.; ſ. Nr. 1308.
—. XV., 1; Kreuzblütler: L. ruderāle L.; ſ. Nr. 1224.
—. " " Capsēlla bursa pastōris Vent.; ſ. Nr. 3.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Raphănus raphanĭstrum L.; ſ. Nr. 588.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Sisymbrĭum officināle Scop.; ſ. Nr. 1361.
—. XV., 2; Kreuzblütler: S. sophĭa L.; ſ. Nr. 591.
—. " " Diplotāxis tenuifolĭa DC.; ſ. Nr. 1313.
—. XV., 2; Kreuzblütler: D. muralis DC.; ſ. Nr. 1314.
—. " " Erucāstrum pollichĭi Sch. et Sp.; ſ. Nr. 1315.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Sinapis cheiranthus Koch; ſ. Nr. 1316.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum rotundifolĭum L.; ſ. Nr. 560.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: G. dissēctum L.; ſ. Nr. 538.
—. " " G. molle L.; ſ. Nr. 539.

—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Erodium cicutarium l'Herit.; ſ. Nr. 217.
—. XVI., 5; Pappelroſenpfl.: Hibiscus triōnum L.; ſ. Nr. 2278.
—. „ „ Althaea hirsūta L.; ſ. Nr. 2195.
—. „ „ Lavatēra thuringiăca L.; ſ. Nr. 2092.
—. XVI., 5; Pappelroſenpfl.: Malva vulgāris Fr.; ſ. Nr. 1318.
—. „ „ M. alcĕa L.; ſ. Nr. 2279.
—. „ „ M. boreālis Wallm.; ſ. Nr. 1319.
—. „ „ M. nicāensis All.; ſ. Nr. 2280.
—. „ „ M. sylvēstris L.; ſ. Nr. 1225.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Onōnis repens L.; ſ. Nr. 1320.
—. „ „ O. spinōsa L.; ſ. Nr. 1321.
—. „ „ O. hircīna Jacq.; ſ. Nr. 1322.
—. „ „ *Medicāgo sativa L.; ſ. Nr. 1323.
—. „ „ M. falcāta L.; ſ. Nr. 1324.
—. „ „ Melilōtus alba Lmk.; ſ. Nr. 2197.
—. „ „ M. officinālis L.; ſ. Nr. 1326.
—. „ „ M. dentāta Pers.; ſ. Nr. 2281.
—. „ „ Trifolium repens L.; ſ. Nr. 597.
—. „ „ T. ochroleucum L.; ſ. Nr. 1140.
—. „ „ T. filifōrme L.; ſ. Nr. 599.
—. „ „ T. procūmbens L.; ſ. Nr. 1329.
—. „ „ Ervum monānthos L.; ſ. Nr. 1332.
—. „ „ Lotus corniculātus L.; ſ. Nr. 1239.
—. „ „ Vicĭa cracca L.; ſ. Nr. 1228.
—. „ „ Lathўrus tuberōsus L.; ſ. Nr. 2198.
—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperīcum perforātum L.; ſ. Nr. 2068.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracium pilosēlla L.; ſ. Nr. 1181.
—. „ „ H. auricŭla L.; ſ. Nr. 1334.
—. „ „ H. murōrum L.; ſ. Nr. 447.
—. „ „ H. rigĭdum Hoffm.; ſ. Nr. 2094.
—. „ „ Crepis setōsa Hall. fil.; ſ. Nr. 2282.
—. „ „ C. foetĭda L.; ſ. Nr. 1336.
—. „ „ C. tectōrum L.; ſ. Nr. 1366.
—. „ „ Sonchus asper All.; ſ. Nr. 1263.
—. „ „ Lactūca saligna L.; ſ. Nr. 2283.
—. „ „ L. scariōla L.; ſ. Nr. 2284.
—. „ „ Taraxăcum officināle Mnch.; ſ. Nr. 59.
—. XIX., 1; Korbblütler: Lappa minor DC.; ſ. Nr. 2199.
—. „ „ L. major Gaertn.; ſ. Nr. 2200.
—. „ „ L. tomentōsa Lmk.; ſ. Nr. 2201.

—. XIX., 1; Korbblütler: Hypochoeris radicata L.; ſ. Nr. 1126.
—. XIX., 1; Korbblütler: Chondrilla juncea L.; ſ. Nr. 2096.
—. „ „ Podospermum laciniatum DC.; ſ. Nr. 602.
—. XIX., 1; Korbblütler: Helminthia echioides Gaertn.; ſ. Nr. 1232.
—. XIX., 1; Korbblütler: Picris hieracioides L.; ſ. Nr. 2241.
—. „ „ Cichorium intybus L.; ſ. Nr. 1338.
—. „ „ Lampsana communis L.; ſ. Nr. 1128.
—. „ „ Leontodon vulgaris Kitt.; ſ. Nr. 1079.
—. XIX., 1; Korbblütler: Scolymus hispanicus L.; ſ. Nr. 2285.
—. XIX., 1; Korbblütler: Cirsium arvense Scop.; ſ. Nr. 2286.
—. „ „ C. eriophorum Scop.; ſ. Nr. 2287.
—. „ „ C. polyanthemon DC.; ſ. Nr. 2288.
—. „ „ C. lanceolatum Scop.; ſ. Nr. 1339.
—. „ „ Carduus nutans L.; ſ. Nr. 2289.
—. „ „ C. tenuiflorus Sm.; ſ. Nr. 1340.
—. „ „ C. acanthoides L.; ſ. Nr. 1233.
—. „ „ C. hamulosus Ehrh.; ſ. Nr. 2290.
—. „ „ C. candicans W. et K.; ſ. Nr. 2291.
—. „ „ Onopordon acanthium L.; ſ. Nr. 2202.
—. „ „ *Silybum marianum Gaertn.; ſ. Nr. 2242.
—. XIX., 2; Korbblütler: Senecio vulgaris L.; ſ. Nr. 218.
—. „ „ S. jacobaea L.; ſ. Nr. 2075.
—. „ „ S. erucaefolius Huds.; ſ. Nr. 2100.
—. „ „ S. viscosus L.; ſ. Nr. 1341.
—. „ „ Filago germanica L.; ſ. Nr. 2292.
—. „ „ Tanacetum vulgare L.; ſ. Nr. 2293.
3008. „ „ Artemisia campestris L. **Feld-Beifuß.** Nichtblüh. St. rasig; Bltr. seidenhaarig-grau oder kahl, häutig, untere dopp.-fiederspalt., stengelst. an der Basis in 3 bis 7 fadenf., kahle Zipf. eingeschn.; Köpfchen eif., kahl, rötlichgelb; 4; 7 bis 9.
—. XIX., 2; Korbblütler: A. vulgaris L.; ſ. Nr. 2205.
—. „ „ *Cotula coronopifolia L.; ſ. Nr. 2294.
—. „ „ Matricaria inodora L.; ſ. Nr. 2206.
—. „ „ *Pyrethrum parthenium Sm.; ſ. Nr. 2243.
—. XIX., 2; Korbblütler: Leucanthemum vulgare Lmk.; ſ. Nr. 1130.

—. XIX., 2; Korbblütler: Achillea millefolium L.; ſ. Nr. 2101.
—. XIX., 2; Korbblütler: Anthemis arvensis L.; ſ. Nr. 1342.
—. „ „ Bellis perennis L.; ſ. Nr. 2.
—. „ „ Inula hirta L.; ſ. Nr. 2295.
—. „ „ I. germanica L.; ſ. Nr. 2296.
—. „ „ I. conyza DC.; ſ. Nr. 2297.
—. „ „ *Stenactis annua Nees; ſ. Nr. 2245.
—. XIX., 3; „ Centaurea jacea L.; ſ. Nr. 1343.
—. „ „ C. scabiosa L.; ſ. Nr. 1131.
—. „ „ C. amara L.; ſ. Nr. 2300.
—. XX., 5; Oſterluzeipfl.: Aristolochia clematitis L.; ſ. Nr. 2209.
—. XXI., 1; Giftmilcher: Euphorbia lathyris L.; ſ. Nr. 2301.
—. „ „ E. gerardiana Jacq.; ſ. Nr. 1344.
—. XXI., 4; Neſſelpfl.: Urtica dioica L.; ſ. Nr. 2102.
—. „ „ U. urens L.; ſ. Nr. 1234.
—. „ „ U. pilulifera L.; ſ. Nr. 1266.
—. XXI., 5; Meldenpfl.: Atriplex nitens Rebent.; ſ. Nr. 2302.
—. „ „ A. patulum L.; ſ. Nr. 2211.
—. „ „ A. angustifolium Sm.; ſ. Nr. 2159.
—. „ „ A. oblongifolium W. et K.; ſ. Nr. 2303.
3009. XXI., 5; Amarantblütige: Amarantus retroflexus L. Rauhſtengeliger Amarant. St. aufr., kurzhaarig; Bltr. eif., zugeſp.; Bl. 5männig; Blütenknäuel ährenſtänd., endſt. Aehre zſgeſetzt; Deckbltr. faſt dornig-ſtachelſp., von dopp. Blütenhüllänge; ☉; 8 bis 9; ×.
—. XXI., 5; Amarantblütige: A. blitum L.; ſ. Nr. 2247.
—. „ „ A. prostratus Balb.; ſ. Nr. 2248.
—. „ Spitzklettenpfl.: Xanthium macrocarpum DC.; ſ. Nr. 2305.
—. XXI., 5; Spitzkletenpfl.: X. strumarium L.; ſ. Nr. 2304.
—. „ „ *X. spinosum L.; ſ. Nr. 2306.

a. An feuchten Wegen:

—. IV., 1; Kardenpfl.: Dipsacus pilosus L.; ſ. Nr. 2079.
—. V., 3; Paronychienpfl.: Corrigiola littoralis L.; ſ. Nr. 1348.
—. VI., 1; Semede: Juncus tenuis Roth; ſ. Nr. 1346.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Euphrasia odontites L.; ſ. Nr. 2308.
—. XIV., 2; Rachenblümler: E. serotina Lmk.; ſ. Nr. 2309.

—. XVI., 5; Pappelroſenpfl.: Althaea officinālis L.; ſ. Nr. 2214.

b. An Wegen neben Gärten:

—. V., 2; Meldenpfl.: *Chenopodĭum ambrosioīdes L.; ſ. Nr. 1247.

c. In feuchten, wenig befahrenen Fahrgleiſen:

—. X., 4; Nelkenblütler: Sagīna apetăla L.; ſ. Nr. 604.

d. An ſchattigen Wegen:

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Galēga officinālis L.; ſ. Nr. 1349.

§. 529. G. **An und auf Mauern, Lehmwänden, Ruinen, Dächern, u. dergl.:**

—. II., 1; Rachenblümler: Veronīca arvēnsis L.; ſ. Nr. 64.
—. „ „ V. polīta Fr.; ſ. Nr. 61.
—. III., 2; Graspfl.: Hordĕum murīnum L.; ſ. Nr. 1280.
—. „ „ Lolĭum perēnne L.; ſ. Nr. 1281.
—. IV., 1; Neſſelpfl.: Parietarĭa officinālis L.; ſ. Nr. 2171.
—. „ „ P. ramiflōra Mnch.; ſ. Nr. 2225.
—. V., 1; Nachtſchattenpfl.: Hyoscyămus niger L.; ſ. Nr. 1195.
—. „ „ *Datūra stramonĭum L.; ſ. Nr. 1253.
—. V., 1; Nachtſchattenpfl.: *Solānum nigrum L.; ſ. Nr. 1254.
3010. „ „ S. villōsum Lmk. Zottiger Nachtſchatten. St. und Blr. faſt filz.-zott.; Aeſte ſchwachkant.; Blr. eilängl. bis lanzettl., bucht.-gezähnt; Bl. weiß; Beere orangegelb; ☉; 8 bis 10; ♱.
Varirt: S. flavum Kit. (Beere bleichgelb).
—. V., 1; Borretſchpfl.: Echĭum vulgāre L.; ſ. Nr. 1108.
—. „ „ Echinospērmum squarrōsum Rchb.; ſ. Nr. 2226.
—. V., 1; Glockenblümler: Campanŭla pyramidālis L.; ſ. Nr. 2227.
—. V., 1; Glockenblümler: C. rapunculoīdes L.; ſ. Nr. 3002.
—. „ Rebenpfl.: *Ampelōpsis quinquefolĭa R. et Sch.; ſ. Nr. 2174.
—. V., 2; Meldenpfl.: Chenopodĭum rubrum L.; ſ. Nr. 2228.
—. „ „ Ch. glaucum L.; ſ. 1292.
—. „ „ Ch. hybrĭdum L.; ſ. Nr. 2229.
—. „ „ Ch. murāle L.; ſ. Nr. 2230.
—. „ „ Ch. album L.; ſ. Nr. 2231.
—. „ „ Ch. botrys L.; ſ. Nr. 1352.

—. V., 2; Meldenpfl.: Ch. vulvaria L.; f. Nr. 2232.
—. „ „ *Ch. ambrosioides L.; f. Nr. 1247.
—. „ Doldenpfl.: Aethusa cynapium L.; f. Nr. 2178.
—. X., 1; Rautenpfl.: Tribulus terrestris L.; f. Nr. 1353.
—. X., 2; Nelkenblütler: Gypsophila muralis L.; f. Nr. 2234.
—. X., 3; „ Cucubalus baccifer us L.; f. Nr. 2186.
—. „ „ Alsine tenuifolia Whbg.; f. Nr. 1355.
—. „ „ Spergularia rubra Presl.; f. Nr. 576.
—. X., 5; Dickblattpfl.: Sedum telephium L.; f. Nr. 2142.
—. „ „ S. annuum L.; f. Nr. 1356.
—. „ „ S. acre L.; f. Nr. 1298.
—. „ „ S. reflexum L.; f. Nr. 2235.
—. „ „ S. album L.; f. Nr. 2572.
—. XI., 3; Waupfl.: Reseda luteola L.; f. Nr. 1299.
—. XI., 5; Dickblattpfl.: Sempervivum tectorum L.; f. Nr. 2236.
—. XI., 5; Dickblattpfl.: S. sobolifer um Sims.; f. Nr. 2167.
—. XII., 3; Rosenpfl.: Geum urbanum L.; f. Nr. 1077.
—. „ „ Potentilla anserina L.; f. Nr. 578.
—. XIII., 1; Mohnpfl.: Chelidonium majus L.; f. Nr. 534.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Hyssopus officinalis L.; f. Nr. 2237.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Nepeta cataria L.; f. Nr. 1218.
—. „ „ N. nepetella L.; f. Nr. 2189.
—. „ „ Lamium album L.; f. Nr. 169.
—. „ „ *Leonurus cardiaca L.; f. Nr. 1182.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Galeopsis ochroleuca Lmk.; f. Nr. 2238.
—. XIV., 1; Lippenblümler: G. tetrahit L.; f. Nr. 2190.
—. „ „ Ballota nigra L.; f. Nr. 1219.
—. „ „ Teucrium chamaedrys L.; f. Nr. 2239.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Antirrhinum majus L.; f. Nr. 1091.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Linaria cymbalaria Dill.; f. Nr. 1360.
—. XIV., 2; Rachenblümler: L. striata DC.; f. Nr. 2240.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Lepidium ruderale L.; f. Nr. 1224.
—. „ „ L. graminifolium L.; f. Nr. 1308.
—. XV., 2; „ Sisymbrium sophia L.; f. Nr. 591.
—. „ „ S. officinale Scop.; f. Nr. 1361.
—. „ „ Diplotaxis tenuifolia DC.; f. Nr. 1313.

—. XV., 2; Kreuzblütler: D. murālis DC.; ſ. Nr. 1314.
—. „ „ Erucāstrum obtusangŭlum Rchb.; ſ. Nr. 1362.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum rotundifolĭum L.; ſ. Nr. 560.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum dissēctum L.; ſ. Nr. 538.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: G. molle L.; ſ. Nr. 539.
—. XVI., 5; Pappelroſenpfl.: Malva vulgaris Fr.; ſ. Nr. 1318.
—. „ „ M. sylvēstris L.; ſ. Nr. 1225.
—. XVII., 2; Erdrauchpfl.: Fumarĭa murālis Sond.; ſ. Nr. 1363.
—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperīcum perforātum L.; ſ. Nr. 2068.
—. XIX., 1; Korbblütler: Picris hieracioïdes L.; ſ. Nr. 2241.
—. „ „ Lampsăna communis L.; ſ. Nr. 1128.
—. „ „ Lappa minor DC.; ſ. Nr. 2199.
—. „ „ L. major Gaertn.; ſ. Nr. 2200.
—. „ „ L. tomentōsa Lmk.; ſ. Nr. 2201.
—. „ „ Cirsĭum lanceolātum Scop.; ſ. Nr. 1339.
—. XIX., 1; Korbblütler: Onopōrdon acanthĭum L.; ſ. Nr. 2202.
—. XIX., 1; Korbblütler: *Silўbum marianum Gaertn.; ſ. Nr. 2242.
—. XIX., 2; Korbblütler: Artemisĭa vulgaris L.; ſ. Nr. 2205.
—. „ „ *Pyrĕthrum parthenĭum Sm.; ſ. Nr. 2243.
—. XIX., 2; Korbblütler: Achillēa nobĭlis L.; ſ. Nr. 2244.
—. „ „ *Stenactis annŭa Nees.; ſ. Nr. 2245.
—. XIX., 5; „ Echīnops sphaerocephălus L.; ſ. Nr. 2246.
—. XX., 5; Oſterluzeipfl.: Aristolochĭa clematītis L.; ſ. Nr. 2209.
—. XXI., 4; Neſſelpfl.: Urtīca urens L.; ſ. Nr. 1234.
—. „ „ U. dioĭca L.; ſ. Nr. 2102.
—. „ „ U. pilulifĕra L.; ſ. Nr. 1266.
—. XXI., 5; Meldenpfl.: Atrĭplex patŭlum L.; ſ. Nr. 2211.

§. 530. **H. In und um Dörfer, Städte, menſchliche Wohnungen u. dergl.:**

—. III., 2; Graspfl.: *Panĭcum miliacĕum L.; ſ. Nr. 1419.
—. IV., 1; Neſſelpfl.: Parietarĭa officinālis L.; ſ. Nr. 2171.
—. „ „ P. ramiflōra Mnch.; ſ. Nr. 2225.

—. V., 1; Rachenblümler: Verbascum nigrum L.; ſ. Nr. 2082.
—. V., 1; Nachtſchattenpfl.: Hyoscyămus niger L.; ſ. Nr. 1195.
—. „ „ *Datūra stramonĭum L.; ſ. Nr. 1253.
—. V., 1; Borretſchpfl.: *Borrago officinālis L.; ſ. Nr. 2250.
—. „ „ Cynoglōssum officināle L.; ſ. Nr. 1287.
—. „ Glockenblümler: Campanŭla rapunculoīdes L.; ſ. Nr. 3002.
—. V., 1; Schnabelpfl.: *Impatĭens parviflōra DC.; ſ. Nr. 2311.
—. V., 2; Meldenpfl.: Blitum capitātum L.; ſ. Nr. 2312.
—. „ „ Chenopodĭum bonus henrĭcus L.; ſ. Nr. 1291.
—. V., 2; Meldenpfl.: Ch. rubrum L.; ſ. Nr. 2228.
—. „ „ Ch. glaucum L.; ſ. Nr. 1292.
—. „ „ Ch. hybrĭdum L.; ſ. Nr. 2229.
—. „ „ Ch. murāle L.; ſ. Nr. 2230.
—. „ „ Ch. urbĭcum L.; ſ. Nr. 2269.
—. „ „ Ch. album L.; ſ. Nr. 2231.
—. „ „ Ch. vulvarĭa L.; ſ. Nr. 2232.
—. „ „ *Ch. ambrosioīdes L.; ſ. Nr. 1247.
3011. „ „ Corispērmum nitĭdum Kit. Glänzender Wanzenſame. K. 2blättr.; Fr. ellipt., ſchmalgeflüg., Flüg. ungezähnelt; obere Deckbltr. eif.-zugeſp., ſtachelſp., mit einem Hautrande von der Breite des grünen oder roten Mittelfeldes; St. unten glänz., rot; ☉; 8; Oe. Varirt: C. cernŭum Kit. (Stgl ſpitzen nickend).
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygŏnum aviculāre L.; ſ. Nr. 2255.
—. XI., 3; Waupfl.: Resēda luteŏla L.; ſ. Nr. 1299.
—. XII., 3; Roſenpfl.: Geum urbānum L.; ſ. Nr. 1077.
—. „ „ Potentĭlla supīna L.; ſ. Nr. 1369.
—. „ „ P. anserīna L.; ſ. Nr. 578.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Lamĭum album L.; ſ. Nr. 169.
—. „ „ Stachys germanĭca L.; ſ. Nr. 2313.
—. „ „ Ballōta nigra L.; ſ. Nr. 1219.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Lepidĭum ruderāle L.; ſ. Nr. 1224.
—. „ „ L. graminifolĭum L.; ſ. Nr. 1308.
—. „ „ Senebiēra coronŏpus Poir.; ſ. Nr. 2258.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Sisymbrĭum sophĭa L.; ſ. Nr. 591.
—. „ „ Diplotāxis tenuifolĭa DC.; ſ. Nr. 1313.

—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum rotundifolĭum L.; ſ. Nr. 560.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: G. robertiānum L.; ſ. Nr. 431.
—. „ „ G. molle L.; ſ. Nr. 539.
—. „ „ Erodĭum cicutarĭum L.; ſ. Nr. 217.
—. XVI., 5; Pappelroſenpfl.: Malva vulgāris Fr.; ſ. Nr. 1318.
—. „ „ M. boreālis Wallm.; ſ. Nr. 1319.
—. „ „ M. sylvēstris L.; ſ. Nr. 1225.
—. XIX., 1; Korbblütler: Sonchus oleracĕus L.; ſ. Nr. 1262.
—. „ „ Lappa minor DC.; ſ. Nr. 2199.
—. „ „ L. major Gaertn.; ſ. Nr. 2200.
—. „ „ L. tomentōsa Lmk.; ſ. Nr. 2201.
—. XIX., 2; „ *Artemisĭa absinthĭum L.; ſ. Nr. 2314.
—. XIX., 2; Korbblütler: *Pyrĕthrum parthenĭum Sm.; ſ. Nr. 2243.
—. XIX., 2; Korbblütler: Bellis perēnnis L.; ſ. Nr. 2.
—. XIX., 3; „ *Helianthus annŭus L.; ſ. Nr. 2315.
—. XIX., 4; „ *Calendŭla officinālis L.; ſ. Nr. 2208.
—. XXI., 4; Neſſelpfl.: Urtīca dioĭca L.; ſ. Nr. 2102.
—. „ „ U. urens L.; ſ. Nr. 1234.
—. „ „ U. pilulifĕra L.; ſ. Nr. 1266.
—. XXI., 5; Meldenpfl.: *Atrĭplex hortēnse L.; ſ. Nr. 2260.
—. „ „ A. hastātum L.; ſ. Nr. 2210.
—. „ „ A. patŭlum L.; ſ. Nr. 2211.
—. „ „ A. angustifolĭum Sm.; ſ. Nr. 2159.
—. „ Amarantpfl.: Amarāntus blitum L.; ſ. Nr. 2247.
—. „ „ A. prostrātus Balb.; ſ. Nr. 2248.

§. 531. **I. Auf Schutt, unbebauten Stellen, wüſten Dorfplätzen und dergl.:**

—. II., 1; Lippenblümler: Salvĭa verticillāta L.; ſ. Nr. 1191.
—. III., 2; Graspfl.: Poa comprēssa L.; ſ. Nr. 1278.
—. „ „ Hordĕum murīnum L.; ſ. Nr. 1280.
—. IV., 1; Kardenpfl.: Dipsăcus sylvēstris Mill.; ſ. Nr. 2172.
—. „ „ D. laciniātus L.; ſ. Nr. 2264.
—. „ „ D. fullōnum L.; ſ. Nr. 2263.
—. „ „ D. pilōsus L.; ſ. Nr. 2079.
—. „ Neſſelpfl.: Parietarĭa officinālis L.; ſ. Nr. 2171.
—. V., 1; Rachenblümler: Verbascum lychnītis L.; ſ. Nr. 2266.
—. V., 1; Nachtſchattenpfl.: Hyoscyămus niger L.; ſ. Nr. 1195.
—. „ „ *Datura stramonĭum L.; ſ. Nr. 1253.

—. V., 1; Nachtſchattenpfl.: *Solānum nigrum L.; ſ. Nr. 1254.
—. „ „ *S. melānocerāsum Willd.; ſ. Nr. 2317.
—. V., 1; Nachtſchattenpfl.: S. villōsum Lmk.; ſ. Nr. 3010.
—. „ Borretſchpfl.: Echĭum vulgāre L.: ſ. Nr. 1108.
—. „ „ *E. italĭcum L.; ſ. Nr. 2318.
—. „ „ *Borrāgo officinālis L.; ſ. Nr. 2250.
—. „ „ Echinospērmum squarrōsum Rchb.; ſ. Nr. 2226.
—. V., 1; Borretſchpfl.: Cynoglōssum officināle L.; ſ. Nr. 1287.
—. V., 1; Glockenblümler: Campanŭla rapunculoīdes L.; Nr. 3002.
3012. V., 1; Bleiwurzpfl.: Plumbāgo europaea L. Europäiſche Bleiwurz. Bl. vollſtänd., 1blättr., unterſtänd., lila; Fr. eine 1fächr., 1ſamige Kapſ.; 4; 8 bis 9; ┼; Iſtrien.
—. V., 2; Meldenpfl.: Chenopodĭum rubrum L.; ſ. Nr. 2228.
—. „ „ Ch. glaucum L.; ſ. Nr. 1292.
—. „ „ Ch. hybrĭdum L.; ſ. Nr. 2229.
—. „ „ Ch. murāle L.; ſ. Nr. 2230.
—. „ „ Ch. urbĭcum L.; ſ. Nr. 2269.
—. „ „ Ch. album L.; ſ. Nr. 2231.
—. „ „ Ch. opulifolĭum Schrad.; ſ. Nr. 2270.
—. „ „ Ch. vulvarĭa L.; ſ. Nr. 2232.
—. „ „ *Ch. ambrosioīdes L.; ſ. Nr. 1247.
—. „ „ Kochĭa scoparĭa Schrad.; ſ. Nr. 2319.
—. „ Doldenpfl.: Aethūsa cynapĭum L.; ſ. Nr. 2178.
—. „ „ Tordylĭum maxĭmum L.; ſ. Nr. 2272.
—. VI., 3; Knöterichpfl.: Rumex obtusifolĭus L.; ſ. Nr. 2104.
—. „ „ R. crispus L.; ſ. Nr. 2254.
—. VIII., 1; „ Polygŏnum aviculāre L.; ſ. Nr. 2255.
—. X., 3; Nelkenblütler: Silēne inflāta Sm.; ſ. Nr. 1178.
—. „ „ Stellarĭa medĭa Vill.; ſ. Nr. 4.
—. X., 5; Schnabelpfl.: *Oxălis stricta Jacq.; ſ. Nr. 1260.
—. „ „ *O. corniculāta L.; ſ. Nr. 1261.
—. XI., 3; Waupfl.: Resēda luteŏla L.; ſ. Nr. 1299.
—. „ „ R. lutĕa L.; ſ. Nr. 1372.
—. XII., 3; Roſenpfl.: Potentĭlla anserīna L.; ſ. Nr. 578.
—. XIII., 1; Mohnpfl.: Chelidonĭum majus L.; ſ. Nr. 534.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Nepĕta catarĭa L.; ſ. Nr. 1218.
—. „ „ N. nepetēlla L.; ſ. Nr. 2189.
—. „ „ Lamĭum album L.; ſ. Nr. 169.
—. „ „ *Leonūrus cardĭaca L.; ſ. Nr. 1182.

—. XIV., 1; Lippenblümler: Chaitūrus marrubiastrum Rchb.; ſ. Nr. 2064.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Galeōpsis tetrăhit L.; ſ. Nr. 2190.
—. XIV., 1; Lippenblümler: G. pubēscens Bess.; ſ. Nr. 2109.
—. „ „ Stachys germanĭca L.; ſ. Nr. 2313.
—. „ „ Marrubĭum candidissĭmum L.; ſ. Nr. 2320.
—. XIV., 1; Lippenblümler: M. pannonĭcum Rchb.; ſ. Nr. 2321.
—. XIV., 1; Lippenblümler: M. cretĭcum Mill.; ſ. Nr. 2322.
—. „ „ M. vulgāre L.; ſ. Nr. 2192.
—. „ „ Ballōta nigra L.; ſ. Nr. 1219.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Antirrhīnum orontĭum L.; ſ. Nr. 2324.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Linarĭa striata DC.; ſ. Nr. 2240.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Thlaspi arvēnse L.; ſ. Nr. 215.
—. „ „ Lepidĭum ruderāle L.; ſ. Nr. 1224.
—. „ „ Capsēlla bursa pastōris L.; ſ. Nr. 3.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Senebiēra coronŏpus Poir.; ſ. Nr. 2258.
—. XV., 1; Kreuzblütler: S. didўma Pers.; ſ. Nr. 2323.
—. XV., 2; „ Sisymbrĭum sophĭa L.; ſ. Nr. 591.
—. „ „ S. officināle Scop.; ſ. Nr. 1361.
—. „ „ Diplotāxis murālis DC.; ſ. Nr. 1314.
—. „ „ Erucāstrum pollichĭi Sch. et Sp.; ſ. Nr. 1315.
—. XV., 2; Kreuzblütler: E. obtusangŭlum Rchb.; ſ. Nr. 1362.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: *Geranĭum sibirĭcum L.; ſ. Nr. 2259.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: G. rotundifolĭum L.; ſ. Nr. 560.
—. „ „ G. dissēctum L.; ſ. Nr. 538.
—. „ „ G. molle L.; ſ. Nr. 539.
—. XVI., 5; Pappelroſenpfl.: Althaea pallĭda W. et K.; ſ. Nr. 1374.
—. XVI., 5; Pappelroſenpfl.: Malva vulgāris Fr.; ſ. Nr. 1318.
—. „ „ M. sylvēstris L.; ſ. Nr. 1225.
—. „ „ M. nicaeēnsis All.; ſ. Nr. 2280.
—. „ „ Lavatēra thuringĭăca L.; ſ. Nr. 2092.
—. XVII., 2; Erdrauchpfl.: Fumarĭa officinālis L.; ſ. Nr. 561.

—. XVII., 2; Erdrauchpfl.: Fumaria capreolāta L.; ſ. Nr. 541.
—. XVII., 2; Erdrauchpfl.: Corydālis claviculāta Pers.; ſ. Nr. 1029.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Melilōtus alba Lmk.; ſ. Nr. 2197.
—. XIX., 1; Korbblütler: Crepis foetīda L.; ſ. Nr. 1336.
—. „ „ C. tectōrum L.; ſ. Nr. 1366.
—. „ „ Lactūca scariōla L.; ſ. Nr. 2284.
—. „ „ Sonchus oleracĕus L.; ſ. Nr. 1262.
—. „ „ S. asper Hall.; ſ. Nr. 1263.
—. „ „ Chondrīlla juncĕa L.; ſ. Nr. 2096.
—. „ „ Leontŏdon vulgāris Kitt.; ſ. Nr. 1079.
—. XIX., 1; Korbblütler: Lappa minor DC.; ſ. Nr. 2199.
—. „ „ L. major Gaertn.; ſ. Nr. 2200.
—. „ „ L. tomentōsa Lmk.; ſ. Nr. 2201.
—. „ „ Cirsĭum erĭophŏrum Scop.; ſ. Nr. 2287.
—. XIX., 1; Korbblütler: C. polyanthĕmon DC.; ſ. Nr. 2288.
—. „ „ Cardŭus nutans L.; ſ. Nr. 2289.
—. „ „ Cardŭus acanthoīdes L.; ſ. Nr. 1233.
—. XIX., 1; Korbblütler: C. hamulōsus Ehrh.; ſ. Nr. 2290.
—. „ „ Onopōrdon acanthĭum L.; ſ. Nr. 2202.
—. XIX., 2; Korbblütler: Senecìo jacobaea L.; ſ. Nr. 2075.
—. „ „ S. vulgāris L.; ſ. Nr. 218.
—. „ „ Artemisĭa vulgāris L.; ſ. Nr. 2205.
—. „ „ *Pyrĕthrum partheníum Sm.; ſ. Nr. 2243.
—. XIX., 2; Korbblütler: Matricarĭa inodōra L.; ſ. Nr. 2206.
—. „ „ Achillēa nobĭlis L.; ſ. Nr. 2244.
—. „ „ Anthĕmis arvēnsis L.; ſ. Nr. 1342.
—. „ „ A. altissĭma DC.; ſ. Nr. 1375.
—. „ „ A. neilreichĭi Joh. Ortm.; ſ. Nr. 2325.
—. XIX., 2; Korbblütler: Inŭla helenĭum L.; ſ. Nr. 2207.
—. „ „ * Stenāctis annŭa Nees; ſ. Nr. 2245.
—. XIX., 3; „ Centaurēa jacēa L.; ſ. Nr. 1343.
—. XIX., 4; „ *Calendŭla officinālis L.; ſ. Nr. 2208.
—. XXI., 1; Giftmiſcher: Euphorbĭa platyphȳllos L.; ſ. Nr. 2326.
—. XXI., 4; Neſſelpfl.: Urtīca dioīca L.; ſ. Nr. 2102.
—. „ „ U. urens L.; ſ. Nr. 1234.

—. XXI., 4; Neſſelpfl.: U. pilulifĕra L.; ſ. Nr. 1266.
—. XXI., 5; Meldenpfl.: *Atrĭplex hortēnse L.; ſ. Nr. 2260.
—. „ „ A. nitens Rebent.; ſ. Nr. 2302.
—. „ „ A. hastātum L.; ſ. Nr. 2210.
—. „ „ A. patŭlum L.; ſ. Nr. 2211.
—. „ „ A. angustifolĭum Sm.; ſ. Nr. 2159.
—. „ „ A. roseum L.; ſ. Nr. 2327.
—. „ „ A. laciniātum L.; ſ. Nr. 2328.
—. „ Amarantpfl.: Amarāntus blitum L.; ſ. Nr. 2247.
—. „ „ A. prostrātus Rchb.; ſ. Nr. 2248.
—. „ Spitzklettenpfl.: Xanthĭum strumarĭum L.; ſ. Nr. 2304.
—. XXI., 5; Spitzklettenpfl.: X. macrocārpum DC.; ſ. Nr. 2305.

§. 532. **K. Auf Düngerhaufen, an Dungſtätten u. dergl.:**

—. III., 2; Graspfl.: Echinochlŏa crus-galli L.; ſ. Nr. 2329.
—. V., 1; Nachtſchattenpfl.: Hyoscyămus niger L.; ſ. Nr. 1195.
—. „ „ *Datūra stramonĭum L.; ſ. Nr. 1253.
—. V., 1; Nachtſchattenpfl.: Solānum nigrum L.; ſ. Nr. 1254.
—. V., 2; Meldenpfl.: Chenopodĭum glaucum L.; ſ. Nr. 1292.
—. V., 2; Meldenpfl.: Ch. hybrĭdum L.; ſ. Nr. 2229.
—. „ „ Ch. ficifolĭum Sm.; ſ. Nr. 3004.
—. „ „ Ch. album L.; ſ. Nr. 2231.
—. „ „ Ch. vulvarĭa L.; ſ. Nr. 2232.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygŏnum persicarĭa L.; ſ. Nr. 2182.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: P. aviculare L.; ſ. Nr. 2255.
—. XII., 3; Roſenpfl.: Potentĭlla supīna L.; ſ. Nr. 1369.
—. XIII., 1; Mohnpfl.: Chelidonĭum majus L.; ſ. Nr. 534.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Capsēlla bursa pastōris Vent.; ſ. Nr. 3.
—. XIX., 1; Korbblütler: Sonchus oleracĕus L.; ſ. Nr. 1262.
—. „ „ Lappa minor DC.; ſ. Nr. 2199.
—. „ „ L. major Gaertn.; ſ. Nr. 2200.
—. „ „ L. tomentōsa Lmk.; ſ. Nr. 2201.
—. XIX., 2; „ *Cotŭla coronopifolĭa L.; ſ. Nr. 2294.
—. XXI., 5; Meldenpfl.: Atrĭplex patŭlum L.; ſ. Nr. 2211.
—. „ „ A. oblongifolĭum W. et K.; ſ. Nr. 2303.
—. XXI., 5; Meldenpfl.: A. roseum L.; ſ. Nr. 2327.

—. XXI., 5; Meldenpfl.: A. laciniatum L.; ſ. Nr. 2328.
—. „ Spitzklettenpfl.: Xanthium strumarium L.; ſ. Nr. 2304.

L. Auf Aeckern: §. 533.

—. II., 1; Rachenblümler: Veronica agrēstis L.; ſ. Nr. 224.
—. „ „ V. polita Fr.; ſ. Nr. 61.
—. „ Lippenblümler: Salvia sylvēstris L.; ſ. Nr. 2168.
—. III., 1; Baldrianpfl.: *Valerianella morisonii DC.; ſ. Nr. 2330.
—. III., 1; Baldrianpfl.: *V. dentata DC.; ſ. Nr. 2368.
—. „ „ *V. auricula DC.; ſ. Nr. 2369.
—. „ Halbgras: Cypērus glomerātus L.; ſ. Nr. 2948.
—. III., 2; Grazpfl.: Andropōgon ischaemum L.; ſ. Nr. 2261.
—. „ „ Setaria verticillāta P. B.; ſ. Nr. 1249.
—. „ „ S. viridis P. B.; ſ. Nr. 2249.
—. „ „ S. glauca P. B.; ſ. Nr. 2331.
—. „ „ S. italica Kth.; ſ. Nr. 2351.
—. „ „ Cynodon dactylon Rich.; ſ. Nr. 2332.
—. „ „ Digitaria glabra R. et Sch.; ſ. Nr. 1272.
—. „ „ D. ciliāris Koel.; ſ. Nr. 1251.
—. „ „ Arrhenathērum avenacēum P. B.; ſ. Nr. 1382.
—. III., 2; Grazpfl.: Avēna brevis Roth; ſ. Nr. 1383.
—. „ „ *A. orientālis Schreb.; ſ. Nr. 2334.
—. „ „ *A. hybrida Peterm.; ſ. Nr. 2335.
—. „ „ Bromus secalinus L.; ſ. Nr. 2336.
—. „ „ Poa annua L.; ſ. Nr. 14.
—. „ „ Triticum repens L.; ſ. Nr. 1279.
—. IV., 1; Kardenpfl.: Scabiōsa columbaria L.; ſ. Nr. 2080.
—. „ „ Sc. arvēnsis L.; ſ. Nr. 1283.
—. „ Krapppfl.: Sherardia arvēnsis L.; ſ. Nr. 632.
—. „ „ Galium aparine L.; ſ. Nr. 2155.
—. „ Roſenpfl.: Alchemilla aphānes Leers; ſ. Nr. 631.
—. V., 1; Schlüſſelblümler: Anagāllis arvēnsis L.; ſ. Nr. 55.
—. „ „ A. coerulea Schreb.; ſ. Nr. 227.
—. „ Nachtſchattenpfl.: *Solānum nigrum L.; ſ. Nr. 1254.
—. „ „ *S. melānocerāsum Willd.; ſ. Nr. 2317.
—. V., 1; Borretſchpfl.: Echium vulgāre L.; ſ. Nr. 1108.
—. „ Glockenblümler: Campanula rotundifolia L.; ſ. Nr. 1288.
—. V., 1; Glockenblümler: C. rapunculoides L.; ſ. Nr. 3002.
—. „ Veilchenpfl.: Viola tricolor L.; ſ. Nr. 525.
—. V., 2; Meldenpfl.: Blitum virgātum L.; ſ. Nr. 2251.

—. V., 2; Meldenpfl.: Chenopodĭum album L.; ſ. Nr. 2231.
—. „ „ Ch. polyspērmum L.; ſ. Nr. 2232.
—. „ „ Kochĭa scoparĭa Schrad.; ſ. Nr. 2319.
—. „ Doldenpfl.: Critămus falcarĭa Rchb.; ſ. Nr. 2252.
—. „ „ Aethūsa cynapĭum L.; ſ. Nr. 2178.
—. „ „ Turgenĭa latifolĭa Hoffm.; ſ. Nr. 2338.
—. „ „ Conĭum maculātum L.; ſ. Nr. 2181.
—. VI., 1; Lilienpfl.: *Allĭum oleracĕum L.; ſ. Nr. 2339.
—. VI., 3; Knöterichpfl.: Rumex acetosēlla L.; ſ. Nr. 1296.
—. VIII., 1; „ Polygŏnum aviculāre L.; ſ. Nr. 2255.
—. „ „ P. convolvŭlus L.; ſ. Nr. 1257.
—. „ „ *P. tatarĭcum L.; ſ. Nr. 2340.
—. X., 2; Paronychienpfl.: Scleränthus annŭus L.; ſ. Nr. 574.
—. X., 3; Nelkenblütler: Stellarĭa medĭa Vill.; ſ. Nr. 4.
—. „ „ Silēne noctiflōra L.; ſ. Nr. 2257.
—. „ „ Spergularĭa rubra Presl.; ſ. Nr. 576.
—. X., 4; „ Sagīna procūmbens L ; ſ. Nr. 635.
—. X., 5; „ Spergŭla arvēnsis L.; ſ. Nr. 1394.
—. „ „ Agrostĕmma githāgo L.; ſ. Nr. 1395.
—. „ Schnabelpfl.: *Oxălis stricta Jacq.; ſ. Nr. 1260.
—. „ „ *O. corniculāta L.; ſ. Nr. 1261.
—. XI., 1; Fettkrautpfl.: Portulāca oleracĕa L.; ſ. Nr. 1269.
—. XI., 3; Waupfl.: Resēda luteŏla L.; ſ. Nr. 1299.
—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: Nigēlla arvēnsis L.; ſ. Nr. 2341.
—. „ „ Delphinĭum consolĭda L.; ſ. Nr. 636.
—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: *D. ajācis L.; ſ. Nr. 1398.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Lamĭum purpurĕum L.; ſ. Nr. 10.
—. XIV., 1; Lippenblümler: L. incīsum Willd.; ſ. Nr. 206.
—. „ „ L. amplexicaule L.; ſ. Nr. 214.
—. „ „ Galeōpsis ladănum L.; ſ. Nr. 2342.
—. XIV., 1; Lippenblümler: G. bifĭda Bönningh.; ſ. Nr. 2191.
—. XIV., 1; Lippenblümler: G. pubēscens Bess.; ſ. Nr. 2109.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Linarĭa minor Desf.; ſ. Nr. 1399.
—. „ „ L. vulgāris Desf.; ſ. Nr. 2193.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Thlapsi arvēnse L.; ſ. Nr. 215.
—. „ „ Capsēlla bursa pastōris Vent.; ſ. Nr. 3.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Senebiēra coronŏpus Poir.; ſ. Nr. 2258.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Arăbis thaliāna L.; ſ. Nr. 58.

—. XV., 2; Kreuzblütler: Diplotāxis murālis DC.; ſ. Nr. 1314.
—. „ „ Erucāstrum obtusangŭlum Rchb.; ſ. Nr. 1362.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Raphănus raphanĭstrum L.; ſ. Nr. 588.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum rotundifolĭum L.; ſ. Nr. 560.
—. XVI., 5; Pappelroſenpfl.: Hibīscus triōnum L.; ſ. Nr. 2278.
—. XVI., 5; Pappelroſenpfl.: Althaea hirsūta L.; ſ. Nr. 2195.
—. XVII., 2; Erdrauchpfl.: Fumarĭa officinālis L.; ſ. Nr. 561.
—. „ „ F. vaillantĭi Lois.; ſ. Nr. 643.
—. „ „ F. wirtgenĭi Koch; ſ. Nr. 1403.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Medicāgo glomerāta Balb.; ſ. Nr. 1404.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: M. prostrāta Jacq.; ſ. Nr. 1405.
—. „ „ M. lupulīna L.; ſ. Nr. 468.
—. „ „ Pocockĭa radiāta Trautv.; ſ. Nr. 2343.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolĭum arvēnse L.; ſ. Nr. 1408.
—. „ „ T. campēstre Schreb.; ſ. Nr. 1409.
—. „ „ T. procŭmbens L.; ſ. Nr. 1329.
—. „ „ Vicĭa cracca L.; ſ. Nr. 1228.
—. „ „ V. tenuifolĭa Roth; ſ. Nr. 1229.
—. „ „ Lathўrus tuberōsus L.; ſ. Nr. 2198.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum auricŭla L.; ſ. Nr. 1334.
—. „ „ Crepis virens L.; ſ. Nr. 1415.
—. „ „ Lactūca scariōla L.; ſ. Nr. 2284.
—. „ „ Sonchus oleracĕus L.; ſ. Nr. 1262.
—. „ „ S. asper Hall.; ſ. Nr. 1263.
—. „ „ Taraxăcum officināle Mnch.; ſ. Nr. 59.
—. XIX., 1; Korbblütler: Helminthĭa echioīdes Gaertn.; ſ. Nr. 1232.
—. XIX., 1; Korbblütler: Lampsăna commūnis L.; ſ. Nr. 1128.
—. XIX., 1; Korbblütler: Cirsĭum arvēnse Scop.; ſ. Nr. 2286.
—. „ „ Cardŭus nutans L.; ſ. Nr. 2289.
—. „ „ Senecĭo vulgāris L.; ſ. Nr. 218.
—. „ „ Filāgo arvēnsis L.; ſ. Nr. 2344.
—. „ „ Matricarĭa chamomīlla L.; ſ. Nr. 1417.
—. XIX., 1; Korbblütler: Anthĕmis arvēnsis L.; ſ. Nr. 1342.
—. „ „ A. neilreichĭi Joh. Ortm.; ſ. Nr. 2325.

—. XIX., 1; Korbblütler: A. austriăca Jacq.; ſ. Nr. 2345.
—. „ „ *Galinsōga parviflōra Cav.; ſ. Nr. 2346.
—. XIX., 1; Korbblütler: Bellis perēnnis L.; ſ. Nr. 2.
—. „ „ *Erigĕron canadēnsis L.; ſ. Nr. 2347.
—. XIX., 3; Korbblütler: *Centaurēa solstitiālis L.; ſ. Nr. 2348.
—. XIX., 4; Korbblütler: Calendŭla arvēnsis L.; ſ. Nr. 1418.
—. XXI., 1; Giftmilcher: *Euphorbĭa peplus L.; ſ. Nr. 1265.
—. „ „ E. falcāta L.; ſ. Nr. 2349.
—. „ „ E. helĭoscopĭa L.; ſ. Nr. 222.
—. XXI., 4; Neſſelpfl.: Urtīca dioĭca L.; ſ. Nr. 2102.
—. „ „ U. urens L.; ſ. Nr. 1234.
—. „ „ U. pilulifĕra L.; ſ. Nr. 1266.
—. XXI., 5; Meldenpfl.: Atrĭplex hastātum L.; ſ. Nr. 2210.
—. „ „ A. patŭlum L.; ſ. Nr. 2211.
—. „ „ A. angustifolĭum Sm.; ſ. Nr. 2159.
—. XXII., 8; Giftmilcher: Mercuriālis annŭa L.; ſ. Nr. 1267.

a. Kulturpflanzen:

3013. III., 1; Halbgras: *Cypērus esculēntus L. Eßbares Zipergras (Erdmandel, Erdnuß). Wrz. ausläufertreib., mit quergeſtreiften Knollen an fädl. Faſern; Aehrchen ſtrohgelb; Narben 3, Halm 3kant., an der Baſis beblätt.; 4; 8 bis 9; ♆; Vaterland: Südeuropa, Nordafrika.
—. III., 2; Graspfl.: *Panĭcum miliacĕum L.; ſ. Nr. 1419.
3014. „ „ *Phalăris canariēnsis L. Kanarienhirſe (Glanz). Riſpe ährenf.; Klapp. zugeſp., am Rande 1nervig, auf dem Rücken mit ganzrand. Flüg.; die 2 unfruchtb. Bl. halb ſo lang, als die fruchtb.; ☉; 7 bis 8; ♆; Vaterland: Südeuropa.
—. III., 2; Graspfl.: *Avēna orientālis Schreb.; ſ. Nr. 2334.
—. IV., 1; Wegerichpfl.: Plantāgo psyllĭum L.; ſ. Nr. 2353.
—. „ Krapppfl.: *Rubĭa tinctōrum L.; ſ. Nr. 2173.
—. V., 1; Nachtſchattenpfl.: *Nicotiāna tabăcum L.; ſ. Nr. 2354.
—. V., 1; Nachtſchattenpfl.: *N. macrophȳlla Spr.; ſ. Nr. 2355.
—. „ „ *Solānum tuberōsum L.; ſ. Nr. 2356.
—. V., 2; Doldenpfl.: *Pimpinēlla anīsum L.; ſ. Nr. 2358.
—. „ „ *Sium sisărum L.; ſ. Nr. 2359.
—. V., 2; Meldenpfl.: Beta vulgāris L.; ſ. Nr. 2357.

—. VIII., 1; Knöterichpfl.: *Polygŏnum fagopȳrum L.; ſ. Nr. 2360.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: *P. tatarĭcum L.; ſ. Nr. 2340.
—. X., 6; Schminkpfl.: *Phytolacca decandra L.; ſ. Nr. 2361.
—. XI., 3; Waupfl.: Resēda luteŏla L.; ſ. Nr. 1299.
—. XIII., 1; Mohnpfl.: *Papāver somnifĕrum L.; ſ. Nr. 1436.
—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: *Nigēlla satīva L.; ſ. Nr. 2362.
—. „ Gichtroſenpfl.: Cimicifŭga foetĭda L.; ſ. Nr. 2062.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: *Medicago satīva L.; ſ. Nr. 1323.
—. „ „ *Trigonēlla foenum graecum L.; ſ. Nr. 1438.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolĭum pratēnse L.; ſ. Nr. 1032.
—. „ „ T. repens L.; ſ. Nr. 597.
—. „ „ *Glycyrrhīza glabra L.; ſ. Nr. 2363.
—. „ „ Ervum monānthos L.; ſ. Nr. 1332.
—. „ „ *Vicĭa faba L.; ſ. Nr. 1441.
—. „ „ *Lathȳrus satīvus L.; ſ. Nr. 659.
—. „ „ *Phaseŏlus vulgaris L.; ſ. Nr. 1447.
—. XIX., 3; Korbblütler: *Cnicus benedīctus L.; ſ. Nr. 2365.
—. „ „ *Helianthus annŭus L.; ſ. Nr. 2315.
—. XXI., 3; Graspfl: *Zea mays L.; ſ. Nr. 1448.
—. XXI., 9; Kürbispfl.: *Cucŭmis satīvus L.; ſ. Nr. 2366.
—. „ „ *Cucurbīta pepō L.; ſ. Nr. 2367.
—. XXII., 5; Neſſelpfl.: Humŭlus lupŭlus L.; ſ. Nr. 2103.

b. Unter der Saat:

—. III., 1; Baldrianpfl.: *Valerianēlla dentāta DC.; ſ. Nr. 2368.
—. III., 1; Baldrianpfl.: *V. auricŭla DC.; ſ. Nr. 2369.
—. IV., 1; Krapppfl.: Galĭum tricōrne With.; ſ. Nr. 2370.
—. „ Wegerichpfl.: Plantāgo psyllĭum L.; ſ. Nr. 2353.
—. V., 1; Glockenblümler: Specularĭa vulgāris Kitt.; ſ. Nr. 1451.
—. V., 1; Glockenblümler: Sp. hybrĭda DC.; ſ. Nr. 1452.
—. V., 2; Doldenpfl.: Orlaȳa grandiflōra Hoffm.; ſ. Nr. 2371.
—. V., 2; Doldenpfl.: Torĭlis infēsta Rchb.; ſ. Nr. 2180.
—. VI., 3; Knöterichpfl.: Rumex crispus L.; ſ. Nr. 2254.
—. X., 2; Nelkenblütler: Vaccarĭa pyramidāta Fl. Wett.; ſ. Nr. 2185.
—. X., 3; Nelkenblütler: Silēne gallĭca L.; ſ. Nr. 1460.
—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: Nigēlla arvēnsis L.; ſ. Nr. 2341.
—. XIII., 3; „ Adōnis flammĕa Jacq.; ſ. Nr. 1463.

—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: A. autumnālis L.; ſ. Nr. 1302.
—. XIV., 1; Lippenblümler. Galeōpsis ochroleuca Lmk.; ſ. Nr. 2238.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Stachys annŭa L.; ſ. Nr. 2373.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Linarĭa arvēnsis Desf.; ſ. Nr. 2374.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Melānosināpis commūnis Sch. et Sp.; ſ. Nr. 2375.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Melilōtus officinālis L.; ſ. Nr. 1326.
—. „ „ Trifolĭum arvēnse L.; ſ. Nr. 1408.
—. „ „ T. campēstre Schreb.; ſ. Nr. 1409.
—. XIX., 1; Korbblütler: Crepis tectōrum L.; ſ. Nr. 1366.
—. „ „ Cirsĭum arvēnse Scop.; ſ. Nr. 2286.
—. XIX., 2; „ Chrysanthĕmum segĕtum L.; ſ. Nr. 2376.
—. XIX., 2; Korbblütler: Anthĕmis neilreichĭi J. Ortm.; ſ. Nr. 2325.
—. XIX., 3; Korbblütler: *Centaurēa cyănus L.; ſ. Nr. 674.

c. Auf feuchten Aeckern:

—. II., 1; Rachenblümler: Veronīca serpyllifolĭa L.; ſ. Nr. 424.
—. V., 1; Glockenblümler: Wahlenbergĭa hederacĕa Rchb.; ſ. Nr. 2113.
—. X., 2; Nelkenblütler: Gypsophĭla murālis L.; ſ. Nr. 2234.
—. X., 4; „ Sagīna apetăla L.; ſ. Nr. 604.
—. X., 5; „ Cerastĭum vulgātum L. spec.; ſ. Nr. 463.
—. X., 5; Nelkenblütler: C. viscōsum L.; ſ. Nr. 684.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Mentha arvēnsis L.; ſ. Nr. 2213.
—. „ „ Galeōpsis versicŏlor Curt.; ſ. Nr. 2124.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Stachys arvēnsis L; ſ. Nr. 2395.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Alectorolŏphus major Rchb.; ſ. Nr. 1495.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Euphrasĭa odontītes L.; ſ. Nr. 2308.
—. „ „ E. serotīna Lmk.; ſ. Nr. 2309.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Nasturtĭum sylvēstre R. Br.; ſ. Nr. 1487.
—. XIX., 2; Korbblütler: Marūta cotŭla DC.; ſ. Nr. 2396.
—. XIX., 3; „ Bidens bipinnāta L.; ſ. Nr. 2397.
—. XXI., 1; Giftmilcher: Euphorbĭa stricta Sm.; ſ. Nr. 1041.

d. Auf feuchten Lehm- und Mergeläckern:

—. X., 4; Nelkenblütler: Sagīna ciliāta Fr.; ſ. Nr. 1491.

c. Auf Mergel- und Thonäckern:

—. XV., 2; Kreuzblütler: Diplotaxis viminea DC.; s. Nr. 1492.
—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Lathyrus tuberosus L.; s. Nr. 2198.
—. XIX., 1; Korbblütler: Sonchus arvensis L.; s. Nr. 2402.
—. „ „ Filago gallica L.; s. Nr. 2403.

f. Auf Lehm- und Mergeläckern:

Vergl. §. 533, e; außerdem:
—. XIV., 2; Rachenblümler: Linaria elatine Mill.; s. Nr. 2404.

g. Auf Lehmäckern:

Vergl. §. 533, f; außerdem:
—. X., 5; Nelkenblütler: Cerastium vulgatum L. spec.; s. Nr. 463.
—. XVII., 2; Erdrauchpfl.: Fumaria densiflora DC.; s. Nr. 1488.

h. Auf kalkhaltigen Feldern:

—. XV., 1; Kreuzblütler: Iberis amara L.; s. Nr. 1494.
—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Lathyrus tuberosus L.; s. Nr. 2198.
—. XXI., 1; Giftmilcher: Euphorbia platyphyllos L.; s. Nr. 2326.

i. Auf Kiesfeldern:

—. V., 2; Meldenpfl.: Blitum capitatum L.; s. Nr. 2312.
—. X., 2; Nelkenblütler: Dianthus saxifraga L.; s. Nr. 2400.

k. Auf mageren Aeckern:

—. V., 2; Doldenpfl.: Eryngium campestre L.; s. Nr. 2271.
—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Ononis spinosa L.; s. Nr. 1321.
—. XIX., 1; Korbblütler: Crepis foetida L.; s. Nr. 1336.
—. XIX., 2; „ Filago montana L.; s. Nr. 2401.

l. Auf Sandfeldern:

—. III., 1; Amarantpfl.: Polycnemum arvense L.; s. Nr. 2382.
—. III., 2; Graspfl.: *Eragrostis megastachya Lk.; s. Nr. 2383.
—. III., 2; Graspfl.: Poa compressa L.; s. Nr. 1278.
. IV., 1; Krapppfl.: Galium anglicum Huds.; s. Nr. 2377.
—. „ Wegerichpfl.: Plantago psyllium L.; s. Nr. 2353.
—. „ „ Pl. arenaria W. et K.; s. Nr. 2384.
—. „ Kardenpfl.: Scabiosa ochroleuca L.; s. Nr. 2386.
—. V., 1; Rachenblümler: Verbascum versiflorum Schrad.; s. Nr. 2387.

—. V., 1; Borretſchpfl.: Heliotropium europaeum L.; ſ. Nr. 2388.
—. V., 1; Glockenblümler: Jasione montana L.; ſ. Nr. 1290.
—. „ Paronychienpfl.: Herniaria hirsuta L.; ſ. Nr. 2389.
—. V., 2; Meldenpfl.: Chenopodium botrys L.; ſ. Nr. 1352.
—. „ „ Kochia prostrata Schrad.; ſ. Nr. 2390.
3015. „ „ K. arenaria Roth. Sand-Kochie. Rauhharig; Bltr. pfrieml.-fadenf., etwas fleiſch.; Bl. meiſt zu 3, blattachſelſt.; Anhängſ. der fruchttrag. Blütenhülle faſt rautenf., ungleich; Staubb. roſenrot; ☉; 8 bis 10; Mittelrhein, Oe., Mä.
—. VI., 3; Knöterichpfl.: Rumex acetosella L.; ſ. Nr. 1296.
—. X., 2; Nelkenblütler: Dianthus prolifer L.; ſ. Nr. 2275.
„ „ Gypsophila fastigiata L.; ſ. Nr. 1480.
—. X., 3; „ Alsine tenuifolia Whlbg.; ſ. Nr. 1355.
—. „ „ A. jacquini Koch; ſ. Nr. 1481.
—. X., 5; „ Spergula arvensis L.; ſ. Nr. 1394.
—. „ Dickblattpfl.: Sedum sexangulare L.; ſ. Nr. 2391.
—. XIII., 1; Sonnenröslein: Helianthemum guttatum Mill.; ſ. Nr. 1482.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Linaria vulgaris Desf.; ſ. Nr. 2193.
—. XIV., 2; Rachenblümler: L. arvensis Desf.; ſ. Nr. 2374.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Sisymbrium sophia L.; ſ. Nr. 591.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranium dissectum L.; ſ. Nr. 538.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Erodium cicutarium l'Herit.; ſ. Nr. 217.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolium arvense L.; ſ. Nr. 1408.
—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hypericum humifusum L.; ſ. Nr. 2134.
—. XIX., 1; Korbblütler: Arnoseris pusilla Gaertn.; ſ. Nr. 2392.
—. XIX., 2; Korbblütler: Filago arvensis L.; ſ. Nr. 2344.
—. XIX., 1; Giftmilcher: Euphorbia segetalis L.; ſ. Nr. 2399.
—. XXI., 5; Amarantpfl.: Amarantus retroflexus L.; ſ. Nr. 3009.

m. Auf mageren Sandäckern:

—. X., 2; Paronychienpfl.: Scleranthus intermedius Kitt. ſ. Nr. 2393.
—. X., 5; Dickblattpfl.: Sedum reflexum L.; ſ. Nr. 2235.

n. Auf feuchten und naſſen Sandfeldern:

—. III., 1; Fettkrautpfl.: Montĭa fontāna L.; ſ. Nr. 683.
—. V., 1; Paronychienpfl.: Illecĕbrum verticillātum L.; ſ. Nr. 1483.
—. X., 3; Nelkenblütler: Spergularĭa rubra Presl.; ſ. Nr. 576.
—. XI., 1; Weiderichpfl.: Lythrum hyssopifolĭa L.; ſ. Nr. 2394.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Erysĭmum cheiranthoïdes L.; ſ. Nr. 1484.
—. XIX., 2; Korbblütler: Gnaphalĭum uliginōsum L.; ſ. Nr. 2398.

o. Auf ſandigen Gemüſeäckern:

3016. III., 3; Paronychienpfl.: *Polycarpon tetraphȳllum L. fil. Vierblättriges Nagelkraut. Blr. verk.-eiſ., zu 4 quirlig; Bl. grünl.; St. von der Baſis aus äſtig, niedergeſtreckt; Bl. gipfelſt., in gedrängter, 3theil., doldentraub. Riſpe; ☉; 6 bis 8; Schl., Bö., Mannheim.

p. Auf Krautäckern:

—. IV., 1; Krapppfl.: Galĭum spurĭum L.; ſ. Nr. 2217.

q. Auf rauhen Aeckern:

—. XIX., 2; Korbblütler: Filāgo germanĭca L.; ſ. Nr. 2292.

r. Auf Gebirgsäckern:

—. XIV., 1; Lippenblümler: Teucrĭum botrys L.; ſ. Nr. 2405.

s. An ſumpfigen Ackerrändern:

—. XIV., 1; Lippenblümler: Stachys palūstris L.; ſ. Nr. 1905.

t. Auf Brachen:

—. II., 1; Rachenblümler: Veronĭca arvēnsis L.; ſ. Nr. 64.
—. IV., 1; Krapppfl.: Galĭum anglĭcum Huds.; ſ. Nr. 2377.
—. V., 1; Glockenblümler: Specularĭa vulgāris Kitt.; ſ. Nr. 1451.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Stachys annŭa L.; ſ. Nr. 2373.
—. " " Sideritis montāna L.; ſ. Nr. 2379.
—. " " Galeōpsis ladănum L.; ſ. Nr. 2342.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Antirrhīnum orontĭum L.; ſ. Nr. 2324.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Linarĭa spurĭa Mill.; ſ. Nr. 2380.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Erucāstrum pollichĭi Sch. et Sp.; ſ. Nr. 1315.

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolium filiförme L.; ſ. Nr. 599.
—. „ „ T. campēstre Schreb; ſ. Nr. 1409.
—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperīcum humifūsum L.; ſ. Nr. 2134.
—. XIX., 2; Korbblütler: Senecīo sylvatĭcus L.; ſ. Nr. 1080.
—. „ „ Achillēa millefolĭum L.; ſ. Nr. 2101.

u. Auf ſandigen Brachen:

—. V., 1; Paronychienpfl.: Herniarĭa glabra L.; ſ. Nr. 1476.
—. X., 2; „ Sclerānthus perēnnis L.; ſ. Nr. 676.
—. „ Nelkenblütler: Gypsophīla murālis L.; ſ. Nr. 2234.
—. X., 4; „ Spergēlla subulāta Rchb.; ſ. Nr. 1188.

v. Auf feuchten Brachen:

—. X., 4; Nelkenblütler: Sagīna apetăla L.; ſ. Nr. 604.
—. XIX., 2; Korbblütler: Asteriscus aquatĭcus Less.; ſ. Nr. 2381.

§. 534. **M. An faſt allen Orten:**

—. XIV., 2; Rachenblümler: Euphrasĭa officinālis L.; ſ. Nr. 2406.
—. XXI., 1; Giftmilcher: Euphorbĭa cyparissĭas L.; ſ. Nr. 2407.

§. 535. **N. Auf fettem Boden:**

—. III., 2; Graspfl.: Echinochlŏa crus-galli L.; ſ. Nr. 2329.
—. V., 1; Nachtſchattenpfl.: *Datūra stramonĭum L.; ſ. Nr. 1253.
—. V., 2; Meldenpfl.: Chenopodĭum album L.; ſ. Nr. 2231.
—. „ „ Ch. vulvarĭa L.; ſ. Nr. 2232.
—. „ „ Ch. polyspērmum L.; ſ. Nr. 2233.
—. X., 5; Schnabelpfl.: *Oxălis stricta Jacq.; ſ. Nr. 1260.
—. „ „ *O. corniculāta L.; ſ. 1261.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Mentha sylvēstris L.; ſ. Nr. 2218.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum boreale Fr.; ſ. Nr. 2996.
—. „ „ Cardŭus crispus L.; ſ. Nr. 2099.
—. XXI., 5; Meldenpfl.: Atrĭplex hastātum L.; ſ. Nr. 2210.
—. „ „ A. patŭlum L.; ſ. Nr. 2211.
—. „ „ A. angustifolĭum Sm.; ſ. Nr. 2159.

§. 536. **O. Auf Sandboden:**

—. III., 3; Paronychienpfl.: *Polycārpon heterophȳllum L. fil.; ſ. Nr. 3016.

—. IV., 1; Kardenpfl.: Scabiōsa arvēnsis L.; ſ. Nr. 1283.
—. V., 1; Paronychienpfl.: Herniaria glabra L.; ſ. Nr. 1476.
—. „ „ H. hirsūta L.; ſ. Nr. 2389.
—. V., 2; Meldenpfl.: Corispērmum marschallii Stev.; ſ. Nr. 2408.
—. V., 2; Doldenpfl.: Eryngium campēstre L.; ſ. Nr. 2271.
—. „ „ Pimpinēlla saxifrăga L.; ſ. Nr. 2176.
—. V., 5; Bleiwurzpfl.: Armeria plantaginĕa Willd.; ſ. Nr. 2409.
—. VI., 3; Knöterichpfl.: Rumex acetosēlla L.; ſ. Nr. 1296.
—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: *Oenothēra biēnnis L.; ſ. Nr. 2256.
—. X., 1; Rautenpfl.: Tribŭlus terrēstris L.; ſ. Nr. 1353.
—. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus armeria L.; ſ. Nr. 2133.
—. „ „ Saponaria officinālis L.; ſ. Nr. 2184.
—. „ Paronychienpfl.: Scleranthus perēnnis L.; ſ. Nr. 676.
—. X., 3; Nelkenblütler: Silēne inflāta Sm.; ſ. Nr. 1178.
—. „ „ Spergularia rubra Presl.; ſ. Nr. 576.
—. X., 5; Dickblattpfl.: Sedum acre L.; ſ. Nr. 1298.
—. XI., 1; Fettkrautpfl.: Portulāca oleracĕa L.; ſ. Nr. 1269.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Stachys recta L.; ſ. Nr. 1303.
—. „ „ Teucrium scorodonia L.; ſ. Nr. 2090.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Linaria vulgāris Desf.; ſ. Nr. 2193.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Biscutēlla laevigāta L.; ſ. Nr. 2410.
—. „ „ Senebiēra didyma Pers.; ſ. Nr. 2323.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Onōnis repens L.; ſ. Nr. 1320.
—. „ „ Melilōtus officinālis L.; ſ. Nr. 1326.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracium pilosēlla L.; ſ. Nr. 1181.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hypochoeris glabra L.; ſ. Nr. 1416.
—. XIX., 2; Korbblütler: Senecio lividus L.; ſ. Nr. 1503.
—. „ „ Gnaphalium lutĕo-album L.; ſ. Nr. 2411.
—. XIX., 2; Korbblütler: Tanacētum vulgāre L.; ſ. Nr. 2293.

a. Auf feuchtem Sandboden:

—. III., 1; Fettkrautpfl.: Montia fontāna L.; ſ. Nr. 683.
—. III., 2; Graspfl.: Andropōgon ischaemum L.; ſ. Nr. 2261.
—. „ „ Calamagrōstis epigeios Roth; ſ. Nr. 2170.
—. „ „ C. montāna Host; ſ. Nr. 1102.
—. IV., 1; Enzianpfl.: Cicendia filiformis Rchb.; ſ. Nr. 2412.

—. IV., 4; Leinpfl.: Radiŏla millegrāna Sm.; ſ. Nr. 2413.
—. V., 1; Paronychienpfl.: Illecĕbrum verticillātum L.; ſ. Nr. 1483.
—. V., 2; Doldenpfl.: Hydrocotўle vulgāris L.; ſ. Nr. 2137.
—. V., 3; Paronychienpfl.: Corrigiŏla littorālis L.; ſ. Nr. 1348.
—. V., 5; Bleiwurzpfl.: Armerĭa vulgāris Willd.; ſ. Nr. 1295.
—. VI., 1; Semede: Juncus commūnis E. Mey.; ſ. Nr. 1512.
—. „ „ J. bufonĭus L.; ſ. Nr. 1513.
—. „ „ J. tenageia Ehrh.; ſ. Nr. 1514.
—. „ Lilienpfl.: Allĭum kermesīnum Rchb.; ſ. Nr. 2414.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygŏnum minus Huds.; ſ. Nr. 2118.
—. X., 4; Nelkenblütler: Sagīna procūmbens L.; ſ. Nr. 635.
—. X., 5; „ Spergēlla subulāta Rchb.; ſ. Nr. 1188.
—. X., 5; Nelkenblütler: Spergŭla arvēnsis L.; ſ. Nr. 1394.
—. XI., 2; Roſenpfl.: Aremonĭa agrimonioīdes Neck.; ſ. Nr. 1515.
—. XII., 3; Roſenpfl.: Potentīlla supīna L.; ſ. Nr. 1369.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Nasturtĭum palūstre DC.; ſ. Nr. 1933.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Erysĭmum cheiranthoīdes L.; ſ. Nr. 1484.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Brayă supīna Koch; ſ. Nr. 2413.
—. XXI., 3; Halbgras: Carex oedēri Retz.; ſ. Nr. 691.

b. Auf trocknem, unfruchtbarem Sandboden:

—. III., 2; Graspfl.: Calamagrōstis arenarĭa Roth; ſ. Nr. 2417.
—. „ „ Setarĭa glauca P. B.; ſ. Nr. 2331.
—. „ „ Cynŏdon dactўlon Rich.; ſ. Nr. 2332.
—. „ „ Digitarĭa glabra R. et Sch.; ſ. Nr. 1272.
—. „ „ D. ciliāris Koel.; ſ. Nr. 1251.
—. V., 1; Rachenblümler: Verbāscum thapsus L.; ſ. Nr. 2107.
—. „ „ V. thapsifōrme Schrad.; ſ. Nr. 2418.
3017. „ „ V. phlomoīdes L. Windblumen-ähnliches Wollkraut. Blтr. gekerbt, beiderſ. dicht-gelb-filz.; Blkr. radf., gelb; Wolle der Stbf. weiß; 2 längere Stbf. kahl oder oberw. ſpärl.-behart, $1\frac{1}{2}$- oder 2mal ſo lang als der auf der einen Seite lang-herablauf. Staubb.; ♂; 8; ☰.
—. XIX., 2; Korbblütler: Helichrўsum arenarĭum DC.; ſ. Nr. 2419.
—. XIX., 2; Korbblütler: Antennarĭa dioĭca Gaertn.; ſ. Nr. 603.

—. XIX., 2; Korbblütler: Artemisĭa campēstris L.; ſ. Nr. 3008.
—. XXII., 13; Zapfenfrüchtler: Ephĕdra monostachўa L.; ſ. Nr. 1505.

c. Auf unfruchtbaren Sand- und Kiesfeldern:

—. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus saxifrăga L.; ſ. Nr. 2400.
—. X., 5; Dickblattpfl.: Sedum reflĕxum L.; ſ. Nr. 2235.

d. Auf feuchtem Kies:

—. V., 1; Schlüſſelblümler: Lysimachĭa nemŏrum L.; ſ. Nr. 1048.

e. Auf Quarzſand:

—. VIII., 1; Heidepfl.: Callūna vulgāris Salisb.; ſ. Nr. 1075.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Galeōpsis ochroleuca Lmk.; ſ. Nr. 2238.

f. Auf feuchtem Quarzſandboden:

—. VI., 1; Semede: Juncus capitātus Weig.; ſ. Nr. 1510.

g. Auf lockerem Sandboden:

—. V., 1; Glockenblümler: Campanŭla rapuncŭlus L.; ſ. Nr. 1289.

h. Auf kalkhaltigem Sandboden:

—. X., 3; Nelkenblütler: Alsīne tenuifolĭa Whlbg.; ſ. Nr. 1355.
—. XIX., 1; Korbblütler: Chondrīlla juncĕa L.; ſ. Nr. 2096.

i. Auf Sandboden unter Gebüſch:

—. XIV., 2; Rachenblümler: Digitālis ambigŭa Murr.; ſ. Nr. 1024.

k. Auf ſandigen Rainen und Ackerrändern:

—. V., 1; Rachenblümler: Verbāscum mönchĭi Schultz; ſ. Nr. 2267.

l. An ſandigen, ſonnigen Orten:

—. V., 1; Paronychienpfl.: Herniarĭa alpīna Vill.; ſ. Nr. 2420.
—. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus armerĭa L.; ſ. Nr. 2133.
—. " " D. deltoīdes L.; ſ. Nr. 1111.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Berterŏa incāna DC.; ſ. Nr. 1305.

m. Auf Sandebenen:

—. XIX., 2; Korbblütler: Artemisĭa scoparĭa W. et K.; ſ. Nr. 2421.

n. Auf feuchten Sandtriften:

—. IV., 4; Leinpfl.: Radiŏla millegrāna Sm.; ſ. Nr. 2413.
—. V., 1; Paronychienpfl.: Illecĕbrum verticillātum L.; ſ. Nr. 1483.
—. XI., 1; Weiderichpfl.: Lythrum hyssopifolĭa L.; ſ. Nr. 2394.
—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperīcum humifūsum L.; ſ. Nr. 2134.

o. Auf Sandfeldern:

Vergl. §. 533, l; außerdem:
—. V., 2; Doldenpfl.: Pastināca satīva L.; ſ. Nr. 2058.
—. X., 2; Paronychienpfl.: Sclerānthus annŭus L.; ſ. Nr. 574.
—. X., 3; Nelkenblütler: Spergularĭa rubra Presl.; ſ. Nr. 576.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Sināpis cheirānthus Koch; ſ. Nr. 1316.

§. 537. **P. Auf Kalkboden:**

—. IV., 1; Krapppfl.: Sherardĭa arvēnsis L.; ſ. Nr. 632.
—. " " Asperŭla tinctorĭa L.; ſ. Nr. 2143.
—. V., 1; Glockenblümler: Campanŭla bononiēnsis L.; ſ. Nr. 2224.
—. V., 1; Paronychienpfl.: Herniarĭa hirsūta L.; ſ. Nr. 2389.
—. V., 2; Doldenpfl.: Critămus falcarĭa Rchb.; ſ. Nr. 2252.
—. " " Bupleurum longifolĭum L.; ſ. Nr. 1201.
—. " " Athamānta libanōtis L.; ſ. Nr. 2083.
—. " " Torĭlis helvetĭca Gmel.; ſ. Nr. 2372.
—. X., 2; Nelkenblütler: Vaccarĭa pyramidāta Fl. Wett.; ſ. Nr. 2185.
—. X., 2; Paronychienpfl.: Sclerānthus polycārpus L.; ſ. Nr. 2422.
—. XIII., 1; Sonnenröslein: Helianthĕmum apennīnum Willd.; ſ. Nr. 1522.
—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: Nigēlla arvēnsis L.; ſ. Nr. 2341.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Melissa calamīntha L.; ſ. Nr. 2063.
—. XIV. 1; Lippenblümler: M. nepĕta L.; ſ. Nr. 2423.
—. " " Prunēlla grandiflōra Jacq.; ſ. Nr. 2439.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Stachys germanĭca L.; ſ Nr. 2313.

—. XIV., 1; Lippenblümler: Teucrĭum botrys L.; ſ. Nr. 2405.
—. „ „ T. chamaedrys L.; ſ. Nr. 2239.
—. „ „ T. montānum L.; ſ. Nr. 2424.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Ibēris amāra L.; ſ. Nr. 1494.
—. „ Biscutēlla laevigāta L.; ſ. Nr. 2410.
—. XVII., 2; Erdrauchpfl.: Fumarĭa vaillantĭi Lois.; ſ. Nr. 643.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Cytĭsus capitātus Jacq.; ſ. Nr. 698.
—. „ Lathўrus tuberōsus L.; ſ. Nr. 2198.
—. XIX., 1; Korbblütler: Crepis setōsa Haller fil.; ſ. Nr. 2282.
—. XIX., 1; Korbblütler: Podospērmum laciniātum DC.; ſ. Nr. 602.
—. XIX., 1; Korbblütler: Jurinĕa mollis DC.; ſ. Nr. 1524.
—. „ „ Carduus deflorātus L.; ſ. Nr. 2074.
3018. „ „ Crinitarĭa linosўris Less. (Chrysocŏma linos. L., Linosўris vulgāris Cass., Galatella lynos., Aster linos. Bernh.). Leinkraut (Harblume). St. faſt kahl, aufr., einfach, oben äſtig; Bltr. ſitz., lineal., ſpitz; Aeſte beblätt., 1- bis 3köpf.; Köpfchen deckblättr.; Hüllbltchn. lineal-lanzettl., an der Spitze zurückgebog.; Bl. goldgelb; 4; 8 bis 9.
Varirt: minor Wallr. (Blütenäſte 1köpf.; Th., München), patŭla DC. (Bltr. abſteh.; trockne Kalkhügelform), stricta Kitt. (Bltr. aufr.; Form kräftigen Bodens).
—. XIX., 2; Korbblütler: Achillēa nobĭlis L.; ſ. Nr. 2244.
—. „ Inŭla germanĭca L.; ſ. Nr. 2296.
—. XIX., 3; „ Centaurēa paniculāta L.; ſ. Nr. 2299.

a. Auf feuchtem Kalkboden:

—. V., 2; Doldenpfl.: Sison amōmum L.; ſ. Nr. 2425.
—. VI., 1; Semede: Juncus obtusiflōrus Ehrh.; ſ. Nr. 1527.

b. Auf trocknem, ſandigem Boden:

—. V., 1; Rachenblümler: Verbāscum thapsifōrme Schrad.; ſ. Nr. 2418.
—. V., 1; Rachenblümler: V. phlomoīdes L.; ſ. Nr. 3017.
—. X., 3; Nelkenblütler: Alsīne tenuifolĭa Whbg.; ſ. Nr. 1355.

c. Auf Kalkboden unter der Saat:

—. XIV., 1; Lippenblümler: Galeōpsis angustifolĭa Ehrh.; ſ. Nr. 2426.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Stachys annŭa L.; ſ. Nr. 2373.

d. Auf kalkhaltigen, feuchten Wiesen:

—. XIX., 1; Korbblütler: Cirsium acaule - oleracĕum Schiede; s. Nr. 2427.

e. Auf Kalkfelsen:

—. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus plumarĭus L.; s. Nr. 2428.
—. X., 3; „ Silēne saxifrăga L.; s. Nr. 2429.
—. „ „ Moehringĭa ponae Fenzl; s. Nr. 1531.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Thalĭctrum foetĭdum L.; s. Nr. 2430.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Capsēlla pauciflōra Koch; s. Nr. 704.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum porrifolĭum Jacq.; s. Nr. 2432.
—. XIX., 1; Korbblütler: Crepis alpēstris Tausch; s. Nr. 2433.
—. XIX., 2; Korbblütler: Doronĭcum caucasĭum M. B.; s. Nr. 1535.

f. Auf Kalkhügeln:

—. V., 2; Doldenpfl.: Seselĭ hippomarăthrum L.; s. Nr. 2434.
—. VI., 1; Lilienpfl.: Allĭum montānum Schmidt; s. Nr. 1536.
—. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus prōlĭfer L.; s. Nr. 2275.
—. „ Paronychienpfl.: Scleränthus polycārpus L.; s. Nr. 2422.
—. XIII., 1; Sonnenröslein: Helianthĕmum vineāle Pers.; s. Nr. 1537.
—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Dorycnĭum herbacĕum Vill.; s. Nr. 2435.
—. XIX., 1; Korbblütler: Jurinĕa mollis DC.; s. Nr. 1524.
—. „ „ Carlīna acaulis L.; s. Nr. 2436.
—. XIX., 2; „ Achillēa odorāta L.; s. Nr. 2437.
—. „ „ Inŭla germanĭca L.; s. Nr. 2296.
3019. „ „ Aster amēllus L. Virgil's Aster (Christus- oder Stierauge, Sternblume). St. behart; Bltr. kurz-steifharig, längl.-lanzettl.; Bltchn. des Hauptk. abgerund.-stumpf, etwas abstehend.; Stral blauviolet; 4; 8 bis 9; ↕.

g. Auf sonnigen, felsigen Schieferhügeln:

—. XIX., 2; Korbblütler: Aster amēllus L.; s. Nr. 3019.

h. Auf Kalkbergen:

—. V., 2; Doldenpfl.: Seseli hippomarathrum L.; ſ. Nr. 2434.
3020. „ „ S. elatum L. (S. gouani Koch). Vieläſtiger Seſel. St. walzenf., wiederholt-gabeläſtig, oben faſt nackt; Bltr. dopp.-gefied.; Dolden 3- bis 5ſtral., Stralen walzenf., kahl; Hüllchenbltchn. lineal., nicht von Döldchenlänge; Bl. weiß; 4; 8 bis 9; Kr.
—. V., 2; Doldenpfl.: Peucedanum officinale L.; ſ. Nr. 2438.
—. V., 5; Leinpfl.: Linum tenuifolium L.; ſ. Nr. 1541.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Erysimum odoratum Ehrh.; ſ. Nr. 1542.
—. XIX., 2; Korbblütler: Achillea odorata L.; ſ. Nr. 2437.

k. Auf Kalkboden in Gebirgswäldern:

—. XIV., 1; Lippenblümler: Stachys alpina L.; ſ. Nr. 1160.

l. Im ſchweizer Jura:

—. XIX., 1; Korbblütler: Carduus multiflorus Gaud.; ſ. Nr. 2440.

Q. Auf Lehmboden: §. 538.

—. V., 2; Doldenpfl.: Critamus falcaria Rchb.; ſ. Nr. 2252.
—. „ „ Torilis helvetica Gmel.; ſ. Nr. 2372.
—. X., 2; Nelkenblütler: Vaccaria pyramidata Fl. Wett.; ſ. Nr. 2185.
—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: Nigella arvensis L.; ſ. Nr. 2341.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Stachys annua L.; ſ. Nr. 2373.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Linaria elatine Mill.; ſ. Nr. 2404.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Melilotus officinalis L.; ſ. Nr. 1326.
—. XIX., 1; Korbblütler: Podospermum laciniatum DC.; ſ. Nr. 602.

a. Auf ſandigem Lehmboden:

—. XIX., 1; Giftmilcher: *Euphorbia exigua L.; ſ. Nr. 1547.

b. Auf feuchtem Lehmboden:

—. V., 2; Doldenpfl.: Sison amomum L.; ſ. Nr. 2425.

c. Auf Lehmäckern:

—. X., 4; Nelkenblütler: Sagina ciliata Fr.; ſ. Nr. 1491.
—. X., 5; „ Cerastium vulgatum L. spec.; ſ. Nr. 463.

—. XVII., 2; Erdrauchpfl.: Fumaria densiflora DC.; ſ. Nr. 1488.

§. 539. **R. Auf Mergelboden:**

—. IV., 1; Krapppfl.: Galium tricorne With.; ſ. Nr. 2370.
—. V., 1; Paronychienpfl.: Herniaria glabra L.; ſ. Nr. 1476.
—. V., 2; Doldenpfl.: Orlaya grandiflora Hoffm.; ſ. Nr. 2371.
—. X., 2; Nelkenblütler: Vaccaria pyramidata Fl. Wett.; ſ. Nr. 2185.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Linaria elatine Mill.; ſ. Nr. 2404.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Senebiera coronopus Poir.; ſ. Nr. 2258.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Diplotaxis vimine DC.; ſ. Nr. 1492.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolium striatum L.; ſ. Nr. 1548.
—. " " Lathyrus tuberosus L.; ſ. Nr. 2198.
—. XIX., 1; Korbblütler: Crepis pulchra L.; ſ. Nr. 2221.
—. XIX., 2; " Filago gallica L.; ſ. Nr. 2403.

a. Auf feuchten Mergeläckern:

—. X., 4; Nelkenblütler: Sagina apetala L.; ſ. Nr. 604.

§. 540. **S. Auf Thonboden:**

—. IV., 1; Krapppfl.: Sherardia arvensis L.; ſ. Nr. 632.
—. " " Galium tricorne With.; ſ. Nr. 2370.
—. V., 1; Rachenblümler: Verbascum blattaria L.; ſ. Nr. 1285.
—. V., 2; Doldenpfl.: Athamanta libanotis L.; ſ. Nr. 2083.
—. " " Orlaya grandiflora Hoffm.; ſ. Nr. 2371.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Melissa calamintha L.; ſ. Nr. 2063.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Lamium incisum Willd.; ſ. Nr. 206.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Teucrium chamaedrys L.; ſ. Nr. 2239.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Senebiera coronopus Poir.; ſ. Nr. 2258.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolium striatum L.; ſ. Nr. 1548.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracium auricula L.; ſ. Nr. 1334.
—. " " Crepis pulchra L.; ſ. Nr. 2221.
—. " " Crinitaria linosyris Less.; ſ. Nr. 3018.

—. XIX., 2; Korbblütler: Senecĭo erucaefolĭus Huds.; ſ. Nr. 2100.
—. XIX., 2; Korbblütler: Filāgo gallĭca L.; ſ. Nr. 2403.

T. Auf ſteinigem Boden: §. 541.

a. Auf ſonnigen, trocknen, ſteinigen Stellen:

—. I., 1; Baldrianpfl.: *Centrānthus ruber DC.; ſ. Nr. 1645.
—. III., 2; Graspfl.: Phleum pratēnse L.; ſ. Nr. 1248.
—. IV., 1; Krapppfl.: Galĭum rubrum L.; ſ. Nr. 1556.
—. „ „ G. purpurĕum L.; ſ. Nr. 2441.
—. „ „ Crucianēlla molluginoïdes M. B.; ſ. Nr. 2442.
—. V., 1; Rachenblümler: Verbāscum thapsus L.; ſ. Nr. 2107.
—. „ „ V. lychnītis L.; ſ. Nr. 2266.
—. „ Nachtſchattenpfl.: Physălis alkekēngi L.; ſ. Nr. 1196.
—. „ „ *Solānum villōsum Lmk.; ſ. Nr. 3010.
—. V., 1; Borretſchpfl.: Echĭum vulgāre L.; ſ. Nr. 1108.
—. V., 2; Doldenpfl.: Eryngĭum campēstre L.; ſ. Nr. 2271.
—. „ „ Seselĭ varĭum Trev.; ſ. Nr. 2443.
—. „ „ Cnidĭum apioïdes Spr.; ſ. Nr. 2444.
—. „ „ Pastinăca opāca Bernh.; ſ. Nr. 2445.
—. „ „ P. fleischmānni Hladn.; ſ. Nr. 2446.
—. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus carthusianōrum L.; ſ. Nr. 459.
—. X., 2; Nelkenblütler: D. deltoïdes L.; ſ. Nr. 1111.
—. X., 5; Dickblattpfl.: Sedum acre L.; ſ. Nr. 1298.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Melĭssa thymifolĭa Rchb.; ſ. Nr. 2447.
—. XIV., 1; Lippenblümler: M. alba W. et K.; ſ. Nr. 2448.
—. „ „ Hyssōpus officinālis L.; ſ. Nr. 2237.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Stachys recta L.; ſ. Nr. 1303.
—. XIV., 2; Eiſenkrautpfl.: Vitex agnus castus L.; ſ. Nr. 2449.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Sisymbrĭum officināle Scop.; ſ. Nr. 1361.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: *Geranĭum sibirĭcum L.; ſ. Nr. 2259.
—. XIX., 1; Korbblütler: Serratŭla nitĭda Bess.; ſ. Nr. 2450.
—. „ „ Lappa minor DC.; ſ. Nr. 2199.
—. „ „ L. major Gaertn.; ſ. Nr. 2200.
—. „ „ L. tomentōsa Lmk.; ſ. Nr. 2201.

—. XIX., 1; Korbblütler: Cirsĭum lanceolātum Scop.; ſ. Nr. 1339.
—. XIX., 1; Korbblütler: Carduus nutans L.; ſ. Nr. 2289.
—. XIX., 2; „ Filāgo arvēnsis L.; ſ. Nr. 2344.
—. „ „ Gnaphalĭum lutĕo-album L.; ſ. Nr. 2411.
—. XIX., 2; Korbblütler: Artemisĭa vulgāris L.; ſ. Nr. 2205.
3021. „ „ A. austriāca L. Oeſterreichiſcher Beifuß. Wrz. kriech.; St. ſtrauchig, ganz grauſeidenharig; Bltr. graufilz., untere fiederſpalt., oberſte lineal.; Köpfchen kug. oder eif., rauhfilz., nickend, endl. aufr.; äußere Hüllbltchn. graufilz.; 4; 8 bis 10; Oe.*)
—. XIX., 2; Korbblütler: Achillēa nobĭlis L.; ſ. Nr. 2244.
—. XIX., 3; „ Centaurēa karstiāna Scop.; ſ. Nr. 2451.
—. XXI., 1; Giftmilcher: Euphorbĭa platyphyllos L.; ſ. Nr. 2326.
3022. XXI., 4; Meldenpfl.: Eurotĭa ceratoïdes C. A. Mey. Zottige Eurotie. Strauch klein, aufr.; Bltr. wechſelſt., geſtielt, häutig, längl. oder lineal-lanzettl.; K. der ♂ 4-theil., der ♀ röhrig, halb-2ſpalt., dichtzott., endl. 2hörnig; ♄; 8 bis 9; Oe., Mä.; ſelten.
—. XXI., 5; Spitzklettenpfl.: Xanthĭum macrocārpum DC.; ſ. Nr. 2305.

b. An ſchattigen, ſteinigen Orten:

—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum robertiānum L.; ſ. Nr. 431.

c. In Steinbrüchen:

—. V., 1; Rachenblümler: Verbāscum nigrum L.; ſ. Nr. 2082.
—. „ Nachtſchattenpfl.: *Solānum villōsum Lmk.; ſ. Nr. 3010.
—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: Epilobĭum angustifolĭum L.; ſ. Nr. 2085.
—. X., 5; Dickblattpfl.: Sedum acre L.; ſ. Nr. 1298.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Galeōpsis ochroleuca Lmk.; ſ. Nr. 2238.
—. XIX., 2; Korbblütler: Senecĭo sylvatĭcus L.; ſ. Nr. 1080.

*) Dieſe Pflanze dient am Südrande der böhmiſch-mähriſchen Hochebene als Feldhüter. Ein Strauß, in die Spalte eines Pfahles der Weinberge geſteckt, verbietet jedem Fremden den Zutritt; Winzer legitimiren ſich durch einen am Hute getragenen Wermutsſtrauß!

d. An steinigen Plätzen:

—. X., 3; Nelkenblütler: Alsine setacea W. et K.; s. Nr. 2453.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Capsella pauciflora Koch; s. Nr. 704.

e. Auf Steingeröll:

—. X., 5; Dickblattpfl.: Sedum acre L.; s. Nr. 1298.
—. XIX., 2; Korbblütler: Inula salicina L.; s. Nr. 2222.

U. In Erdgruben: §. 542.

—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: Epilobium angustifolium L.; s. Nr. 2085.
—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: E. roseum Schr.; s. Nr. 2129.

V. An Abhängen: §. 543.

—. V., 1; Rachenblümler: Verbascum blattaria L.; s. Nr. 1285.
—. V., 1; Borretschpfl.: Echium vulgare L.; s. Nr. 1108.
—. „ Glockenblümler: Campanula rapunculus L.; s. Nr. 1289.
—. V., 1; Glockenblümler: Jasione montana L.; s. Nr. 1290.
—. X., 2; Nelkenblütler: Dianthus carthusianorum L.; s. Nr. 459.
—. X., 2; Nelkenblütler: D. prolifer L.; s. Nr. 2275.
—. „ „ Gypsophila muralis L.; s. Nr. 2234.
—. X., 5; Dickblattpfl.: Sedum acre L.; s. Nr. 1298.
—. XII., 3; Rosenpfl.: Potentilla reptans L.; s. Nr. 1181.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Thymus serpyllum L.; s. Nr. 2088.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Melissa calamintha L.; s. Nr. 2063.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Prunella vulgaris L.; s. Nr. 2277.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Diplotaxis tenuifolia DC.; s. Nr. 1313.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Erodium cicutarium l'Herit.; s. Nr. 217.
—. XVI., 5; Pappelrosenpfl.: Malva moschata L.; s. Nr. 1563.
—. XIX., 2; Korbblütler: Senecio erucaefolius Huds.; s. Nr. 2100.
—. XIX., 2; Korbblütler: S. nemorensis L.; s. Nr. 1150.

a. An feuchten Abhängen:

—. V., 2; Enzianpfl.: Gentiāna germanĭca Willd.; ſ. Nr. 2456.
—. XI., 2; Roſenpfl.: Agrimonĭa procēra Wallr.; ſ. Nr. 1115.

b. An ſteinigen Abhängen:

—. V., 1; Borretſchpfl.: Echinospērmum squarrōsum Rchb.; ſ. Nr. 2226.

c. An ſteinigen, begraſten Abhängen:

—. IV., 1; Kardenpfl.: Scabiōsa leucāntha L.; ſ. Nr. 2458.

d. An ſonnigen, ſteinigen Abhängen:

—. X., 5; Dickblattpfl.: Sedum acre L.; ſ. Nr. 1298.
—. „ „ S. sexangulāre L.; ſ. Nr. 2391.
—. „ „ S. reflēxum L.; ſ. Nr. 2235.
—. XIII., 1; Sonnenröslein: Helianthĕmum vulgāre Gaertn.; ſ. Nr. 1120.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Sināpis cheirānthus Koch; ſ. Nr. 1316.
—. XIX., 1; Korbblütler: Leontŏdon crispus Vill.; ſ. Nr. 2457.

e. An ſterilen Abhängen:

—. X., 2; Paronychienpfl.: Scleránthus perēnnis L.; ſ. Nr. 676.

f. An trocknen Abhängen:

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Astragălus austriăcus L.; ſ. Nr. 1567.

g. An ſonnigen Abhängen:

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolĭum striātum L.; ſ. Nr. 1548.
—. XIX., 2; Korbblütler: Solidāgo virgo-aurĕa L.; ſ. Nr. 2077.

h. An buſchigen Abhängen:

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Ervum sylvatĭcum Peterm.; ſ. Nr. 1140.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Lathyrus sylvēstris L.; ſ. Nr. 1036.

i. An Bergabhängen:

—. V., 2; Doldenpfl.: Peucedănum officināle L.; ſ. Nr. 2438.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum divaricātum Ehrh.; ſ. Nr. 2194.

—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracium stoloniflorum W. et K.; ſ. Nr. 1569.

k. In Gebirgen:

—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hypericum coris L.; ſ. Nr. 2461.

W. In Weinbergen: §. 544.

—. III., 2; Graspfl.: Andropogon ischaemum L.; ſ. Nr. 2261.
—. „ „ Setaria verticillata P. B.; ſ. Nr. 1249.
—. „ „ S. viridis P. B.; ſ. Nr. 2249.
—. „ „ Digitaria sanguinalis Scop.; ſ. Nr. 1250.
—. „ „ D. ciliaris Koel.; ſ. Nr. 1251.
—. V., 1; Nachtſchattenpfl.: Physalis alkekengi L.; ſ. Nr. 1196.
—. V., 1; Borretſchpfl.: Echium vulgare L.; ſ. Nr. 1108.
—. „ Glockenblümler: Campanula rapunculoides L.; ſ. Nr. 3002.
—. VI., 1; Lilienpfl.: Lilium oleraceum L.; ſ. Nr. 2339.
—. X., 2; Nelkenblütler: Vaccaria pyramidata Fl. Wett.; ſ. Nr. 2185.
—. X., 3; Nelkenblütler: Stellaria media Vill.; ſ. Nr. 4.
—. X., 5; Dickblattpfl.: Sedum acre L.; ſ. Nr. 1298.
—. XI., 3; Waupfl.: Reseda lutea L.; ſ. Nr. 1372.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Galeopsis ladanum L.; ſ. Nr. 2342.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Sideritis montana L.; ſ. Nr. 2379.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Diplotaxis vimineа DC.; ſ. Nr. 1492.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Raphanus raphanistrum L.; ſ. Nr. 588.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranium rotundifolium L.; ſ. Nr. 560.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: G. divaricatum Ehrh.; ſ. Nr. 2194.
—. XVI., 5; Pappelroſenpfl.: Althaea hirsuta L.; ſ. Nr. 2195.
—. „ „ A. pallida W. et K.; ſ. Nr. 1374.
—. „ „ Lavatera thuringiaca L.; ſ. Nr. 2092.
—. XVII., 2; Erdrauchpfl.: Fumaria officinalis L.; ſ. Nr. 561.
—. XVII., 2; Erdrauchpfl.: F. vaillantii Lois.; ſ. Nr. 643.
—. „ „ F. wirtgenii Koch; ſ. Nr. 1403.
—. „ „ F. parviflora L.; ſ. Nr. 644.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Galega officinalis L.; ſ. Nr. 1349.

—. XIX., 1; Korbblütler: Crepis pulchra L.; s. Nr. 2221.
—. " " Podospērmum laciniātum DC.; s. Nr. 602.
—. XIX., 1; Korbblütler: Helminthĭa echioīdes Gaertn.; s. Nr. 1232.
—. XIX., 1; Korbblütler: *Silўbum mariānum Gaertn.; s. Nr. 2242.
3023. XIX., 2; Korbblütler: *Artemisĭa abrotănum L. Eberreis (Zitronen-, Abrand- oder Hartkraut, Stabwurz, Eber- oder Alpraute, Zitronelle, Gartenhahn, Gotteshölzchen, Eberritte). Bltr. vielspalt., untere dopp.-gefied., Zipf. schmal-lineal.; Blütenboden kahl; Bl. gelb; Hüllbtchn. flaumig; ♃; 8 bis 10; ⚘; ♄; Vaterland: Südeuropa.
—. XIX., 4; Korbblütler: Calendŭla arvēnsis L.; s. Nr. 1418.
—. XIX., 5; " Echīnops sphaerocephălus L.; s. Nr. 2246.
—. XX., 5; Osterluzeipfl.: Aristolochĭa clematītis L.; s. Nr. 2209.
—. XXI., 1; Giftmilcher: Euphorbĭa falcāta L.; s. Nr. 2349.
—. XXI., 4; Nesselpfl.: Urtīca dioĭca L.; s. Nr. 2102.
—. " " U. urens L.; s. Nr. 1234.
—. XXI., 5; Meldenpfl.: Atrĭplex nitens Rebent.; s. Nr. 2302.
—. XXI., 5; Amarantpfl.: Amarāntus blitum L.; s. Nr. 2247.
—. XXI., 9; Kürbispfl.: *Cucurbĭta melopĕpo L.; s. Nr. 1576.

a. An Weinbergsmauern:

—. XIX., 1; Korbblütler: Lactūca scariōla L.; s. Nr. 2284.

§. 545. **X. Auf Anhöhen und Hügeln:**

—. II., 1; Lippenblümler: Salvĭa sylvēstris L.; s. Nr. 2168.
—. IV., 1; Krapppfl.: Galĭum mollūgo L.; s. Nr. 1006.
—. V., 1; Borretschpfl.: Echĭum vulgāre L.; s. Nr. 1108.
—. " Glockenblümler: Jasiōne montāna L.; s. Nr. 1290.
—. V., 2; Doldenpfl.: Pimpinēlla saxifrăga L.; s. Nr. 2176.
—. " " Bupleurum falcātum L.; s. Nr. 3003.
—. " " B. juncĕum L.; s. Nr. 2462.
—. " " Peucedănum orĕoselīnum Mnch.; s. Nr. 2463.
—. V., 2; Doldenpfl.: P. cervarĭa Cuss.; s. Nr. 2132.
—. " " Pastināca satīva L.; s. Nr. 2058.
—. V., 5; Leinpfl.: Linum tenuifolĭum L.; s. Nr. 1541.
—. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus carthusianōrum L.; s. Nr. 459.

—. X., 2; Nelkenblütler: D. prolĭfer L.; ſ. Nr. 2275.
—. X., 5; Dickblattpfl.: Sedum acre L.; ſ. Nr. 1298.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Thymus serpȳllum L.; ſ. Nr. 2088.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Saturēja montāna L.; ſ. Nr. 2464.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Euphrasia lutĕa L.; ſ. Nr. 2138.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Berterŏa incāna DC.; ſ. Nr. 1305.
—. XVI., 5; Pappelroſenpfl.: Malva alcĕa L.; ſ. Nr. 2279.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolĭum filifŏrme L.; ſ. Nr. 599.
—. XIX., 1; Korbblütler: Crepis pulchra L.; ſ. Nr. 2221.
—. „ „ Lactūca scariōla L.; ſ. Nr. 2284.
—. „ „ Crinitarĭa linosȳris Less.; ſ. Nr. 3018.
—. XIX., 2; Korbblütler: Filāgo germanĭca L.; ſ. Nr. 2192.
—. „ „ Matricarĭa chamomīlla L.; ſ. Nr. 1417.
—. XIX., 2; Korbblütler: Erigĕron villarsĭi Bell.; ſ. Nr. 2465.
—. XIX., 3; Korbblütler: Centaurēa paniculāta L.; ſ. Nr. 2299.

a. Auf Kalkhügeln:

Vergl. §. 537, f; außerdem:

—. IV., 1; Kardenpfl.: Scabiōsa suaveŏlens Desf.; ſ. Nr. 2466.
—. V., 5; Leinpfl.: Linum tenuifolĭum L.; ſ. Nr. 1541.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Cytĭsus capitātus Jacq.; ſ. Nr. 698.

b. Auf Gipshügeln:

—. X., 2; Nelkenblütler: Gypsophīla repens L.; ſ. Nr. 2482.
—. „ „ G. fastigiāta L.; ſ. Nr. 1480.

c. Auf ſteinigen Hügeln:

—. II., 1; Rachenblümler: Veronĭca spicāta L.; ſ. Nr. 2470.
—. III., 2; Graspfl.: Molinĭa serotĭna M. et K.; ſ. Nr. 3006.
—. IV., 1; Krapppfl.: Galĭum pumĭlum Lamk.; ſ. Nr. 1585.
—. V., 1; Rachenblümler: Verbāscum collīnum Schrad.; ſ. Nr. 2467.
—. V., 2; Doldenpfl.: Bupleurum longifolĭum L.; ſ. Nr. 1201.
—. V., 2; Doldenpfl.: Seſĕli hippomarăthrum L.; ſ. Nr. 2434.
—. V., 2; Doldenpfl.: Peucedănum austriăcum Koch; ſ. Nr. 2468.

—. V., 2; Doldenpfl.: Siler aquilegifolium Gaertn.; ſ. Nr. 1589.
—. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus saxifrăga L.; ſ. Nr. 2400.
—. X., 3; „ Alsīne jacquīni Koch; ſ. Nr. 1481.
—. XI., 3; Waupfl.: Resēda lutĕa L.; ſ. Nr. 1372.
—. XIII., 1; Sonnenröslein: Helianthĕmum alpēstre Rchb.; ſ. Nr. 1591.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Melīssa nepĕta L.; ſ. Nr. 2423.
—. „ „ Nepĕta cataria L.; ſ. Nr. 1218.
—. „ „ N. nepetēlla L.; ſ. Nr. 2189.
—. „ „ Marrubium vulgāre L.; ſ. Nr. 2192.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Linaria italĭca Trev.; ſ. Nr. 2469.
—. XVI., 5; Pappelroſenpfl.: Malva moschāta L.; ſ. Nr. 1563.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracium brachiātum Bertol.; ſ. Nr. 1593.
—. XIX., 2; Korbblütler: Filāgo montāna L.; ſ. Nr. 2401.

d. Auf ſteinigen, felſigen Hügeln:

—. XIX., 1; Korbblütler: Phaenŏpus viminĕus DC.; ſ. Nr. 2473.

e. Auf ſandigen, ſteinigen Hügeln:

—. II., 1; Rachenblümler: Veronīca spicāta L.; ſ. Nr. 2470.

f. Auf rauhen Höhen:

—. XIV., 1; Lippenblümler: Stachys germanĭca L.; ſ. Nr. 2313.

g. Auf ſonnigen, ſteinigen Hügeln:

—. II., 1; Rachenblümler: Veronīca spicāta L.; ſ. Nr. 2470.
—. IV., 1; Wegerichpfl.: Plantāgo carināta Schrad.; ſ. Nr. 2471.
—. V., 1; Rachenblümler: Verbāscum lychnītis L.; ſ. Nr. 2266.
—. V., 2; Seidenfrüchtler: Vincetoxĭcum officināle Mnch.; ſ. Nr. 2175.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Teucrĭum montānum L.; ſ. Nr. 2424.

h. Auf ſonnigen, trocknen, ſteinigen, ſandigen Hügeln:

—. IV., 1: Krapppfl.: Asperŭla tinctoria L.; ſ. Nr. 2143.
—. „ „ A. cynanchĭca L.; ſ. Nr. 2265.

—. V., 2; Doldenpfl.: Bupleurum odontites L.; ſ. Nr. 2472.
—. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus monspessulānus L.; ſ. Nr. 2474.
—. X., 2; Nelkenblütler: D. prolĭfer L.; ſ. Nr. 2275.
—. XIX., 1; Korbblütler: Crepis virens L.; ſ. Nr. 1415.
—. XXI., 2; „ Helichrȳsum angustifolĭum DC.; ſ. Nr. 2475.
—. XIX., 2; Korbblütler: Anthĕmis tinctorĭa L.; ſ. Nr. 1599.
—. „ „ Inŭla conȳza DC.; ſ. Nr. 2297.

i. Auf rauhen Hügeln:

3024. XIX., 2; Korbblütler: Inŭla ensifolĭa L. Nerviger Alant. St. am Gipf. ſpinnwebig, 1- bis 5köpf.; Bltr. ſitz., ſchmal-lanzettl., auch lineal., mehrnervig, kahl; Hüllblſchn. nervig, unten ſpinnwebig-filz., aufr., etwas locker; Bl. groß, gelb; 4; 8 bis 9; Mä., Oc., St., Kr.

k. Auf trocknen Hügeln:

—. III., 2; Graspfl.: Agrōstis vulgāris With.; ſ. Nr. 2169.
—. „ „ Setarĭa glauca P. B.; ſ. Nr. 2331.
—. „ „ Bromus erēctus Huds.; ſ. Nr. 1276.
—. IV., 1; Kardenpfl.: Scabiōsa columbarĭa L.; ſ. Nr. 2080.
—. „ „ Sc. suaveŏlens Desf.; ſ. Nr. 2466.
—. V., 2; Doldenpfl.: Peucedănum alsatĭcum L.; ſ. Nr. 1202.
—. X., 3; Nelkenblütler: Alsīne jacquīni Koch; ſ. Nr. 1481.
—. XIII., 1; Sonnenröslein: Helianthĕmum vulgāre Gaertn.; ſ. Nr. 1120.
—. XIII., 1; Sonnenröslein: H. apennīnum Willd.; ſ. Nr. 1522.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolĭum striātum L.; ſ. Nr. 1548.
—. „ „ Astragălus austrĭăcus L.; ſ. Nr. 1567.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum cymōsum L.; ſ. Nr. 1583.
—. „ „ H. murōrum L.; ſ. Nr. 447.
—. „ „ Podospērmum laciniātum DC.; ſ. Nr. 602.
—. XIX., 1; Korbblütler: Carlīna acaulis L.; ſ. Nr. 2436.
—. XIX., 2; „ Inŭla ocŭlus christi L.; ſ. Nr. 1584.

l. Auf trocknen, ſandigen und thonigen Hügeln:

3025. XIX., 1; Korbblütler: Carlīna vulgāris L. (C. caulēscens Lmk., C. subacaulis DC., C. alpīna Jacq.). Stengelloſe Eberwurz (Mannstreu, Treue-, Sand-, Samen-, Wetter-, Karls- oder engliſche Diſtel, Hundszorn, Roßkopfsſtaude). Stengellos oder ſtengelig ſich erhebend;

St. meist 1köpf.; Bltchn. stralend, untere Hälfte lineal.; Bl. blaßgelb; ♂ (♃); 8 bis 9; ⅄.

Varirt: C. vulgāris Auct. (Deckblätter kürzer als die Köpfchen), C. nebrodēnsis Guss. (C. longifolĭa Rchb.; St. 1- bis 3köpf.; Köpfchen von Deckbltrn. umhüllt, welche die ersteren überragen; äußere Hüllbltchn. dopp.-fiederspalt.).

m. Auf sonnigen Hügeln:

—. II., 1; Rachenblümler: Veronīca officinālis L.; s. Nr. 997.
—. IV., 1; Krapppfl.: Galium pumĭlum Lmk.; s. Nr. 1585.
—. V., 1; Rachenblümler: Verbāscum phoenicĕum L.; s. Nr. 2131.
—. V., 1; Glockenblümler: Campanŭla rotundifolĭa L.; s. Nr. 1288.
—. V., 1; Glockenblümler: Jasiōne montāna L.; s. Nr. 1290.
—. V., 2; Doldenpfl.: Ptychōtis hetĕrophўlla Koch; s. Nr. 2476.
—. V., 2; Doldenpfl.: Bupleurum aristātum Bartl.; s. Nr. 2477.
—. V., 5; Bleiwurzpfl.: Armerĭa vulgāris Willd.; s. Nr. 1295.
—. X., 2; Paronychienpfl.: Scleränthus perēnnis L.; s. Nr. 676.
—. XIII., 1; Sonnenröslein: Helianthĕmum guttātum Mill.; s. Nr. 1482.
—. XIII., 1; Sonnenröslein: H. vineāle Pers.; s. Nr. 1537.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Origănum vulgāre L.; s. Nr. 2087.
—. XVI., 1; Lippenblümler: Stachys germanĭca L.; s. Nr. 2313.
—. XIV., 1; Lippenblümler: St. recta L.; s. Nr. 1303.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Linarĭa genistifolĭa Mill.; s. Nr. 2479.
—. XIX., 1; Korbblütler: Cardŭus candĭcans W. et K.; s. Nr. 2291.
—. XIX., 2; Korbblütler: Achillēa nobĭlis L.; s. Nr. 2244.
— „ „ Inŭla hirta L.; s. Nr. 2295.
—. „ „ I. germanĭca L.; s. Nr. 2296.
3026. „ „ Erigĕron acris L. (E. acer L.).

Gemeines Berufkraut (scharfe Dürrwurz, Zauberwurz, Flöh- oder Altemannskraut). St. traubig; Aeste 1- bis 3köpf.; Bltr. meist rauhharig, lanzett-spatelf. bis lineal-lanzettl., ganzrand.; Bl. blaßrot oder blaßlila; ♂ und ♃; 8 bis 9; ×; †.

Varirt: E. brachyglōssum DC. (Stralbl. aufr., die

Scheibe nicht überragend; verkümmerte Form steiniger Orte), E. acris Weihe (Stralbl. aufr., schmutzigweiß oder lila, viel länger als die der Scheibe; Kalkform), E. serotinus Weihe (Stralbl. aufr., bischofrot; Urgebirgs-, Sandstein-, Lehm- und Thonform), E. podolicus Bess. (Stralbl. aufr.-abstehend., die Scheibenbl. überragend, lila; Rhön, Spessart).

—. XIX., 3; Korbblütler: Centaurea nigra L.; s. Nr. 2162.
—. XIX., 5; „ Echinops ritro L.; s. Nr. 2479.

n. Auf unfruchtbaren Hügeln:

—. V., 2; Doldenpfl.: Eryngium campestre L.; s. Nr. 2271.
—. „ „ Tordylium maximum L.; s. Nr. 2272.
—. X., 2; Nelkenblütler: Dianthus prolifer L.; s. Nr. 2275.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracium echioides Lumn.; s. Nr. 1595.
—. XIX., 2; Korbblütler: Senecio viscosus L.; s. Nr. 1341.
—. „ „ Inula ensifolia L.; s. Nr. 3024.

o. Auf Sandhügeln:

—. XXI., 1; Giftmilcher: Euphorbia gerardiana Jacq.; s. Nr. 1344.

p. Auf locker-sandigen Hügeln:

—. X., 2; Nelkenblütler: Dianthus plumarius L.; s. Nr. 2428.
—. XIX., 2; Korbblütler: Senecio sylvaticus L.; s. Nr. 1080.
—. „ „ Filago montana L.; s. Nr. 2401.

q. Auf grasigen, sandigen Hügeln:

—. X., 3; Nelkenblütler: Silene chlorantha Ehrh.; s. Nr. 2164.
—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Vicia tenuifolia Roth; s. Nr. 1229.

r. Auf grasigen Hügeln:

—. II., 1; Rachenblümler: Veronica arvensis L.; s. Nr. 64.
—. „ Lippenblümler: Salvia verticillata L.; s. Nr. 1191.
—. V., 1; Rachenblümler: Verbascum speciosum Schrad.; s. Nr. 2480.
—. V., 1; Enzianpfl.: Erythraea centaurium Rich.; s. Nr. 1009.
—. X., 2; Nelkenblütler: Dianthus seguierii Vill.; s. Nr. 2086.

s. Auf feuchten, grasigen Hügeln:

3027. XX., 1; Orchidee: Spiranthes autumnalis Rich. (Ophrys spiralis L., Sp. spiral. C. Koch, Helleborine spir. Bernh., Neottia spir. Sw.). Herbst-Drehährenständel

(Wendel- oder Drehorche, Blütenschraube). St. blattlos, scheidig; untere Bltr. eif.-längl., zur Seite des St.; Bl. klein, weißl., in schraubenf.-gedrehter Aehre; 4; 8 bis 9.

t. Auf sonnigen Grashügeln:

—. X., 2; Paronychienpfl.: Scleränthus polycárpus L.; s. Nr. 2422.

u. Auf Hügeln unter Gesträuch:

3028. XIX., 1; Korbblütler: Hieracium sabaudum L. (hort. ups., spec. plant. et herb., non flor. suec., H. autumnäle Griseb.). Savoyer Habichtskraut. St. starr, rauhharig oder fast kahl, oberw. rispig, fast ebensträuß.; Bltr. eif., gezähnt, obere mit herzf. Basis umfass.-sitz.; Blütenst. und Hauptk. graugrün, bemerkl. länger als das stützende Deckblatt; Bl. gelb; 4; 8 bis 10; K. S., Schl., Brd., M., Po., Rh., Hn., Ty.

v. Auf buschigen Hügeln:

—. III., 2; Graspfl.: Holcus mollis L.; s. Nr. 1132.
—. „ „ Elymus europaeus L.; s. Nr. 1004.
—. IV., 1; Krapppfl.: Asperula laevigäta L.; s. Nr. 1601.
—. XI., 2; Rosenpfl.: Agrimonia eupatoria L.; s. Nr. 1114.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Sideritis montäna L.; s. Nr. 2379.
—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Cytisus capitätus Jacq.; s. Nr. 698.
—. „ „ Trifolium medium L.; s. Nr. 1033.
—. „ „ Lathyrus latifolius L.; s. Nr. 2481.
—. XIX., 3; Korbblütler: Centaurea jacea L.; s. Nr. 1343.

w. Auf Hügeln subalpiner Gegenden:

—. XIV., 2; Rachenblümler: Alectorolophus angustifolius Gmel.; s. Nr. 2483.

§. 546. **Y. Auf Bergen:**

—. III., 1; Halbgras: Scirpus gracilis Salzm.; s. Nr. 2484.
—. IV., 1; Kardenpfl.: Scabiosa hladnikiana Host; s. Nr. 2485.
—. IV., 1; Kardenpfl.: Sc. ucranica L.; s. Nr. 2486.
—. „ Krapppfl.: Asperula laevigäta L.; s. Nr. 1601.
—. V., 1; Glockenblümler: Campanula rhomboidälis L.; s. Nr. 2487.
—. V., 2; Doldenpfl.: Bupleurum exaltätum M. B.; s. Nr. 2488.

—. V., 2; Doldenpfl.: Peucedănum orĕoselīnum Mnch.; ſ. Nr. 2463.
—. V., 2; Doldenpfl.: Molospērmum cicutarĭum DC.; ſ. Nr. 2490.
3029. V., 2; Doldenpfl.: Pastināca selinoīdes Vis. Silgen-Paſtinak. St. kant.; Aeſte geſtreift; Blr. einfach- oder dopp.-gefied., Fiedern der unteren Blr. eikeilf., der oberſten lineal-lanzettl., ganzrand.; Hüllchen einſeitig; Bl. gelb; ♂; 8; Kr.
—. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus carthusianōrum L.; ſ. Nr. 459.
—. X., 5; Dickblattpfl.: Sedum acre L.; ſ. Nr. 1298.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Lavendŭla spica L.; ſ. Nr. 2492.
—. „ „ Marrubĭum vulgāre L.; ſ. Nr. 2192.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Lathўrus heterophўllus L.; ſ. Nr. 2067.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum cymōsum L.; ſ. Nr. 1583.
—. XIX., 1; Korbblütler: Crinitarĭa linosўris Less.; ſ. Nr. 3018.

a. Auf Kalkbergen:

Vergl. §. 537, h; außerdem:
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Cytīsus capitātus Jacq.; ſ. Nr. 698.

b. Auf ſteinigen Bergen:

—. V., 2; Doldenpfl.: Bupleurum longifolĭum L.; ſ. Nr. 1201.
—. V., 2; Doldenpfl.: Seseli hippomarăthrum L.; ſ. Nr. 2434.
—. V., 2; Doldenpfl.: Peucedănum austriăcum Koch; ſ. Nr. 2468.
—. V., 2; Doldenpfl.: Pastināca fleischmānni Hladn.; ſ. Nr. 2446.
—. V., 2; Doldenpfl.: Siler aquilegifolĭum Gaertn.; ſ. Nr. 1589.
—. XVI., 5; Pappelroſenpfl.: Malva moschāta L.; ſ. Nr. 1563.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum brachiātum Bertol.; ſ. Nr. 1593.
—. XIX., 2; Korbblütler: Anthĕmis tinctorĭa L.; ſ. Nr. 1599.

c. Auf ſandigen, ſteinigen Bergen:

—. II., 1; Rachenblümler: Veronīca spicāta L.; ſ. Nr. 2470.

d. Auf steinigen, sonnigen Bergen:

—. XIV., 1; Lippenblümler: Teucrium chamaedrys L.; s. Nr. 2239.

—. XIV., 1; Lippenblümler: T. montānum L.; s. Nr. 2424.

e. Auf felsigen Bergen:

3030. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: Aconītum anthōra L. Feinblättriger Eisenhut. Wrz. rübenf., knoll.; Bltr. handf.-fiedertheil.-vielspalt.; die 2 oberen Blbltr. auf dem vorwärts-bogigen Nagel fast wagr.-nickend; Bl. gelbl.; Sporn spiral.-zurückgerollt, oberf. an der Basis quer-eingeknickt; 4; 8 bis 9; ∓; Südd.

Varirt: A. velutīnum Rchb. (K. und Kapf. stark-weichharig), A. jacquinīānum Rchb. (Helm hinten schräg-abgedacht).

f. Auf sonnigen, trocknen Bergen:

—. V., 2; Doldenpfl.: Trinia vulgāris DC.; s. Nr. 2493.

—. " " Peucedănum alsatĭcum L.; s. Nr. 1202.

—. XIV., 1; Lippenblümler: Lavendŭla spica L.; s. Nr. 2492.

—. " " Thymus serpyllum L.; s. Nr. 2088.

—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Trifolĭum striātum L.; s. Nr. 1548.

g. Auf Kies- und Sandboden der trockensten, unfruchtbarsten Berge:

—. XIX., 1; Korbblütler: Chondrilla prenanthoides Vill.; s. Nr. 2494.

h. Auf grasigen Bergen:

3031. XIX., 2; Korbblütler: Buphthālmum salĭcifolĭum DC. Weidenblättriges Ochsenauge (Rindsauge). Bltr. lanzettl., etwas gezähnelt, weichharig, untere stumpf, stielverschmäl., obere sitz., verschmäl.-spitz; Bltchn. des Hauptk. lanzettl., harsp., so lang als die Scheibenbl.; Bl. gelb; 4; 8 bis 9; ↕; Th., Würzburg, Südd.*)

Varirt: B. foliātum (Bltr. groß, breit; Köpfchen klein), B. vulgāre (ganz zottig), B. grandiflōrum L. (fast kahl; Blütenköpfe groß).

i. An Bergabhängen:

—. II., 1; Lippenblümler: Salvĭa glutinōsa L.; s. Nr. 2106.

—. V., 2; Enzianpfl.: Gentiāna obtusifolĭa Willd.; s. Nr. 2502.

*) B. succisaefolium Brittinger, eine nicht seltene Alpenform, hat einen rauhharigen St., zottige Bltr., von denen die unteren verkehrt-eif., stumpf, die oberen lanzettl., spitz sind, und vorn breitere, 4zähnig erscheinende Zungenblümchen!

. V., 2; Doldenpfl.: Peucedănum officināle L.; ſ. Nr. 2438.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Origănum vulgāre L.; ſ. Nr. 2087.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Melīssa nepĕta L.; ſ. Nr. 2423.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum divaricātum Ehrh.; ſ. Nr. 2194.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum stolŏniflōrum W. et K.; ſ. Nr. 1569.

k. An trocknen Bergabhängen:

—. V., 1; Zauberpfl.: Thesīum divaricātum Jan.; ſ. Nr. 2460.

l. An felſigen, ſteinigen Abhängen:

—. XIV., 1; Lippenblümler: Hyssōpus officināls L.; ſ. Nr. 2237.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Digitālis ambigŭa Murr.; ſ. Nr. 1024.

m. Auf buſchigen, bewaldeten Bergen:

—. XIV., 1; Lippenblümler: Siderītis montāna L.; ſ. Nr. 2379.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Cytīsus capitātus Jacq.; ſ. Nr. 698.
—. „ „ Lathўrus sylvēstris L.; ſ. Nr. 1036.
—. „ „ L. latifolĭus L.; ſ. Nr. 2481.
—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperīcum montānum L.; ſ. Nr. 1037.

n. In Bergwäldern:

—. II., 1; Rachenblümler: Veronīca spicāta L.; ſ. unter Nr. 2212.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Euphrasĭa lutĕa L.; ſ. Nr. 2138.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Ervum sylvatĭcum Peterm.; ſ. Nr. 1148.

o. In lichten Bergwäldern:

—. IV., 1; Kardenpfl.: Scabiōsa sylvatĭca L.; ſ. Nr. 2141.
—. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus supērbus L.; ſ. Nr. 1016.
—. X., 5; Dickblattpfl.: Sedum telephĭum L.; ſ. Nr. 2142.
—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: Aconītum lycoctŏnum L.; ſ. Nr. 2153.

p. In ſchattigen Bergwäldern:

—. II., 1; Nachtkerzenpfl.: Circaea intermedĭa Ehrh.; ſ. Nr. 2140.

q. Auf Bergwieſen:

—. IV., 1; Kardenpfl.: Scabiōsa sylvatĭca L.; ſ. Nr. 2141.
—. V., 2; Doldenpfl.: Athamānta libanōtis L.; ſ. Nr. 2083.

—. V., 2; Doldenpfl.: Seseli colorātum Ehrh.; ſ. Nr. 2495.
—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: Delphinium elātum L.; ſ. Nr. 2496.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolium agrarium L.; ſ. Nr. 1084.
—. " " Vicia tenuifolia Roth; ſ. Nr. 1229.
—. " " Lathyrus sylvēstris L.; ſ. Nr. 1036.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hippochoeris maculāta L.; ſ. Nr. 2111.
—. XIX., 1; Korbblütler: Serratula nitida Bess.; ſ. Nr. 2450.
—. " " Cirsium acaule-tuberōsum Schiede; ſ. Nr. 2417.
—. XIX., 1; Korbblütler: C. pannonicum DC.; ſ. Nr. 2498.
—. XIX., 2; " Pyrēthrum macrophyllum Willd.; ſ. Nr. 2499.
—. XIX., 2; Korbblütler: Inula germanica L.; ſ. Nr. 2296.

r. Auf trocknen Bergwieſen:

—. IV., 1; Kardenpfl.: Scabiōsa gramuntia L.; ſ. Nr. 1611.
3032. V., 2; Enzianpfl.: Gentiāna campēstris L. Feld-Enzian. Bltr. eilanzettl., unterſte verk.-eif., geſtielt; Bltr. 4ſpalt., bläulich-violet, ſeltener gelblichweiß mit bärtigem Schlunde; Kzähne ungleich, die 2 äußeren breit-ellipt.; ☉; 8 bis 10.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranium sanguineum L.; ſ. Nr. 486.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Astragālus onobrychis L.; ſ. Nr. 1612.

s. Auf feuchten Bergwieſen:

—. IV., 1; Krapppfl.: Galium boreāle L.; ſ. Nr. 2081.
—. V., 2; Doldenpfl.: Selinum carvifolia L.; ſ. Nr. 2057.
—. V., 4; Studentenröschen: Parnassia palūstris L.; ſ. Nr. 2500.
—. XIX., 1; Korbblütler: Cirsium heterophyllum DC.; ſ. Nr. 2501.

§. 547. **Z. In Gebirgen:**

—. II., 1; Rachenblümler: Veronica crenūlata Hoffm.; ſ. unter Nr. 2212.
—. II., 1; Rachenblümler: V. alternifolia Lej.; ſ. unter Nr. 2212.
—. III., 2; Graspfl.: Poa cenisia All.; ſ. Nr. 2503.
—. IV., 1; Kardenpfl.: Scabiōsa lucida Vill.; ſ. Nr. 2504.
—. V., 1; Borretſchpfl.: Onōsma stellulātum W. et K.; ſ. Nr. 1617.

—. V., 1; Veilchenpfl.: Viŏla lutĕa Sm.; ſ. Nr. 2505.
—. V., 2; Enzianpfl.: Gentiana lutĕa L.; ſ. Nr. 2506.
—. „ „ G. pannonĭca Scop.; ſ. Nr. 2507.
—. „ „ G. punctāta L.; ſ. Nr. 2597.
3033. „ „ G. asclepiadēa L. Schwalbenwurzartiger Enzian. St. vielblüt.; Bltr. eilanzettl.; Bl. gegenſt., azurblau, mit dunkl. Punkten, oder gelblichweiß; Blkr. 5ſpalt., trichtf.-glockig; 4; 8 bis 9; Tafelfichte, Rieſengeb., A.
—. V., 2; Doldenpfl.: Meum mutellīna Gaertn.; ſ. Nr. 1618.
—. „ „ Conĭoselīnum fischēri W. et Gr.; ſ. Nr. 2508.
—. V., 2; Doldenpfl.: Heraclĕum sibirĭcum L.; ſ. Nr. 2145.
—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: Epilobĭum angustifolĭum L.; ſ. Nr. 2085.
—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: E. rosmărinifolĭum Haenke; ſ. Nr. 2509.
—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: E. alpīnum L.; ſ. Nr. 2510.
—. „ „ E. virgātum Fr.; ſ. Nr. 2121.
—. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus barbātus L.; ſ. Nr. 2511.
3034. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: Aconĭtum cammărum L. (A. bernhardiānum Wallr.). Langhelmiger Eiſenhut. Wrz. knollig; Bltr. handf.-5- bis 7theil., Lappen rautenf., fiederſpalt.; die 2 oberen Bltr. aufr. oder oben ſchwachübergebog.; Kapuze groß, mehr oder weniger vorwärts gebog., kegelf.; Sporn zurückgekr.; Fr. aufr.; Eierſtöcke 3 bis 5, aufr.-abſteh.; Bl. violet, lichtblau und weiß; 4; 8 bis 10; ∓.

Varirt: A. cernŭum Wulff. (A. paniculātum Lmk.; obere Blbltr. mit an der Spitze vorwärts-geneigten Kapuzen), A. cammărum Jacq. (obere Blbltr. nebſt den Kapuzen aufr.; Helm faſt grade, kegelf., aufr., ſackf.-vertieft), A. varĭegātum L. (obere Blbltr. wie bei vor.; Helm aufgeblaſen-kegelf., vorw.-geneigt, etwas umgerollt-geſchnäb.).
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Anemōne alpīna L.; ſ. Nr. 771.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Dracocephălum moldavĭca L.; ſ. Nr. 2147.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Alectorolŏphus angustifolĭus Gmel.; ſ. Nr. 2483.
—. XIV., 2; Rachenblümler: A. alpēstris Whlbg.; ſ. Nr. 2512.
—. „ „ Bartschĭa alpīna L.; ſ. Nr. 1622.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Cardamĭne resedifolĭa L.; ſ. Nr. 2513.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum alpīnum L.; ſ. Nr. 2514.

—. XIX., 1; Korbblütler: H. villōsum L.; ſ. Nr. 2515.
—. „ „ H. tridentātum Fr.; ſ. Nr. 2071.
—. „ „ H. boreāle Fr.; ſ. Nr. 2996.
—. „ „ Cardŭus personāta Jacq.; ſ. Nr. 2516.
—. XIX., 1; Korbblütler: Adenostўles albĭfrons Rchb.; ſ. Nr. 2520.
—. XIX., 2; Korbblütler: Senecĭo alpīnus Scop.; ſ. Nr. 2517.
—. „ „ Achillēa magna L.; ſ. Nr. 2518.
—. „ „ A. tanăcetifolĭa All.; ſ. Nr. 2519.
—. XXI., 3; Halbgras: Carex frigĭda All.; ſ. Nr. 1641.

a. Auf höheren Gebirgen:

—. X., 5; Dickblattpfl.: Sedum repens Schleich.; ſ. Nr. 2523.
—. XI., 5; „ Sempervīvum montānum L.; ſ. Nr. 2524.
—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: Aconītum napēllus L.; ſ. Nr. 1628.
—. XIX., 1; Korbblütler: Crepis grandiflōra Willd. enum.; ſ. Nr. 2526.
—. XIX., 1; Korbblütler: C. sibirĭca L.; ſ. Nr. 2527.
—. „ „ Mulgedĭum alpīnum Less.; ſ. Nr. 2528.
—. XIX., 1; Korbblütler: M. plumiēri DC.; ſ. Nr. 2529.
3035. XIX., 2; „ Gnaphalĭum supīnum L. (Omalothĕca supīna DC. prodr.). Niedriges Ruhrkraut. St. fadenf., mit kriech. Ausläufern; Bltr. lineal.-lanzettl.; Köpfchen in kurzen Aehren oder Trauben oder einzeln an der Spitze des St.; Bl. gelblichweiß; 4; 8 bis 9.

Varirt: G. supīnum Auct. (ſchwächl. Pfl. mit 1nervigen Bltrn. und ſpitzl. Hüllbltchn.), G. fuscum Scop. (große Pfl. mit mehr oder weniger deutl.-3nervigen Bltrn. und faſt völlig abgerund. Hüllbltchn.), G. norvegĭcum Gunn. (obere und mittl. Blattachſeln mit Köpfchen).

b. Auf hohen Gebirgen:

—. V., 1; Schlüſſelblümler: Primŭla minĭma L.; ſ. Nr. 2521.
—. „ „ Androsăce carnĕa L.; ſ. Nr. 2522.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Melampўrum sylvatĭcum L.; ſ. Nr. 2525.

c. Auf Urgebirgen:

—. X., 2; Steinbrechpfl.: Saxifrăga exarāta Vill.; ſ. Nr. 2531.

—. XV., 2; Kreuzblütler: Cardamĭne resēdifolĭa L.; ſ. Nr. 2513.
—. XIX., 3; Korbblütler: Centaurēa nigra L.; ſ. Nr. 2162.

d. Auf Sandſteingebirgen:

—. XIX., 3; Korbblütler: Centaurēa nigra L.; ſ. Nr. 2162.

e. Auf Kalkgebirgen:

—. V., 2; Doldenpfl.: Seseli montānum DC.; ſ. Nr. 2530.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Prunēlla grandiflōra Jacq.; ſ. Nr. 2439.
—. XIX., 2; Korbblütler: Doronĭcum austriăcum Jacq.; ſ. Nr. 1529.

f. Auf Jurakalkgebirgen:

—. XIX., 2; Korbblütler: Buphthālmum salicifolĭum DC.; ſ. Nr. 3031.

g. Auf Baſaltkuppen:

—. X., 2; Steinbrechpfl.: Saxifrăga bryoīdes L.; ſ. Nr. 2532.

h. Auf Gebirgsrücken:

—. XII., 3; Roſenpfl.: Dryas octopetăla L.; ſ. Nr. 2541.

i. In ſteinigen Gebirgen:

—. X., 2; Nelkenblütler: Gypsophīla fastigiāta L.; ſ. Nr. 1480.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum pallēscens W. et K.; ſ. Nr. 2543.
—. XIX., 1; Korbblütler: Lactūca virōsa L.; ſ. Nr. 2544.

k. An felſigen Stellen:

—. V., 1; Glockenblümler: Campanŭla pusilla Haenke; ſ. Nr. 1681.
—. X., 2; Steinbrechpfl.: Saxifrăga bryoīdes L.; ſ. Nr. 2532.
—. „ „ S. aïzōon Jacq.; ſ. Nr. 2534.
—. X., 3; Nelkenblütler: Silēne rupēstris L.; ſ. Nr. 2536.
—. X., 5; Dickblattpfl.: Sedum annŭum L.; ſ. Nr. 1356.
—. XI., 5; „ Sempervīvum hirtum L.; ſ. Nr. 2537.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Saturēja pygmaea Sieb.; ſ. Nr. 2454.

l. Zwiſchen Felſen:

—. III., 2; Graspfl.: Calamagrōstis montāna Host; ſ. Nr. 1102.
—. III., 2; Graspfl.: Tritĭcum biflōrum Brign.; ſ. Nr. 2579.

m. In Felsenritzen und zwischen Gestein:

—. X., 2; Steinbrechpfl.: Saxifrăga aïzoon Jacq.; s. Nr. 2534.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Arăbis alpīna L.; s. Nr. 788.

n. Auf nackten Stellen:

—. XIX., 1; Korbblütler: Crinitarĭa linosўris Less.; s. Nr. 3018.

o. An feuchten Orten:

—. V., 2; Doldenpfl.: Archangelĭca officinālis Hoffm.; s. Nr. 1646.
—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: Epilobĭum alpīnum L.; s. Nr. 2510.
—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: E. origanifolĭum Lmk.; s. Nr. 2547.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Bartschĭa alpīna L.; s. Nr. 1622.
—. XIX., 2; Korbblütler: Senecĭo doрĭa L.; s. Nr. 2126.

p. An feuchten, quelligen Stellen:

—. IV., 1; Rosenpfl.: Alchemīlla fissa Schumm.; s. Nr. 2548.

q. Auf Torfmoren:

—. XIV., 2; Rachenblümler: Pediculāris sceptrum carolīnum L.; s. Nr. 1056.

r. An Bächen:

—. II., 1; Rachenblümler: Veronīca mediа Schrad.; s. unter Nr. 2212.

s. An faulen Baumstämmen:

—. XX., 1; Orchidee: Epipogĭum gmelīni Rich.; s. Nr. 2105.

t. Auf Gebirgsäckern:

—. VIII., 1; Knöterichpfl.: *Polygŏnum fagopўrum L.; s. Nr. 2360.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Teucrĭum botrys L.; s. Nr. 2405.

u. In Gebirgsschluchten:

—. V., 2; Doldenpfl.: Archangelĭca officinālis Hoffm.; s. Nr. 1646.
—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: Epilobĭum trigōnum Schrk.; s. Nr. 1647.

v. In Gebirgsthälern:

—. III., 1; Halbgras: Cypērus badĭus Desf.; s. Nr. 2538.
—. XXI., 3; „ Carex vahlĭi Schkhr.; s. Nr. 2539.

w. An Gebirgsabhängen:

—. XIV., 2; Rachenblümler: Anarrhīnum bellidifolĭum Desf.; ſ. Nr. 2540.

—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperĭcum coris L.; ſ. Nr. 2461.

x. In gebirgigen Gegenden:

—. XIX., 1; Korbblütler: Cirsĭum erĭophŏrum Scop.; ſ. Nr. 2287.

—. XIX., 1; Korbblütler: Centrophȳllum lanātum DC.; ſ. Nr. 2563.

—. XIX., 2; Korbblütler: Telekĭa cordifolĭa Kit.; ſ. Nr. 2564.

—. „ „ Gnaphalĭum sylvatĭcum L.; ſ. Nr. 3051.

—. XIX., 2; Korbblütler: Inŭla viscōsa Ait.; ſ. Nr. 2565.

—. XIX., 3; „ Crupīna vulgāris Cass.; ſ. Nr. 1637.

y. Auf Grasplätzen:

3036. V., 2; Enzianpfl.: Gentiāna ciliāta L. Gefranſter Enzian. St. aufr., 4kant., gekniet; Bltr. lineal.-lanzettl.; Bl. endſt., blau, kahlſchlundig; Zipf. der 4ſpalt. Blkr. gefranſt; Stbgf. 4; 2|; 8 bis 9; Bö., Schl., Rh., W., Hn., Th., Ha., Sa., B. u. ſ. w.

—. XII., 3; Roſenpfl.: Sieversĭa montāna Spr.; ſ. Nr. 2552.

—. XIX., 1; Korbblütler: Leontŏdon squamōsus Lmk.; ſ. Nr. 2553.

—. XIX., 1; Korbblütler: Cirsĭum acaule All.; ſ. Nr. 2097.

z. Auf naſſen Triften:

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Hedysărum obscūrum L.; ſ. Nr. 1649.

a¹. Auf Triften über der Waldregion:

—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: Delphinĭum elātum L.; ſ. Nr. 2496.

b¹. Auf Gebirgswieſen:

—. II., 1; Rachenblümler: Veronĭca medĭa Schrad.; ſ. unter Nr. 2212.

—. V., 1; Glockenblümler: Phyteuma orbiculāre L.; ſ. Nr. 1653.

—. V., 1; Veilchenpfl.: Viŏla lutĕa Sm.; ſ. Nr. 2505.

—. V., 2; Enzianpfl.: Gentiāna obtusifolĭa Willd.; ſ. Nr. 2502.

—. V., 2; Doldenpfl.: Meum athamantĭcum Jacq.; ſ. Nr. 2554.

—. V., 2; Doldenpfl.: Chaerophyllum hirsūtum L.; ſ. Nr. 2130.
—. VI., 1; Lilienpfl.: Allium schoenoprāsum L.; ſ. Nr. 1654.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygŏnum bistōrta L.; ſ. Nr. 1139.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Alectorolŏphus pulcher Schumm.; ſ. Nr. 2555.
—. XIX., 1; Korbblütler: Cardŭus deflorātus L.; ſ. Nr. 2074.
—. XIX., 3; „ Centaurēa phrygĭa L.; ſ. Nr. 2163.
—. „ „ C. nigrēscens Willd.; ſ. Nr. 2556.

c¹. Auf feuchten Gebirgswieſen:

—. IV., 1; Roſenpfl.: Sanguisōrba officinālis L.; ſ. Nr. 1658.
—. V., 2; Doldenpfl.: Pleurospērmum austriăcum Hoffm.; ſ. Nr. 2557.
—. XIX., 1; Korbblütler: Crepis succisaefolĭa Tausch; ſ. Nr. 2558.
—. XIX., 1; Korbblütler: Cirsĭum palūstri - tuberōsum Schiede; ſ. Nr. 2559.

d¹. Auf Sumpfwieſen:

—. V., 2; Enzianpfl.: Sweertĭa perēnnis L.; ſ. Nr. 2560.

e¹. Auf Torfwieſen:

—. VIII., 1; Heidepfl.: Tetrălix septentrionālis E. Mey.; ſ. Nr. 2561.

f¹. Auf trocknen Wieſen in Gebirgsgegenden:

—. II., 1; Nachtkerzenpfl.: Circaea alpīna L.; ſ. Nr. 1062.

g¹. Unter Gebüſch:

—. V., 2; Doldenpfl.: Laserpitĭum marginātum W. et K.; ſ. Nr. 2549.
—. X., 3; Nelkenblütler: Silēne armerĭa L.; ſ. Nr. 2550.

h¹. In der Waldregion:

—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum prenanthoīdes Vill.; ſ. Nr. 2551.

i¹. In Gebirgshainen:

—. XIX., 3; Korbblütler: Centaurēa phrygĭa L.; ſ. Nr. 2163.

k¹. In Gebirgswäldern:

—. III., 1; Baldrianpfl.: Valerĭana montāna L.; ſ. Nr. 1153.
—. IV., 1; Krapppfl.: Asperŭla tinctorĭa L.; ſ. Nr. 2143.
—. „ „ Galĭum sylvatĭcum L.; ſ. Nr. 2144.

—. IV., 1; Krapppfl.: G. aristātum L.; ſ. Nr. 1154.
—. V., 1; Nachtſchattenpfl.: Atrŏpa belladōnna L.; ſ. Nr. 2053.
—. V., 1; Glockenblümler: Campanŭla latifolĭa L.; ſ. Nr. 1156.
—. V., 2; Doldenpfl.: Astrantĭa major L.; ſ. Nr. 1157.
—. „ „ Heraclēum sibirĭcum L.; ſ. Nr. 2145.
—. „ „ H. alpīnum L.; ſ. Nr. 2146.
—. „ „ Laserpitĭum latifolĭum L.; ſ. Nr. 1158.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Digitālis purpurāscens Koch; ſ. Nr. 1161.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Scrophularĭa scopolĭi Hoppe; ſ. Nr. 2148.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum lucĭdum L.; ſ. Nr. 504.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Lathўrus heterophўllus L.; ſ. Nr. 2067.
—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hypericum pulchrum L.; ſ. Nr. 1089.
—. XIX., 1; Korbblütler: Prenānthes purpurĕa L.; ſ. Nr. 2149.
—. XIX., 2; Korbblütler: Senecĭo nemorēnsis L.; ſ. Nr. 2150.

l[1]. In feuchten Gebirgswäldern:

—. II., 1; Nachtkerzenpfl.: Circaea alpīna L.; ſ. Nr. 1062.
—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: Aconĭtum stoerkeānum Rchb.; ſ. Nr. 1168.

m[1]. In ſchattigen Gebirgswäldern:

—. II., 1; Nachtkerzenpfl.: Circaea alpīna L.; ſ. Nr. 1062.

n[1]. In feuchten, ſchattigen Gebirgswäldern:

—. V., 1; Schlüſſelblümler: Cyclāmen europaeum L.; ſ. Nr. 288.
—. V., 1; Schlüſſelblümler: Soldanēlla montāna Willd.; ſ. Nr. 496.
—. XXI., 1; Giftmilcher: Euphorbĭa procēra M. B.; ſ. Nr. 1169.

o[1]. In ſchattigen, moſigen Gebirgswaldungen:

—. IV., 1; Krapppfl.: Galĭum rotundifolĭum L.; ſ. Nr. 2151.

p[1]. In ſchattigen Thälern der Gebirgswälder:

—. V., 2; Doldenpfl.: Astrantĭa major L.; ſ. Nr. 1157.

q¹. In steinigen Gebirgswaldungen:

—. XIV., 2; Rachenblümler: Digitālis purpurĕa L.; ſ. Nr. 1170.

r¹. An Rändern der Gebirgswälder:

—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: Aconītum lycoctŏnum L.; ſ. Nr. 2153.

§. 548. **A¹. Auf und an Felſen:**

—. III., 2; Graspfl.: Andropōgon allionĭi DC.; ſ. Nr. 1661.
—. „ „ Tritĭcum biflōrum Brign.; ſ. Nr. 2579.
—. V., 1; Glockenblümler: Campanŭla pyramidālis L.; ſ. Nr. 2227.
—. V., 1; Veilchenpfl.: Viŏla tricŏlor L.; ſ. Nr. 525.
—. VI., 1; Lilienpfl.: Allĭum saxatĭle M. B.; ſ. Nr. 2568.
—. VIII., 1; Rautenpfl.: Ruta graveŏlens L.; ſ. Nr. 2569.
—. X., 2; Nelkenblütler: Gypsophīla paniculāta L.; ſ. Nr. 2570.
—. X., 2; Steinbrechpfl.: Saxifrăga exarāta Vill.; ſ. Nr. 2531.
—. „ „ S. planifolĭa Lapeyr.; ſ. Nr. 2571.
—. X., 3; Nelkenblütler: Moehringĭa villōsa Fenzl; ſ. Nr. 1663.
—. X., 5; Dickblattpfl.: Sedum telephĭum L.; ſ. Nr. 2142.
—. „ „ S. annŭum L.; ſ. Nr. 1356.
—. „ „ S. acre L.; ſ. Nr. 1298.
—. „ „ S. reflēxum L.; ſ. Nr. 2235.
—. „ „ S. album L.; ſ. Nr. 2572.
—. XI.. 5; „ Sempervīvum tectōrum L.; ſ. Nr. 2236.
—. XI., 5; Dickblattpfl.: S. globifĕrum L.; ſ. Nr. 2573.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Hyssōpus officinālis L.; ſ. Nr. 2237.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Stachys recta L.; ſ. Nr. 1303.
—. „ „ Teucrĭum flavum L.; ſ. Nr. 1663.
—. „ „ T. scorodonĭa L.; ſ. Nr. 2090.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Linarĭa cymbalarĭa Dill.; ſ. Nr. 1360.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Berterŏa incāna DC.; ſ. Nr. 1305.
—. „ „ Biscutēlla laevigāta L.; ſ. Nr. 2410.
—. XV., 2; „ Diplotāxis tenuifolĭa DC.; ſ. Nr. 1313.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Sināpis cheiränthus Koch; ſ. Nr. 1316.

—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranium lucidum L.; s. Nr. 504.
—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Melilōtus alba Lmk.; s. Nr. 2197.
—. XIX., 1; Korbblütler: Cirsium acaule All.; s. Nr. 2097.
—. XIX., 2; „ Doronicum caucasicum M. B.; s. Nr. 1535.
—. XIX., 2; Korbblütler: Achillēa nobilis L.; s. Nr. 2244.
—. XIX., 3; „ Centaurēa alba L.; s. Nr. 2575.
—. XXI., 4; Nesselpfl.: Urtica piulifĕra L.; s. Nr. 1266.

a. An schattigen Felsen:

—. III., 2; Grasp fl.: Sesleria coerulĕa Ard.; s. Nr. 83.
—. X., 2; Steinbrechpfl.: Saxifrăga arachnoides Sternb.; s. Nr. 2577.
—. X., 3; Nelkenblütler: Moehringia muscōsa L.; s. Nr. 1666.
—. XIX., 1; Korbblütler: Prenānthes purpurĕa L.; s. Nr. 2149.

b. An trocknen Felsen:

—. X., 2; Paronychienpfl.: Scleränthus perēnnis L.; s. Nr. 676.

c. In Felsenritzen:

—. XIV., 2; Rachenblümler: Linaria genistifolia Mill.; s. Nr. 2479.

d. In Felsenklüften:

—. V., 1; Nachtschattenpfl.: *Solānum villōsum Lmk.; s. Nr. 3010.

e. Unter Felsen:

—. V., 2; Doldenpfl.: Bupleurum longifolium L.; s. Nr. 1201.
—. X., 2; Steinbrechpfl.: Saxifrăga cernŭa L.; s. Nr. 2580.

f. Am Fuße der Felsen:

—. X., 2; Nelkenblütler: Saponaria officinālis L.; s. Nr. 2184.

g. Auf Kalkfelsen:

—. X., 2; Nelkenblütler: Dianthus plumarius L.; s. Nr. 2428.
—. X., 3; „ Silēne saxifrăga L.; s. Nr. 2429.
—. „ „ Moehringia ponae Fenzl; s. Nr. 1531.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Capsella pauciflōra Koch; s. Nr. 704.

h. An felsigen Orten:

—. V., 2; Doldenpfl.: Seseli tortuōsum L.; s. Nr. 2581.

—. V., 3; Paronychienpfl.: Telephium imperati L.; ſ. Nr. 2582.
—. X., 3; Nelkenblütler: Silene armeria L.; ſ. Nr. 2550.
—. „ „ Alsine setacea M. et K.; ſ. Nr. 2453.
—. XIX., 1; Korbblütler: Scolymus hispanicus L.; ſ. Nr. 2285.

i. An felſigen, ſchattigen Orten:

—. X., 5; Dickblattpfl.: Sedum cepaea L.; ſ. Nr. 2578.

k. An felſigen, waldigen Orten:

—. XIV., 1; Lippenblümler: Melissa stricta Rchb.; ſ. Nr. 2546.

l. An felſigen, gebirgigen Orten:

—. XIV., 1; Lippenblümler: Saturēja pygmaea Sieb.; ſ. Nr. 2454.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Teucrium polium L.; ſ. Nr. 2455.

§. 549. **B[1]. In den Alpen und Voralpen:**

—. II., 1; Rachenblümler: Veronica fruticulosa Wulff.; ſ. Nr. 2583.
—. II., 1; Lippenblümler: Salvia glutinosa L.; ſ. Nr. 2106.
—. III., 2; Graspfl.: Calamagrostis tenella Lk.; ſ. Nr. 2585.
—. „ „ Avena alpestris Host; ſ. Nr. 2586.
—. „ „ A. argentea L.; ſ. Nr. 2587.
—. „ „ A. scheuchzeri All.; ſ. Nr. 2588.
—. „ „ Poa cenisia All.; ſ. Nr. 2503.
—. „ „ P. laxa Haenke; ſ. Nr. 2589.
—. IV., 1; Wegerichpfl.: Plantago alpina L.; ſ. Nr. 1672.
—. „ Kardenpfl.: Scabiosa lucida Vill.; ſ. Nr. 2504.
—. „ „ Sc. graminifolia L.; ſ. Nr. 1674.
—. „ Krapppfl.: Asperula longiflora W. et K.; ſ. Nr. 2590.
—. IV., 1; Roſenpfl.: Alchemilla alpina L.; ſ. Nr. 1284.
—. V., 1; Schlüſſelblümler: Cyclamen europaeum L.; ſ. Nr. 288.
—. V., 1; Schlüſſelblümler: Soldanella alpina L.; ſ. Nr. 817.
—. „ „ Androsace villosa L.; ſ. Nr. 819.
—. „ Borretſchpfl.: Cerinthe aspera Roth; ſ. Nr. 2591.
—. „ Heidepfl.: Azalea procumbens L.; ſ. Nr. 1680.
—. „ Glockenblümler: Campanula pusilla Haenke; ſ. Nr. 1681.

—. V., 1; Glockenblümler: C. caespitōsa Scop.; ſ. Nr. 2533.
—. „ „ C. pubēscens Schm.; ſ. Nr. 1682.
—. „ „ C. linifolĭa Lmk.; ſ. Nr. 1683.
—. „ „ Phyteuma scheuchzēri All.; ſ. Nr. 2592.
—. V., 1; Glockenblümler: Ph. globulariaefolĭum St. et Hoppe; ſ. Nr. 2593.
—. V., 1; Glockenblümler: Ph. hemisphaerĭcum L.; ſ. Nr. 2594.
—. V., 1; Veilchenpfl.: Viŏla lutĕa Sm.; ſ. Nr. 2505.
—. „ „ V. alpīna Jacq.; ſ. Nr. 2595.
—. V., 2; Enzianpfl.: Gentiāna lutĕa L.; ſ. Nr. 2506.
—. „ „ G. purpurĕa Vill.; ſ. Nr. 2596.
—. „ „ G. pannonĭca Scop.; ſ. Nr. 2507.
—. „ „ G. punctāta L.; ſ. Nr. 2597.
—. „ „ G. asclepiadēa L.; ſ. Nr. 3033.
—. „ „ G. acaulis L.; ſ. Nr. 1690.
—. „ „ G. imbricāta Froel.; ſ. Nr. 2598.
—. „ Doldenpfl.: Astrantĭa major L.; ſ. Nr. 1157.
—. „ „ Eryngĭum alpīnum L.; ſ. Nr. 2599.
3037. „ „ E. amethystĭmum L. Blauer Mannstreu. St. oben gefärbt, ametiſtblau, äſtig; Bltr. dopp.-fiederſpalt., faſt kraus, grundſt. vielſpalt., herzf., lang-geſtielt, ſteif-ſägezähn.; Bl. ſtalblau; 4; 8; Kr., Ty.
— V., 2; Doldenpfl.: Bupleurum graminifolĭum Vahl; ſ. Nr. 2600.
—. V., 2; Doldenpfl.: Turbith matthiōli Tausch; ſ. Nr. 2601.
—. „ „ Meum mutellīna Gaertn.; ſ. Nr. 1618.
—. „ „ Peucedănum rablēnse Koch; ſ. Nr. 2602.
—. V., 2; Doldenpfl.: Heraclēum sibirĭcum L.; ſ. Nr. 2145.
—. „ „ H. alpīnum L.; ſ. Nr. 2146.
—. „ „ Laserpitĭum alpīnum W. et K.; ſ. Nr. 2603.
—. V., 2; Doldenpfl.: L. gaudinĭi Moretti; ſ. Nr. 2604.
—. „ „ L. siler L.; ſ. Nr. 2605.
—. „ „ L. peucĕdanoïdes L.; ſ. Nr. 2606.
—. „ „ L. nitĭdum Zanted; ſ. Nr. 2607.
—. VI., 1; Semede: Juncus arctĭcus Willd.; ſ. Nr. 2608.
—. „ „ J. castanĕus Sm.; ſ. Nr. 1693.
—. „ „ J. jacquīni L.; ſ. Nr. 1694.
—. „ Lilienpfl.: Allĭum ochroleucum W. et K.; ſ. Nr. 2609.
—. VI., 1; Lilienpfl.: A. nigrum L.; ſ. Nr. 1696.

—. VI., 1; Lilienpfl.: Rumex alpīnus L.; ſ. Nr. 1697.
—. „ „ R. arifolĭus All.; ſ. Nr. 1610.
—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: Epilobĭum rosmarīnifolĭum Haenke; ſ. Nr. 2509.
—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: E. alpīnum L.; ſ. Nr. 2510.
—. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus barbātus L.; ſ. Nr. 2511.
—. „ „ D. sylvēstris Wulff.; ſ. Nr. 2611.
—. „ „ Gypsophīla repens L.; ſ. Nr. 2482.
—. „ „ Smegmānthe ocymoīdes Fenzl; ſ. Nr. 2612.
—. X., 2; Steinbrechpfl.: Saxifrăga muscoīdes Wulf.; ſ. Nr. 1701.
—. X., 2; Steinbrechpfl.: S. tenēlla Wulf.; ſ. Nr. 2613.
—. „ „ S. cotylēdon L.; ſ. Nr. 2614.
—. „ „ S. cuneĭfolĭa L.; ſ. Nr. 2615.
—. X., 3; Nelkenblütler: Silēne saxifrăga L.; ſ. Nr. 2429.
—. „ „ Alsīne larĭcifolĭa Whlbg.; ſ. Nr. 2617.
—. X., 3; Nelkenblütler: A. austrĭăca M. et K.; ſ. Nr. 2618.
—. X., 5; „ Cerastĭum latifolĭum L.; ſ. Nr. 2616.
—. XI., 5; Dickblattpfl.: Sempervīvum funkĭi A. Br.; ſ. Nr. 2620.
—. XI., 5; Dickblattpfl.: S. sobolifĕrum Sims.; ſ. Nr. 2167.
—. XII., 3; Roſenpfl.: Dryas octopetăla L.; ſ. Nr. 2541.
—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: Aconītum anthōra L.; ſ. Nr. 3030.
—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: A. napēllus L.; ſ. Nr. 1628.
—. „ „ A. cammărum L.; ſ. Nr. 3034.
—. XIII., 3; „ Atragĕne alpīna L.; ſ. Nr. 2621.
—. „ „ Anemōne alpīna L.; ſ. Nr. 771.
—. „ „ Ranuncŭlus aconītifolĭus L.; ſ. Nr. 1709.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: R. montānus Willd.; ſ. Nr. 1710.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Melīssa alpīna Benth.; ſ. Nr. 2622.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Betonĭca officinālis L.; ſ. Nr. 1027.
—. XIV., 1; Lippenblümler: B. alopecūros L.; ſ. Nr. 2623.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Pediculāris foliōsa L.; ſ. Nr. 2065.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Melampўrum sylvatĭcum L. ſ. Nr. 2525.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Bartschĭa alpina L.; ſ. Nr. 1622.

—. XV., 1; Kreuzblütler: Alyssum wulfenianum Bernh.; ſ. Nr. 2627.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Biscutella laevigata L.; ſ. Nr. 2410.
—. XV., 2; „ Cardamine alpina Willd.; ſ. Nr. 2628.
—. XV., 2; Kreuzblütler: C. resedifolia L.; ſ. Nr. 2513.
—. „ „ Braya pinnatifida Koch; ſ. Nr. 2630.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolium badium Schreb.; ſ. Nr. 1718.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Phaca alpina Jacq.; ſ. Nr. 2631.
—. „ „ Ph. astragalina Pers.; ſ. Nr. 2632.
—. „ „ Oxytropis montana DC.; ſ. Nr. 1721.
—. „ „ O. campestris DC.; ſ. Nr. 2633.
—. „ „ Astragalus purpureus Lmk.; ſ. Nr. 2634.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Hedysarum obscurum L.; ſ. Nr. 1649.
—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hypericum richeri Vill.; ſ. Nr. 2635.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hypericum incisum Hoppe; ſ. Nr. 1723.
—. XIX.. 1; Korbblütler: H. cydoniaefolium Vill.; ſ. Nr. 2636.
—. „ „ H. lycopifolium Froel.; ſ. Nr. 2637.
—. „ „ H. amplexicaule L.; ſ. Nr. 2638.
—. „ „ H. alpinum L.; ſ. Nr. 2514.
—. „ „ H. albidum Vill.; ſ. Nr. 2639.
—. „ „ H. flexuosum W. et K.; ſ. Nr. 2640.
—. „ „ H. candolleï Froel.; ſ. Nr. 2641.
—. „ „ H. pilosum Schleich.; ſ. Nr. 2642.
—. „ „ H. villosum L.; ſ. Nr. 2515.
—. „ „ H. graminifolium DC.; ſ. Nr. 2643.
—. „ „ Crepis aurea Cass.; ſ. Nr. 2644.
—. „ „ C. grandiflora Willd. enum.; ſ. Nr. 2526.
—. XIX., 1; Korbblütler: Mulgedium alpinum Less.; ſ. Nr. 2528.
—. XIX., 1; Korbblütler: Serratula rhapontica DC. fl. fr.; ſ. Nr. 2645.
—. XIX., 1; Korbblütler: Carduus personata Jacq.; ſ. Nr. 2516.
—. XIX., 1; Korbblütler: C. arctioides Willd.; ſ. Nr. 2646.
—. „ „ Saussurea alpina DC.; ſ. Nr. 2647.
—. „ „ S. discolor DC.; ſ. Nr. 2648.

—. XIX., 1; Korbblütler: Carlina acanthifolia All.; ſ. Nr. 2649.
—. XIX., 1; Korbblütler: C. lanata L.; ſ. Nr. 2650.
—. XIX., 2; „ Senecio lyratifolius Rchb.; ſ. Nr. 2652.
—. XIX., 2; Korbblütler: S. alpinus Scop.; ſ. Nr. 2517.
—. „ „ S. doronicum L.; ſ. Nr. 2653.
—. „ „ Aronicum scorpioides L.; ſ. Nr. 2654.
—. XIX., 2; Korbblütler: Artemisia lanata Willd.; ſ. Nr. 2655.
3038. XIX., 2; Korbblütler: A. tanacetifolia All. Rainfarnblättriger Beifuß. Raſenbildend; Blütenſt. aufſteig., einfach oder traubig-äſtig; Bltr. kahl oder behart, dopp.-fiederſpalt., Fiedern lanzettl., ſpitzl.; Köpfchen kug., nickend; Bl. gelb; 4; 7 bis 8; Kr. (Alpe Moroſch bei Flitſch).
—. XIX., 2; Korbblütler: Pyrethrum hallēri Willd.; ſ. Nr. 2656.
—. XIX., 2; Korbblütler: Anthemis alpina L.; ſ. Nr. 2657.
3039. „ „ A. styriaca Vest. (A. kitaibelii Spr., DC. prodr. VI. 7; A. montana (L.) Koch syn. 2. edit.). Steierer Hundskamille. St. einfach, oben nackt, weichharig, 1köpf.; Bltr. in der Jugend unterſ. behart, in den geflüg., 3nervigen Blattſt. verlauf., 3- bis 6parig-fiedertheil.; Spreublttchn. durchſcheinend, vorn zernagt, innere glänzendweiß, äußere an der Spitze braunſchwarz; Bl. weiß, Scheibe gelb; 4; 8 bis 9; St. (hoher Zinken).*)
—. XIX., 2; Korbblütler: Aster alpinus L.; ſ. Nr. 2659.
—. „ „ Adenostyles alpinus Bl. et Fing.; ſ. Nr. 2651.
—. XIX., 2; Korbblütler: A. albifrons Rchb.; ſ. Nr. 2520.
—. XX., 1; Orchidee: Chamorchis alpina Rich.; ſ. Nr. 2660.
—. XXI., 3; Halbgras: Carex capillaris L.; ſ. Nr. 1731.
3040. „ „ C. ustulata Whlbg. (C. atrofusca Schk.). Schwarzährige Segge. Wrzſtock wagr., mit kurzen, bogig-aufſteig. Ausläufern; Bltr. breit-lanzett-lineal., flach, ſcharfſpitz.; Halm aufr., ſtumpf-3kant., geſtreift, glatt; Aehren eif., geſtielt, ♂ gipfelſt., eilängl., die übrigen (2 bis 3) ♀, kug.-eif.; Blütenſch. ſchwarz, häutig; Blüten-

*) De Candolle hat die A. styriaca Vest. bei Anthemis gelaſſen, minder konſequent.

ſcheidchen ſchwarz, grün- oder rotgelb-gekielt; 4; 8; Kä., St., Kr.

a. Auf höheren Alpen:

—. X., 2; Steinbrechpfl.: Saxifrăga sedoīdes L.; ſ. Nr. 2766.
—. „ „ S. seguierĭi Spr.; ſ. Nr. 2718.
—. X., 5; Dickblattpfl.: Sedum repens Schleich.; ſ. Nr. 2523.
—. XII., 3; Roſenpfl.: Potentīlla grandiflōra L.; ſ. Nr. 2719.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum angustifolĭum Hoppe; ſ. Nr. 1753.
— XIX., 1; Korbblütler: H. glandulifĕrum Hoppe; ſ. Nr. 2720.
3041. XIX., 2; Korbblütler: Pyrĕthrum alpīnum Willd. (Chrysanthĕmum alp. L.). Alpen-Bertramwurz. Raſenbildend, kahl oder weichharig; St. aufſteig., 1köpf.; untere Bltr. langgeſtielt, Platte rundl.-eif., vorn gleichſam abgeſtutzt, ſonnenfächerartig-fiederſpalt., mit 5, 7 oder 9 ganzrand., ſelten 2ſpitz. Fiedern; Scheibe gelb; Stral weiß; 4; 7 bis 8.
Varirt: P. pubēscens Duby (behart).

b. Auf Geröll der höheren Alpen:

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolĭum pallēscens Schreb.; ſ. Nr. 2806.

c. Auf den höchſten Alpen:

—. II., 1; Rachenblümler: Veronĭca aphўlla L.; ſ. Nr. 1735.
—. III., 1; Baldrianpfl.: Valeriāna elongāta L.; ſ. Nr. 1754.
„ „ V. supīna L.; ſ. Nr. 2705.
—. „ „ V. saliūnca All.; ſ. Nr. 2661.
—. III., 2; Graspfl.: Avēna distĭchophўlla Vill.; ſ. Nr. 2662.
—. III., 2; Graspfl.: Festūca scheuchzēri Gaud.; ſ. Nr. 2663.
—. III., 2; Graspfl.: F. rhaetĭca Sut.; ſ. Nr. 2664.
—. „ „ Koelerĭa hirsūta Gaud.; ſ. Nr. 1738.
—. „ „ Sesleria sphaerocĕphala DC.; ſ. Nr. 2665.
—. III., 2; Graspfl.: S. distĭcha Pers.; ſ. Nr. 2666.
—. V., 1; Schlüſſelblümler: Primŭla minĭma L.; ſ. Nr. 2521.
—. „ „ Gregorĭa vitaliāna Dub.; ſ. Nr. 2667.
—. V., 1; Schlüſſelblümler: Androsăce alpīna Lam.; ſ. Nr. 1741.
—. V., 1; Schlüſſelblümler: A. carnĕa L.; ſ. Nr. 2522.

—. V., 1; Glockenblümler: Phyteuma pauciflōrum Pers.; ſ. Nr. 2668.
—. V., 2; Enzianpfl.: Gentiāna bavarĭca L.; ſ. Nr. 2672.
—. „ „ G. prostrāta Haenke; ſ. Nr. 2673.
—. „ „ G. nivālis L.; ſ. Nr. 2674.
—. „ „ G. nana Wulff.; ſ. Nr. 2675.
3042. „ „ G. glaciālis Vill. Langſtieliger Enzian. St. 4kant., aufſteig., aufr.; Bltr. längl.-eif., ſtumpfl., 5nervig; Blütenſt. ſcharf-4kant., borſtenf.; K. glock., 4theil., Lappen eilanzettl., die 2 äußeren breiter; Kr. 4ſpalt., im Schlunde gebärt., violet oder weiß; ☉; 8 bis 9.
—. V., 2; Doldenpfl.: Astrantĭa minor L.; ſ. Nr. 2676.
—. „ „ Bupleurum stellatum L.; ſ. Nr. 2677.
—. „ „ Laserpitĭum hirsūtum Lam.; ſ. Nr. 2678.
—. VI., 1; Semede: Juncus trifĭdus L.; ſ. Nr. 1742.
—. „ „ Luzŭla spicāta Desv.; ſ. Nr. 1743.
—. VI., 3; Zeitloſenpfl.: Tofieldĭa boreālis Whlbg.; ſ. Nr. 2679.
—. X., 2; Steinbrechpfl.: Saxifrāga pedemontāna All.; ſ. Nr. 1744.
—. X., 2; Steinbrechpfl.: S. crustāta Vest; ſ. Nr. 2620.
—. X., 3; Nelkenblütler: Stellarĭa cerastoīdes L.; ſ. Nr. 2681.
—. „ „ Alsīne rubēlla Whlbg.; ſ. Nr. 2682.
—. X., 6; Roſenpfl.: Sibbaldĭa procūmbens L.; ſ. Nr. 2683.
—. XII., 3; „ Sieversĭa reptans Spr.; ſ. Nr. 2684.
—. „ „ Potentĭlla frigĭda Vill.; ſ. Nr. 2685.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Pediculāris rostrāta L.; ſ. Nr. 2686.
—. XIV., 2; Rachenblümler: P. fasciculāta Bell.; ſ. Nr. 2626.
—. „ Geisblattpfl.: Linnaea boreālis Gronov.; ſ. Nr. 2165.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Draba frigĭda Saut.; ſ. Nr. 2687.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum argentēum L.; ſ. Nr. 1747.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolĭum alpīnum L.; ſ. Nr. 1748.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum sphaerocephălum Rchb.; ſ. Nr. 2690.
—. XIX., 1; Korbblütler: H. barbātum Hegetschw.; ſ. Nr. 2691.
—. XIX., 1; Korbblütler: H. pilifĕrum Hoppe; ſ. Nr. 2692.
—. XIX., 2; „ Senecĭo uniflōrus All.; ſ. Nr. 2693.
—. „ „ Gnaphalĭum supīnum L.; ſ. Nr. 3035.

—. XIX., 2; Korbblütler: Artemisĭa mutellīna L.; ſ. Nr. 2694.
—. XIX., 2; Korbblütler: A. spicāta Jacq.; ſ. Nr. 2695.
—. „ „ Achillēa moschāta Wulff.; ſ. Nr. 2696.
—. XIX., 2; Korbblütler: A. clavēnnae L.; ſ. Nr. 2697.
—. XXI., 3; Halbgras: Elȳna spicāta Schrad.; ſ. Nr. 1728.
—. „ „ Cobresĭa caricīna Willd.; ſ. Nr. 2698.
—. „ „ Carex lagopīna Whlbg.; ſ. Nr. 1749.
—. „ „ C. gebhardĭi Hoppe; ſ. Nr. 2728.
—. „ „ C. curvŭla All.; ſ. Nr. 2699.
—. „ „ C. nigra All.; ſ. Nr. 2700.
3043. „ „ C. fuliginōsa Sckhr. Rußfarbne Segge. Wrz. faſerig; Blr. lineal., ſcharf, gefalt., gebog., 2reih.; Halm aufr., ſchlängelig, 3kant.; Aehrchen langgeſtielt, oberſtes keulenf., unten ♂, oben ♀, die übrigen (2 bis 3) ♀, längl.; Fr. zſgedr., längl.-lanzettl., langſchnäb., 2ſpitz., am Rande gewimp.-geſägt; Blütenſch. zuweilen mit weißl. Spitze; 4; 8; Sg., St., Kä., Ty.
—. XXII., 2; Weide: Salix herbacĕa L.; ſ. Nr. 2702.
—. „ „ S. reticulāta L.; ſ. Nr. 1751.

d. Auf ſteinigen Plätzen und Triften der höchſten Alpen:

—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Anemōne baldēnsis L.; ſ. Nr. 2703.

e. An ſonnigen, ſteinigen Abhängen der höchſten Alpen:

—. X., 3; Nelkenblütler: Alsīne recūrva Whlbg.; ſ. Nr. 2704.

f. Auf Grasplätzen der höchſten Alpjoche:

—. IV., 1; Roſenpfl.: Alchemīlla fissa Schumm.; ſ. Nr. 2548.
—. XIX., 1; Korbblütler: Apargĭa taraxăci Hoffm.; ſ. Nr. 2717.

g. In Felſenſpalten der höchſten Alpen:

—. XII., 3; Roſenpfl.: Potentīlla clusiāna Jacq.; ſ. Nr. 2706.

h. Auf Urgebirgsalpen:

—. III., 1; Baldrianpfl.: Valeriāna celtĭca L.; ſ. Nr. 1760.
—. V., 1; Schlüſſelblümler: Primŭla integrifolĭa L.; ſ. Nr. 2722.
—. V., 1; Glockenblümler: Campanŭla rhomboidālis L.; ſ. Nr. 2487.

—. V., 1; Glockenblümler: C. barbāta L.; ſ. Nr. 1762.
3044. V., 2; Enzianpfl.: Gentiāna excīsa Presl. Gezackt-blumiger Enzian. Bl. faſt ſitz. oder kurzgeſtielt; Kelchlapp. etwas locker anligend; Kr. bauchig, an den Saumrändern und Falten ringsum klein-gezähnelt, blau; 4; 8.
—. X., 1; Heidepfl.: Rhododēndron ferruginĕum L.; ſ. Nr. 1763.
—. X., 3; Nelkenblütler: Silēne alpēstris Jacq.; ſ. Nr. 2733.
—. XI., 5; Dickblattpfl.: Sempervīvum braunĭi Funk; ſ. Nr. 2724.
—. XI., 5; Dickblattpfl.: S. arachnoidĕum L.; ſ. Nr. 2737.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Cardamĭne resedifolĭa L.; ſ. Nr. 2513.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Oxytrŏpis cyanĕa M. B.; ſ. Nr. 2726.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum flexuōsum W. et K.; ſ. Nr. 2640.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hypochoeris uniflōra Vill.; ſ. Nr. 1766.
—. XIX., 1; Korbblütler: Cirsĭum pauciflōrum Spr.; ſ. Nr. 2727.

i. Auf den höchſten Urgebirgsalpen:

—. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus glaciālis Haenke; ſ. Nr. 2730.
—. X., 2; Steinbrechpfl.: Saxifrăga biflōra All.; ſ. Nr. 1759.
—. XI., 5; Dickblattpfl.: Sempervīvum montānum L.; ſ. Nr. 2524.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Ranuncŭlus crenātus W. et K.; ſ. Nr. 2731.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Draba wahlenbergĭi Hartm.; ſ. Nr. 2707.
—. XIX., 2; Korbblütler: Senecĭo incānus L.; ſ. Nr. 2732.
—. „ „ S. carniolĭcus Willd.; ſ. Nr. 2714.
—. „ „ Achillēa nana L.; ſ. Nr. 2709.
—. XXI., 3; Halbgras: Carex aterrĭma Hoppe; ſ. Nr. 3088.

k. Auf Felſen der höchſten Urgebirgsalpen:

—. V., 1; Borretſchpfl.: Eritrichĭum nanum Schrad.; ſ. Nr. 2733.
—. V., 2; Enzianpfl.: Gentiāna frigĭda Haenke; ſ. Nr. 2729.
3045. „ „ Pleurogўne carinthiăca Eschsch. (Gentiāna carinth. Froel., Sweertĭa carinth. Wulff.,

Lomatogonium carinthiacum A. Br.). Himmelblaue Nahtnarbe (Franſenkante). St. gabeläſtig, aufr., 4kant., dünn; Bltr. ſitz., mehrnervig, untere verk.-eif., die übrigen eif., ſtumpf oder ſpitzl., an der Baſis zſgewachſen; Kr. radf., 5ſpalt. bis 5theil., himmelblau, weißrandig; Schlund gebärtet; ☉; 8 bis 9; Sg., St., Kä.

—. XII., 3; Roſenpfl.: Potentilla nitida L.; ſ. Nr. 2734.

l. Auf Sand der höheren Urgebirgsalpen:

—. X., 3; Nelkenblütler: Arenaria biflora L.; ſ. Nr. 2735.

m. In Felſenritzen der höheren Ur- und Kalkgebirgsalpen:

—. XV., 1; Kreuzblütler: Draba tomentosa Whlbg.; ſ. Nr. 2736.

n. An Felſen der Urgebirgsalpen:

—. X., 5; Dickblattpfl.: Sedum annuum L.; ſ. Nr. 1356.

—. XI., 5; „ Sempervivum wulfenii Hoppe; ſ. Nr. 2739.

o. Auf Geröll der Urgebirgsalpen:

—. X., 2; Steinbrechpfl.: Saxifraga bryoides L.; ſ. Nr. 2532.

—. XV., 1; Kreuzblütler: Hutchinsia brevicaulis Hoppe; ſ. Nr. 2741.

p. Auf ſteinigen Boden der Urgebirgsalpen:

—. X., 2; Steinbrechpfl.: Saxifraga bryoides L.; ſ. Nr. 2532.

—. X., 3; Nelkenblütler: Arenaria ciliata L.; ſ. Nr. 2740.

q. Auf naſſen Stellen der Urgebirgsalpen:

—. XIV., 2; Rachenblümler: Pediculāris asplēnifolia Flörke; ſ. Nr. 2725.

r. Auf Glimmerſchieferalpen:

3046. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Ranunculus pygmaeus Whlbg. (R. tappeinēri Bamb.). Zwerg-Hahnenfuß. St. ligend, aufſteig., 1blüt.; grundſt. Bltr. langgeſtielt, 3- bis 5lapp., ſtengelſt. tief-2- bis 4lapp.; Blütenſt. dick, ſeicht-gefurcht, filz.; K. kahl oder wenig behart, abſteh.; Krbltr. vor den Kelchbltrn. abfall., gelb, klein; Fr. eif., gekielt, auf den Seiten ſchwach-warzig; 4; 8; †; ötzthaler Gebirgsſtock.*)

*) Dieſe Pflanze kannte man früher nur im hohen Norden, bis ſie in neuerer Zeit von dem Apotheker Bamberger aus Meran auf den höchſten ſchweizer Alpen entdeckt wurde!

s. An und in der Nähe der Gletscher:

—. IV., 1; Rosenpfl.: Alchemilla pentaphyllea L.; s. Nr. 2711.
—. X., 2; Steinbrechpfl.: Saxifraga biflora All.; s. Nr. 1759.
—. X., 3; Nelkenblütler: Stellaria cerastoides L.; s. Nr. 2681.
—. XII., 3; Rosenpfl.: Potentilla frigida Vill.; s. Nr. 2685.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Ranunculus glacialis L.; s. Nr. 2712.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: R. pygmaeus Whlbg.; s. Nr. 3046.
—. XIX., 1; Korbblütler: Crepis jubata Koch; s. Nr. 2713.
—. XIX., 2; „ Senecio carniolicus Willd.; s. Nr. 2714.
—. XIX., 2; Korbblütler: Artemisia glacialis L.; s. Nr. 2715.

t. Nächst der Schneegrenze:

—. XII., 3; Rosenpfl.: Potentilla frigida Vill.; s. Nr. 2685.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Ranunculus glacialis L.; s. Nr. 2712.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Draba wahlenbergii Hartm.; s. Nr. 2707.
—. XIX., 2; Korbblütler: Leontopodium alpinum Cass.; s. Nr. 2708.
—. XIX., 2; Korbblütler: Achillea nana L.; s. Nr. 2709.

u. Auf Kalkalpen:

—. V., 1; Schlüsselblümler: Androsace bryoides DC.; s. Nr. 2742.
—. V., 1; Glockenblümler: Campanula pulla L.; s. Nr. 1769.
—. V., 2; Doldenpfl.: Heracleum asperum M. B.; s. Nr. 2743.
—. V., 2; Doldenpfl.: Chaerophyllum elegans Gaud.; s. Nr. 2744.
—. X., 2; Steinbrechpfl.: Saxifraga squarrosa Sieb.; s. Nr. 2745.
—. X., 3; Nelkenblütler: Alsine laricifolia Whlbg.; s. Nr. 2617.
—. XIII., 1; Sonnenröslein: Helianthemum alpestre Rchb.; s. Nr. 1591.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Pedicularis incarnata Jacq.; s. Nr. 2746.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Hutchinsia alpina R. Br.; s. Nr. 842.
—. XV., 2; „ Arabis coerulea Wulff.; s. Nr. 2747.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracium speciosum Lk.; s. Nr. 2748.

—. XIX., 1; Korbblütler: Crepis alpēstris Tausch; ſ. Nr. 2433.
—. XIX., 1; Korbblütler: C. montāna Rchb.; ſ. Nr. 2749.
—. „ „ Cirsĭum spinosissĭmum Scop.; ſ. Nr. 2750.
3047. XIX., 2; Korbblütler: Senecĭo abrotanifolĭus L. Stabwurzblättriges Kreuzkraut. Kahl; St. ligend, dann aufſteig., oben einfach-doldentraub.; Bltr. ohne Oehrchen, ſitz., tief-fiederſpalt., Fiedern lineal., kurzzugeſp., bei den oberen ungetheilt, ungezähnt; Hüllblтchn. lanzettl., an der Spitze weiß-gewimp.; innere Hüllſchuppen braunſpitz.; Bl. gelb; 4; 8 bis 9.

v. Auf graſigen Jochen der höchſten Kalkalpen:

—. X., 2; Steinbrechpfl.: Saxifrăga stenopetăla Gaud.; ſ. Nr. 2752.
—. XIX., 1; Korbblütler: Crepis hyoseridifolĭa Tausch; ſ. Nr. 2754.

w. An ſteinigen, felſigen Abhängen der höchſten Kalkalpen:

—. XIX., 1; Korbblütler: C. jacquīni Tausch; ſ. Nr. 2753.

x. Auf Geröll der Kalkalpen:

—. X., 5; Nelkenblütler: Cerastĭum ovātum Hoppe; ſ. Nr. 2755.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Thlaspi rotundifolĭum Gaud.; ſ. Nr. 2756.

y. An felſigen Stellen der Kalkalpen:

—. III., 1; Baldrianpfl.: Valeriāna saxatĭlis L.; ſ. Nr. 1775.
—. X., 3; Nelkenblütler: Moehringĭa muscōsa L.; ſ. Nr. 1666.
—. XIX., 1; Korbblütler: Saussurĕa pygmaea Spr.; ſ. Nr. 2757.

z. Auf Kalkfelſen:

—. V., 1; Glockenblümler: Campanŭla zoysĭi Wulff.; ſ. Nr. 2751.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Thalĭctrum foetĭdum L.; ſ. Nr. 2430.
—. XIX., 1; Korbblütler: Crepis alpēstris Tausch; ſ. Nr. 2433.

a¹. In Alpengegenden:

—. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygŏnum vivipārum L.; ſ. Nr. 1837.

b¹. Auf und an Felsen der Alpen:

—. III., 1; Baldrianpfl.: Valeriāna montāna L.; s. Nr. 1153.
—. III., 2; Graspfl.: Agrōstis alpīna Scop.; s. Nr. 2759.
—. „ „ Calamagrōstis argentĕa DC.; s. Nr. 2760.
—. „ „ Avēna sempervĭrens Vill.; s. Nr. 2761.
—. „ „ Festūca pumĭla Vill.; s. Nr. 2762.
—. IV., 1; Krapppfl.: Galĭum boreāle L.; s. Nr. 2081.
—. V., 1; Glockenblümler: Campanŭla spicāta L.; s. Nr. 1795.
—. V., 2; Doldenpfl.: Bupleurum ranunculoīdes L.; s. Nr. 2763.
—. VI., 2; Knöterichpfl.: Oxyrĭa renifōrmis Hook; s. Nr. 1796.
—. X., 2; Steinbrechpfl.: Saxifrăga aïzōon Jacq.; s. Nr. 2534.
—. X., 3; Nelkenblütler: Silēne rupēstris L.; s. Nr. 2536.
—. „ „ S. acaulis L.; s. Nr. 1802.
—. X., 5; Dickblattpfl.: Sedum annŭum L.; s. Nr. 1356.
—. XI., 5; „ Sempervīvum hirtum L.; s. Nr. 2537.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Arăbis alpīna L.; s. Nr. 788.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum humĭle Host; s. Nr. 1798.
—. XIX., 1; Korbblütler: H. rupēstre All.; s. Nr. 1799.
—. „ „ H. pallēscens W. et K.; s. Nr. 2543.
—. „ „ H. glaucum All.; s. Nr. 2764.
—. „ „ Leontŏdon berinĭi Roth; s. Nr. 1800.

c¹. An nassen Felsen:

—. V., 1; Schlüsselblümler: Cortūsa matthiōli L.; s. Nr. 854.
—. X., 2; Steinbrechpfl.: Zahlbrucknēra paradōxa Rchb.; s. Nr. 2765.
—. X., 2; Steinbrechpfl.: Saxifrăga cernŭa L.; s. Nr. 2580.
—. X., 3; Nelkenblütler: Alsīne setacĕa M. et K.; s. Nr. 2453.

d¹. Zwischen Gestein:

—. XV., 2; Kreuzblütler: Arăbis alpīna L.; s. Nr. 788.

e¹. Auf Steingeröll:

—. X., 2; Steinbrechpfl.: Saxifrăga bryoīdes L.; s. Nr. 2532.
—. XIII., 1; Mohnpfl.: Papāver alpīnum L.; s. Nr. 1757.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Ranuncŭlus glaciālis L.; s. Nr. 2712.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Thlaspi rotundifolĭum Gaud.; s. Nr. 2756.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Arăbis coerulĕa Wulff.; s. Nr. 2747.
—. „ „ A. alpīna L.; s. Nr. 788.
—. „ „ Erysĭmum odorātum Ehrh.; s. Nr. 1542.

3048. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolium caespitōsum Reyn. Raſenbildender Klee. Kahl; St. raſenbildend, ſehr kurz; Bltr. verk.-eif., geſtutzt, gezähnelt; Nebenbltchn. eif., langzugeſp., pergamentartig; Aehren kug., blattachſelſt.; Blütenſt. viel kürzer, als der K., ſpäter nach allen Seiten gewendet; K. von halber Länge der weißen, dann rötl., endl. braunen Kr.; Röhre glock., 5nervig; Hülſe 2- bis 4ſamig; 4; 8 bis 9.

—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracium glaucum All.; ſ. Nr. 2764.

f¹. An Sennhütten und Kühruhen:

—. VI., 3; Knöterichpfl.: Rumex alpīnus L.; ſ. Nr. 1697.

g¹. Auf faulem Holze:

—. X., 4; Nelkenblütler: Sagīna bryoīdes Froel.; ſ. Nr. 1834.

h¹. An ſonnigen Orten:

—. V., 2; Doldenpfl.: Ligustĭcum seguiēri Koch; ſ. Nr. 2778.

i¹. An Quellen:

—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: Epilobĭum alpīnum L.; ſ. Nr. 2510.

—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: E. origanifolĭum Lam.; ſ. Nr. 2547.

k¹. An feuchten Orten:

—. V., 2; Enzianpfl.: Gentiāna utriculōsa L.; ſ. Nr. 941.

—. X., 2; Steinbrechpfl.: Saxifrăga aïzoïdes L.; ſ. Nr. 2767.

—. „ „ S. mutāta L.; ſ. Nr. 1804.

—. „ „ S. stellāris L.; ſ. Nr. 2772.

—. XIX., 2; Korbblütler: Achillēa atrāta L.; ſ. Nr. 2773.

l¹. An torfigen Stellen:

—. X., 2; Steinbrechpfl.: Saxifrăga hieracifolĭa W. et K.; ſ. Nr. 2774.

m¹. An ſumpfigen Orten:

—. XIX., 1; Korbblütler: Willemetĭa apargioïdes Less.; ſ. Nr. 1829.

n¹. Auf Torf- und Morboden:

—. III., 1; Halbgras: Eriophŏrum capitātum Host; ſ. Nr. 872.

—. V., 1; Schlüſſelblümler: Soldanēlla montāna Willd.; ſ. Nr. 496.

—. VI., 1; Semede: Juncus filiformis L.; ſ. Nr. 1790.
—. „ „ J. alpinus Vill.; ſ. Nr. 1831.
—. „ „ J. stygius L.; ſ. Nr. 2775.
—. VI., 3; Zeitloſenpfl.: Tofieldia calyculata Whlbg.; ſ. Nr. 1832
—. XIV., 2; Rachenblümler: Pediculāris sceptrum carolinum L.; ſ. Nr. 1056.

o¹. Auf Kies und Geröll der Alpengewäſſer:

—. III., 2; Graspfl.: Avena distichophylla Vill.; ſ. Nr. 2662.
—. „ „ Poa cenisia All.; ſ. Nr. 2503.
—. „ „ P. alpina L.; ſ. Nr. 1814.
—. „ „ Brachypodium poa R. et Sch.; ſ. Nr. 1836.
—. IV., 4; Najadenpfl.: Potamogēton praelongus Wulff.; ſ. Nr. 2769.
—. V., 1; Schlüſſelblümler: Cortūsa mathiōli L.; ſ. Nr. 854.
—. VI., 1; Semede: Juncus alpinus Vill.; ſ. Nr. 1831.
—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: Epilobium alpinum L.; ſ. Nr. 2510.
—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: E. origanifolium Lam.; ſ. Nr. 2547.
—. X., 2; Steinbrechpfl.: Zahlbrucknēra paradōxa Rchb.; ſ. Nr. 2765.
—. X., 2; Steinbrechpfl.: Saxifrăga aïzoïdes L.; ſ. Nr. 2767.
—. „ „ S. aïzōon Jacq.; ſ. Nr. 2534.
—. XII., 3; Roſenpfl.: Dryas octopetăla L.; ſ. Nr. 2541.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Bartschia alpina L.; ſ. Nr. 1622.
—. „ „ Linaria alpina Mill.; ſ. Nr. 2770.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracium graminifolium DC.; ſ. Nr. 2643.
—. XIX., 1; Korbblütler: Leontŏdon berinii Roth; ſ. Nr. 1800.
—. XIX., 2; Korbblütler: Erigĕron droebachēnsis Mill.; ſ. Nr. 2768.

p¹. An Alpenbächen unter Gebüſch:

—. V., 2; Doldenpfl.: Pleurospērmum austriăcum Hoffm.; ſ. Nr. 2557.

q¹. An Bächen der Alpenwieſen:

—. V., 2; Doldenpfl.: Heraclēum aspĕrum M. B.; ſ. Nr. 2743.

r¹. In Alpenthälern:

3049. V., 2; Enzianpfl.: Gentiāna amarella L. Schwachbitterer Enzian. St. einfach oder äſtig, wenig- oder vielblüt.; Blr. eilanzettl., unterſte verk.-eif., geſtielt, obere ſitz.; K. meiſt 5ſpalt., Zipf. lineal.-lanzettl., faſt gleich lang oder 2 wenig breiter als die anderen; Blkr. meiſt 5ſpalt., violet; ☉; 8 bis 10.

Varirt: G. uliginōsa Willd. (G. amarella Willd.; St. meiſt niedrig; Blkr. klein, blaß-violet, ſeltener gelblichweiß; Kzähne ſchmal; Sumpfform), G. pyramidālis Hoppe (ſehr äſtig, einen Blütenſtrauß vorſtellend; K. von Länge der Blkrröhre), G. axillāris Rchb. (Bl. blattachſelſt.), G. sylvēstris de Bray (ſehr reichblüt., von der Baſis aus gedrängt-vieläſtig).

s¹. In engen, ſchattigen Alpenthälern:

—. II., 1; Nachtkerzenpfl.: Circaea alpīna L.; ſ. Nr. 1062.

t¹. An Abhängen:

—. XXI., 3; Halbgras: Carex foetĭda All.; ſ. Nr. 2776.

u¹. An ſteinigen Abhängen:

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Astragălus leontīnus Wulf.; ſ. Nr. 2804.

—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum humĭle Host; ſ. Nr. 1798.

—. XIX., 1; Korbblütler: H. longifolĭum Schleich.; ſ. Nr. 2805.

v¹. Auf Aeckern der Alpen:

—. XIX., 1; Korbblütler: Cardŭus platylēpis Rchb. et Saut.; ſ. Nr. 2777.

w¹. Auf Grasplätzen:

—. III., 2; Graspfl.: Poa alpīna L.; ſ. Nr. 1814.

—. V., 1; Glockenblümler: Campanŭla alpīna Jacq.; ſ. Nr. 1815.

—. XII., 3; Roſenpfl.: Sieversĭa montāna Spr.; ſ. Nr. 2552.

—. XIV., 2; Rachenblümler: Pediculāris verticillāta L.; ſ. Nr. 2788.

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolĭum patens Schreb.; ſ. Nr. 1816.

—. XIX., 1: Korbblütler: Leontŏdon squamōsus Lmk.; ſ. Nr. 2553.

x¹. An grasigen, trocknen Orten:

—. V., 2; Enzianpfl.: Gentiāna campēstris L.; s. Nr. 3032.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Hieracĭum pyrenaĭcum L.; s. Nr. 2786.

y¹. Auf Gerölle und Grasplätzen:

—. III., 2; Graspfl.: Agrōstis rupēstris All.; s. Nr. 2787.
—. „ „ Avēna distichophȳlla Vill.; s. Nr. 2662.
—. „ „ Poa minor Gaud.; s. Nr. 2771.

z¹. Auf Alpentriften:

—. VI., 1; Lilienpfl.: Lloydĭa serotĭna Rchb.; s. Nr. 2731.
—. X., 5; Nelkenblütler: Spergēlla glabra Rchb.; s. Nr. 2782.
—. XII., 3; Rosenpfl.: Sieversĭa montāna Spr.; s. Nr. 2552.
—. „ „ Potentĭlla minĭma L.; s. Nr. 2783.
—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Oxytrŏpis lapponĭca Gaud.; s. Nr. 2785.

a². Auf höher gelegenen Weiden:

—. XIX., 2; Korbblütler: Leontopodĭum alpīnum Cass.; s. Nr. 2708.

b². Auf Weiden der Kalk- und Voralpen:

—. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus alpīnus L.; s. Nr. 2758.

c². Auf Alpenwiesen:

—. III., 2; Graspfl.: Agrōstis alpīna Scop.; s. Nr. 2759.
—. „ „ Phleum alpīnum L.; s. Nr. 1819.
—. „ „ Festūca varĭa Haenke; s. Nr. 2789.
—. „ „ Koelerĭa hirsūta Gaud.; s. Nr. 1738.
—. IV., 1; Krapppfl.: Galĭum helvetĭcum Weig.; s. Nr. 2790.
—. V., 2; Doldenpfl.: Meum athamantĭcum Jacq.; s. Nr. 2554.
—. „ „ Heraclēum austriăcum L.; s. Nr. 2791.
—. V., 5; Bleiwurzpfl.: Armerĭa alpīna Hoppe; s. Nr. 2792.
—. VI., 1; Semede: Juncus triglūmis L.; s. Nr. 1791.
—. „ „ Luzŭla lutĕa Desv.; s. Nr. 2793.
—. „ Lilienpfl.: Antherĭcum liliāstrum L.; s. Nr. 1821.
—. VI., 3; Zeitlosenpfl.: Verātrum album L.; s. Nr. 1822.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum prenanthoīdes Vill.; s. Nr. 2551.
—. XIX., 1; Korbblütler: Crepis montāna Rchb.; s. Nr. 2749.
—. „ „ Cirsĭum erisithāles Scop.; s. Nr. 2795.
—. XIX., 1; Korbblütler: C. spinosissĭmo-erisithāles Facch.; s. Nr. 2796.

—. XIX., 3; Korbblütler: Centaurēa phrygĭa L.; ſ. Nr. 2163.
—. „ „ C. vochinēnsis Bernh.; ſ. Nr. 2797.
—. XX., 1; Orchidee: Nigritēlla angustifolĭa Rich.; ſ. Nr. 1826.
—. XX., 1; Orchidee: N. fragrans Saut.; ſ. Nr. 2798.

d². Auf ſumpfigen Alpenwieſen:

—. V., 2; Enzianpfl.: Sweertĭa perēnnis L.; ſ. Nr. 2560.

e². Auf ſteinigen Alpenwieſen:

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolĭum caespitōsum Reyn.; ſ. Nr. 3048.

f². Auf den höchſten Alpenwieſen:

—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Thalĭctrum alpīnum L.; ſ. Nr. 2799.

g². Auf feuchten Alpenwieſen:

—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: Aconĭtum stoerkeānum Rchb.; ſ. Nr. 1168.
—. XIX., 1; Korbblütler: Crepis succisaefolĭa Tausch; ſ. Nr. 2558.
—. XIX., 1; Korbblütler: Cirsĭum pauciflōrum Spr.; ſ. Nr. 2727.
—. XIX., 1; Korbblütler: C. palūstri-rivulāriș Schiede; ſ. Nr. 1827.

h². In der Waldregion:

—. X., 2; Steinbrechpfl.: Saxifrăga retūsa Gouan.; ſ. Nr. 2801.
—. XIX, 2; Korbblütler: Senecĭo cacaliāster Lmk.; ſ. Nr. 2802.

i². In Alpenhainen:

—. XIX., 3; Korbblütler: Centaurēa phrygĭa L.; ſ. Nr. 2163.

k². In feuchten Nadelholzwäldern der Alpen:

—. XIX., 2; Korbblütler: Achillēa macrophȳlla L.; ſ. Nr. 2803.

l². In hohen Alpenwäldern:

—. V., 1; Schlüſſelblümler: Soldanēlla montāna Willd.; ſ. Nr. 496.
—. VI., 3; Zeitloſenpfl.: Verātrum nigrum L.; ſ. Nr. 2152.

m². Auf Voralpen:

—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: Epilobium trigonum Schrk. ſ. Nr. 1647.
—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: Aconitum lycoctonum L.; ſ. Nr. 2153.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracium speciosum Lk.; ſ. Nr. 2748.
—. XIX., 1; Korbblütler: Crepis blattarioides Vill.; ſ. Nr. 1787.
—. XIX., 2; Korbblütler: Senecio arachnoideus Sieb.; ſ. Nr. 2807.
—. XIX., 2; Korbblütler: Buphthalmum salicifolium DC.; ſ. Nr. 3031.

n². Auf Humus der Voralpen:

—. XIX., 2; Korbblütler: Doronicum austriacum Jacq.; ſ. Nr. 1529.

o². Auf Felſen der Voralpen:

—. XIV., 1; Lippenblümler: Melissa grandiflora L.; ſ. Nr. 2808.

p². Auf Flußkies der Voralpen:

—. X., 2; Nelkenblütler: Gypsophila repens L.; ſ. Nr. 2482.

q². An Bächen der Voralpengegenden:

—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Ranunculus aconitifolius L.; ſ. Nr. 1709.

r². In Wäldern der Voralpen:

—. XIV., 1; Lippenblümler: Melissa grandiflora L.; ſ. Nr. 2808.

s². Auf Voralpenwieſen:

—. V., 2; Doldenpfl.: Chaerophyllum hirsutum L.; ſ. Nr. 2130.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Ranunculus aconitifolius L.; ſ. Nr. 1709.
—. XIX., 1; Korbblütler: Cirsium oleraceo-rivulare Schiede; ſ. Nr. 2809.

t². Auf Waldwieſen der Voralpen:

—. V., 2; Doldenpfl.: Laserpitium archangelica Wulff.; ſ. Nr. 2811.

u². Auf Sumpfwiesen der Voralpen:

—. III., 2; Graspfl.: Calamagrōstis montāna Host; ſ. Nr. 1102.

—. VI., 1; Semede: Juncus filiformis L.; ſ. Nr. 1790.

v². Auf Grashügeln der Alpen:

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Phaca oroboïdes DC.; ſ. Nr. 2780.

C¹. Auf Heiden: §. 550.

—. IV., 1; Krapppfl.: Galĭum sylvēstre Poll.; ſ. Nr. 1005.

3050. VIII., 1; Heidepfl.: Tetrălix cinerĕa L. (Erīca cinerĕa L.). Graue Dopheide (Glockenheide). Bltr. 3ſtänd., lineal., ſcharfrand., unterſ. gewölbt, kahl; Bl. quirlig-traubig, bläulichrot; ♄; 8 bis 9; Bonn (Dottendorf), Maſtricht (Waſſenberg), Lüttich, Spaa.

—. XII., 3; Roſenpfl.: Tormentilla erēcta L.; ſ. Nr. 1082.

—. XIII., 1; Sonnenröslein: Helianthĕmum vulgāre Gaertn.; ſ. Nr. 1120.

—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum bohemĭcum L.; ſ. Nr. 1028.

—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperĭcum humifūsum L.; ſ. Nr. 2134.

—. XVIII., 2; Hartheupfl.: H. pulchrum L.; ſ. Nr. 1089.

—. XIX., 2; Korbblütler: Filāgo arvēnsis L.; ſ. Nr. 2344.

3051. „ „ Gnaphalĭum sylvatĭcum L. (G. rectum Sm., G. strictum Kabath). Wald-Ruhrkraut. St. ſteif-aufr., einfach, rutenf., ährig; untere Bltr. lanzettl., mittl. allmälig kleiner, unterſ. weißfilz., oberſ. zuletzt kahl; Bl. gelblichweiß, Randbl. ♀, Scheibenbl. ☿; 4; 8 bis 9.
Varirt: G. umbrōsum (Bltr. faſt alle lineal., Hüllbltchn. ungefleckt; ſchlanke Form ſchattiger Wälder), G. fuscātum (untere Bltr. lanzettl., Hüllſchuppen braungefleckt; gedrungene Form der Heiden und Bergabhänge), G. virgātum Kitt. hb. (St. einfach).

a. Auf Torfheiden:

—. VIII., 1; Heidepfl.: Tetrălix septentrionālis E. Mey.; ſ. Nr. 2561.

b. Auf ſandigen, feuchten Heiden:

—. V., 1; Paronychienpfl.: Illecēbrum verticillātum L.; ſ. Nr. 1483.

§. 551. **D¹. An trocknen Stellen:**

a. An sonnigen Stellen:

—. V., 1; Nachtschattenpfl.: *Solānum melanocerāsum Willd.; s. Nr. 3317.
—. V., 1; Nachtschattenpfl.: *S. miniātum Bernh.; s. Nr. 2268.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Thymus serpyllum L.; s. Nr. 2088.

b. An sonnigen, trocknen Stellen:

—. IV., 1; Krapppfl.: Galium mollūgo L.; s. Nr. 1006.
—. V., 1; Paronychienpfl.: Paronychia capitāta Lmk.; s. Nr. 2812.
—. V., 1; Paronychienpfl.: Herniaria glabra L.; s. Nr. 1476.
—. V., 2; Doldenpfl.: Peucedānum oreoselīnum Mnch.; s. Nr. 2463.
—. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus carthusianōrum L.; s. Nr. 459.
—. X., 2; Nelkenblütler: D. deltoīdes L.; s. Nr. 1111.
—. " " D. prolifer L.; s. Nr. 2275.
—. X., 3; " Melandrium pratēnse Roehl.; s. Nr. 1113.
—. X., 5; Dickblattpfl.: Sedum acre L.; s. Nr. 1298.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Erucāstrum obtusangūlum Rchb.; s. Nr. 1362.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracium praeāltum W. et Gr.; s. Nr. 1846.
—. XIX., 1; Korbblütler: H. virēscens Sond.; s. Nr. 3000.
—. " " Crepis tectōrum L.; s. Nr. 1366.
—. " " Lappa minor DC.; s. Nr. 2199.
—. " " L. major Gaertn.; s. Nr. 2200.
—. " " L. tomentōsa Lmk.; s. Nr. 2201.
—. " " Cardūus nutans L.; s. Nr. 2289.
—. XIX., 2; " Ceranthēmum inapērtum Willd.; s. Nr. 2813.
—. XIX., 2; Korbblütler: *Artemisia absinthium L.; s. Nr. 2314.
—. XIX., 2; Korbblütler: A. pontica L.; s. Nr. 2814.
—. XIX., 3; " *Centaurēa diffūsa Lmk.; s. Nr. 1850.

§. 552. **E¹. Auf Grasplätzen und Triften:**

—. III., 2; Graspfl.: Phleum pratēnse L.; s. Nr. 1248.
—. " " Lolium boucheānum Kth.; s. Nr. 2818.

—. IV., 1; Wegerichpfl.: Plantāgo medĭa L.; f. Nr 1282.
—. „ „ Pl. lanceolāta L.; f. Nr. 1252.
—. „ Kardenpfl.: Scabiōsa arvēnsis L.; f. Nr. 1283.
—. V., 2; Doldenpfl.: Pimpinēlla saxifrăga L.; f. Nr. 2176.
—. „ „ Sesēli colorātum Ehrh.; f. Nr. 2495.
—. „ „ Pastināca opāca Bernh.; f. Nr. 2445.
—. V., 5; Leinpfl.: Linum cathartĭcum L.; f. Nr. 1854.
—. VI., 3; Knöterichpfl.: Rumex pratēnsis M. et K.; f. Nr. 1208.
—. VI., 3; Knöterichpfl.: R. acetosēlla L.; f. Nr. 1296.
—. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus carthusianōrum L.; f. Nr. 459.
—. X., 2; Nelkenblütler: Gypsophĭla murālis L.; f. Nr. 2234.
—. X., 3; „ Spergularĭa rubra Presl.; f. Nr. 576.
—. XI., 2; Rosenpfl.: Agrimonĭa eupatorĭa L.; f. Nr. 1114.
—. „ „ A. procēra Wallr.; f. Nr. 1115.
—. XII., 3; „ Potentĭlla anserīna L.; f. Nr. 578.
—. „ „ P. mixta Nolte; f. Nr. 2276.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Thymus serpyllum L.; f. Nr. 2088.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Prunēlla vulgāris L.; f. Nr. 2277.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Senebiēra coronŏpus Poir.; f. Nr. 2258.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum pratēne L.; f. Nr. 1244.
—. „ „ G. molle L.; f. Nr. 539.
—. „ „ Erodĭum cicutarĭum l'Her.; f. Nr. 217.
—. XVI., 5; Pappelrosenpfl.: Malva sylvēstris L.; f. Nr. 1225.
—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Onōnis spinōsa L.; f. Nr. 1321.
—. „ „ O. hircīna Jacq.; f. Nr. 1322.
—. „ „ Medicāgo falcāta L.; f. Nr. 1324.
—. „ „ M. lupulīna L.; f. Nr. 468.
—. „ „ Trifolĭum pratēnse L.; f. Nr. 1032.
—. „ „ T. repens L.; f. Nr. 597.
—. „ „ T. filiformē L.; f. Nr. 599.
—. „ „ T. procūmbens L.; f. Nr. 1329.
—. „ „ Lotus corniculātus L.; f. Nr. 1239.
—. „ „ Astragălus sulcātus L.; f. Nr. 1857.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum stoloniflōrum W. et K.; f. Nr. 1569.
—. XIX., 1; Korbblütler: H. umbellātum L.; f. Nr. 2095.
—. „ „ Taraxăcum officināle Mnch.; f. Nr. 59.

—. XIX., 1; Korbblütler: Leontŏdon vulgāris Kitt.; ſ. Nr. 1079.
—. XIX., 2; Korbblütler: Senecĭo jacobaea L.; ſ. Nr. 2075.
—. „ „ Achillēa millefolĭum L.; ſ. Nr. 2101.
—. „ „ Bellis perēnnis L.; ſ. Nr. 2.

a. Auf trocknen Grasplätzen und Triften:

—. III., 2; Graspfl.: Agrōstis canīna L.; ſ. Nr. 2816.
—. „ „ Bromus erēctus Huds.; ſ. Nr. 1276.
—. „ „ Poa annŭa L.; ſ. Nr. 14.
—. IV., 1; Kardenpfl.: Scabiōsa columbarĭa L.; ſ. Nr. 2080.
—. V., 1; Glockenblümler: Campanŭla bononiēnsis L.; ſ. Nr. 2224.
—. V., 2; Doldenpfl.: Eryngĭum campēstre L.; ſ. Nr. 2271.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Onōnis repens L.; ſ. Nr. 1320.
—. „ „ Trifolĭum angustifolĭum L.; ſ. Nr. 1855.
—. XIX., 1; Korbblütler: Cirsĭum acaule All.; ſ. Nr. 2097.

b. An graſigen Orten:

—. XII., 3; Roſenpfl.: Potentīlla hirta L.; ſ. Nr. 2824.

c. Auf wenig-begraſten Plätzen:

—. X., 4; Nelkenblütler: Sagīna apetăla L.; ſ. Nr. 604.

d. Auf ſonnigen Grasplätzen:

—. XII., 1; Sonnenröslein: Helianthĕmum vulgāre Gaertn.; ſ. Nr. 1120.

e. Auf ſchattigen Grasplätzen:

—. V., 2; Doldenpfl.: Peucedănum officinăle L.; ſ. Nr. 2438.
—. XII., 3; Roſenpfl.: Tormentīlla reptans L.; ſ. Nr. 1068.

f. Auf Grasplätzen der ſubalpinen Striche:

—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum floribūndum W. et Gr.; ſ. Nr. 896.

g. Auf feuchten Grasplätzen und Triften:

—. V., 1; Enzianpfl.: Erythraea pulchēlla Fr.; ſ. Nr. 1856.
—. V., 2; „ Gentiāna amarēlla L.; ſ. Nr. 3049.
—. VI., 1; Weiderichpfl.: Peplis portŭla L.; ſ. Nr. 2819.
—. X., 4; Nelkenblütler: Sagīna procūmbens L.; ſ. Nr. 635.
—. XII., 3; Roſenpfl.: Potentīlla reptans L.; ſ. Nr. 1301.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Mentha pulegĭum L.; ſ. Nr. 2820.

—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperīcum humifūsum L.; f. Nr. 2134.
—. XIX., 2; Korbblütler: Pulicarĭa dysenterĭca Gaertn.; f. Nr. 2821.

h. Auf salzhaltigen Triften:

—. X., 3; Nelkenblütler: Spergularĭa salīna Presl.; f. Nr. 2822.
—. XIX., 2; Korbblütler: Artemisĭa rupēstris L.; f. Nr. 2823.

i. Auf feuchten Sandtriften:

—. IV., 4; Leinpfl.: Radiŏla millegrāna Sm.; f. Nr. 2413.
—. V., 1; Paronychienpfl.: Illecēbrum verticillātum L.; f. Nr. 1483.
—. V., 2; Enzianpfl.: Cicendĭa filiformis Rchb.; f. Nr. 2412.
—. XI., 1; Weiderichpfl.: Lythrum hyssopifolĭa L.; f. Nr. 2394.

k. Auf feuchten, torfigen Triften:

—. VIII., 1; Enzianpfl.: Chlora perfoliāta L.; f. Nr. 894.

l. Auf hochgelegenen Triften:

—. V., 2; Enzianpfl.: Gentiāna campēstris L.; f. Nr. 3032.

m. Auf Gebirgstriften:

—. XII., 3; Rosenpfl.: Sieversĭa montāna Spr.; f. Nr. 2552.
—. XIX., 1; Korbblütler: Leontŏdon squamōsus Lmk.; f. Nr. 2553.

n. Auf Waldtriften:

—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperīcum quadrangŭlum Fr.; f. Nr. 2069.

o. In Auen:

—. V., 2; Doldenpfl.: Trinĭa kitaibelĭi M. B.; f. Nr. 2054.

F[1]. Auf Aengern: §. 553.

—. XII., 3; Rosenpfl.: Potentĭlla anserīna L.; f. Nr. 578.
—. XIX., 2; Korbblütler: Senecĭo barbareaefolĭus Krock.; f. Nr. 2203.
—. XIX., 2; Korbblütler: Achillēa millefolĭum L.; f. Nr. 2101.
—. „ „ Bellis perēnnis L.; f. Nr. 2.

G[1]. Auf Weiden: §. 554.

—. III., 2; Grasp fl.: Agrōstis stolonifĕra L.; f. Nr. 2154.

—. III., 2; Graspfl.: Arrhenathērum avenacĕum P. B.; ſ. Nr. 1382.
—. III., 2; Graspfl.: Poa triviālis L.; ſ. Nr. 1860.
—. „ „ P. annŭa L.; ſ. Nr. 14.
—. „ „ Lolĭum perēnne L.; ſ. Nr. 1281.
—. „ „ L. boucheānum Kth.; ſ. Nr. 2818.
—. IV., 1; Wegerichpfl.: Plantāgo lanceolāta L.; ſ. Nr. 1252.
—. V., 1; Rachenblümler: Verbāscum adulterīnum Koch; ſ. Nr. 2825.
—. V., 1; Enzianpfl.: Erythraea centaurĭum Rich.; ſ. Nr. 1009.
—. V., 5; Leinpfl.: Linum cathartĭcum L.; ſ. Nr. 1854.
—. VI., 3; Knöterichpfl.: Rumex acetōsa L.; ſ. Nr. 1074.
—. X., 3; Nelkenblütler: Silēne inflāta Sm.; ſ. Nr. 1178.
—. X., 5; „ Cerastĭum viscōsum L.; ſ. Nr. 684.
—. XII., 3; Roſenpfl.: Potentīlla anserīna L.; ſ. Nr. 578.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Prunēlla vulgāris L.; ſ. Nr. 2277.
—. „ „ P. grandiflōra Jacq.; ſ. Nr. 2439.
—. „ „ Betonĭca officinālis L.; ſ. Nr. 1027.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Onōnis spinōsa L.; ſ. Nr. 1321.
—. „ „ *Medicāgo satīva L.; ſ. Nr. 1323.
—. „ „ M. lupulīna L.; ſ. Nr. 468.
—. „ „ Trifolĭum pratēnse L.; ſ. Nr. 1032.
—. „ „ T. repens L.; ſ. Nr. 597.
—. „ „ T. hybrĭdum L.; ſ. Nr. 469.
—. „ „ T. filiformĕ L.; ſ. Nr. 599.
—. „ „ T. procūmbens L.; ſ. Nr. 1329.
—. „ „ Lotus corniculātus L.; ſ. Nr. 1239.
—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperĭcum perforātum L.; ſ. Nr. 2068.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum auricŭla L.; ſ. Nr. 1334.
—. „ „ Crepis virens L.; ſ. Nr. 2221.
—. „ „ Lactūca salīgna L.; ſ. Nr. 2283.
—. „ „ Taraxăcum officināle Mnch.; ſ. Nr. 59.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hypochoeris glabra L.; ſ. Nr. 1416.
—. „ „ Oporinĭa autumnālis Don; ſ. Nr. 2826.
—. XIX., 1; Korbblütler: Leontŏdon vulgāris Kitt.; ſ. Nr. 1079.
—. XIX., 1; Korbblütler: Cirsĭum acaule All.; ſ. Nr. 2097.
—. XIX., 2; „ Senecĭo viscōsus L.; ſ. Nr. 1341.
—. „ „ S. jacobaea L.; ſ. Nr. 2075.
—. „ „ S. erucaefolĭus Huds.; ſ. Nr. 2100.

—. XIX., 2; Korbblütler: Filāgo montana L.; ſ. Nr. 2401.
—. „ „ Gnaphalĭum lutĕo-album L.; ſ. Nr. 2411.
—. XIX., 2; Korbblütler: Leucanthĕmum vulgāre Lmk.; ſ. Nr. 1130.
—. XIX., 2; Korbblütler: Achillēa millefolĭum L.; ſ. Nr. 2101.
—. XIX., 2; Korbblütler: Inŭla hirta L.; ſ. Nr. 2295.
—. „ „ Bellis perēnnis L.; ſ. Nr. 2.

a. Auf feuchten Weiden:

—. II., 1; Rachenblümler: Gratĭola officinālis L.; ſ. Nr. 2817.
—. III., 2; Graspfl.: Agrōstis canīna L.; ſ. Nr. 2816.
—. „ „ Festūca pratēnsis Huds.; ſ. Nr. 1852.
—. „ „ Briza medĭa L.; ſ. Nr. 1859.
—. „ „ Poa annŭa L.; ſ. Nr. 14.
—. „ „ Lolĭum perēnne L.; ſ. Nr. 1281.
3052. IV., 1; Kardenpfl.: Scabiōsa succīsa L. (Succīsa pratēnsis Mnch., Succ. praemōrsa Aschrsn., Astĕrocephălus succ. Wallr.). Teufels-Abbiß (Sumpfſkabioſe, Teufelsbiß, Sternkopf, Wieſenabbiß). Wrzſtock abgebiſſen; St. ſteifharig; Innenkelch 5borſtig; Bl. himmelblau, violet oder weißl.; Köpfchen halbkugelf.; beſonderes Hüllchen rauhharig, die 4 Lappen eif., ſpitz.; 4; 8 bis 9; ×; ♃.
—. V., 2; Enzianpfl.: Gentiāna amarēlla L.; ſ. Nr. 3049.
—. VI., 1; Semede: Juncus commūnis E. Mey.; ſ. Nr. 1512.
—. „ „ J. atrātus Krock.; ſ. Nr. 2136.
—. „ „ J. capitātus Weig.; ſ. Nr. 1510.
—. „ „ J. comprēssus Jacq.; ſ. Nr. 1863.
—. VI., 3; Knöterichpfl.: Rumex sanguinĕus L.; ſ. Nr. 1014.
—. X., 4; Nelkenblütler: Sagīna procūmbens L.; ſ. Nr. 635.
—. XV., 2; Kreuzblümler: Nasturtĭum sylvēstre R. Br.; ſ. Nr. 1487.
—. XIX., 1; Korbblütler: Cirsĭum palūstre Scop.; ſ. Nr. 1059.

b. Auf ſalzhaltigen Weiden:

—. XIX., 2; Korbblütler: Artemisĭa rupēstris L.; ſ. Nr. 2823.

c. Auf feuchten, ſalzhaltigen Weiden:

—. XIX., 2; Korbblütler: Senecĭo aquatĭcus Huds.; ſ. Nr. 2827.

d. Auf torfigen Weiden:

—. VI., 1; Semede: Juncus filiformis L.; ſ. Nr. 1790.

e. Auf fetten Weiden:

—. XIV., 1; Lippenblümler: Mentha sylvestris L.; ſ. Nr. 2218.

f. Auf magern Weiden:

—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranium rotundifolium L.; ſ. Nr. 560.

—. XIX., 1; Korbblütler: Hypochoeris radicāta L.; ſ. Nr. 1126.

g. Auf trocknen Weiden:

—. IV., 1; Kardenpfl.: Scabiōsa columbaria L.; ſ. Nr. 2080.

§. 555. **H[1]. Auf Wieſen:**

—. IV., 1; Wegerichpfl.: Plantāgo media L.; ſ. Nr. 1282.
—. „ Kardenpfl.: Scabiōsa arvēnsis L.; ſ. Nr. 1283.
—. „ Krapppfl.: Galium boreāle L.; ſ. Nr. 2081.
—. V., 1; Glockenblümler: Campanula rotundifolia L.; ſ. Nr. 1288.
—. V., 1; Enzianpfl.: Erythraea centaurium Rich.; ſ. Nr. 1009.
—. V., 2; Enzianpfl.: Gentiāna obtusifolia Willd.; ſ. Nr. 2502.
—. V., 2; Doldenpfl.: Astrantia major L.; ſ. Nr. 1157.
—. „ „ Pimpinella magna L.; ſ. Nr. 2157.
—. „ „ Peucedānum vettēri Vis.; ſ. Nr. 2828.
—. „ „ P. schottii Bess.; ſ. Nr. 2829.
—. „ „ P. chabraei Rchb.; ſ. Nr. 2830.
—. „ „ Pastināca sativa L.; ſ. Nr. 2058.
—. „ „ Heraclēum sphondylium L.; ſ. Nr. 1867.
—. V., 5; Leinpfl.: Linum cathartīcum L.; ſ. Nr. 1854.
—. VI., 3; Knöterichpfl.: Rumex pratēnsis M. et K.; ſ. Nr. 1208.
—. VI., 3; Knöterichpfl.: R. obtusifolius L.; ſ. Nr. 2104.
—. „ „ R. patientia L.; ſ. Nr. 2273.
—. „ „ R. acetōsa L.; ſ. Nr. 1074.
—. X., 5; Schnabelpfl.: *Oxālis stricta Jacq.; ſ. Nr. 1260.
—. „ Nelkenblütler: Cerastium vulgātum L. spec.; ſ. Nr. 463.
—. XII., 3; Roſenpfl.: Tormentilla erecta L.; ſ. Nr. 1082.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Prunella vulgāris L.; ſ. Nr. 2277.

—. XIV., 1; Lippenblümler: Pr. grandiflōra Jacq.; ſ. Nr. 2439.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Betonĭca officinālis L.; ſ. Nr. 1027.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Alectorolŏphus major Rchb.; ſ. Nr. 1485.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Nasturtĭum pyrenaĭcum R. Br.; ſ. Nr. 905.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum pratēnse L.; ſ. Nr. 1244.
—. XVI., 5; Pappelroſenpfl.: Althaea pallĭda W. et K.; ſ. Nr. 1374.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Onōnis hircīna Jacq.; ſ. Nr. 1322.
—. „ „ *Medicāgo satīva L.; ſ. Nr. 1323.
—. „ „ M. lupulīna L.; ſ. Nr. 468.
—. „ „ Melilōtus officinālis L.; ſ. Nr. 1326.
—. „ „ Trifolĭum pratēnse L.; ſ. Nr. 1032.
—. „ „ T. repens L.; ſ. Nr. 597.
—. „ „ T. filifōrme L.; ſ. Nr. 599.
—. „ „ T. procūmbens L.; ſ. Nr. 1329.
—. „ „ Lotus corniculātus L.; ſ. Nr. 1239.
—. „ „ Vicĭa cracca L.; ſ. Nr. 1228.
—. „ „ Lathўrus pratēnsis L.; ſ. Nr. 1240.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum pilosēlla L.; ſ. Nr. 1181.
—. „ „ H. stoloniflōrum W. et K.; ſ. Nr. 1569.
—. „ „ H. auricŭla L.; ſ. Nr. 1334.
—. „ „ Crepis setōsa Hall. fil.; ſ. Nr. 2282.
—. „ „ C. virens L.; ſ. Nr. 1415.
—. „ „ Taraxăcum officināle Mnch.; ſ. Nr. 59.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hypochoeris glabra L.; ſ. Nr. 1416.
—. „ „ Picris hieracioīdes L.; ſ. Nr. 2241.
—. „ „ Oporinĭa autumnālis Don; ſ. Nr. 2826.
—. XIX., 1; Korbblütler: Leontŏdon vulgāris Kitt.; ſ. Nr. 1079.
—. XIX., 1; Korbblütler: Cichorĭum intўbus L.; ſ. Nr. 1328.
—. XIX., 2; „ Leucanthĕmum vulgāre Lmk.; ſ. Nr. 1130.
—. XIX., 2; Korbblütler: Achillēa millefolĭum L.; ſ. Nr. 2101.
—. XIX., 2; Korbblütler: Bellis perēnnis L.; ſ. Nr. 2.
—. XIX., 3; „ Centaurēa scabiōsa L.; ſ. Nr. 1131.
—. „ „ C. jacēa L.; ſ. Nr. 1343.

a. Auf feuchten, naſſen Wieſen:

—. II., 1; Rachenblümler: Veronīca longifolĭa L.; ſ. Nr. 2212.
—. II., 1; Rachenblümler: V. serpyllifolĭa L.; ſ. Nr. 424.
—. „ „ V. scutellāta L.; ſ. Nr. 1875.
—. III., 1; Halbgras: Cypērus flavēscens L.; ſ. Nr. 1143.
—. „ „ C. fuscus L.; ſ. Nr. 2831.
—. „ „ Scirpus palūstris L.; ſ. Nr. 1876.
—. „ „ Sc. setacĕus L.; ſ. Nr. 2832.
—. „ „ Sc. holoschoenus L.; ſ. Nr. 2833.
—. „ „ Sc. radĭcans Schkhr.; ſ. Nr. 2834.
—. „ Baldrianpfl.: Valeriāna officinālis L.; ſ. Nr. 998.
—. III., 2; Graspfl.: Leersĭa oryzoĭdes Sw.; ſ. 2999.
—. „ „ Agrōstis stolonifĕra L.; ſ. Nr. 2154.
—. „ „ Calamagrōstis lanceolāta Roth; ſ. Nr. 2835.
—. III., 2; Graspfl.: Alopecūrus geniculātus L.; ſ. Nr. 1880.
—. „ „ Crypsis alopecuroĭdes Schrad.; ſ. Nr. 1881.
—. III., 2; Graspfl.: Catabrōsa aquatĭca P. B.; ſ. Nr. 1882.
—. „ „ Arrhenathērum avenacĕum P. B.; ſ. Nr. 1382.
—. III., 2; Graspfl.: Festūca pratēnsis Huds.; ſ. Nr. 1852.
—. „ „ Poa triviālis L.; ſ. Nr. 1860.
—. „ „ Glycerĭa distans Whlbg.; ſ. Nr. 1886.
—. „ „ Brachypodĭum loliacĕum R. et Sch.; ſ. Nr. 1887.
—. III., 2; Graspfl.: Lolĭum perēnne L.; ſ. Nr. 1281.
—. „ „ L. boucheānum Kth.; ſ. Nr. 2818.
—. IV., 1; Wegerichpfl.: Plantāgo lanceolāta L.; ſ. Nr. 1252.
—. „ Kardenpfl.: Scabiōsa succīsa L.; ſ. Nr. 3052.
—. „ „ Sc. austrālis Wulff.; ſ. Nr. 2836.
—. „ Krapppfl.: Galĭum uliginōsum L.; ſ. Nr. 1889.
—. „ Roſenpfl.: Sanguisōrba officinālis L.; ſ. Nr. 1658.
—. V., 1; Borretſchpfl.: Myosōtis palūstris With.; ſ. Nr. 1891.
—. „ Enzianpfl.: Erythraea pulchēlla Fr.; ſ. Nr. 1856.
—. „ Glockenblümler: Wahlenbergĭa hederacĕa Rchb.; ſ. Nr. 2113.

3053. V., 2; Enzianpfl.: Gentiāna pneumonānthe L. Gemeiner Enzian (Lungenblume, Wieſen- oder Lungen-E., St. Peters- oder Schelmenkraut). St. undeutl.-4kant.; Bltr. 1- bis 3nervig, ſtumpfl., am Rande zurückgerollt, lanzett-lineal., unterſte ſchuppenf.; K. halb-5ſpalt., Lappen

lineal.; Bl. gegen- oder wechſelſt., dunkelblau, mit 5 grünl. Streifen, innen gelb-punkt.; 4; 8 bis 9.

—. V., 2; Enzianpfl.: G. amarella L.; ſ. Nr. 3049.
—. „ „ G. germanica Willd.; ſ. Nr. 2456.
—. „ Doldenpfl.: Cicuta virosa L.; ſ. Nr. 1892.
—. „ „ Helosciadium repens Koch; ſ. Nr. 2837.
—. „ „ Sium latifolium L.; ſ. Nr. 2838.
—. „ „ S. angustifolium L.; ſ. Nr. 2839.
—. „ „ Oenanthe fistulosa L.; ſ. Nr. 1893.
—. „ „ Oe. peucedanifolia Poll.; ſ. Nr. 1895.
—. „ „ Cnidium venosum Koch; ſ. Nr. 2135.

3054. „ „ Osterīcum palustre Bess. (O. pratense Hoffm., Angelica pratensis M. B., Imperatoria palustris Bess.). Sumpf-Mutterwurz (Mutterwurzel, Sumpfmeiſterwurz, Wieſenangelika). St. gefurcht, wenigblättr.; Blr. 2- bis 3fach-gefied.; Hülle fehlend oder ein-, Hüllchen vielblättr.; Bl. weiß; Fr. metalliſch-glänzend; 4 (♂); 8.

—. V., 2; Doldenpfl.: Angelica sylvestris L.; ſ. Nr. 2115.
—. „ „ Archangelica officinalis Hoffm.; ſ. Nr. 1646.
—. V., 2; Doldenpfl.: Peucedanum palustre Mnch.; ſ. Nr. 2160.
—. V., 2; Doldenpfl.: P. officinale L.; ſ. Nr. 2438.
—. VI., 1; Semede: Juncus communis E. Mey.; ſ. Nr. 1512.
—. „ „ J. filiformis L.; ſ. Nr. 1790.
—. „ „ J. obtusiflorus Ehrh.; ſ. Nr. 1527.
—. „ „ J. alpinus Vill.; ſ. Nr. 1831.
—. „ „ J. lamprocarpos Ehrh.; ſ. Nr. 1897.
—. „ „ J. capitatus Weig.; ſ. Nr. 1510.
—. „ „ J. comprēssus Jacq.; ſ. Nr. 1863.
—. VI., 3; Junkaginee: Triglochin palustre L.; ſ. Nr. 2840.
—. „ Knöterichpfl.: Rumex maritimus L.; ſ. Nr. 1899.
—. „ „ R. palustris Sm.; ſ. Nr. 2841.
—. „ „ R. aquaticus L.; ſ. Nr. 2842.
—. VIII., 1; „ Polygonum amphibium L.; ſ. Nr. 2843.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: P. persicaria L.; ſ. Nr. 2182.
—. „ „ P. hydropiper L.; ſ. Nr. 2117.
—. X., 3; Nelkenblütler: Stellaria crassifolia Ehrh.; ſ. Nr. 1900.
—. XI., 1; Weiderichpfl.: Lythrum hyssopifolia L.; ſ. Nr. 2394.

—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Ranuncŭlus scelerātus L.; ſ. Nr. 1904.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Mentha arvēnsis L.; ſ. Nr. 2213.
—. „ „ M. pulegĭum L.; ſ. Nr. 2820.
—. „ „ Scutellarĭa galericulāta L.; ſ. Nr. 2122.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Sc. hastifolĭa L.; ſ. Nr. 2123.
—. „ „ Sc. minor L.; ſ. Nr. 2844.
—. „ „ Stachys palūstris L.; ſ. Nr. 1905.
—. „ „ Teucrĭum scorodonĭa L.; ſ. Nr. 2090.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Euphrasĭa odontītes L.; ſ. Nr. 2308.
—. XIV., 2; Rachenblümler: E. serotĭna Lmk.; ſ. Nr. 2309.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum palūstre L.; ſ. Nr. 1057.
—. XVI., 5; Pappelroſenpfl.: Althaea officinālis L.; ſ. Nr. 2214.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Melilōtus dentāta Pers.; ſ. Nr. 2281.
—. „ „ Trifolĭum hybrĭdum L.; ſ. Nr. 469.
—. „ „ T. fragifĕrum L.; ſ. Nr. 1908.
—. „ „ Galēga officinālis L.; ſ. Nr. 1349.
—. „ „ Astragălus sulcātus L.; ſ. Nr. 1857.
—. „ „ Lathўrus pratēnsis L.; ſ. Nr. 1240.
—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperĭcum tetraptĕrum Fr.; ſ. Nr. 2128.
—. XIX., 1; Korbblütler: Sonchus palūstris L.; ſ. Nr. 2846.
—. „ „ Cirsĭum oleracĕum All.; ſ. Nr. 2847.
—. „ „ C. acaule-oleracĕum Schiede; ſ. Nr. 2427.
—. XIX., 1; Korbblütler: C. lanceolāta-oleracĕum Schultz; ſ. Nr. 2848.
—. XIX., 1; Korbblütler: C. palūstri-oleracĕum Schiede; ſ. Nr. 2849.
—. XIX., 1; Korbblütler: C. palūstre Scop.; ſ. Nr. 1059.
—. „ „ C. setōsum M. B.; ſ. Nr. 2098.
3055. „ „ C. canum M. B. (Cardŭus canus L.). Graue Kratzdiſtel. Wrz. büſchelig, mit verdickten, ſpindelf. Faſern; St. 1köpf. oder in einige lange, 1köpf. Aeſte getheilt; Bltr. längl.-lanzettl., bucht.-gezähnt, untere herablauf.; Bl. purpurrot; 4; 8 bis 9; Schl., Po., Bö., Mä., Oe.
3056. XIX., 1; Korbblütler: C. cano-oleracĕum Naeg. (C. tatarĭcum Wimm. et Gr., Cardŭus tatarĭcus L.). Baſtard. Wrzfaſern fadenf.; St. 1köpf. oder mit einigen langen,

1köpf. Aeſten; Bltr. faſt ſtengelumfaſſ., wenig herablauf.; Köpfchen an der Baſis mit 1 bis 3 lineal., kleinen, ungefärbten, am Rande dornigen Deckbltrn.; Bl. blaßgelbl., bisweilen rötl.; 2♃; 7 bis 8.

—. XIX., 1; Korbblütler: Eupatorĭum cannabĭnum L.; ſ. Nr. 2850.

—. XIX., 2; Korbblütler: Senecĭo barbareaefolĭus Krock.; ſ. Nr. 2203.

—. XIX., 2; Korbblütler: Achillēa ptarmĭca L.; ſ. Nr. 2927.

—. „ „ Carpesĭum cernŭum L.; ſ. Nr. 2204.

—. „ „ Inŭla brittanĭca L.; ſ. Nr. 2851.

—. „ „ I. helenĭum L.; ſ. Nr. 2207.

—. XX., 1; Orchidee: Spirānthes aestivālis Rich.; ſ. Nr. 1060.

—. XXI., 3; Halbgras: Carex oedēri Retz.; ſ. Nr. 691.

b. An Rändern feuchter Wieſen:

—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hypericum quadrangŭlum Fr.; ſ. Nr. 2069.

c. Auf feuchten, ſalzigen Wieſen:

—. XIX., 2; Korbblütler: Senecĭo aquatĭcus Huds.; ſ. Nr. 2827.

d. Auf naſſen, ſchwammigen Wieſen:

—. V., 4; Studentenröschen: Parnassĭa palūstris L.; ſ. Nr. 2500.

e. Auf feuchten, kalkhaltigen Wieſen:

—. VI., 1; Lilienpfl.: Allĭum acutangŭlum Schrad.; ſ. Nr. 2866.

f. Auf moſigen Wieſen:

—. X., 5; Nelkenblütler: Spergēlla nodōsa Rchb.; ſ. Nr. 2415.

g. Auf Torfmoos:

—. V., 3 (oder 5); Sonnenthaupfl.: Droseĕra rotundifolĭa L.; ſ. Nr. 2855.

h. Auf Sumpfwieſen:

—. IV., 1; Krapppfl.: Galĭum palūstre L.; ſ. Nr. 2852.

—. „ „ G. uliginōsum L.; ſ. Nr. 1889.

3057. „ „ G. trifĭdum L. Dreiſpaltiges Labkraut. St. 4kant., auf den Kanten fein-rückw.-hakerig; Bltr. zu 4 bis 6, längl.-lineal., ſtumpf, nicht ſtachelſp., 1nervig, auf dem Nerv und am Rande rückw.-feinſtachelſp.;

Bl. weiß; Fr. kahl, glatt; 4; 8 bis 9; St. (Seethal bei Judenburg).

—. V., 2; Doldenpfl.: Cicūta virōsa L.; ſ. Nr. 1892.
—. „ „ Cnidĭum venōsum Koch; ſ. Nr. 2135.
—. „ „ Peucedănum palūstre Much.; ſ. Nr. 2160.
—. VI., 3; Junkaginee: Triglōchin palūstre L.; ſ. Nr. 2840.
—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: Epilobĭum palūstre L.; ſ. Nr. 2853.
—. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus supērbus L.; ſ. Nr. 1016.
—. X., 3; „ Stellarĭa crassifolĭa Ehrh.; ſ. Nr. 1900.
—. X., 5; Nelkenblütler: Spergēlla nodōsa Rchb.; ſ. Nr. 2415.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Stachys palūstris L.; ſ. Nr. 1905.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum palūstre L.; ſ. Nr. 1057.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Galēga officinālis L.; ſ. Nr. 1349
—. „ „ Lathўrus palūstris L.; ſ. Nr. 3059.
—. XIX., 1; Korbblütler: Cirsĭum pannonĭco-palūstre Koch; ſ. Nr. 1916.

i. Auf ſandigen Sumpfwieſen:

—. VI., 1; Lilienpfl.: Allĭum suaveŏlens Jacq.; ſ. Nr. 2854.

k. Auf Morwieſen:

—. XIV., 1; Lippenblümler: Betonĭca officinālis L.; ſ. Nr. 1027.

l. Auf Torfwieſen:

—. IV., 1; Krapppfl.: Galĭum boreāle L.; ſ. Nr. 2081.
—. „ Enzianpfl.: Cicendĭa filifōrmis Rchb.; ſ. Nr. 2412.
—. V., 1; Vorretſchpfl.: Myosōtis palūstris With.; ſ. Nr. 1891.
—. V., 2; Enzianpfl.: Gentiāna pneumonānthe L.; ſ. Nr. 3053.
—. „ „ G. obtusifolĭa Willd.; ſ. Nr. 2502.
—. „ „ Sweertĭa perēnnis L.; ſ. Nr. 2560.
—. V., 3 (oder 5); Sonnenthaupfl.: Droſĕra rotundifolĭa L.; ſ. Nr. 2855.
—. V., 3 (oder 5); Sonnenthaupfl.: D. longifolĭa L.; ſ. Nr. 2856.
—. V., 3 (oder 5); Sonnenthaupfl.: D. intermedĭa Hayne; ſ. Nr. 1918.
—. VI., 3; Zeitloſenpfl.: Tofieldĭa calyculāta Whlbg.; ſ. Nr. 1832.
—. VIII., 1; Heidepfl.: Tetrălix septentrionālis E. Mey.; ſ. Nr. 2561.

—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: Epilobium palustre L.; ſ. Nr. 2853.
—. X., 2; Steinbrechpfl.: Saxifraga hircŭlus L.; ſ. Nr. 2858.
—. „ Nelkenblütler: Dianthus supērbus L.; ſ. Nr. 1016.
—. X., 3; „ Stellaria crassifolia Ehrh.; ſ. Nr. 1900.
—. X., 5; Nelkenblütler: Spergella nodosa Rchb.; ſ. Nr. 2415.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolium spadicĕum L.; ſ. Nr. 1058.
—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hypericum elŏdes L.; ſ. Nr. 2859.
—. XIX., 2; Korbblütler: Cineraria palustris L.; ſ. Nr. 2860.

m. Auf Salzwieſen:

—. III., 2; Graspfl.: Glyceria distans Whlbg.; ſ. Nr. 1886.
—. IV., 1; Wegerichpfl.: Plantago cornūti Gouan.; ſ. Nr. 2861.
—. IV., 1; Wegerichpfl.: P. coronŏpus L.; ſ. Nr. 2862.
—. V., 1; Schlüſſelblümler: Samŏlus valerandi L.; ſ. Nr. 2863.
—. V., 2; Doldenpfl.: Bupleurum tenuissĭmum L.; ſ. Nr. 2864.
3058. V., 5; Leinpfl.: Linum maritĭmum L. Seeſtrands-Lein. St. an der Baſis holz., oben aufr.-wenigäſtig, kahl; Bltr. 3nervig, kahl, am Rande gleich, untere gegenſt., verk.-eiläng., ſtumpf, obere wechſelſt., lanzettl., kurzzugeſp.; Kbltchn. eif., ſtachelſp., 3nervig; Bl. gelb; 4; 8 bis 9; Kr.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Melilōtus dentāta Pers.; ſ. Nr. 2281.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolium fragifĕrum L.; ſ. Nr. 1908.
—. XIX., 2; Korbblütler: Artemisia laciniāta L.; ſ. Nr. 2865.
—. XXI., 5; Meldenpfl.: Atriplex oblongifolĭum W. et K.; ſ. Nr. 2303.

n. Auf ſonnigen Wieſen:

—. V., 2; Doldenpfl.: Pastināca selinoīdes Vis.; ſ. Nr. 3029.

o. Auf unfruchtbaren Wieſen:

—. V., 2; Doldenpfl.: Ferŭla ferulāgo L.; ſ. Nr. 2867.

p. Auf trocknen Wieſen:

—. III., 2; Graspfl.: Andropōgon gryllus L.; ſ. Nr. 1872.
—. „ „ Agrōstis vulgāris With.; ſ. Nr. 2169.
—. „ „ Phleum pratēnse L.; ſ. Nr. 1248.
—. „ „ Bromus erēctus Huds.; ſ. Nr. 1276.
—. „ „ Festūca pratēnsis Huds.; ſ. Nr. 1852.

—. III., 2; Graspfl.: Dactylis glomerāta L.; s. Nr. 1104.
—. „ „ Briza media L.; s. Nr. 1859.
—. „ „ Poa annua L.; s. Nr. 14.
—. „ „ Lolium perēnne L.; s. Nr. 1281.
—. „ „ L. boucheānum Kth.; s. Nr. 2818.
—. IV., 1; Wegerichpfl.: Plantāgo lanceolāta L.; s. Nr. 1252.
—. „ Kardenpfl.: Scabiōsa columbaria L.; s. Nr. 2080.
—. „ Krapppfl.: Galium mollūgo L.; s. Nr. 1006.
—. V., 1; Glockenblümler: Campanula rapunculus L.; s. Nr. 1289.
—. V., 1; Glockenblümler: C. bononiēnsis L.; s. Nr. 2224.
—. V., 2; Doldenpfl.: Pimpinella saxifrāga L.; s. Nr. 2176.
—. „ „ Seseli colorātum Ehrh.; s. Nr. 2495.
—. „ „ Peucedanum cervaria Cuss.; s. Nr. 2132.
—. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus deltoīdes L.; s. Nr. 1111.
—. „ „ D. supērbus L.; s. Nr. 1016.
—. X., 3; „ Silēne inflāta Sm.; s. Nr. 1178.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Linaria elatīne Mill.; s. Nr. 2404.
—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Onōnis repens L.; s. Nr. 1320.
—. „ „ Medicāgo falcāta L.; s. Nr. 1324.
—. „ „ Trifolium medium L.; s. Nr. 1033.
—. „ „ Astragalus austriacus L.; s. Nr. 1567.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hypochoeris radicāta L.; s. Nr. 1126.
—. XIX., 1; Korbblütler: Cirsium acaule All.; s. Nr. 2097.
—. XIX., 2; „ Inula squarrōsa L.; s. Nr. 2868.

q. An Wiesenrändern:

—. III., 2; Graspfl.: Bromus longiflōrus Willd.; s. Nr. 3001.
—. V., 1; Rachenblümler: Verbascum phoenicēum L.; s. Nr. 2131.
—. X., 3; Nelkenblütler: Melandrium pratēnse Roehl.; s. Nr. 1113.

r. Auf Waldwiesen:

—. V., 2; Doldenpfl.: Cnidium venōsum Koch; s. Nr. 2135.
—. „ „ Laserpitium prutheni cum L.; s. Nr. 2059.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranium sanguinēum L.; s. Nr. 486.
—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Trifolium ochroleucum L.; s. Nr. 1140.
—. XVII., 4; Hülsenpfl.: T. spadicēum L.; s. Nr. 1058.
—. XIX., 1; Korbblütler: Serratula tinctoria L.; s. Nr. 2073.

s. Auf feuchten Waldwiesen:

—. V., 2; Doldenpfl.: Hydrocotyle vulgāris L.; ſ. Nr. 2137.

t. Auf Waldwiesen der Voralpen:

—. V., 2; Doldenpfl.: Laserpitium archangelica Wulff.; ſ. Nr. 2811.

u. Auf fetten Wieſen:

—. XIV., 1; Lippenblümler: Mentha sylvēstris L.; ſ. Nr. 2218.

v. Auf ſandigen Wieſen:

—. V., 5; Bleiwurzpfl.: Armeria vulgāris Willd.; ſ. Nr. 1295.

w. Auf Berg- und Gebirgswieſen:

—. III., 2; Graspfl.: Holcus lanātus L.; ſ. Nr. 371.
—. „ „ Avēna planicūlmis Schrad.; ſ. Nr. 2869.
—. „ „ Molinia coerulea Mnch.; ſ. Nr. 2112.
—. IV., 1; Kardenpfl.: Scabiōsa sylvatica L.; ſ. Nr. 2141.
. „ Roſenpfl.: Sanguisōrba officinālis L.; ſ. Nr. 1658.
—. V., 1; Veilchenpfl.: Viola lutea Sm.; ſ. Nr. 2505.
—. V., 2; Doldenpfl.: Athamantica libanōtis L.; ſ. Nr. 2083.
—. „ „ Seseli colorātum Ehrh.; ſ. Nr. 2495.
—. „ „ Meum athamanticum Jacq.; ſ. Nr. 2554.
—. „ „ Chaerophyllum hirsūtum L.; ſ. Nr. 2130.
—. „ „ Pleurospermum austriacum Hoffm.; ſ. Nr. 2557.
—. VI., 1; Lilienpfl.: Allium victoriālis L.; ſ. Nr. 2870.
—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: Delphinium elātum L.; ſ. Nr. 2496.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Alectorolophus pulcher Schumm.; Nr. 2555.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolium agrarium L.; ſ. Nr. 1084.
—. „ „ Vicia tenuifolia Roth; ſ. Nr. 1229.
—. „ „ Lathyrus sylvēstris L.; ſ. Nr. 1036.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hypochoeris maculāta L.; ſ. Nr. 2111.
—. XIX., 1; Korbblütler: Serratula nitida Bess.; ſ. Nr. 2450.
—. „ „ Cirsium acaule-tuberōsum Schiede; ſ. Nr. 2497.
—. XIX., 1; Korbblütler: C. pannonicum DC.; ſ. Nr. 2498.
—. „ „ Carduus deflorātus L.; ſ. Nr. 2074.
—. XIX., 2; „ Pyrethrum macrophyllum Willd.; ſ. Nr. 2499.
—. XIX., 2; Korbblütler: Inula germanica L.; ſ. Nr. 2296.

—. XIX., 3; Korbblütler: Centaurēa phrygĭa L.; ſ. Nr. 2163.
—. „ „ C. nigrēscens Willd.; ſ. Nr. 2556.
—. XX., 1; Orchidee: Epipactis latifolĭa Sw.; ſ. Nr. 2139.

x. Auf trocknen Bergwieſen:

—. IV., 1; Kardenpfl.: Scabiōsa gramuntĭa L.; ſ. Nr. 1611.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum sanguinĕum L.; ſ. Nr. 486.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Astragălus onobrўchis L.; ſ. Nr. 1612.
—. XXI., 1; Giftmilcher: Euphorbĭa nicaeēnsis All.; ſ. Nr. 1914.

y. Auf trocknen Gebirgswieſen:

—. V., 1; Glockenblümler: Phyteuma orbiculāre L.; ſ. Nr. 1653.

z. Auf feuchten Gebirgswieſen:

—. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygŏnum bistōrta L.; ſ. Nr. 1139.

a[1]. Auf feuchten Bergwieſen:

—. IV., 1; Krapppfl.: Galĭum boreāle L.; ſ. Nr. 2081.
—. V., 2; Doldenpfl.: Selīnum carvifolĭa L.; ſ. Nr. 2057.
—. V., 4; Studentenröschen: Parnassĭa palūstris L.; ſ. Nr. 2500.
—. XIX., 1; Korbblütler: Cirsĭum heterophўllum DC.; ſ. Nr. 2501.

§. 556. **I[1]. An feuchten, ſumpfigen Orten:**

—. II., 1; Waſſerſchlauchpfl.: Utricularĭa neglēcta Lehm.; ſ. Nr. 2871.
—. II., 1; Waſſerſchlauchpfl.: U. pulchēlla Lehm.; ſ. Nr. 2872.
—. „ Rachenblümler: Veronĭca serpyllifolĭa L.; ſ. Nr. 424.
—. „ „ V. scutellāta L.; ſ. Nr. 1875.
—. „ „ Gratĭŏla officinālis L.; ſ. Nr. 2817.
—. „ Lippenblümler: Lycŏpus europaeus L.; ſ. Nr. 2891.
—. „ „ L. exaltātus L. fil.; ſ. Nr. 2892.
—. III., 1; Halbgras: Cypērus flavēscens L.; ſ. Nr. 1143.
—. „ „ C. serotĭnus Rottb.; ſ. Nr. 2873.
—. „ „ C. fuscus L.; ſ. Nr. 2831.
—. „ „ Schoenus marĭscus L.; ſ. Nr. 2874.
—. „ „ Scirpus dichotŏmus L.; ſ. Nr. 2875.
—. „ „ Sc. palūstris L.; ſ. Nr. 1876.
—. „ „ Sc. setacĕus L.; ſ. Nr. 2832.

—. III., 1; Halbgras: Sc. supīnus L.; ſ. Nr. 2876.
—. III, 2; Graspfl.: Alopecūrus geniculatus L.; ſ. Nr. 1880.
—. „ „ Crypsis aculeāta Ait.; ſ. Nr. 2877.
3059. „ „ Aira uliginōsa Weihe (A. discŏlor Thuill.). Sumpf-Schmele. Blтr. flach oder zſgefalt.; Blatthäutchen längl., verſchmäl.-ſpitz; Riſpe aufr.-abſteh.; Balg gleich; Stielchen der 2. Blüte halb ſo lang, als die Bl. ſelbſt; 4; 8 bis 9; Rh., W., Ha., Po.
3060. III., 2; Graspfl.: Arūndo donax L. (Donax arundinacĕus P. B.). Zahmes Spazirrohr. Wrz. kriech.; Halm ſtaudenartig; Riſpe dicht, offen; Aehrchen 3blüt.; 4; 8 bis 10; ♆; ⚓; Ty., Kr.
—. III., 2; Graspfl.: Poa triviālis L.; ſ. Nr. 1860.
—. „ „ Glycerĭa distans Whlbg.; ſ. Nr. 1886.
—. IV., 1; Krapppfl.: Galĭum rubioīdes L.; ſ. Nr. 2878.
—. „ „ G. uliginōsum L.; ſ. Nr. 1889.
—. V., 1; Nachtſchattenpfl.: Solānum dulcamāra L.; ſ. Nr. 1197.
—. V., 1; Borretſchpfl.: Myosōtis palūstris With.; ſ. Nr. 1891.
—. „ „ M. caespitōsa Schultz; ſ. Nr. 1926.
—. „ Enzianpfl.: Lymnanthĕmum nymphaeoīdes Lk.; ſ. Nr. 1927.
—. V., 1; Glockenblümler: Lobelĭa dortmānna L.; ſ. Nr. 2879.
—. V., 2; Seidenfrüchtler: Apocȳnum venĕtum L.; ſ. Nr. 2882.
—. V., 2; Doldenpfl.: Hydrocotȳle vulgāris L.; ſ. Nr. 2137.
—. „ „ Cicūta virōsa L.; ſ. Nr. 1892.
—. „ „ Helosciadĭum repens Koch; ſ. Nr. 2837.
—. „ „ H. inundātum Koch; ſ. Nr. 2880.
—. „ „ Oenānthe phellandrĭum Lmk.; ſ. Nr. 2881.
—. V., 3 (oder 5); Sonnenthaupfl.: Drosĕra rotundifolĭa L.; ſ. Nr. 2855.
—. V., 3 (oder 5); Sonnenthaupfl.: Dr. longifolĭa L.; ſ. Nr. 2856.
—. V., 3 (oder 5); Sonnenthaupfl.: Dr. intermedĭa Hayne; ſ. Nr. 1918.
—. VI., 1; Semede: Juncus commūnis E. Mey.; ſ. Nr. 1512.
—. „ „ J. glaucus Ehrh.; ſ. Nr. 1930.
—. „ „ J. obtusiflōrus Ehrh.; ſ. Nr. 1527.
—. VI., 3; Knöterichpfl.: Rumex hydrolapăthum Huds.; ſ. Nr. 2884.
—. VI., 3; Knöterichpfl.: R. maxĭmus Schreb.; ſ. Nr. 2885.
—. „ „ R. aquatĭcus L.; ſ. Nr. 2842.

—. VI., 5; Löffelpfl.: Alisma ranunculoïdes L.; ſ. Nr. 1931.
—. „ „ A. parnassifolium L.; ſ. Nr. 2886.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygŏnum amphibĭum L.; ſ. Nr. 2843.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: P. persicarĭa L.; ſ. Nr. 2182.
—. „ „ P. hydropīper L.; ſ. Nr. 2117.
—. „ Nachtkerzenpfl.: Epilobĭum tetragōnum L.; ſ. Nr. 2215.
—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: E. rosĕum Schr.; ſ. Nr. 2129.
—. VIII., 4; Tännelpfl.: Elatīne alsināstrum L.; ſ. Nr. 2887.
—. X., 3; Nelkenblütler: Stellarĭa crassifolĭa Ehrh.; ſ. Nr. 1900.
—. X., 5; Nelkenblütler: Cerastĭum vulgātum L. spec.; ſ. Nr. 463.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Mentha aquatĭca L.; ſ. Nr. 2888.
—. XIV., 1; Lippenblümler: M. arvensis L.; ſ. Nr. 2213.
—. „ „ Scutellarĭa galericulāta L.; ſ. Nr. 2122.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Stachys sylvatĭca L.; ſ. Nr. 1026.
—. „ „ St. palūstris L.; ſ. Nr. 1905.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Nasturtĭum palūstre DC.; ſ. Nr. 1933.
—. XV., 2; Kreuzblütler: N. sylvēstre R. Br.; ſ. Nr. 1487.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum palūstre L.; ſ. Nr. 1057.
—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperīcum elōdes L.; ſ. Nr. 2859.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum auricŭla L.; ſ. Nr. 1334.
—. XIX., 1; Korbblütler: Cardŭus crispus L.; ſ. Nr. 2099.
—. XIX., 2; „ Cinerarĭa palūstris L.; ſ. Nr. 2860.
—. „ „ *Cotŭla coronopifolĭa L.; ſ. Nr. 2294.
—. XIX., 2; Korbblütler: Pallēnis spinōsa Cass.; ſ. Nr. 1935.
—. XIX., 2; Korbblütler: Achillēa ptarmĭca L.; ſ. Nr. 2927.
—. „ „ Pulicarĭa dysenterĭca Gaertn.; ſ. Nr. 2821.
—. XIX., 3; Korbblütler: Bidens bipinnāta L.; ſ. Nr. 2397.
3061. „ „ B. cernŭa W. Ueberhängender Waſſerdoſt (Wanzengeſicht, Wanzenlausſame, Zweizahn). Kahl oder drüſenharig; Blтr. ungetheilt, eilanzettl., lanzettl.

bis lineal-lanzettl., entfernt-scharf-sägezähn.; Köpfchen anfangs nickend, selbst überhäng.; Bl. gelb; ☉; 8 bis 9.

Varirt: B. cernŭa L. (strallos; St. mit kurzen, kleinköpf. Nebenästen), B. minĭma L. (Coreōpsis bidens L.; strallos; St. einfach, 1köpf.; Bltr. sitz., ganzrand.; Köpfchen fast aufr.), B. radiāta (mit Stral; obere Blütenäste endl. länger als die Hauptachse; St. von der Basis an ästig, die Aeste armf.-aufstreb.), B. mixta (untere Köpfchen stralend, obere strallos).

3062. XIX., 3; Korbblütler: B. tripartĭta L. Dreitheiliger W. (Wasserhanf, Zweizahn, Pfauenspiegel, Kunigundenkraut, Hahnenkamm, deutsche Akmelle, Katzenigel, Wasserlattich). Kahl; Bltr. 3- bis 5lapp. oder -theilig; Köpfchen strallos; Achänen verk.-eif.; Bl. gelb; ☉; 8 bis 9.

Varirt: B. hybrĭda Thuill. (Bltr. fast 5theil., Lappen längl.-lineal.), B. cannabĭna Tausch (Bltr. 3theil., Mittellapp. fiederspalt.), B. pinnatifĭda Turcz. (Bltr. 3-theil., Lappen fiederspalt.), B. tenŭis Turcz. (Bltr. ungetheilt), B. pygmaea (Pfl. klein).

—. XXI., 1; Aronpfl.: Calla palūstris L.; s. Nr. 1146.

—. XXI., 4; Wegerichpfl.: Littorēlla lacūstris L.; s. Nr. 2889.

—. XXI., 5; Tannenwedelpfl.: Myriophўllum spicātum L.; s. Nr. 1940.

a. An feuchten, schattigen Stellen:

—. V., 1; Nachtschattenpfl.: Solānum dulcamāra L.; s. Nr. 1197.

—. V., 2; Meldenpfl.: Chenopodĭum polyspērmum L.; s. Nr. 2233.

—. V., 2; Doldenpfl.: Aegopodĭum podagrarĭa L.; s. Nr. 1012.

—. V., 2; Doldenpfl.: Laserpitĭum pruthenĭcum L.; s. Nr. 2059.

—. V., 5; Leinpfl.: Linum cathartĭcum L.; s. Nr. 1854.

—. X., 5; Nelkenblütler: Malachĭum aquatĭcum Fr.; s. Nr. 1241.

—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Ranuncŭlus repens L.; s. Nr. 2890.

—. XIV., 1; Lippenblümler: Mentha arvēnsis L.; s. Nr. 2213.

—. XIV., 1; Lippenblümler: Lamĭum maculātum L.; s. Nr. 190.

—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum sylvatĭcum Lmk.; s. Nr. 1038.

—. XXI., 5; Meldenpfl.: Atrĭplex angustifolĭum Sm.; ſ. Nr. 2159.
—. XXI., 5; Amarantpfl.: Amarāntus blitum L.; ſ. Nr. 2247.

b. In ausgetrockneten Sümpfen:

—. VI., 1; Semede: Juncus tenageia Ehrh.; ſ. Nr. 1514.
—. VI., 5; Löffelpfl.: Alĭsma natans L.; ſ. Nr. 1944.

c. Auf Salzſümpfen:

—. V., 1; Schlüſſelblümler: Samŏlus valerāndi L.; ſ. Nr. 2863.
—. XXI., 5; Meldenpfl.: Atrĭplex littorāle L.; ſ. Nr. 2893.

d. Auf feuchten Weiden:

Vergl. §. 554, a.

e. Auf feuchten Grasplätzen und Triften:

Vergl. §. 552, g.

f. Auf feuchten, naſſen Wieſen:

Vergl. §. 555, a.

g. Auf Sumpfwieſen:

Vergl. §. 555, h.

§. 557. **K[1]. An ſchattigen Orten:**

a. An feuchten, ſchattigen Stellen:

Vergl. §. 556, a.

b. An ſchattigen, ſteinigen Stellen:

Vergl. §. 541, b.

§. 558. **L[1]. An Quellen und quelligen Orten:**

—. III., 1; Fettkrautpfl.: Montĭa fontāna L.; ſ. Nr. 683.
—. III., 2; Graspfl.: Catabrōsa aquatĭca P. B.; ſ. Nr. 1882.
—. IV., 1; Krapppfl.: Galĭum palūstre L.; ſ. Nr. 2852.
—. V., 1; Schlüſſelblümler: Lysimachĭa nemŏrum L.; ſ. Nr. 1048.
—. V., 1; Borretſchpfl.: Myosōtis palūstris With.; ſ. Nr. 1891.
—. V., 2; Doldenpfl.: Sium latifolĭum L.; ſ. Nr. 2838.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygŏnum persicarĭa L.; ſ. Nr. 2182.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: P. hydropīper L.; ſ. Nr. 2117.
—. " Nachtkerzenpfl.: Epilobĭum virgātum Fr.; ſ. Nr. 2121.
—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: E. tetragōnum L.; ſ. Nr. 2215.

—. XIV., 1; Lippenblümler: Mentha arvēnsis L.; ſ. Nr. 2213.
—. „ „ Scutellaria galericulāta L.; ſ. Nr. 2122.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Nasturtium officināle R. Br.; ſ. Nr. 954.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranium palūstre L.; ſ. Nr. 1057.
—. XXI., 4; Wegerichpfl.: Littorella lacūstris L.; ſ. Nr. 2889.

a. An ſickernden Quellen:

—. V., 3 (oder 5); Sonnenthaupfl.: Drosĕra rotundifolia L.; ſ. Nr. 2855.

M¹. Auf Moraſt- und Morboden: §. 559.

—. II., 1; Waſſerſchlauchpfl.: Utricularia neglecta Lehm.; ſ. Nr. 2871.
—. III., 1; Halbgras: Schoenus marīscus L.; ſ. Nr. 2874.
—. „ „ Sch. albus L.; ſ. Nr. 2894.
—. „ „ Eriophŏrum capitātum Host; ſ. Nr. 872.
—. III., 2; Graspfl.: Aira uliginōsa Weihe; ſ. Nr. 3059.
—. V., 1; Schlüſſelblümler: Anagallis tenella L.; ſ. Nr. 1946.
—. VI., 1; Semede: Narthecium ossifrăgum Huds.; ſ. Nr. 1947.
—. VI., 3; Knöterichpfl.: Rumex palūstris Sm.; ſ. Nr. 2841.
—. VI., 5; Löffelpfl.: Alisma ranunculoides L.; ſ. Nr. 1931.
—. X., 2; Steinbrechpfl.: Saxifrăga hircŭlus L.; ſ. Nr. 2858.

N¹. Auf Torfboden: §. 560.

—. III., 1; Halbgras: Scirpus multicaulis Sm.; ſ. Nr. 1948.
—. V., 1; Borretſchpfl.: Myosōtis caespitōsa Schultz; ſ. Nr. 1926.
—. VI., 1; Semede: Juncus filifōrmis L.; ſ. Nr. 1790.
—. „ „ J. alpīnus Vill.; ſ. Nr. 1831.
—. „ „ J. squarrōsus L.; ſ. Nr. 1141.
—. „ „ Narthecium ossifrăgum Huds.; ſ. Nr. 1947.
—. VI., 5; Löffelpfl.: Alisma ranunculoides L.; ſ. Nr. 1931.
—. VIII., 1; Enzianpfl.: Chlora perfoliāta L.; ſ. Nr. 894.
—. „ „ C. serotīna Koch; ſ. Nr. 2895.
—. XIX., 2; Korbblütler: Cineraria palūstris L.; ſ. Nr. 2860.
—. XX., 1; Orchidee: Malāxis paludōsa Sw.; ſ. Nr. 2896.

a. Auf Torfwiesen:

Vergl. §. 555, l.

b. Auf Torfmoren:

—. II., 1; Wasserschlauchpfl.: Utricularĭa neglēcta Lehm.; s. Nr. 2871.
—. V., 1; Schlüsselblümler: Anagāllis tenēlla L.; s. Nr. 1946.
—. V., 3 (oder 5); Sonnenthaupfl.: Droserа longifolĭa L.; s. Nr. 2856.
—. V., 3 (oder 5); Sonnenthaupfl.: D. intermedĭa Hayne; s. Nr. 1918.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Pediculāris sceptrum carolīnum L.; s. Nr. 1056.

c. Auf Torfmoren in Gebirgen:

—. V., 1; Schlüsselblümler: Soldanēlla montāna Willd.; s. Nr. 496.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Pediculāris sceptrum carolīnum L.; s. Nr. 1056.

d. Auf Torfmos:

—. V., 3 (oder 5); Sonnenthaupfl.: Droserа rotundifolĭa L.; s. Nr. 2855.

e. In Torfgruben:

—. IV., 1; Nachtkerzenpfl.: Isnardĭa palūstris L.; s. Nr. 2897.

f. In Torfbrüchen:

—. V., 1; Paronychienpfl.: Illecēbrum verticillātum L.; s. Nr. 1483.

g. Auf salzhaltigem Torfboden:

—. VI., 3; Junkaginee: Triglōchin maritĭmum L.; s. Nr. 1949.

§. 561. **O[1]. Auf Schlamm:**

—. III., 1; Halbgras: Scirpus aciculāris L.; s. Nr. 1950.
—. „ „ Sc. radĭcans Schkhr.; s. Nr. 2834.
—. V., 1; Borretschpfl.: Myosōtis caespitōsa Schleich.; s. Nr. 1926.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygŏnum persicarĭa L.; s. Nr. 2182.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: P. hydropīper L.; s. Nr. 2117.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Limosēlla aquatĭca L.; s. Nr. 2898.

a. Auf sandigem Schlammboden:

—. XXI., 4; Wegerichpfl.: Littorella lacustris L.; s. Nr. 2889.

P¹ Auf überschwemmten Stellen: §. 562.

—. II., 1; Wasserschlauchpfl.: Utricularia intermedia Hayne; s. Nr. 1951.
—. III., 1; Halbgras: Scirpus aciculāris L.; s. Nr. 1950.
—. IV., 4; Dickblattpfl.: Bulliardia vaillantii DC.; s. Nr. 964.
—. V., 3; Paronychienpfl.: Corrigiola littorālis L.; s. Nr. 1348.
—. VI., 1; Semede: Juncus tenageia Ehrh.; s. Nr. 1514.
—. VI., 3; Junkaginee: Triglochin palustre L.; s. Nr. 2840.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygonum amphibium L.; s. Nr. 2843.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: P. persicaria L.; s. Nr. 2182.
—. " " P. hydropiper L.; s. Nr. 2117.
—. VIII., 4; Tännelpfl.: Elatine triandra Schkhr.; s. Nr. 2901.
—. VIII., 4; Tännelpfl.: E. hydropiper L.; s. Nr. 1952.
—. XI., 1; Weiderichpfl.: Lythrum hyssopifolia L.; s. Nr. 2394.
—. XII., 3; Rosenpfl.: Potentilla supina L.; s. Nr. 1369.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Lindernia pyxidaria All.; s. Nr. 2902.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Nasturtium palustre DC.; s. Nr. 1933.
—. XXI., 4; Wegerichpfl.: Littorella lacustris L.; s. Nr. 2889.

a. Auf überschwemmten Stellen in Wäldern:

—. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygonum minus Huds.; s. Nr. 2118.

Q¹. An und in Gräben, Bächen, Flüssen u. dergl.: §. 563.

—. I., 1; Tannenwedelpfl.: Hippuris vulgāris L.; s. Nr. 2903.
—. II., 1; Wasserschlauchpfl.: Utricularia vulgāris L.; s. Nr. 1953.
—. II., 1; Wasserschlauchpfl.: U. minor L.; s. Nr. 2899.
—. " " U. intermedia Hayne; s. Nr. 1951.
—. " Rachenblümler: Veronica longifolia L.; s. Nr. 2212.
—. " " V. beccabunga L.; s. Nr. 1954.
—. " " V. anagallis L.; s. Nr. 1955.
—. " " V. scutellata L; s. Nr. 1875.

—. II., 1; Rachenblümler: Gratiŏla officinālis L.; ſ. Nr. 2817.
—. „ Lippenblümler: Lycŏpus europaeus L.; ſ. Nr. 2891.
—. „ „ L. exaltātus L. fil.; ſ. Nr. 2892.
—. III., 1; Halbgras: Cypērus flavēscens L.; ſ. Nr. 1143.
—. „ „ C. longus L.; ſ. Nr. 2904.
—. „ „ Scirpus palūstris L.; ſ. Nr. 1876.
—. „ „ Sc. aciculāris L.; ſ. Nr. 1950.
—. „ „ Sc. fluĭtans L.; ſ. Nr. 1956.
—. „ „ Sc. holoschoenus L.; ſ. Nr. 2833.
—. „ „ Sc. tabernaemontāni Gmel.; ſ. Nr. 1957.
—. „ „ Sc. trigōnus Roth; ſ. Nr. 1958.
—. „ „ Sc. triquĕter L.; ſ. Nr. 2905.
—. „ „ Sc. pungens Vahl; ſ. Nr. 2906.
—. „ „ Sc. mucronātus L.; ſ. Nr. 2907.
—. „ „ Sc. micheliānus L.; ſ. Nr. 2908.
—. „ „ Sc. maritĭmus L.; ſ. Nr. 2909.
—. „ „ Sc. radīcans Schkhr.; ſ. Nr. 2834.
—. „ Baldrianpfl.: Valeriāna officinālis L.; ſ. Nr. 998.
—. III., 2; Graspfl.: Coleānthus subtīlis Seid.; ſ. Nr. 2910.
—. „ „ Leersĭa oryzoīdes Sw.; ſ. Nr. 2999.
—. „ „ Agrōstis stolonifĕra L.; ſ. Nr. 2154.
—. „ „ Calamagrōstis epigeios Roth; ſ. Nr. 2170.
—. „ „ C. littorēa DC.; ſ. Nr. 2911.
—. „ „ C. lanceolāta Roth; ſ. Nr. 2835.
—. „ „ Echinochlŏa crus-galli L.; ſ. Nr. 2329.
—. „ „ Alopecūrus geniculātus L.; ſ. Nr. 1880.
—. „ „ Catabrōsa aquatĭca P. B.; ſ. Nr. 1882.
—. „ „ Phragmītes commūnis L.; ſ. Nr. 2912.
—. „ „ Festūca boreālis M. et K.; ſ. Nr. 2913.
—. „ „ Glycerĭa fluĭtans Scop.; ſ. Nr. 1960.
—. „ „ G. aquatĭca Whlbg.; ſ. Nr. 2914.
—. „ „ Brachypodĭum loliacĕum R. et Sch.; ſ. Nr. 1887.
—. III., 2; Graspfl.: Tritĭcum canīnum L.; ſ. Nr. 1047.
—. „ „ T. rigĭdum Schrad.; ſ. Nr. 2915.
—. „ „ Elўmus arenarĭus L.; ſ. Nr. 2916.
—. IV., 1; Kardenpfl.: Dipsăcus sylvēstris Mill.; ſ. Nr. 2172.
—. „ „ D. laciniātus L.; ſ. Nr. 2264.
—. „ „ D. fullōnum L.; ſ. Nr. 2263.
—. „ „ D. pilōsus L.; ſ. Nr. 2079.
—. „ „ Scabiōsa austrālis Wulff.; ſ. Nr. 2836.
—. „ Krapppfl.: Galĭum palūstre L.; ſ. Nr. 2852.
—. „ Nachtkerzenpfl.: Isnardĭa palūstris L.; ſ. Nr. 2897.
—. IV., 4; Najadenpfl.: Potămogēton natans L.; ſ. Nr. 1963.

—. IV., 4; Najadenpfl.: P. rufēscens Schrad.; ſ. Nr. 1964.
—. „ „ P. heterophȳllus Schreb.; ſ. Nr. 1965.
—. „ „ P. lucens L.; ſ. Nr. 1966.
—. „ „ P. praelōngus Wulff.; ſ. Nr. 2769.
—. „ „ P. perfoliātus L.; ſ. Nr. 1967.
—. „ „ P. crispus L.; ſ. Nr. 1968.
—. „ „ P. comprēssus L.; ſ. Nr. 2917.
—. „ „ P. acutifolĭus Lk.; ſ. Nr. 1986.
—. „ „ P. obtusifolĭus Koch; ſ. Nr. 1969.
—. „ „ P. pusillus L.; ſ. Nr. 2918.
—. „ „ P. pectinātus L.; ſ. Nr. 1970.
—. V., 1; Rachenblümler: Verbāscum adulterīnum Koch; ſ. Nr. 2825.
—. V., 1; Nachtſchattenpfl.: Solānum dulcamāra L.; ſ. Nr. 1197.
—. V., 1; Vorretſchpfl.: Myosōtis palūstris With.; ſ. Nr. 1891.
—. V., 1; Vorretſchpfl.: M. caespitōsa Schultz; ſ. Nr. 1926.
—. „ Enzianpfl.: Lymnanthĕmum nymphaeoīdes Lk.; ſ. Nr. 1927.
—. V., 2; Meldenpfl.: Chenopodĭum ficifolĭum Sm.; ſ. Nr. 3004.
—. V., 2; Meldenpfl.: Ch. album L.; ſ. Nr. 2231.
—. „ „ Ch. polyspērmum L.; ſ. Nr. 2233.
—. „ „ Corispērmum hyssopifolĭum L.; ſ. Nr. 3005.
—. V., 2; Meldenpfl.: C. nitĭdum Kit.; ſ. Nr. 3011.
—. „ „ Salsŏla kali L.; ſ. Nr. 2919.
—. „ Doldenpfl.: Cicūta virōsa L.; ſ. Nr. 1892.
—. „ „ Helosciadĭum nodiflōrum Koch; ſ. Nr. 2920.
—. V., 2; Doldenpfl.: Aegopodĭum podagrarĭa L.; ſ. Nr. 1012.
—. V., 2; Doldenpfl.: Sium latifolĭum L.; ſ. Nr. 2838.
—. „ „ S. angustifolĭum L.; ſ. Nr. 2839.
—. „ „ Oenānthe phellandrĭum Lmk.; ſ. Nr. 2881.
—. V., 2; Doldenpfl.: Oe. fistulōsa L.; ſ. Nr. 1893.
—. „ „ Angelĭca sylvēstris L.; ſ. Nr. 2115.
—. „ „ Peucedănum palūstre Mnch.; ſ. Nr. 2160.
—. VI., 1; Semede: Juncus commūnis E. Mey.; ſ. Nr. 1512.
—. „ „ J. obtusifolĭus Ehrh.; ſ. Nr. 1527.
—. „ „ J. alpīnus Vill.; ſ. Nr. 1831.

—. VI., 1; Semede: J. lamprocārpus Ehrh.; ſ. Nr. 1897.
—. „ „ J. atrātus Krock.; ſ. Nr. 2136.
—. „ „ J. acutiflōrus Ehrh.; ſ. Nr. 2116.
—. „ „ J. uliginōsus Roth; ſ. Nr. 1050.
—. „ „ J. comprēssus Jacq.; ſ. Nr. 1863.
—. „ Lilienpfl.: Allium schoenoprāsum L.; ſ. Nr. 1654.
—. „ Weiderichpfl.: Peplis portula L.; ſ. Nr. 2819.
—. VI., 3; Knöterichpfl.: Rumex maritimus L.; ſ. Nr. 1899.
—. „ „ R. palūstris Sm.; ſ. Nr. 2841.
—. „ „ R. pulcher L.; ſ. Nr. 1256.
—. „ „ R. obtusifolius L.; ſ. Nr. 2104.
—. „ „ R. patientia L.; ſ. Nr. 2273.
—. „ „ R. hydrolapathum Huds.; ſ. Nr. 2884.
—. „ „ R. maximus Schreb.; ſ. Nr. 2885.
—. „ „ R. aquaticus L.; ſ. Nr. 2842.
—. VI., 5; Löffelpfl.: Alisma natans L.; ſ. Nr. 1944.
—. „ „ A. plantāgo L.; ſ. Nr. 1972.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygonum amphibium L.; ſ. Nr. 2843.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: P. hydropiper L.; ſ. Nr. 2117.
—. „ Nachtkerzenpfl.: *Oenothēra biennis L.; ſ. Nr. 2256.
—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: Epilobium parviflōrum Schreb.; ſ. Nr. 2119.
—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: E. palūstre L.; ſ. Nr. 2853.
—. „ „ E. virgātum Fr.; ſ. Nr. 2121.
—. „ „ E. tetragōnum L.; ſ. Nr. 2215.
—. „ „ E. roseum Schr.; ſ. Nr. 2129.
—. VIII., 4; Tännelpfl.: Elatine hexándra DC.; ſ. Nr. 1973
—. „ „ E. triándra Schkhr.; ſ. Nr. 2901.
—. „ „ E. hydropiper L.; ſ. Nr. 1952.
—. IX., 3; Waſſerlieſchpfl.: Butomus umbellātus L.; ſ. Nr. 1974.
—. X., 2; Nelkenblütler: Gypsophila murālis L.; ſ. Nr. 2234.
—. X., 5; „ Malachium aquaticum Fr.; ſ. Nr. 1241.
—. X., 5; Nelkenblütler: Cerastium vulgātum L. spec.; ſ. Nr. 463.
—. X., 5; Nelkenblütler: C. viscōsum L.; ſ. Nr. 684.
—. XI., 1; Weiderichpfl.: Lythrum salicaria L.; ſ. Nr. 1242.
—. „ „ L. hyssopifolia L.; ſ. Nr. 2394.
—. XII., 3; Roſenpfl.: Geum urbānum L.; ſ. Nr. 1077.
—. „ „ Potentilla supīna L.; ſ. Nr. 1369.
—. „ „ P. anserina L.; ſ. Nr. 578.

—. XII., 3; Rosenpfl.: P. reptans L.; s. Nr. 1301.
—. " " P. mixta Nolte; s. Nr. 2276.
—. XIII., 1; Nixenpfl.: Nymphaea alba L.; s. Nr. 1976.
—. " " Nuphar luteum Sm.; s. Nr. 1977.
—. XIII., 2; Gichtrosenpfl.: Cimicifuga foetida L.; s. Nr. 2062.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Ranunculus aquatilis L.; s. Nr. 1978.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: R. lingua L.; s. Nr. 2922.
—. " " R. sceleratus L.; s. Nr. 1904.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Mentha sylvestris L.; s. Nr. 2218.
—. XIV., 1; Lippenblümler: M. rotundifolia L.; s. Nr. 2187.
—. " " M. nepetoides Lej.; s. Nr. 2923.
—. " " M. piperita L.; s. Nr. 2924.
—. " " M. aquatica L.; s. Nr. 2888.
—. " " M. arvensis L.; s. Nr. 2213.
—. " " M. pulegium L.; s. Nr. 2820.
—. " " Scutellaria galericulata L.; s. Nr. 2122.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Sc. hastifolia L.; s. Nr. 2123.
—. " " Sc. minor L.; s. Nr. 2844.
—. " " Galeopsis bifida Boenningh.; s. Nr. 2191.
—. XIV., 1; Lippenblümler: G. versicolor Curt.; s. Nr. 2124.
—. " " Stachys ambigua Sm.; s. Nr. 1238.
—. " " St. palustris L.; s. Nr. 1905.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Limosella aquatica L.; s. Nr. 2898.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Lindernia pyxidaria All.; s. Nr. 2902.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Scrophularia nodosa L.; s. Nr. 1069.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Sc. aquatica L.; s. Nr. 2925.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Senebiera coronopus Poir.; s. Nr. 2258.
—. XV., 1; Kreuzblütler: S. didyma Pers.; s. Nr. 2323.
—. XV., 2; " Nasturtium officinale R. Br.; s. Nr. 954.
—. XV., 2; Kreuzblütler: N. pyrenaicum R. Br.; s. Nr. 905.
—. " " Erysimum cheiranthoides L.; s. Nr. 1484.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Sisymbrium sophia L.; s. Nr. 591.

—. XV., 2; Kreuzblütler: Melānosināpis commūnis Sch. et Sp.; ſ. Nr. 2375.
—. XVI., 5; Pappelroſenpfl.: Malva moschāta L.; ſ. Nr. 1563.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Onōnis hircīna Jacq.; ſ. Nr. 1322.
—. „ „ Melilōtus alba Lmk.; ſ. Nr. 2197.
—. „ „ Trifolĭum fragifĕrum L.; ſ. Nr. 1908.
—. „ „ Lotus corniculātus L.; ſ. Nr. 1239.
—. „ „ Galēga officinālis L.; ſ. Nr. 1349.
—. „ „ Lathўrus pratēnsis L.; ſ. Nr. 1240.
—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperīcum quadrangŭlum Fr.; ſ. Nr. 2069.
—. XVIII., 2; Hartheupfl.: H. tetraptĕrum Fr.; ſ. Nr. 2128.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum lycopifolĭum Froel.; ſ. Nr. 2637.
—. XIX., 1; Korbblütler: Crepis biēnnis L.; ſ. Nr. 1869.
—. „ „ Sonchus asper Hall.; ſ. Nr. 1263.
—. „ „ S. palūstris L.; ſ. Nr. 2846.
—. „ „ Picris hieracioīdes L.; ſ. Nr. 2241.
—. „ „ Leontŏdon vulgāris Kitt.; ſ. Nr. 1079.
—. XIX., 1; Korbblütler: Cirsĭum oleracĕum All.; ſ. Nr. 2847.
—. XIX., 1; Korbblütler: C. palūstre Scop.; ſ. Nr. 1059.
—. „ „ C. erĭophŏrum Scop.; ſ. Nr. 2287.
—. „ „ Cardŭus nutans L.; ſ. Nr. 2289.
—. „ „ C. crispus L.; ſ. Nr. 2099.
—. XIX., 2; „ Senecĭo paludōsus L.; ſ. Nr. 2926.
—. „ „ S. saracenĭcus L.; ſ. Nr. 1980.
—. „ „ Gnaphalĭum lutĕo-album L.; ſ. Nr. 2411.
—. XIX., 2; Korbblütler: Tanacētum vulgāre L.; ſ. Nr. 2293.
—. „ „ Artemisĭa vulgāris L.; ſ. Nr. 2205.
—. „ „ Achillēa ptarmĭca L.; ſ. Nr. 2927.
—. „ „ Telekĭa cordifolĭa Kit.; ſ. Nr. 2564.
—. „ „ Pulicarĭa dysenterĭca Gaertn.; ſ. Nr. 2821.
—. XIX., 2; Korbblütler: Inŭla britannĭca L.; ſ. Nr. 2851.
—. „ „ I. salicĭna L.; ſ. Nr. 2222.
—. „ „ *Solidāgo procēra Sol.; ſ. Nr. 2997.
—. „ „ Bellis perēnnis L.; ſ. Nr. 2.
—. „ „ Aster salīgnus Willd.; ſ. Nr. 2928.
3063. „ „ *A. parviflōrus Nees. Kleinblütige Aſter. St. riſp.-äſtig; Stbltr. lanzettl., langzu-

gesp., entfernt-sägezähn.; Stral blaßlila, zuletzt königblau; 4; 8 bis 10; ↕; Vaterland: Nordamerika.

3064. XIX., 2; Korbblütler: *A. leucanthĕmus Desf. Weißstralige A. St. doldentraub., äußere Zweige 1köpf.; Stbltr. sitz., verläng.-lanzett-lineal., ganzrand. oder in der Mitte mit 1 bis 3 Sägezähnen; Stral milchweiß, zuletzt mit blaßroter Spitze; 4; 8 bis 10; ↕; Vaterland: Nordamerika.

—. XIX., 3; Korbblütler: Bidens tripartīta L.; s. Nr. 3062.

—. XIX., 5; „ Echīnops sphaerocephălus L.; s. Nr. 2246.

—. XXI., 1; Aronpfl.: Calla palūstris L.; s. Nr. 1146.

—. „ Najadenpfl.: Caulinĭa fragĭlis Willd.; s. Nr. 1990.

—. „ „ Zannichellĭa palūstris L.; s. Nr. 2929.

—. XXI., 1; Wasserfernpfl.: Callitrĭche stagnālis Scop.; s. Nr. 2930.

—. XXI., 1; Wasserfernpfl.: C. platycārpa Kütz.; s. Nr. 2931.

—. XXI., 1; Wasserfernpfl.: C. autumnālis L.; s. Nr. 2932.

—. „ Giftmilcher: Euphorbĭa stricta Sm.; s. Nr. 1041.

—. „ „ E. lathўris L.; s. Nr. 2301.

—. „ „ E. gerardiana Jacq.; s. Nr. 1344.

—. XXI., 2; Najadenpfl.: Ruppĭa maritĭma L.; s. Nr. 2933.

—. XXI., 3; Rohrkolbenpfl.: Sparganĭum ramōsum Huds.; s. Nr. 2934.

—. XXI., 3; Halbgras: Carex oedēri Retz.; s. Nr. 691.

—. XXI., 4; Wegerichpfl.: Littorēlla lacūstris L.; s. Nr. 2889.

3065. XXI., 5; Hornblattpfl.: Ceratophўllum demērsum L. (C. oxўacānthum Cham. et Schldl.). Rauher Igellock (Zinken, Hornblatt, Pferdeschweif). Bltr. genähert, wirtelf., gabelspalt.; Fr. eif., flügellos, 3nervig, mit 2 zurückgekr. Dornen an der Basis; Bl. blattachselst., klein; 4; 8 bis 9.

Varirt: C. gibbum Laforet (Stacheln minder gekrümmt, mit geflüg. Basis aufsitz.), in Rheingräben u. s. w.

3066. XXI., 5; Hornblattpfl.: C. platyacānthum Cham. et Schldl. Breitdorniger J. Fr. mit gezähneltem Rande auf den Seiten, geflüg., 2 flache Dornen an der Basis; 4; 8 bis 9; Hn., K. S., Brd.

—. XXI., 5; Meldenpfl.: Atrĭplex roseum L.; s. Nr. 2327.

—. „ Tannenwedelpfl.: Myriophўllum spicātum L.; s. Nr. 1940.

—. XXII., 1; Najadenpfl.: Najas major Roth; s. Nr. 2935.

—. XXIII., 1; Froſchbißpfl.: *Elodĕa canadēnsis Rich. et Mich.; ſ. Nr. 970.

a. In warmen Bächen:

—. III., 1; Halbgras: Cypērus badĭus Desf.; ſ. Nr. 2538.

b. Auf nacktem, ſterilem Flußuferſande:

—. IV., 4; Dickblattpfl.: Bulliardĭa aquatĭca DC.; ſ. Nr. 2900.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygŏnum aviculāre L.; ſ. Nr. 2255.

c. Auf Flußgeröll.

—. V., 1; Paronychienpfl.: Herniarĭa hirsūta L.; ſ. Nr. 2389.
—. V., 3; „ Corrigiŏla littorālis L.; ſ. Nr. 1348.
—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: *Oenothēra muricāta L.; ſ. Nr. 1982.
—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: Epilobĭum rosmarinifolĭum Haenke; ſ. Nr. 2509.
—. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus saxifrăga L.; ſ. Nr. 2400.
—. „ „ Saponarĭa officinālis L.; ſ. Nr. 2184.
—. X., 3; „ Silēne tatarĭca Pers.; ſ. Nr. 2936.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Ibēris amāra L.; ſ. Nr. 1494.
—. XIX., 1; Korbblütler: Chondrĭlla prenanthoīdes Vill.; ſ. Nr. 2494.
—. XXI., 5; Spitzklettenpfl.: Xanthĭum macrocārpum DC.; ſ. Nr. 2305.

d. An lehmigen Flußufern:

—. XV., 2; Kreuzblütler: Diplotāxis viminĕa DC.; ſ. Nr. 1492.

e. In ausgetrockneten Bächen, Flußbetten:

—. XIX., 2; Korbblütler: Micrŏpus erēctus L.; ſ. Nr. 1983.

f. In klaren Bächlein:

—. III., 1; Fettkrautpfl.: Montĭa fontāna L.; ſ. Nr. 683.

g. Unter Gebüſch:

—. IV., 1; Krapppfl.: Asperŭla aparīne M. B.; ſ. Nr. 2223.
—. V., 1; Schnabelpfl.: Impatĭens noli tangĕre L.; ſ. Nr. 2114.
—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: Epilobĭum parviflōrum Schreb.; ſ. Nr. 2119.
—. X., 3; Nelkenblütler: Cucubălus baccifĕrus L.; ſ. Nr. 2186.

—. XIV., 1; Lippenblümler: Lamĭum maculātum L.; ſ. Nr. 190.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Vicĭa tenuifolĭa Roth; ſ. Nr. 1229.

R¹. An und in ſtehenden Gewäſſern (Seen, Teichen u. ſ. w.): §. 564.

—. I., 1; Tannenwedelpfl.: Hippūris vulgāris L.; ſ. Nr. 2903.
—. II., 1; Waſſerſchlauchpfl.: Utricularĭa vulgāris L.; ſ. Nr. 1953.
—. II., 1; Waſſerſchlauchpfl.: U. minor L.; ſ. Nr. 2899.
—. „ „ U. intermedĭa Hayne; ſ. Nr. 1951.
—. „ Rachenblümler: Veronīca beccabūnga L.; ſ. Nr. 1954.
—. II., 1; Rachenblümler: V. anagāllis L.; ſ. Nr. 1955.
—. „ „ V. scutellāta L.; ſ. Nr. 1875.
—. „ Lippenblümler: Lycŏpus europaeus L.; ſ. Nr. 2891.
—. „ „ L. exaltātus L. fil.; ſ. Nr. 2892.
—. III., 1; Halbgras: Cypērus glomerātus L.; ſ. Nr. 2948.
—. „ „ C. fuscus L.; ſ. Nr. 2831.
—. „ „ C. longus L.; ſ. Nr. 2904.
—. „ „ Schoenus marīscus L.; ſ. Nr. 2874.
—. „ „ Scirpus palūstris L.; ſ. Nr. 1876.
—. „ „ Sc. aciculāris L.; ſ. Nr. 1950.
—. „ „ *Sc. parvŭlus R. et Sch.; ſ. Nr. 2939.
—. „ „ Sc. fluĭtans L.; ſ. Nr. 1956.
—. „ „ Sc. setacĕus L.; ſ. Nr. 2832.
—. „ „ Sc. holoschoenus L.; ſ. Nr. 2833.
—. „ „ Sc. tabernaemontāni Gmel.; ſ. Nr. 1957.
—. „ „ Sc. trigōnus Roth.; ſ. Nr. 1958.
—. „ „ Sc. mucronātus L.; ſ. Nr. 2907.
—. „ „ Sc. micheliānus L.; ſ. Nr. 2908.
—. „ „ Sc. maritĭmus L.; ſ. Nr. 2909.
—. III., 2; Graspfl.: Coleānthus subtīlis Seid.; ſ. Nr. 2910.
—. „ „ Calamagrōstis epigeios Roth; ſ. Nr. 2170.
—. III., 2; Graspfl.: C. littorĕa DC.; ſ. Nr. 2911.
—. „ „ C. lanceolāta Roth; ſ. Nr. 2835.
—. „ „ Phragmītes commūnis L.; ſ. Nr. 2912.
—. „ „ Glycerĭa fluĭtans Scop.; ſ. Nr. 1960.
—. „ „ Gl. aquatĭca Whlbg.; ſ. Nr. 2914.
—. „ „ Brachypodĭum loliacĕum R. et Sch.; ſ. Nr. 1887.
—. IV., 1; Krapppfl.: Galĭum uliginōsum L.; ſ. Nr. 1889.
—. „ Nachtfernzenpfl.: Isnardĭa palūstris L.; ſ. Nr. 2897.
—. IV., 4; Najadenpfl.: Potămogēton natans L.; ſ. Nr. 1963.

—. IV., 4; Najadenpfl.: P. heterophȳllus Schreb.; ſ. Nr. 1965.
—. „ „ P. plantaginĕus du Croz.; ſ. Nr. 1985.
—. „ „ P. lucens L.; ſ. Nr. 1966.
—. „ „ P. perfoliātus L.; ſ. Nr. 1967.
—. „ „ P. crispus L.; ſ. Nr. 1968.
—. „ „ P. comprēssus L.; ſ. Nr. 2917.
—. „ „ P. obtusifolĭus Koch; ſ. Nr. 1969.
—. „ „ P. pusīllus L.; ſ. Nr. 2918.
—. „ „ P. trichoīdes Cham. et Schldl.; ſ. Nr. 2940.
—. IV., 4; Najadenpfl.: P. pectinātus L.; ſ. Nr. 1970.
—. „ „ P. marīnus L.; ſ. Nr. 2941.
—. „ „ P. densus L.; ſ. Nr. 1987.
—. V., 1; Nachtſchattenpfl.: Solānum dulcamāra L.; ſ. Nr. 1197.
—. V., 1; Borretſchpfl.: Myosōtis palūstris With.; ſ. Nr. 1891.
—. „ „ M. caespitōsa Schultz; ſ. Nr. 1926.
—. „ Enzianpfl.: Limnanthĕmum nymphaeoīdes Lk.; ſ. Nr. 1927.
—. V., 1; Glockenblümler: Lobelĭa dortmānna L.; ſ. Nr. 2879.
—. V., 2; Doldenpfl.: Helosciadĭum nodiflōrum Koch; ſ. Nr. 2920.
—. V., 2; Doldenpfl.: Aegopodĭum podagrarĭa L.; ſ. Nr. 1012.
—. V., 2; Doldenpfl.: Oenānthe phellandrĭum Lamk.; ſ. Nr. 2881.
—. V., 2; Doldenpfl.: Oe. fistulōsa L.; ſ. Nr. 1893.
—. „ „ Peucedănum palūstre Mnch.; ſ. Nr. 2160.
—. V., 5; Sonnenthaupfl.: Aldrovānda vesiculōsa L.; ſ. Nr. 2942.
—. VI., 1; Semede: Juncus obtusiflōrus Ehrh.; ſ. Nr. 1527.
—. „ „ J. alpīnus Vill.; ſ. Nr. 1831.
—. „ „ J. uliginōsus Roth; ſ. Nr. 1050.
—. „ „ J. comprēssus Jacq.; ſ. Nr. 1863.
—. „ Weiderichpfl.: Peplis portŭla L.; ſ. Nr. 2819.
—. VI., 3; Knöterichpfl.: Rumex maritĭmus L.; ſ. Nr. 1899.
—. „ „ R. palūstris Sm.; ſ. Nr. 2841.
—. VI., 5; Löffelpfl.: Alīsma natans L.; ſ. Nr. 1944.
—. „ „ A. plantāgo L.; ſ. Nr. 1972.
—. „ „ A. parnassifolĭum L.; ſ. Nr. 2886.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygŏnum amphibĭum L.; ſ. Nr. 2843.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: P. hydropiper L.; ſ. Nr. 2117.

—. VIII., 1; Nachtkerzenpfl.: * Oenothēra biennis L.; ſ. Nr. 2256.
—. VIII., 4; Tännelpfl.: Elatine alsināstrum L.; ſ. Nr. 2887.
—. „ „ E. hexāndra DC.; ſ. Nr. 1973.
—. „ „ E. triāndra Schkhr.; ſ. Nr. 2901.
—. „ „ E. hydropīper L.; ſ. Nr. 1952.
—. IX., 3; Waſſerlieſchpfl.: Butŏmus umbellatus L.; ſ. Nr. 1974.
—. X., 2; Nelkenblütler: Gypsophīla murālis L.; ſ. Nr. 2234.
—. X., 5; „ Cerastĭum vulgātum L. spec.; ſ. Nr. 463.
—. XII., 3; Roſenpfl.: Geum urbānum L.; ſ. Nr. 1077.
—. „ „ Potentīlla supīna L.; ſ. Nr. 1369.
—. „ „ P. mixta Nolte; ſ. Nr. 2276.
—. XIII., 1; Nixenpfl.: Nymphaea alba L.; ſ. Nr. 1976.
—. „ „ Nuphar lutĕum Sm.; ſ. Nr. 1977.
—. „ „ N. pumĭlum Sm.; ſ. Nr. 2943.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Ranuncŭlus tripartītus DC.; ſ. Nr. 1988.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: R. aquatĭlis L.; ſ. Nr. 1978.
—. „ „ R. lingŭa L.; ſ. Nr. 2922.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Mentha arvēnsis L.; ſ. Nr. 2213.
—. „ „ M. pulegĭum L.; ſ. Nr. 2820.
—. „ „ Scutellarĭa galericulāta L.; ſ. Nr. 2122.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Limosēlla aquatĭca L.; ſ. Nr. 2898.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Lindernĭa pyxidarĭa All.; ſ. Nr. 2902.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Scrophularĭa aquatĭca L.; ſ. Nr. 2925.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Nasturtĭum officināle R. Br.; ſ. Nr. 954.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolĭum fragifĕrum L.; ſ. Nr. 1908.
—. „ „ Galēga officinālis L.; ſ. Nr. 1349.
—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperīcum tetraptĕrum Fr.; ſ. Nr. 2128.
—. XIX., 1; Korbblütler: Cirsĭum palūstre Scop.; ſ. Nr. 1059.
—. XIX., 2; „ Senecĭo paludōsus L.; ſ. Nr. 2926.
—. „ „ Artemisĭa vulgāris L.; ſ. Nr. 2205.
—. „ „ Pulicarĭa dysenterĭca Gaertn.; ſ. Nr. 2821.
—. XIX., 2; Korbblütler: Bellis perēnnis L.; ſ. Nr. 2.
—. XIX., 3; „ Bidens tripartīta L.; ſ. Nr. 3062.

—. XXI., 1; Najadenpfl.: Caulinĭa fragĭlis Willd.; ſ. Nr. 1990.
3067. „ „ C. flexĭlis Willd. (Najas flex. Rostk. et Schmidt). Biegſame Kaulinie. St. biegſam; Bltr. ſehr fein-ſtachelſp.-gezähnelt, zu 3 oder mehren, ſchmal-lineal.; ⊙; 8 bis 9; Po., Brd.
—. XXI., 1; Najadenpfl.: Zannichellĭa palūstris L.; ſ. Nr. 2929.
—. XXI., 1; Najadenpfl.: Z. pedicellāta Whlbg.; ſ. Nr. 2944.
—. „ Waſſerſternpfl.: Callitrĭche verna L.; ſ. Nr. 948.
—. „ „ C. platycārpa Kütz.; ſ. Nr. 2931.
—. „ „ C. autumnālis L.; ſ. Nr. 2932.
—. XXI., 2; Najadenpfl.: Ruppĭa maritĭma L.; ſ. Nr. 2933.
—. XXI., 3; Rohrkolbenpfl.: Sparganĭum ramōsum Huds.; ſ. Nr. 2934.
—. XXI., 3; Rohrkolbenpfl.: Sp. natans L.; ſ. Nr. 2945.
—. XXI., 4; Wegerichpfl.: Littorēlla lacūstris L.; ſ. Nr. 2889.
—. XXI., 5; Hornblattpfl.: Ceratophўllum demērsum L.; ſ. Nr. 3065.
3068. XXI., 5; Hornblattpfl.: C. submērsum L. (C. mutĭcum Cham. et Schldl.). Glatter Igellock (Hornblatt, Zinken). Bltr. lebhaft grün, entfernt-wirtelſ., 3mal-gabelſpalt., in 5 bis 8 fadenf. Lappen getheilt; Fr. eif., flügellos, an der Baſis ohne Dorn; 4; 8 bis 9.
—. XXI., 5, Tannenwedelpfl.: Myriophўllum spicātum L.; ſ. Nr. 1940.
—. XXI., 5; Tannenwedelpfl.: M. verticillātum L.; ſ. Nr. 2946.
—. XXII., 1; Najadenpfl.: Najas major Roth; ſ. Nr. 2935.
—. XXII., 8; Nixenpfl.: Hydrochăris morsus ranae L.; ſ. Nr. 2947.
—. XXIII., 1; Froſchbißpfl.: *Elodĕa canadēnsis Rich. et Mich.; ſ. Nr. 970.

a. In Tümpeln, Pfützen und Lachen:

—. III., 1; Halbgras: Scirpus supīnus L.; ſ. Nr. 2876.
—. IV., 4; Najadenpfl.: Potămogēton densus L.; ſ. Nr. 1987.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Limosēlla aquatĭca L.; ſ. Nr. 2898.
—. XXI., 1; Najadenpfl.: Caulinĭa fragĭlis Willd.; ſ. Nr. 1990.
—. XXI., 1; Waſſerſternpfl.: Callitrĭche verna L.; ſ. Nr. 948.
—. XXII., 1; Najadenpfl.: Najas major Roth; ſ. Nr. 2935.

§. 565. **S[1]. An ſalzhaltigen Orten des Binnenlandes:**

3069. II., 1; Meldenpfl.: Salicornĭa herbacĕa L. Krautartiges Glasſchmalz. St. krautartig, geglied., äſtig;

Gelenke zſgedr., ausgerand.; Gelenkglieder umgekehrt-kegelf.; Bl. in fleiſch. Aehren, mit Deck.-geſtellter Hülle; ⊙; 8 bis 9.
—. III., 2; Graspfl.: Glyceria distans Whlbg.; ſ. Nr. 1886.
—. IV., 1; Wegerichpfl.: Plantago maritima L.; ſ. Nr. 1993.
—. „ „ P. coronopus L ; ſ. Nr. 2862.
—. V., 1; Schlüſſelblümler: Samolus valerandi L.; Nr. 2863.
—. V., 1; Enzianpfl.: Erythraea linariaefolia Pers.; ſ. Nr. 1994.
3070. V., 2; Meldenpfl.: Suaeda chenopodioides M. B. (Schoberia maritima C. A. M., Chenopodium maritimum L., Chenopodina maritima Moq. Tand., Suaeda marit. Dum.). Meldenartige Soda (Schoberie). St. ſtaudenartig, äſtig; Bltr. wechſelſt., fleiſch., halbwalzenf., ſpitzl.; Bl. ſehr klein, meiſt zu 3 blattachſelſt.; ⊙; 8 bis 9.
—. V., 2; Meldenpfl.: Salsola kali L.; ſ. Nr. 2919.
—. „ Doldenpfl.: Bupleurum tenuissimum L.; ſ. Nr. 2864.
—. V., 5; Leinpfl.: Linum maritimum L.; ſ. Nr. 3058.
—. VI., 1; Semede: Juncus bottnicus Whlbg.; ſ. Nr. 2883.
—. VI., 3; Junkaginee: Triglochin maritimum L.; ſ. Nr. 1949.
—. X., 3; Nelkenblütler: Spergularia salina Presl.; ſ. Nr. 2822.
—. X., 3; Nelkenblütler: Sp. marginata Kitt.; ſ. Nr. 2949.
—. X., 4; „ Sagina maritima Sm.; ſ. Nr. 635.
—. XVI., 5; Pappelroſenpfl.: Althaea officinalis L.; ſ. Nr. 2214.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Melilotus dentata Pers.; ſ. Nr. 2281.
—. XIX., 1; Korbblütler: Lactuca saligna L.; ſ. Nr. 2283.
—. XIX., 2; „ Senecio aquaticus Huds.; ſ. Nr. 2827.
—. XIX., 2; Korbblütler: Artemisia rupestris L.; ſ. Nr. 2823.
—. „ „ A. laciniata L.; ſ. Nr. 2865.
3071. „ „ Aster tripolium L. (A. pannonicus Jacq., Tripolium vulgare Nees). Strand-Aſter. Graugrün; St. kahl; Bltr. etwas fleiſch., kahl; innere Bltchn. des Hauptk. ſtumpf, letzterer angedr.-dachzieg.; Stral blau; Scheibe gelb; 4 (♃); 8 bis 9; †.
—. XXI., 5; Meldenpfl.: Atriplex oblongifolium W. et K.; ſ. Nr. 2303.
—. XXI., 5; Meldenpfl.: A. littorale L.; ſ. Nr. 2893.
3072. „ „ A. pedunculata L. (Halimus pedunculatus Wallr., Obione pedunculata Moq. Tand., Diotis atriplicina Spr.). Stielfrüchtige Melde

(Keilmelde, Halimus). St. krautig, ſperrig-äſtig; Bltr. längl., ſtumpf, ganzrand.; ♀ K. geſtielt, Lappen keilf., zurückgebog.; ⊙; 8 bis 10.

§. 566. **T[1]. Am Meeresſtrande:**

—. I., 1; Tannenwedelpfl.: Hippūris vulgāris L.; ſ. Nr. 2903.
—. II., 1; Meldenpfl.: Salicornĭa herbacĕa L.; ſ. Nr. 3069.
—. „ Nachenblümler: Veronĭca maritĭma L.; ſ. unter Nr. 2212.
—. III., 1; Halbgras: Scirpus maritĭmus L.; ſ. Nr. 2909.
—. III., 2; Graspfl.: Agrōstis stoloniferа L.; ſ. Nr. 2154.
—. „ „ Calamagrōstis baltĭca Lk.; ſ. Nr. 2950.
—. „ „ Polypōgon littorālis Sm.; ſ. Nr. 2951.
—. „ „ Poa procūmbens Sm.; ſ. Nr. 1997.
—. „ „ Glycerĭa distans Whlbg.; ſ. Nr. 1886.
—. „ „ G. maritĭma Whlbg.; ſ. Nr. 2952.
—. „ „ Tritĭcum rigĭdum Schrad.; ſ. Nr. 2915.
—. „ „ T. acūtum DC.; ſ. Nr. 1999.
—. „ „ T. juncĕum L.; ſ. Nr. 2002.
—. „ „ Elўmus arenarĭus L.; ſ. Nr. 2916.
—. IV., 1; Wegerichpfl.: Plantāgo maritĭma L.; ſ. Nr. 1993.
—. „ „ P. coronŏpus L.; ſ. Nr. 2862.
—. „ „ P. arenarĭa W. et K.; ſ. Nr. 2384.
—. IV., 4; Najadenpfl.: Potămogēton marīnus L.; ſ. Nr. 2941.
—. V., 1; Windenpfl.: Convolvŭlus soldanēlla L.; ſ. Nr. 2954.
—. V., 1; Enzianpfl.: Erythraea linariaefolĭa Pers.; ſ. Nr. 1994.
—. V., 1; Enzianpfl.: E. spicāta Pers.; ſ. Nr. 2955.
—. V., 2; Meldenpfl.: Beta maritĭma L.; ſ. Nr. 2956.
—. „ „ Kochĭa hirsūta Nolte; ſ. Nr. 2957.
3073. „ „ Corispērmum intermedĭum Schwgg. Baltiſcher Wanzenſamen (Tremſamen). Bltr. und untere Deckbltr. lineal., ſtachelſp.; Nußflügel breit, durchſcheinend, an der Spitze ganzrand.; Aehren gipfel- und blattachſelſt.; ⊙; 8; Pr.
—. V., 2; Meldenpfl.: Suaeda chenopodoĭdes M. B.; ſ. Nr. 3070.
—. V., 2; Meldenpfl.: Salsŏla kali L.; ſ. Nr. 2919.
—. „ „ S. soda L.; ſ. Nr. 2958.
—. „ Doldenpfl.: Eryngĭum maritĭmum L.; ſ. Nr. 2003.
—. „ „ Bupleurum tenuissĭmum L.; ſ. Nr. 2864.
—. „ „ Crithmum maritĭmum L.; ſ. Nr. 2959.

—. V., 5; Bleiwurzpfl.: Statice limonium L.; ſ. Nr. 2960.
—. „ Leinpfl.: Linum maritimum L.; ſ. Nr. 3058.
—. VI., 1; Semede: Juncus balticus Willd.; ſ. Nr. 2004.
—. „ „ J. alpinus Vill.; ſ. Nr. 1831.
—. „ „ J. bottnicus Whlbg.; ſ. Nr. 2883.
—. „ „ J. maritimus Lam.; ſ. Nr. 2961.
—. VI., 3; Junkaginee: Triglochin maritimum L.; ſ. Nr. 1949.
—. VI., 3; Knöterichpfl.: Rumex maritimus L.; ſ. Nr. 1899.
—. X., 3; Nelkenblütler: Spergularia salina Presl.; ſ. Nr. 2822.
—. X., 3; Nelkenblütler: Sp. marginata Kitt.; ſ. Nr. 2949.
—. X., 4; „ Sagina maritima Sm.; ſ. Nr. 973.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Stachys maritima L.; ſ. Nr. 2006.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Linaria loeselii Schwgg.; ſ. Nr. 2962.
—. XIV., 2; Rachenblümler: L. striata DC.; ſ. Nr. 2240.
3074. XV., 1; Kreuzblütler: Cakile maritima Scop. (Bunias cakile L.). Gewöhnlicher Meerſenf. St. äſtig, aufſteig.; Bltr. fleiſch., fiederſpalt., mit lineal. Lappen, oder fiederſpalt. bis ganzrand.; Bl. violet bis weiß; ☉; 8; Oſt- und Nordſee.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolium vesiculosum Savi; ſ. Nr. 2007.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: *Pisum maritimum L.; ſ. Nr. 2964.
—. XIX., 2; Korbblütler: Senecio aquaticus Huds.; ſ. Nr. 2827.
3075. XIX., 2; Korbblütler: Artemisia coerulescens L. Bläulicher Beifuß. Raſenbildend; St. ſtrauchig, feinſeidenhaarig-ſpitz.; Stbltr. ungetheilt, lanzettl., grau; Köpfchen längl., aufr. oder nickend; Bl. gelb; 4; 8 bis 9; Trieſt.
—. XIX., 2; Korbblütler: Inula crithmoides L.; ſ. Nr. 2965.
—. „ „ I. britannica L.; ſ. Nr. 2851.
—. „ „ Aster tripolium L.; ſ. Nr. 3071.
—. XXI., 1; Najadenpfl.: Zostera marina L.; ſ. Nr. 2009.
—. „ „ Z. nana Roth; ſ. Nr. 2010.
—. „ „ Z. noltei Hornem.; ſ. Nr. 2011.
—. „ „ Caulinia flexilis Willd.; ſ. Nr. 3067.
—. „ „ Zannichellia palustris L.; ſ. Nr. 2929.
—. XXI., 1; Najadenpfl.: Z. polycarpa Nolte; ſ. Nr. 2966.
—. „ „ Z. pedicellata Whlbg.; ſ. Nr. 2944.

—. XXI., 1; Giftmilcher: Euphorbĭa peplis L.; ſ. Nr. 2967.
—. XXI., 2; Najadenpfl.: Ruppĭa maritĭma L.; ſ. Nr. 2933.
—. XXI., 3; Halbgras: Carex extēnsa Good.; ſ. Nr. 2968.
—. XXI., 4; Wegerichpfl.: Littorēlla lacūstris L.; ſ. Nr. 2889.
—. XXI., 5; Meldenpfl.: Atrĭplex pedunculāta L.; ſ. Nr. 3072.
—. „ „ A. littorāle L.; ſ. Nr. 2893.
3076. „ „ A. portulacoīdes L. (Halĭmus port. Wallr., Obiōne port. Moq. Tand.). Portulakartige Melde (Keilmelde). St. halbſtrauch.; Bltr. längl.-verk.-eif. bis lanzettl.; ♀ K. ſitz., deltaf., 3lapp., weichſtach.; ♄; 8 bis 10; Oſt- und Nordſee.
—. XXII., 1; Najadenpfl.: Najas major Roth; ſ. Nr. 2935.
3077. XXII., 6; Spargelpfl.: Smilax aspĕra L. Gemeine Stechwinde. Strauch mit kant., rückw.-ſtachel. St., der im Zickzack aufſteigt; Nebenbltr. rankend; Bltr. geſtielt, aus herzf. Baſis langzugeſp., 5nervig, ſtachelrand.; Bl. in blattachſel- und gipfelſt. Trauben, grünlichweiß; Beere rot; ♄; 8 bis 9; Trieſt.

a. Unter der Saat in der Nähe des Meeres:

—. V., 2; Doldenpfl.: Bupleurum semicomposĭtum L.; ſ. Nr. 2969.

b. Auf Sanddünen:

—. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus arenarĭus L.; ſ. Nr. 1501.

c. Auf Ballaſterde:

—. XIX., 1; Korbblütler: Cardŭus tenuiflōrus Sm.; ſ. Nr. 1340.

§. 567. **U[1]. Kulturpflanzen:**

a. In Gemüſegärten:

—. V., 2; Doldenpfl.: *Anēthum graveŏlens L.; ſ. Nr. 2019.
—. „ „ Pastināca satīva L.; ſ. Nr. 2058.
—. VI., 1; Lilienpfl.: *Allĭum ampeloprāsum L.; ſ. Nr. 2971.
—. „ „ *A. rotūndum L.; ſ. Nr. 2972.
—. „ „ *A. cepa L.; ſ. Nr. 2024.
—. „ „ A. oleracĕum L.; ſ. Nr. 2339.
—. „ „ A. schoenoprāsum L.; ſ. Nr. 1654.
—. VI., 3; Knöterichpfl.: *Rumex patientĭa L.; ſ. Nr. 2273.
—. VIII., 1; Rautenpfl.: Ruta graveŏlens L.; ſ. Nr. 2569.
—. XI., 1; Fettkrautpfl.: Portulaca oleracĕa L.; ſ. Nr. 1269.
—. „ „ P. satīva Haw.; ſ. Nr. 2025.
3078. XIV., 1; Lippenblümler: *Origănum majorāna L.

Majoran (Meiran, Wurstkraut). Bltr. gestielt, ellipt.-stumpf, beiders. grausilz.; K. halbirt, zahnlos; Bl. rötlich-weiß; ⊙ und ♃; 8 bis 9; ⚘; ♄; Vaterland: Nordafrika.*)

Varirt: O. majoranoīdes Auct. (Winter-M.; weniger filzig).

—. XIV., 1; Lippenblümler: *Saturēja hortēnsis L.; s. Nr. 2973.

—. XIV., 1; Lippenblümler: S. montāna L.; s. Nr. 2464.

—. " " Dracocephălum moldavĭca L.; s. Nr. 2147.

—. XV., 2; Kreuzblütler: Nasturtĭum officināle R. Br.; s. Nr. 954.

—. XV., 2; Kreuzblütler: Raphănus satīvus L.; s. Nr. 2027.

—. XVII., 4; Hülsenpfl.: *Tetragonolŏbus purpurĕus Mnch.; s. Nr. 2974.

—. XVII., 4; Hülsenpfl.: *Phaseŏlus vulgāris L.; s. Nr. 1447.

—. XVII., 4; Hülsenpfl.: *Ph. multiflōrus Willd.; s. Nr. 1448.

—. XIX., 1; Korbblütler: *Cichorĭum endivĭa L.; s. Nr. 2975.

—. XIX., 1; Korbblütler: *Lactūca satīva L.; s. Nr. 2976.

—. XIX., 2; " *Artemisĭa abrotănum L.; s. Nr. 3023.

3079. XIX., 2; Korbblütler: *A. dracuncŭlus L. Estragon (Dragon-Beifuß, Dragon, Schlangenkraut, Kaisersalat). St. krautig, aufr., rispig; Bltr. kahl, lanzettl., stengelst. ganzrand.; Köpfchen fast kug., überhäng., weißl.; ♃; 8 bis 9; ⚘; Vaterland: Sibirien.

—. XXI., 5; Meldenpfl.: *Atrĭplex hortēnse L.; s. Nr. 2260.

—. XXI., 9; Kürbispfl.: *Cucŭmis satīvus L.; s. Nr. 2366.

—. " " *C. melo L.; s. Nr. 2977.

—. " " *Cucurbĭta pepō L.; s. Nr. 2367.

—. " " *C. verrucōsa L.; s. Nr. 2978.

—. " " *C. melopĕpo L.; s. Nr. 1576.

—. " " *C. maxĭma Duch.; s. Nr. 2030.

b. In Blumengärten, Anlagen u. dergl.:

—. V., 1; Glockenblümler: Campanŭla pyramidālis L.; s. Nr. 2227.

---

*) Nach Catull war der Majoran zu Kränzen bei Hochzeiten der Alten beliebt!

—. V., 1; Rebenpfl.: *Ampelōpsis quinquefolĭa R. et Sch.; ſ. Nr. 2174.
—. V., 3; Terebintenpfl.: *Rhus coriarĭa L.; ſ. Nr. 2979.
—. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus plumarĭus L.; ſ. Nr. 2428.
—. X., 3; „ Silēne armerĭa L.; ſ Nr. 2550.
—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: *Delphinĭum ajācis L.; ſ. Nr. 1398.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Adōnis autumnālis L.; ſ. Nr. 1302.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Lavandŭla spica L.; ſ. Nr. 2492.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Melissa officinālis L.; ſ. Nr. 2188.
—. XV., 2; Kreuzblütler: *Matthiōla incāna R. Br.; ſ. Nr. 108.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Lathўrus latifolĭus L.; ſ. Nr. 2481.

c. In Obſtgärten, Plantagen:

—. XVIII., 1; Goldäpfelpfl.: *Citrus medĭca Riss.; ſ. Nr. 2980.
—. XVIII., 1; Goldäpfelpfl.: *C. limētta Riss.; ſ. Nr. 2981.
—. „ „ *C. limonĭum Riss.; ſ. Nr. 2982.
—. „ „ *C. vulgāris Riss.; ſ. Nr. 2983.
—. „ „ *C. aurantĭum Riss.; ſ. Nr. 2984.

d. Als Beerenobſt:

—. XII., 3; Roſenpfl.: Rubus idaeus L.; ſ. Nr. 396.

e. In Grasgärten:

—. V., 2; Doldenpfl.: Levistĭcum officināle Koch; ſ. Nr. 2985.

§. 568. **VI. Schmarotzer:**

a. Auf Carduus deflorātus:

—. XIV., 2; Braunſchupper: Orobānche sautēri F. Schultz; ſ. Nr. 2033.

b. Auf Labiaten, Helianthĕmum, Cytĭsus, Geranĭum:

—. XIV., 2; Braunſchupper: O. epithўmum DC.; ſ. Nr. 2035.

c. Auf Artemisĭa campēstris:

—. XIV., 2; Braunſchupper: O. arenarĭa Borkh.; ſ. Nr. 2986.

d. Auf Hanf, Tabak, Nachtschatten, Klee u. s. w.:

—. XIV., 2; Braunschupper: O. ramōsa L.; s. Nr. 2046.

e. In Tannenwäldern:

—. XIV., 2; Braunschupper: O. neottioïdes Saut.; s. Nr. 2990.

f. Auf Weidengebüschen:

—. V., 2; Windenpfl.: Cuscŭta monogўna Vahl; s. Nr. 2048.

g. Auf Nesseln, Hanf, Hopfen, Wicken, Weiden u. s. w.:

—. V., 2; Windenpfl.: C. europaea L.; s. Nr. 2991.

h. Auf Nesseln, Hopfen, Weiden:

—. V., 2; Windenpfl.: C. schkuhriāna Pfeiff.; s. Nr. 2992.

i. Auf Lein:

—. V., 2; Windenpfl.: C. epilīnum Weihe; s. Nr. 2993.

k. Auf Quendel, Heide, Ginster, Wicken, Gras u. s. w.:

—. V., 2; Windenpfl.: C. epithўmum Sm.; s. Nr. 2049.

l. Auf Luzerne:

3080. V., 2; Windenpfl.: *C. suaveŏlens Ser. Wohlriechende Flachsseide (Luzernewürger). St. ästig, glatt, wachsgelb, fadendünn; Bl. gestielt, büschelig-gehäuft, weiß; Röhre der Blkr. glockig, durch zweigende, geschlitzte Schuppen geschlossen; ☉ 8 bis 9; Vaterland: Amerika.*)

September.

A. In Wäldern: §. 569.

—. IV., 1; Kardenpfl.: Scabiōsa transsylvanĭca L.; s. Nr. 2052.

—. IV., 1; Krapppfl.: Galĭum mollūgo L.; s. Nr. 1006.

—. V., 2; Doldenpfl.: Aegopodĭum podagrarĭa L.; s. Nr. 1012.

—. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus supērbus L.; s. Nr. 1016.

*) Ist mit Luzernesamen eingeschleppt und eigentlich nur Abart von C. racemosa Mart. (C. hassiaca Pfeiff., Cuscutina suaveolens Pfeiff.)!

—. XIII., 2; Gichtroſenpfl.: Cimicifŭga foetida L.; ſ. Nr. 2062.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Chaitūrus marrubiāstrum Rchb.; ſ. Nr. 2064.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranium bohemicum L.; ſ. Nr. 1028.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Cytisus ramentacĕus Sieb.; ſ. Nr. 2995.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracium boreāle Fr.; ſ. Nr. 2996.
—. XIX., 1; Korbblütler: Cardŭus deflorātus L.; ſ. Nr. 2074.
—. XIX., 2; „ Solidāgo virga-aurĕa L.; ſ. Nr. 2077.
—. „ „ *S. procēra Sol.; ſ. Nr. 2997.
—. XXI., 1; Giftmilcher: Euphorbia stricta Sm.; ſ. Nr. 1041.

a. In feuchten Wäldern:

—. III., 1; Halbgras: Cypērus flavēscens L.; ſ. Nr. 1143.
—. V., 2; Doldenpfl.: Angelica sylvēstris L.; ſ. Nr. 2115.
—. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus supērbus L.; ſ. Nr. 1016.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranium robertiānum L.; ſ. Nr. 431.

b. An feuchten Stellen:

—. II., 1; Rachenblümler: Veronica serpyllifolia L.; ſ. Nr. 424.
—. III., 2; Graspfl.: Leersia oryzoides Sw.; ſ. Nr. 2999.
—. „ „ Molinia coerulĕa Mnch.; ſ. Nr. 2112.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygŏnum hydropīper L.; ſ. Nr. 2117.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: P. minus Huds.; ſ. Nr. 2118.

c. In ſchattigen Wäldern:

—. XIV., 2; Rachenblümler: Scrophularia nodōsa L.; ſ. Nr. 1069.

d. In lichten Wäldern:

—. XII., 3; Roſenpfl.: Geum urbānum L.; ſ. Nr. 1077.
—. XIX., 1; Korbblütler: Leontŏdon vulgāris Kitt.; ſ. Nr. 1079.
—. XIX., 2; Korbblütler: Senecio sylvaticus L.; ſ. Nr. 1080.

e. In trocknen, ſteinigen Wäldern:

—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperīcum pulchrum L.; ſ. Nr. 1089.

f. An steinigen Waldorten:

—. XIV., 2; Nachenblümler: Antirrhinum majus L.; s. Nr. 1091.

g. Auf Waldwiesen:

—. III., 2; Graspfl.: Molinia coerulea Mnch.; s. Nr. 2112.

h. An Bäumen:

3081. V., 1; Aralienpfl.: Hedera helix L. Gemeiner Efeu (Eppig, Zaunwinde, Wintergrün). St. wurzel-faserig, hoch kletternd; Blr. lederig, kahl, glänz., eckig-blapp.; Bl. grün; Beere schwarz, bereift, im Frühlinge reifend; ♄; 9 bis 11; ↕; †.

i. An Waldrändern:

—. IV., 1; Kardenpfl.: Dipsacus pilosus L.; s. Nr. 2079.
—. „ „ Scabiosa columbaria L.; s. Nr. 2080.
—. „ Krapppfl.: Galium mollugo L.; s. Nr. 1006.
—. V., 1; Borretschpfl.: Echium vulgare L.; s. Nr. 1108.
—. X., 2; Nelkenblütler: Dianthus deltoides L.; s. Nr. 1111.
—. X., 3; „ Melandrium pratense Roehl.; s. Nr. 1113.
—. X., 5; Nelkenblütler: Cerastium vulgatum L. spec.; s. Nr. 463.
—. XI., 2; Rosenpfl.: Agrimonia procera Wallr.; s. Nr. 1115.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Thymus serpyllum L.; s. Nr. 2088.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Lamium album L.; s. Nr. 169.
—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Trifolium hybridum L.; s. Nr. 469.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracium virescens Sond.; s. Nr. 3000.
—. XIX., 1; Korbblütler: H. umbellatum L.; s. Nr. 2095.
—. „ „ Chondrilla juncea L.; s. Nr. 2096.
—. „ „ Cirsium acaule All.; s. Nr. 2097.
—. XIX., 2; „ Senecio sylvaticus L.; s. Nr. 1080.
—. „ „ Achillea millefolium L.; s. Nr. 2101.
—. „ „ Solidago virga-aurea L.; s. Nr. 2077.
—. „ „ Bellis perennis L.; s. Nr. 2.

k. Auf feuchten Waldäckern:

—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hypericum humifusum L.; s. Nr. 2134.

l. In lichten Bergwäldern:

—. IV., 1; Kardenpfl.: Scabiōsa sylvatĭca L.; ſ. Nr. 2141.
—. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus supērbus L.; ſ. Nr. 1016.
—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: Aconĭtum lycoctŏnum L.; ſ. Nr. 2153.

m. In Gebirgswäldern:

—. IV., 1; Krapppfl.: Asperŭla tinctorĭa L.; ſ. Nr. 2143.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum lucĭdum L.; ſ. Nr. 504.
—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperĭcum pulchrum L.; ſ. Nr. 1089.

n. In hohen, feuchten Gebirgswäldern:

—. V., 1; Schlüſſelblümler: Soldanēlla montāna Willd.; ſ. Nr. 496.

§. 570. **B. In Hainen:**

—. IV., 1; Krapppfl.: Galĭum aparīne L.; ſ. Nr. 2155.
—. V., 2; Doldenpfl.: Aegopodĭum podagrarĭa L.; ſ. Nr. 1012.
—. X., 5; Nelkenblütler: Cerastĭum vulgātum L. spec.; ſ. Nr. 463.
—. XII., 3; Roſenpfl.: Geum urbānum L.; ſ. Nr. 1077.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum robertiānum L.; ſ. Nr. 431.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum pilosēlla L.; ſ. Nr. 1181.
—. XIX., 1; Korbblütler: H. umbellātum L.; ſ. Nr. 2095.
—. „ „ H. boreāle Fr.; ſ. Nr. 2996.

a. In graſigen Hainen:

—. XIX., 3; Korbblütler: Centaurēa nigra L.; ſ. Nr. 2162.

b. In Gebirgshainen:

—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: Aconĭtum lycoctŏnum L.; ſ. Nr. 2153.
—. XIX., 3; Korbblütler: Centaurēa phrygĭa L.; ſ. Nr. 2163.

§. 571. **C. In Nadelwäldern:**

—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum pilosēlla L.; ſ. Nr. 1181.

D. In Gebüschen, Hecken, Zäunen u. dergl.: §. 572.

—. II., 1; Lippenblümler: Salvĭa verticillāta L.; ſ. Nr. 1191.
—. IV., 1; Kardenpfl.: Dipsăcus pilōsus L.; ſ. Nr. 2079.
—. „ Krapppfl.: Galĭum mollūgo L.; ſ. Nr. 1006.
—. „ „ G. aparīne L.; ſ. Nr. 2155.
—. V., 1; Nachtſchattenpfl.: Hyoscyămus niger L.; ſ. Nr. 1195.
—. V., 1; Bleiwurzpfl.: Plumbāgo europaea L.; ſ. Nr. 3012.
—. „ Veilchenpfl.: Viŏla tricŏlor L.; ſ. Nr. 525.
—. V., 2; Doldenpfl.: Aegopodĭum podagrarĭa L.; ſ. Nr. 1012.
—. V., 2; Doldenpfl.: Pimpinēlla saxifrăga L.; ſ. Nr. 2176.
—. „ „ Bupleurum falcātum L.; ſ. Nr. 3003.
—. „ „ Peucedănum alsatĭcum L.; ſ. Nr. 1202.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygŏnum dumetōrum L.; ſ. Nr. 2183.
—. X., 2; Nelkenblütler: Saponarĭa officinālis L.; ſ. Nr. 2184.
—. „ „ Vaccarĭa pyramidata Fl. Wett.; ſ. Nr. 2185.
—. X., 3; Nelkenblütler: Melandrĭum pratēnse Roehl.; ſ. Nr. 1113.
—. X., 3; Nelkenblütler: Cucubălus baccifĕrus L.; ſ. Nr. 2186.
—. X., 5; Nelkenblütler: Cerastĭum vulgātum L. spec.; ſ. Nr. 463.
—. XII., 3; Roſenpfl.: Geum urbānum L.; ſ. Nr. 1077.
—. XIII., 1; Mohnpfl.: Chelidonĭum majus L.; ſ. Nr. 534.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Mentha rotundifolĭa L.; ſ. Nr. 2187.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Lamĭum maculātum L.; ſ. Nr. 190.
—. XIV., 1; Lippenblümler: L. album L.; ſ. Nr. 169.
—. „ „ L. purpurĕum L.; ſ. Nr. 10.
—. „ „ L. incīsum Willd.; ſ. Nr. 206.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Linarĭa vulgāris Desf.; ſ. Nr. 2193.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Scrophularĭa nodōsa L.; ſ. Nr. 1069.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Capsēlla bursa pastōris Vent.; ſ. Nr. 3.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum dissĕctum L.; ſ. Nr. 538.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: G. robertiānum L.; ſ. Nr. 431.

—. XVI., 2; Schnabelpfl.: G. molle L.; ſ. Nr. 539.
—. XVI., 5; Pappelroſenpfl.: Althaea cannabĭna L.; ſ. Nr. 2196.
—. XVI., 5; Pappelroſenpfl.: Malva sylvēstris L.; ſ. Nr. 1225.
—. XVII., 2; Erdrauchpfl.: Fumaría capreolāta L.; ſ. Nr. 541.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Melilōtus alba Lam.; ſ. Nr. 2197.
—. „ „ Lotus corniculātus L.; ſ. Nr. 1239.
—. XIX., 1; Korbblütler: Onopōrdon acanthĭum L.; ſ. Nr. 2202.
—. XIX., 2; Korbblütler: Matricaría inodōra L.; ſ. Nr. 2206.
—. „ „ Achillēa millefolĭum L.; ſ. Nr. 2101.
—. „ „ Solidāgo virga - aurĕa L.; ſ. Nr. 2077.
—. XIX., 2; Korbblütler: Bellis perēnnis L.; ſ. Nr. 2.
—. XIX., 4; „ *Calendŭla officinālis L.; ſ. Nr. 2208.

a. In feuchtem Gebüſch und an naſſen Stellen:

—. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygŏnum minus Huds.; ſ. Nr. 2118.
—. X., 5; Nelkenblütler: Malachĭum aquatĭcum Fr.; ſ. Nr. 1241.
—. XI., 1; Weiderichpfl.: Lythrum salicaría L.; ſ. Nr. 1242.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Mentha arvēnsis L.; ſ. Nr. 2213.
—. XXI., 5; Meldenpfl.: Atrĭplex hastātum L.; ſ. Nr. 2210.
—. „ „ A. patŭlum L.; ſ. Nr. 2211.

b. Unter Gebüſch:

—. V., 1; Glockenblümler: Phyteuma canēscens W. et K.; ſ. Nr. 2220.

c. Unter Weidengebüſch:

—. IV., 1; Krapppfl.: Galĭum spurĭum L.; ſ. Nr. 2217.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Mentha sylvēstris L.; ſ. Nr. 2218.
—. XIX., 2; Korbblütler: Inŭla salicĭna L.; ſ. Nr. 2222.
—. „ „ *Solidāgo glabra Desf.; ſ. Nr. 2219.

§. 573. **E. In Gärten** (Baum- und Grasgärten, auf Gartenland):

—. IV., 1; Krapppfl.: Galĭum spurĭum L.; ſ. Nr. 2217.
—. V., 1; Schlüſſelblümler: Anagāllis arvēnsis L.; ſ. Nr. 55.
—. „ Veilchenpfl.: Viŏla tricŏlor L.; ſ. Nr. 525.

—. V., 2; Meldenpfl.: Chenopodĭum hybrĭdum L.; ſ. Nr. 2229.
—. „ „ Ch. album L.; ſ. Nr. 2231.
—. „ „ Corispērmum hyssopifolĭum L.; ſ. Nr. 3005.
—. V., 2; Doldenpfl.: Aegopodĭum podagrarĭa L.; ſ. Nr. 1012.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygŏnum aviculāre L.; ſ. Nr. 2255.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: P. convolvŭlus L.; ſ. Nr. 1257.
—. X., 2; Nelkenblütler: Saponarĭa officinālis L.; ſ. Nr. 2184.
—. X., 3; „ Silēne noctiflōra L.; ſ. Nr. 2257.
—. „ „ Stellarĭa medĭa Vill.; ſ. Nr. 4.
—. X., 5; Schnabelpfl.: *Oxălis stricta Jacq.; ſ. Nr. 1260.
—. „ „ *O. corniculāta L.; ſ. Nr. 1261.
—. XI., 1; Fettkrautpfl.: Portulāca oleracĕa L.; ſ. Nr. 1269.
—. XII., 3; Roſenpfl.: Geum urbānum L.; ſ. Nr. 1077.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Lamĭum purpurĕum L.; ſ. Nr. 10.
—. XIV., 1; Lippenblümler: L. album L.; ſ. Nr. 169.
—. „ „ L. amplexicaule L.; ſ. Nr. 214.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Thlaspi arvēnse L.; ſ. Nr. 215.
—. „ „ Capsēlla bursa pastōris Vent.; ſ. Nr. 3.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Arăbis thaliāna L.; ſ. Nr. 58.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum rotundifolĭum L.; ſ. Nr. 560.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Erodĭum cicutarĭum l'Her.; ſ. Nr. 217.
—. XVII., 2; Erdrauchpfl.: Fumarĭa officinālis L.; ſ. Nr. 561.
—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperīcum perforātum L.; ſ. Nr. 2068.
—. XIX., 1; Korbblütler: Sonchus oleracĕus L.; ſ. Nr. 1262.
—. „ „ S. asper Hall.; ſ. Nr. 1263.
—. „ „ Taraxăcum officināle Mnch.; ſ. Nr. 59.
—. XIX., 2; Korbblütler: Senecĭo vulgāris L.; ſ. Nr. 218.
—. „ „ Achillēa millefolĭum L.; ſ. Nr. 2101.
—. „ „ Bellis perēnnis L.; ſ. Nr. 2.
—. XIX., 4; „ *Calendŭla officinālis L.; ſ. Nr. 2208.
—. XXI., 1; Giftmilcher: Euphorbĭa helioscopĭa L.; ſ. Nr. 222.
—. XXI., 1; Giftmilcher: *E. peplus L.; ſ. Nr. 1265.
—. XXI., 4; Neſſelpfl.: Urtica pilulifĕra L.; ſ. Nr. 1266.

—. XXI., 5; Meldenpfl.: Atriplex hastatum L.; ſ. Nr. 2210.
—. „ „ A. patulum L.; ſ. Nr. 2211.
—. „ Amarantpfl.: Amarantus blitum L.; ſ. Nr. 2247.
—. XXII., 8; Giftmilcher: Mercuriālis annua L.; ſ. Nr. 1267.

§. 574. **F. An Wegen, Straßen, Ackerrändern, Dämmen u. dergl.:**

—. II., 1; Rachenblümler: Veronica agrestis L.; ſ. Nr. 224.
—. „ „ V. polita Fr.; ſ. Nr. 61.
—. „ Lippenblümler: Salvia verticillāta L.; ſ. Nr. 1191.
—. III., 2; Graspfl.: Poa annua L.; ſ. Nr. 14.
—. „ „ Molinia serotina M. et K.; ſ. Nr. 3006.
—. „ „ Triticum repens L.; ſ. Nr. 1279.
—. „ „ Lolium perēnne L.; ſ. Nr. 1281.
—. IV., 1; Wegerichpfl.: Plantāgo major L.; ſ. Nr. 2262.
—. „ „ P. lanceolāta L.; ſ. Nr. 1252.
—. „ Kardenpfl.: Dipsacus laciniātus L.; ſ. Nr. 2264.
—. „ „ Scabiōsa columbaria L.; ſ. Nr. 2080.
—. „ „ Sc. arvēnsis L.; ſ. Nr. 1283.
—. „ Krapppfl.: Asperula cynanchica L.; ſ. Nr. 2265.
—. „ „ Galium mollūgo L.; ſ. Nr. 1006.
—. V., 1; Nachtſchattenpfl.: Hyoscyamus niger L.; ſ. Nr. 1195.
—. „ „ *Datūra stramonium L.; ſ. Nr. 1253.
—. „ „ *Solānum nigrum L.; ſ. Nr. 1254.
—. „ „ *S. humile Bernh.; ſ. Nr. 3007.
—. „ „ S. miniātum Bernh.; ſ. Nr. 2268.
—. „ Borretſchpfl.: Echium vulgāre L.; ſ. Nr. 1108.
—. „ „ Echinospērmum squarrōsum Rchb.; ſ. Nr. 2226.
—. V., 1; Glockenblümler: Campanula rotundifolia L.; ſ. Nr. 1288.
—. V., 1; Veilchenpfl.: Viola tricŏlor L.; ſ. Nr. 525.
—. V., 2; Meldenpfl.: Chenopodium hybridum L.; ſ. Nr. 2229.
„ „ Ch. album L.; ſ. Nr. 2231.
—. „ Doldenpfl.: Eryngium campēstre L.; ſ. Nr. 2271.
—. „ „ Pimpinēlla saxifrāga L.; ſ. Nr. 2176.
—. „ „ Bupleurum falcātum L.; ſ. Nr. 3003.
—. V., 5; Bleiwurzpfl.: Armeria vulgāris Willd.; ſ. Nr. 1295.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygŏnum aviculāre L.; ſ. Nr. 2255.
—. X., 2; Nelkenblütler: Saponaria officinālis L.; ſ. Nr. 2184.
—. „ „ Vaccaria pyramidāta Fl. Wett.; ſ. Nr. 2185.
—. X., 2; Paronychienpfl.: Scleränthus annŭus L.; ſ. Nr. 574.
—. X., 3; Nelkenblütler: Stellaria media Vill.; ſ. Nr. 4.

—. X., 3; Nelkenblütler: Spergularĭa rubra Presl.; ſ. Nr. 576.
—. XI., 1; Fettkrautpfl.: Portulāca oleracĕa L.; ſ. Nr. 1269.
—. XII., 3; Roſenpfl.: Potentĭlla anserĭna L.; ſ. Nr. 578.
—. XIII., 1; Mohnpfl.: Chelidonĭum majus L.; ſ. Nr. 534.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Adōnis autumnālis L.; ſ. Nr. 1302.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Thymus serpyllum L.; ſ. Nr. 2088.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Prunēlla vulgāris L.; ſ. Nr. 2277.
—. „ „ Lamĭum album L.; ſ. Nr. 169.
—. „ „ Chaitūrus marrubiāstrum Rchb.; ſ. Nr. 2064.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Galeōpsis ochroleuca Lmk.; ſ. Nr. 2238.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Teucrĭum chamaedrys L.; ſ. Nr. 2239.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Linarĭa vulgāris Desf.; ſ. Nr. 2193.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Berterŏa incāna DC.; ſ. Nr. 1305.
—. „ „ Thlaspi arvēnse L.; ſ. Nr. 215.
—. „ „ Lepidĭum graminifolĭum L.; ſ. Nr. 1308.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Capsēlla bursa pastōris Vent.; ſ. Nr. 3.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Sisymbrĭum officināle Scop.; ſ. Nr. 1361.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Diplotāxis tenuifolĭa DC.; ſ. Nr. 1313.
—. XV., 2; Kreuzblütler: D. murālis DC.; ſ. Nr. 1314.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum rotundifolĭum L.; ſ. Nr. 560.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: G. dissēctum L.; ſ. Nr. 538.
—. „ „ G. molle L.; ſ. Nr. 539.
—. „ „ Erodĭum cicutarĭum l'Her.; ſ. Nr. 217.
—. XVI., 5; Pappelroſenpfl.: Malva vulgāris Fr.; ſ. Nr. 1318.
—. „ „ M. boreālis Wallm.; ſ. Nr. 1319.
—. „ „ M. sylvēstris L.; ſ. Nr. 1225.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Medicāgo satīva L.; ſ. Nr. 1323.
—. „ „ M. falcāta L.; ſ. Nr. 1324.
—. „ „ Melilōtus alba Lmk.; ſ. Nr. 2197.
—. „ „ M. officinālis L.; ſ. Nr. 1326.

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolĭum repens L.; ſ. Nr. 597.
—. „ „ T. filiförme L.; ſ. Nr. 599.
—. „ „ T. procūmbens L.; ſ. Nr. 1329.
—. „ „ Lotus corniculātus L.; ſ. Nr. 1239.
—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperīcum perforātum L.; ſ. Nr. 2068.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum pilosélla L.; ſ. Nr. 1181.
—. „ „ Crepis setōsa Hall. fil.; ſ. Nr. 2282.
—. „ „ Sonchus asper All.; ſ. Nr. 1263.
—. „ „ Taraxăcum officināle Mnch.; ſ. Nr. 59.
—. XIX., 1; Korbblütler: Chondrílla juncĕa L.; ſ. Nr. 2096.
—. „ „ Picris hieracioïdes L.; ſ. Nr. 2241.
—. „ „ Leontŏdon vulgāris Kitt.; ſ. Nr. 1097.
—. XIX., 1; Korbblütler: Cirsĭum arvēnse Scop.; ſ. Nr. 2286.
—. „ „ C. lanceolātum Scop.; ſ. Nr. 1339.
—. „ „ Onopōrdon acanthĭum L.; ſ. Nr. 2202.
—. XIX, 1; Korbblütler: *Silўbum mariānum Gaertn.; ſ. Nr. 2242.
—. XIX., 2; Korbblütler: Senecĭo vulgāris L.; ſ. Nr. 218.
—. „ „ S. viscōsus L.; ſ. Nr. 1341.
—. „ „ Artemisĭa campēstris L.; ſ. Nr. 3008.
—. XIX., 2; Korbblütler: Matricarĭa inodōra L.; ſ. Nr. 2206.
—. „ „ Achillēa millefolĭum L.; ſ. Nr. 2101.
—. „ „ Bellis perēnnis L.; ſ. Nr. 2.
—. „ „ *Stenāctis annŭa Nees; ſ. Nr. 2245.
—. XIX., 3; „ Centaurēa jăcēa L.; ſ. Nr. 1343.
—. XX., 5; Oſterluzeipfl.: Aristolochĭa clematītis L.; ſ. Nr. 2209.
—. XXI., 4; Neſſelpfl.: Urtīca pilulifĕra L.; ſ. Nr. 1266.
—. XXI., 5; Meldenpfl.: Atrĭplex patŭlum L.; ſ. Nr. 2211.
—. „ Amarantpfl.: Amarāntus blitum L.; ſ. Nr. 2247.
—. „ „ A. retroflēxus L.; ſ. Nr. 3009.
3082. „ „ A. sylvēstris Desf. (A. berchtōldi Seidl.). Wilder Amarant. Hauptſtgl. aufr., Nebenſtgl. aufſtreb.; Blr. rauten-eif., wellig, nur die unterſten an der Spitze ſchwach-ausgerand.; Bl. 3männig; Blütenknäuel ſämmtlich blattachſelſt.; ☉; 9 bis 10; Bö. (Prag), Ober- und Mittelrhein.
—. XXI., 5; Spitzklettenpfl.: Xanthĭum macrocārpum DC.; ſ. Nr. 2305.

a. An feuchten Wegen:

—. IV., 1; Kardenpfl.: Dipsăcus pilōsus L.; ſ. Nr. 2079.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Euphrasĭa odontītes L.; ſ. Nr. 2308.

G. An und auf Mauern, Lehmwänden, Dächern, Ruinen u. ſ. w.: §. 575.

—. II., 1; Rachenblümler: Veronīca polīta Fr.; ſ. Nr. 61.
—. III., 2; Graspfl.: Lolĭum perēnne L.; ſ. Nr. 1281.
—. IV., 1; Neſſelpfl.: Parietarĭa ramiflōra Mnch.; ſ. Nr. 2225.
—. V., 1; Nachtſchattenpfl.: Hyoscyămus niger L.; ſ. Nr. 1195.
—. „ „ *Solānum nigrum L.; ſ. Nr. 1254.
—. „ „ S. villōsum Lmk.; ſ. Nr. 3010.
—. „ Borretſchpfl.: Echĭum vulgāre L.; ſ. Nr. 1108.
—. „ „ Echinospērmum squarrōsum Rchb.; ſ. Nr. 2226.
—. V., 1; Aralienpfl.: Hedĕra helix L.; ſ. Nr. 3081.
—. V., 2; Meldenpfl.: Chenopodĭum hybrĭdum L.; ſ. Nr. 2229.
—. „ „ Ch. album L.; ſ. Nr. 2231.
—. X., 2; Nelkenblütler: Gypsophīla murālis L.; ſ. Nr. 2234.
—. X., 3; „ Cucubălus baccifĕrus L.; ſ. Nr. 2186.
—. XII., 3; Roſenpfl.: Geum urbānum L.; ſ. Nr. 1077.
—. „ „ Potentīlla anserīna L.; ſ. Nr. 578.
—. XIII., 1; Mohnpfl.: Chelidonĭum majus L.; ſ. Nr. 534.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Lamĭum album L.; ſ. Nr. 169.
—. „ „ Galeōpsis ochroleuca Lmk.; ſ. Nr. 2238.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Teucrĭum chamaedrys L.; ſ. Nr. 2239.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Antirrhīnum majus L.; ſ. Nr. 1091.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Lepidĭum graminifolĭum L.; ſ. Nr. 1308.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Sisymbrĭum officināle Scop.; ſ. Nr. 1361.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Diplotāxis tenuifolĭa DC.; ſ. Nr. 1313.
—. XV., 2; Kreuzblütler: D. murālis DC.; ſ. Nr. 1314.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum rotundifolĭum L.; ſ. Nr. 560.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: G. dissēctum L.; ſ. Nr. 538.
—. „ „ G. robertiānum L.; ſ. Nr. 431.
—. „ „ G. molle L.; ſ. Nr. 539.

—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Erodĭum cicutarĭum l'Her.; ſ. Nr. 217.
—. XVI., 5; Pappelroſenpfl.: Malva vulgaris Fr.; ſ. Nr. 1318.
—. „ „ M. sylvēstris L.; ſ. Nr. 1225.
—. XVII., 2; Erdrauchpfl.: Fumarĭa murālis Sond.; ſ. Nr. 1363.
—. XIX., 1; Korbblütler: Picris hieracioīdes L.; ſ. Nr. 2241.
—. „ „ Cirsĭum lanceolātum Scop.; ſ. Nr. 1339.
—. XIX., 1; Korbblütler: Onopōrdon acanthĭum L.; ſ. Nr. 2202.
—. XIX., 1; Korbblütler: *Silўbum mariānum Gaertn.; ſ. Nr. 2242.
—. XIX., 2; Korbblütler: *Stenāctis annŭa Nees; ſ. Nr. 2245.
—. XX., 5; Oſterluzeipfl.: Aristolochĭa clematītis L.; ſ. Nr. 2209.
—. XXI., 4; Neſſelpfl.: Urtīca pilulifĕra L.; ſ. Nr. 1266.
—. XXI., 5; Meldenpfl.: Atrĭplex patŭlum L.; ſ. Nr. 2211.

§. 576. **H. Zu und um Dörfer, Städte, menſchliche Wohnungen:**

—. IV.. 1; Neſſelpfl.: Parietarĭa ramiflōra Mnch.; ſ. Nr. 2225.
—. V., 1; Nachtſchattenpfl.: Hyoscyămus niger L.; ſ. Nr. 1195.
—. „ Aralienpfl.: Hedĕra helix L.; ſ. Nr. 3081.
—. V., 2; Meldenpfl.: Chenopodĭum hybrĭdum L.; ſ. Nr. 2229.
—. V., 2; Meldenpfl.: Ch. album L.; ſ. Nr. 2231.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygŏnum aviculāre L.; ſ. Nr. 2255.
—. XII., 3; Roſenpfl.: Geum urbānum L.; ſ. Nr. 1077.
—. „ „ Potentĭlla supīna L.; ſ. Nr. 1369.
—. „ „ P. anserīna L.; ſ. Nr. 578.
—. XIII., 1; Mohnpfl.: Chelidonĭum majus L.; ſ. Nr. 534.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Lamĭum album L.; ſ. Nr. 169.
—. XV., 1; Kreuzblümler: Lepidĭum graminifolĭum L.; ſ. Nr. 1308.
—. XV., 2; Kreuzblümler: Diplotāxis tenuifolĭa DC.; ſ. Nr. 1313.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum rotundifolĭum L.; ſ. Nr. 560.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: G. robertiānum L.; ſ. Nr. 431.
—. „ „ G. molle L.; ſ. 539.

—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Erodium cicutarium l'Her.; ſ. Nr. 217.
—. XVI., 5; Pappelroſenpfl.: Malva vulgaris Fr.; ſ. Nr. 1318.
—. „ „ M. boreālis Wallm.; ſ. Nr. 1319.
—. „ „ M. sylvēstris L.; ſ. Nr. 1225.
—. XIX., 1; Korbblütler: Sonchus oleracĕus L.; ſ. Nr. 1262.
—. XIX., 2; „ Bellis perēnnis L.; ſ. Nr. 2.
—. XIX., 4; „ *Calendŭla officinālis L.; ſ. Nr. 2208.
—. XXI., 5; Meldenpfl.: Atrĭplex hastātum L.; ſ. Nr. 2210.
—. „ „ A. patŭlum L.; ſ. Nr. 2211.
—. „ Amarantpfl.: Amarāntus blitum L.; ſ. Nr. 2247.

I. Auf Schutt, unbebauten Stellen, wüſten Dorfplätzen u. dergl.: §. 577.

—. II., 1; Lippenblümler: Salvĭa verticillāta L.; ſ. Nr. 1191.
—. IV., 1; Kardenpfl.: Dipsăcus laciniātus L.: ſ. Nr. 2264.
—. V., 1; Nachtſchattenpfl.: Hyoscyămus niger L.; ſ. Nr. 1195.
—. V., 1; Nachtſchattenpfl.: *Solānum nigrum L.; ſ. Nr. 1254.
—. „ „ *S. melānocerăsum Willd.; ſ. Nr. 2317.
—. V., 1; Borretſchpfl.: Echĭum vulgāre L.; ſ. Nr. 1108.
—. „ „ Echinospērmum squarrōsum Rchb.; ſ. Nr. 2226.
—. V., 1; Bleiwurzpfl.: Plumbāgo europaea L.; ſ. Nr. 3012.
—. V., 2; Meldenpfl.: Chenopodĭum hybrĭdum L.; ſ. Nr. 2229.
—. V., 2; Meldenpfl.: Ch. album L.; ſ. Nr. 2231.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygŏnum aviculāre L.; ſ. Nr. 2255.
—. X., 3; Nelkenblütler: Stellarĭa medĭa Vill.; ſ. Nr. 4.
—. „ „ Alsīne verna Bartl.; ſ. Nr. 618.
—. XII., 3; Roſenpfl.: Potentīlla anserīna L.; ſ. Nr. 578.
—. XIII., 1; Mohnpfl.: Chelidonĭum majus L.; ſ. Nr. 534.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Lamĭum album L.; ſ. Nr. 169.
—. „ „ Chaitūrus marrubiāstrum Rchb.; ſ. Nr. 2064.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Teucrĭum chamaedrys L.; ſ. Nr. 2239.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Antirrhīnum orontĭum L.; ſ. Nr. 2324.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Thlaspi arvēnse L.; ſ. Nr. 215.
—. „ „ Capsēlla bursa pastōris Vent.; ſ. Nr. 3.

—. XV., 2; Kreuzblütler: Sisymbrium officinale Scop.; ſ. Nr. 1361.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Diplotaxis tenuifolia DC.; ſ. Nr. 1313.
—. XV., 2; Kreuzblütler: D. murālis DC.; ſ. Nr. 1314.
—. XVI., 2; Pappelroſenpfl.: Geranium rotundifolium L.; ſ. Nr. 560.
—. XVI., 2; Pappelroſenpfl.: G. dissectum L.; ſ. Nr. 538.
—. „ „ G. molle L.; ſ. Nr. 539.
—. XVI., 5; Pappelroſenpfl.: Malva vulgāris Fr.; ſ. Nr. 1318.
—. „ „ M. sylvēstris L.; ſ. Nr. 1225.
—. XVII., 2; Erdrauchpfl.: Fumaria officinālis L.; ſ. Nr. 561.
—. XVII., 2; Erdrauchpfl.: F. capreolāta L.; ſ. Nr. 541.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Melilōtus alba Lmk.; ſ. Nr. 2197.
—. XIX., 1; Korbblütler: Sonchus oleracēus L.; ſ. Nr. 1262.
—. „ „ S. asper Hall.; ſ. Nr. 1263.
—. „ „ Leontŏdon vulgāris Kitt.; ſ. Nr. 1079.
—. XIX., 1; Korbblütler: Onopōrdon acanthium L.; ſ. Nr. 2202.
—. XIX., 2; Korbblütler: Matricaria inodōra L.; ſ. Nr. 2206.
—. „ „ Anthĕmis neilreichii J. Ortm.; ſ. Nr. 2325.
—. XIX., 2; Korbblütler: *Stenāctis annua Nees; ſ. Nr. 2245.
—. XIX., 3; Korbblütler: Centaurēa jacēa L.; ſ. Nr. 1343.
—. XIX., 4; „ *Calendŭla officinālis L.; ſ. Nr. 2208.
—. XXI., 1; Giftmilcher: Euphorbia platyphyllos L.; ſ. Nr. 2326.
—. XXI., 5; Meldenpfl.: Atriplex hastātum L.; ſ. Nr. 2210.
—. „ „ A. patŭlum L.; ſ. Nr. 2211.
—. „ Amarantpfl.: Amarantus blitum L.; ſ. Nr. 2247.

§. 578. **K. Auf Düngerhaufen, an Miſtgruben u. ſ. w.:**

—. V., 1; Nachtſchattenpfl.: Hyoscyămus niger L.; ſ. Nr. 1195.
—. V., 1; Nachtſchattenpfl.: *Solanum nigrum L.; ſ. Nr. 1254.
—. V., 2; Meldenpfl.: Chenopodium album L.; ſ. Nr. 2231.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygŏnum persicaria L.; ſ. Nr. 2182.
—. XII., 3; Roſenpfl.: Potentilla supina L.; ſ. Nr. 1369.
—. XIII., 1; Mohnpfl.: Chelidonium majus L.; ſ. Nr. 534.

—. XV., 1; Kreuzblütler: Capsella bursa pastoris Vent.; ſ. Nr. 3.
—. XIX., 1; Korbblütler: Sonchus oleraceus L.; ſ. Nr. 1262.
—. XXI., 5; Meldenpfl.: Atriplex patulum L.; ſ. Nr. 2211.

L. Auf Aeckern: §. 579.

—. II., 1; Rachenblümler: Veronica agrestis L.; ſ. Nr. 224.
—. „ „ V. polita Fr.; ſ. Nr. 61.
—. III., 1; Halbgras: Cyperus glomeratus L.; ſ. Nr. 2948.
—. III., 2; Graspfl.: Poa annua L.; ſ. Nr. 14.
—. „ „ Triticum repens L.; ſ. Nr. 1279.
—. IV., 1; Kardenpfl.: Scabiosa columbaria L.; ſ. Nr. 2080.
—. „ „ Sc. arvensis L.; ſ. Nr. 1283.
—. „ Krapppfl.: Sherardia arvensis L.; ſ. Nr. 632.
—. „ „ Galium aparine L.; ſ. Nr. 2155.
—. „ Roſenpfl.: Alchemilla aphanes Leers; ſ. Nr. 631.
—. V., 1; Schlüſſelblümler: Anagallis arvensis L.; ſ. Nr. 55.
—. „ „ A. coerulea Schreb.; ſ. Nr. 227.
—. „ Nachtſchattenpfl.: *Solanum nigrum L.; ſ. Nr. 1254.
—. „ „ *S. melanocerasum Willd.; ſ. Nr. 2317.
—. V., 1; Veilchenpfl.: Viola tricolor L.; ſ. Nr. 525.
—. V., 2; Meldenpfl.: Chenopodium album L.; ſ. Nr. 2231.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygonum aviculare L.; ſ. Nr. 2255.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: P. convolvulus L.; ſ. Nr. 1257.
—. „ „ *P. tataricum L.; ſ. Nr. 2340.
—. X., 2; Paronychienpfl.: Scleranthus annuus L.; ſ. Nr. 574.
—. X., 3; Nelkenblütler: Silene noctiflora L.; ſ. Nr. 2257.
—. „ „ Stellaria media Vill.; ſ. Nr. 4.
—. „ „ *Spergularia rubra Presl.; ſ. Nr. 576.
—. X., 5; Schnabelpfl.: *Oxalis stricta Jacq.; ſ. Nr. 1260.
—. „ „ *O. corniculata L.; ſ. Nr. 1261.
—. „ Nelkenblütler: Spergula arvensis L.; ſ. Nr. 1394.
—. XI., 1; Fettkrautpfl.: Portulaca oleracea L.; ſ. Nr. 1269.
—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: Nigella arvensis L.; ſ. Nr. 2341.
—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: Delphinium consolida L.; ſ. Nr. 636.
—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: *D. ajacis L.; ſ. Nr. 1328.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Lamium purpureum L.; ſ. Nr. 10.

—. XIV., 1; Lippenblümler: L. incīsum Willd.; ſ. Nr. 206.
—. „ „ L. intermedĭum Fr.; ſ. Nr. 639.
—. „ „ L. amplexicaule L.; ſ. Nr. 214.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Linarĭa vulgāris Desf.; ſ. Nr. 2193.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Thlapsi arvēnse L.; ſ. Nr. 215.
—. „ „ Capsēlla bursa pastōris Vent.; ſ. Nr. 3.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Arăbis thaliāna L.; ſ. Nr. 58.
—. „ „ Diplotāxis murālis DC.; ſ. Nr. 1314.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum rotundifolĭum L.; ſ. Nr. 560.
—. XVII., 2; Erdrauchpfl.: Fumarĭa officinālis L.; ſ. Nr. 561.
—. XVII., 2; Erdrauchpfl.: F. vaillantĭi Lois.; ſ. Nr. 643.
—. „ „ F. wirtgenĭi Koch; ſ. Nr. 1403.
—. „ „ F. parviflōra L.; ſ. Nr. 644.
—. „ „ F. rostellāta Knaf; ſ. Nr. 1489.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolĭum repens L.; ſ. Nr. 597.
—. „ „ T. procūmbens L.; ſ. Nr. 1329.
—. „ „ Pocockĭa radiāta Trautv.; ſ. Nr. 2343.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolĭum arvēnse L.; ſ. Nr. 1408.
—. XIX., 1; Korbblütler: Sonchus oleracĕus L.; ſ. Nr. 1262.
—. „ „ S. asper Hall.; ſ. Nr. 1263.
—. „ „ Taraxăcum officināle Mnch.; ſ. Nr. 59.
—. XIX., 1; Korbblütler: Cirsĭum arvēnse Scop.; ſ. Nr. 2286.
—. XIX., 2; Korbblütler: Senecĭo vulgāris L.; ſ. Nr. 218.
—. „ „ Anthĕmis neilreichĭi J. Ortm.; ſ. Nr. 2325.
—. XIX., 2; Korbblütler: *Galinsōga parviflōra Cav.; ſ. Nr. 2346.
—. XIX., 2; Korbblütler: Bellis perēnnis L.; ſ. Nr. 2.
—. „ „ *Erigĕron canadēnsis L.; ſ. Nr. 2347.
—. XIX., 4; Korbblütler: Calendŭla arvēnsis L.; ſ. Nr. 1418.
—. XXI., 1; Giftmilcher: *Euphorbĭa peplus L.; ſ. Nr. 1265.
—. „ „ E. falcāta L.; ſ. Nr. 2349.
—. „ „ E. helioscopĭa L.; ſ. Nr. 222.
—. XXI., 4; Neſſelpfl.: Urtīca pilulifĕra L.; ſ. Nr. 1266.
—. XXI., 5; Meldenpfl.: Atrĭplex hastatum L.; ſ. Nr. 2210.
—. „ „ A. patŭlum L.; ſ. Nr. 2211.

—. XXII., 8; Giftmilcher: Mercurialis annŭa L.; ſ. Nr. 1267.

a. Kulturpflanzen:

—. III., 1; Halbgras: Cypērus esculēntus L.; ſ. Nr. 3013.
3083. „ Schwertelpfl.: *Crocus satīvus All. Aechter Safran. Blütenſch. 2; Kelchſchlund dicht-gebärtet; Narbe 3theil., von Kelchlänge; Bl. violet, purpurſtreifig; 4; 9 bis 10; ♆; ♃; ♋; Vaterland: Orient.
—. V., 1; Nachtſchattenpfl.: *Nicotiāna tabăcum L.; ſ. Nr. 2354.
—. V., 1; Nachtſchattenpfl.: *N. microphȳlla Spr.; ſ. Nr. 2355.
—. V., 2; Meldenpfl.: Beta vulgāris L.; ſ. Nr. 2357.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: *Polygŏnum tatarĭca L.; ſ. Nr. 2340.
—. X., 6; Schminkpfl.: *Phytolācca decāndra L.; ſ. Nr. 2361.
—. XIII., 2; Gichtroſenpfl.: Cimicifŭga foetĭda L.; ſ. Nr. 2062.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Brassĭca oleracĕa L.; ſ. Nr. 109.
—. „ „ B. rapa L.; ſ. Nr. 654.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: *Medicāgo satīva L.; ſ. Nr. 1323.
—. „ „ Trifolĭum pratēnse L.; ſ. Nr. 1032.
—. „ „ Tr. repens L.; ſ. Nr. 597.
3084. XIX., 3; Korbblütler: *Heliānthus tuberōsus L. Knollige Sonnenroſe (Topinambur, Batate, Erdbirne, Erdapfel, Saukartoffel, Erd- oder jeruſalemer Artiſchocke). Blr. 3nervig, geſägt, rauh, untere herz-, obere längl.-eif., auch lanzettl., zugeſp., wechſelſt.; Köpfchen aufr.; Bl. gelb; Fr. mit 1 bis 4 gewimp. Grannen; 4; 9 bis 10; ♆; Vaterland: Braſilien.*)
—. XXI., 3; Kürbispfl.: *Cucŭmis satīvus L.; ſ. Nr. 2366.
—. „ „ *Cucurbĭta pepō L.; ſ. Nr. 2367.

b. Unter der Sat:

—. IV., 1; Krapppfl.: Galĭum tricōrne With.; ſ. Nr. 2370.
—. X., 2; Nelkenblütler: Vaccarĭa pyramidata Fl. Wett.; ſ. Nr. 2185.
—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: Nigēlla arvēnsis L.; ſ. Nr. 2341.
—. XIII., 3; „ Adōnis autumnālis L.; ſ. Nr. 1302.

*) Die erſten Knollen dieſer Pflanze kamen i. J. 1617 aus Braſilien nach England und darauf nach Deutſchland!

—. XIV., 1; Lippenblümler: Galeŏpsis ochroleuca Lmk.; ſ. Nr. 2238.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Stachys annŭa L.; ſ. Nr. 2373.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Linarĭa arvēnsis Desf.; ſ. Nr. 2374.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Melānosinapis commūnis Sch. et Sp.; ſ. Nr. 2375.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Melilōtus officinālis L.; ſ. Nr. 1326.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolĭum campēstre Schreb.; ſ. Nr. 1409.
—. XIX., 1; Korbblütler: Cirsĭum arvēnse Scop.; ſ. Nr. 2286.
—. XIX., 2; „ Anthĕmis neilreichĭi J. Ortm.; ſ. Nr. 2325.

c. Auf feuchten Aeckern:

—. III., 1; Fettkrautpfl.: Montĭa fontāna L.; ſ. Nr. 683.
—. X., 2; Nelkenblütler: Gypsophīla murālis L.; ſ. Nr. 2234.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Mentha arvēnsis L.; ſ. Nr. 2213.
—. „ „ Stachys arvēnsis L.; ſ. Nr. 2395.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Euphrasĭa odontītes L.; ſ. Nr. 2308.
—. XIX., 2; Korbblütler: Marūta cotŭla DC.; ſ. Nr. 2396.
—. XIX., 3; „ Bidens tripartīta L.; ſ. Nr. 3062.
—. XXI., 1; Giftmilcher: Euphorbĭa stricta Sm.; ſ. Nr. 1041.

d. Auf feuchten Lehmäckern:

—. X., 5; Nelkenblütler: Cerastĭum vulgātum L. spec.; ſ. Nr. 463.

e. Auf Mergelfeldern:

—. XV., 2; Kreuzblütler: Diplotāxis viminĕa DC.; ſ. Nr. 1492.

f. Auf kalkhaltigen Aeckern:

—. XXI., 1; Giftmilcher: Euphorbĭa platyphȳllos L.; ſ. Nr. 2326.

g. Auf Krautäckern:

—. IV., 1; Krapppfl.: Galĭum spurĭum L.; ſ. Nr. 2217.

h. Auf ſandigen Gemüſeäckern:

—. III., 3; Paronychienpfl.: *Polycārpon tetraphȳllum L.; ſ. Nr. 3016.

i. Auf Sandfeldern:

—. III., 2; Graspfl.: *Eragrōstis megastachȳa Lk.; ſ. Nr. 2383.

—. IV., 1; Kardenpfl.: Scabiōsa ochroleuca L.; ſ. Nr. 2386.
—. „ Krapppfl.: Galĭum anglĭcum Huds.; ſ. Nr. 2377.
—. V., 1; Borretſchpfl.: Heliotropĭum europaeum L.; ſ. Nr. 2388.
—. V., 1; Borretſchpfl.: Echĭum vulgāre L.; ſ. Nr. 1108.
—. „ Glockenblümler: Campanŭla rotundifolĭa L.; ſ. Nr. 1288.
—. V., 1; Paronychienpfl.: Herniarĭa hirsūta L.; ſ. Nr. 2389.
—. V., 2; Meldenpfl.: Kochĭa arenarĭa Roth; ſ. Nr. 3015.
—. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus prolĭfer L.; ſ. Nr. 2275.
—. „ Paronychienpfl.: Sclerānthus annŭus L.; ſ. Nr. 574.
—. X., 3; Nelkenblütler: Spergularĭa rubra Presl.; ſ. Nr. 576.
—. X., 5; Nelkenblütler: Spergŭla arvēnsis L.; ſ. Nr. 1394.
—. XIII., 1; Sonnenröslein: Helianthĕmum guttātum Mill.; ſ. Nr. 1482.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Linarĭa vulgāris Desf.; ſ. Nr. 2193.
—. XIV., 2; Rachenblümler: L. arvēnsis Desf.; ſ. Nr. 2374.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum dissĕctum L.; ſ. Nr. 538.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Erodĭum cicutarĭum L.; ſ. Nr. 217.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolĭum arvēnse L.; ſ. Nr. 1408.
—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperĭcum humifūsum L.; ſ. Nr. 2134.
—. XIX., 1; Korbblütler: Arnosĕris pusĭlla Gaertn.; ſ. Nr. 2392.
—. XXI., 1; Giftmilcher: Euphorbĭa segetālis L.; ſ. Nr. 2399.
—. XXI., 5; Amarantpfl.: Amarāntus retroflĕxus L.; ſ. Nr. 3009.

k. Auf feuchten Sandäckern:

—. X., 3; Nelkenblütler: Spergularĭa rubra Presl.; ſ. Nr. 576.
—. XI., 1; Weiderichpfl.: Lythrum hyssopifolĭa L.; ſ. Nr. 2394.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Erysĭmum cheiranthoīdes L.; ſ. Nr. 1484.

l. Auf unfruchtbaren Aeckern:

—. V., 2; Doldenpfl.: Eryngĭum campēstre L.; ſ. Nr. 2271.

m. Auf Aeckern in Gebirgsgegenden:

—. XIV., 1; Lippenblümler: Teucrĭum botrys L.; ſ. Nr. 2405.

n. Auf Brachen:

—. IV., 1; Krapppfl.: Galĭum anglĭcum Huds.; ſ. Nr. 2377.
—. X., 2; Nelkenblütler: Gypsophĭla murālis L.; ſ. Nr. 2234.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Stachys annŭa L.; ſ. Nr. 2373.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Antirrhīnum orontĭum L.; ſ. Nr. 2324.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolĭum filifōrme L.; ſ. Nr. 599.
—. „ „ T. campēstre Schreb.; ſ. Nr. 1409.
—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperĭcum humifūsum L.; ſ. Nr. 2134.
—. XIX., 2; Korbblütler: Senecĭo sylvatĭcus L.; ſ. Nr. 1080.
—. „ „ Achillēa millefolĭum L.; ſ. Nr. 2101.

§. 580. **M. An faſt allen Orten:**

—. XIV., 2; Rachenblümler: Euphrasĭa officinālis L.; ſ. Nr. 2406.
—. XXI., 1; Giftmilcher: Euphorbĭa cyparissĭas L.; ſ. Nr. 2407.

§. 581. **N. Auf fettem Boden:**

—. X., 5; Schnabelpfl.: *Oxălis corniculāta L.; ſ. Nr. 1261.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum boreāle Fr.; ſ. Nr. 2996.

§. 582. **O. Auf Sandboden:**

—. III., 3; Paronychienpfl.: Polycārpon tetraphўllum L.; ſ. Nr. 3016.
—. IV., 1; Kardenpfl.: Scabiōsa arvēnsis L.; ſ. Nr. 1283.
—. V., 2; Doldenpfl.: Eryngĭum campēstre L.; ſ. Nr. 2271.
—. „ „ Pimpinēlla saxifrăga L.; ſ. Nr. 2176.
—. X., 2; Nelkenblütler: Saponarĭa officinālis L.; ſ. Nr. 2184.
—. „ Paronychienpfl.: Scleränthus perēnnis L.; ſ. Nr. 676.
—. X., 3; Nelkenblütler: Spergularĭa rubra Presl.; ſ. Nr. 576.
—. XI., 1; Fettkrautpfl.: Portulāca oleracĕa L.; ſ. Nr. 1269.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Linarĭa vulgāris Desf.; ſ. Nr. 2193.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Erodĭum cicutarĭum l'Herit.; ſ. Nr. 217.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Melilōtus officinālis L.; ſ. Nr. 1326.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum pilosēlla L.; ſ. Nr. 1181.

—. XIX., 2; Korbblütler: Artemisĭa scoparĭa W. et K.; ſ. Nr. 2421.

a. Auf feuchtem Sandboden:

—. III., 1; Fettkrautpfl.: Montĭa fontāna L.; ſ. Nr. 683.
—. VI., 1; Semede: Juncus bufonĭus L.; ſ. Nr. 1513.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygŏnum minus Huds.; ſ. Nr. 2118.
—. X., 5; Nelkenblütler: Spergŭla arvēnsis L.; ſ. Nr. 1394.
—. XII., 3; Roſenpfl.: Potentīlla supīna L.; ſ. Nr. 1369.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Nasturtĭum palūstre DC.; ſ. Nr. 1933.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Erysĭmum cheiranthoīdes L.; ſ. Nr. 1484.

b. Auf Sandfeldern:

Vergl. §. 579, i.

c. Auf trocknem, kalkhaltigem Sandboden:

—. V., 1; Rachenblümler: Verbāscum thapsifōrme Schrad.; ſ. Nr. 2418.
—. XIX., 1; Korbblütler: Chondrīlla juncĕa L.; ſ. Nr. 2096.

d. Auf Quarzſand:

—. XIV., 1; Lippenblümler: Galeōpsis ochroleuca Lmk.; ſ. Nr. 2238.

e. Auf magerem Sandboden:

—. XIX., 2; Korblütler: Artemisĭa campēstris L.; ſ. Nr. 3008.

f. An ſandigen, ſonnigen Orten:

—. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus deltoīdes L.; ſ. Nr. 1111.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Berterŏa incāna DC.; ſ. Nr. 1305.

g. Auf feuchten Sandtriften:

—. XI., 1; Weiderichpfl.: Lythrum hyssopifolĭa L.; ſ. Nr. 2394.
—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperīcum humifūsum L.; ſ. Nr. 2134.

P. Auf Kalkboden: §. 583.

—. IV., 1; Krapppfl.: Sherardĭa arvēnsis L.; ſ. Nr. 633.
—. „ „ Asperŭla tinctorĭa L.; ſ. Nr. 2143.
—. V., 1; Rachenblümler: Verbāscum thapsifōrme Schrad.; ſ. Nr. 2418.

—. V., 1; Paronychienpfl.: Herniaria hirsuta L.; ſ. Nr. 2389.
—. X., 2; Nelkenblütler: Vaccaria pyramidata Fl. Wett.; ſ. Nr. 2185.
—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: Nigella arvensis L.; ſ. Nr. 2341.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Teucrium chamaedrys L.; ſ. Nr. 2239.
—. XVII., 2; Erdrauchpfl.: Fumaria vaillantii Lois.; ſ. Nr. 643.
—. XIX., 1; Korbblütler: Crepis setosa Hall. fil.; ſ. Nr. 2282.
—. XIX., 1; Korbblütler: Jurinea mollis DC.; ſ. Nr. 1524.
—. „ „ Cirsium acaule All.; ſ. Nr. 2097.
—. „ „ Carduus deflorātus L.; ſ. Nr. 2074.
—. „ „ Crinitaria linosyris Less.; ſ. Nr. 3018.

3085. XIX., 2; Korbblütler: Artemisia camphorata Vill. Kampfer-Beifuß. St. aufſteig., ſtrauchig, riſpig-traub.; Bltr. geſtielt, am Stiele geöhrt, faſt kahl oder etwas grau, untere dopp.-fiederſpalt.; Köpfchen kug., in lockern, traub. Riſpen; Blütenboden kraus-behart; 4; 9 bis 10; E., Ty., Kr.*)

a. Auf trocknem, kalkhaltigem Sandboden:

Vergl. §. 582, c.

b. Auf Kalkboden unter der Sat:

—. XIV., 1; Lippenblümler: Galeopsis angustifolia Ehrh.; ſ. Nr. 2426.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Stachys annua L.; ſ. Nr. 2473.

c. Auf Kalkhügeln:

—. X., 2; Nelkenblütler: Dianthus prolifer L.; ſ. Nr. 2275.
—. XIX., 2; Korbblütler: Jurinea mollis DC.; ſ. Nr. 1524.

d. Auf Kalkfelſen:

—. XIX., 2; Korbblütler: Artemisia camphorata Vill.; ſ. Nr. 3085.

e. Auf Kalkboden in Gebirgen:

—. XIV., 1; Lippenblümler: Teucrium botrys L.; ſ. Nr. 2405.

*) Die Form mit grauharigen Stengeln und Blättern und mit wenig-behartem Blütenboden iſt A. saxatilis W. et K.!

Q. Auf Lehmboden: §. 584.

—. X., 2; Nelkenblütler: Vaccaria pyramidata Fl. Wett.; s. Nr. 2185.
—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: Nigella arvensis L.; s. Nr. 2341.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Stachys annua L.; s. Nr. 2373.
—. XVII., 4; Hülsenpfl.: Melilotus officinalis L.; s. Nr. 1326.

a. Auf sandigem Lehmboden:

—. XXI., 1; Giftmilcher: *Euphorbia exigua L.; s. Nr. 1547.

b. Auf feuchten Lehmäckern:

—. X., 5; Nelkenblütler: Cerastium vulgatum L. spec.; s. Nr. 463.

R. Auf Mergelboden: §. 585.

—. IV., 1; Krapppfl.: Galium tricorne With.; s. Nr. 2370.
—. V., 1; Paronychienpfl.: Herniaria hirsuta L.; s. Nr. 2389.
—. X., 2; Nelkenblütler: Vaccaria pyramidata Fl. Wett.; s. Nr. 2185.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Diplotaxis viminea DC.; s. Nr. 1492.

S. Auf Thonboden: §. 586.

—. IV., 1; Krapppfl.: Sherardia arvensis L.; s. Nr. 633.
—. „ „ Galium tricorne With.; s. Nr. 2389.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Lamium incisum Willd.; s. Nr. 206.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Teucrium chamaedrys L.; s. Nr. 2239.
—. XIX., 1; Korbblütler: Crinitaria linosyris Less.; s. Nr. 3018.

T. Auf steinigem Boden: §. 587.

a. Auf steinigen, unfruchtbaren, wüsten Plätzen:

—. V., 1; Nachtschattenpfl.: Solanum villosum Lmk.; s. Nr. 3010.
—. V., 1; Borretschpfl.: Echium vulgare L.; s. Nr. 1108.
—. V., 2; Doldenpfl.: Eryngium campestre L.; s. Nr. 2271.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Sisymbrium officinale Scop.; s. Nr. 1361.
—. XIX., 1; Korbblütler: Cirsium lanceolatum Scop.; s. Nr. 1339.
—. XIX., 2; Korbblütler: Artemisia austriaca L.; s. Nr. 3021.

—. XXI., 1; Giftmilcher: Euphorbĭa platyphȳllos L.; ſ. Nr. 2326.
—. XXI., 4; Meldenpfl.: Eurotĭa ceratoïdes C. A. Mey.; ſ. Nr. 3022.
—. XXI., 5; Spitzklettenpfl.: Xanthĭum macrocārpum DC.; ſ. Nr. 2305.

b. In Steinbrüchen:

—. V., 1; Nachtſchattenpfl.: Solānum villōsum Lmk.; ſ. Nr. 3010.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Galeōpsis ochroleuca Lmk.; ſ. Nr. 2238.
—. XIX., 2; Korbblütler: Senecĭo sylvatĭcus L.; ſ. Nr. 1080.

c. Auf Schlackenhalden:

—. X., 3; Nelkenblütler: Alsīne verna Bartl.; ſ. Nr. 618.

d. Auf Steingeröll:

—. XIX., 2; Korbblütler: Inŭla salicĭna L.; ſ. Nr. 2222.

e. An ſchattigen, ſteinigen Stellen:

—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum robertiānum L.; ſ. Nr. 431.

§. 588. **U. An Abhängen:**

—. V., 1; Borretſchpfl.: Echĭum vulgāre L.; ſ. Nr. 1108.
—. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus prolĭfer L.; ſ. Nr. 2275.
—. „ „ Gypsophīla murālis L.; ſ. Nr. 2234.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Prunēlla vulgāris L.; ſ. Nr. 2277.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Diplotāxis tenuifolĭa DC.; ſ. Nr. 1313.

a. An feuchten Abhängen:

—. V., 2; Enzianpfl.: Gentiāna germanĭca Willd.; ſ. Nr. 2456.
—. XI., 2; Roſenpfl.: Agrimonĭa procēra Wallr.; ſ. Nr. 1115.

b. An ſonnigen Abhängen:

—. XIX., 2; Korbblütler: Solidāgo virga-aurĕa L.; ſ. Nr. 2077.

c. An ſterilen Abhängen:

—. X., 2; Paronychienpfl.: Scleränthus perēnnis L.; ſ. Nr. 676.

d. An steinigen Abhängen:

—. V., 1; Borretschpfl.: Echinospērmum squarrōsum Rchb.; s. Nr. 2226.

V. In Weinbergen: §. 589.

—. III., 1; Schwertelpfl.: *Crocus satīvus All.; s. Nr. 3083.
—. V., 1; Borretschpfl.: Echĭum vulgāre A.; s. Nr. 1108.
—. X., 2; Nelkenblütler: Vaccarĭa pyramidāta Fl. Wett.; s. Nr. 2185.
—. X., 3; Nelkenblütler: Stellarĭa medĭa Vill.; s. Nr. 4.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Diplotāxis viminĕa DC.; s. Nr. 1492.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum rotundifolĭum L.; s. Nr. 560.
—. XVII., 2; Erdrauchpfl.: Fumarĭa officinālis L.; s. Nr. 561.
—. „ „ F. vaillantĭi Lois.; s. Nr. 643.
—. „ „ F. wirtgenĭi Koch; s. Nr. 1403.
—. „ „ F. parviflōra L.; s. Nr. 644.
—. XIX., 1; Korbblütler: *Silўbum mariānum Gaertn.; s. Nr. 2242.
—. XIX., 2; Korbblütler: Artemisĭa abrotănum L.; s. Nr. 3023.
—. XIX., 4; Korbblütler: Calendŭla arvēnsis L.; s. Nr. 1418.
—. XX., 5; Osterluzeipfl.: Aristolochĭa clematītis L.; s. Nr. 2209.
—. XXI., 1; Giftmilcher: Euphorbĭa falcāta L.; s. Nr. 2349.
—. XXI., 5; Amarantpfl.: Amarāntus blitum L.; s. Nr. 2247.
—. XXI., 9; Kürbispfl.: *Cucurbĭta melopĕpo L.; s. Nr. 1576.

a. In kalkhaltigen Weinbergen:

3086. VI., 1; Lilienpfl.: Scilla autumnālis L. Herbst-Meerzwiebel. Schaft eckig; Bltr. mehr als 2, schmal-lineal.; Blütentraube kurz, fast doldig, deckblattlos; Bl. klein, sternf., blau, in's rötliche spielend; 4; 9; Kr., E.

W. Auf Anhöhen und Hügeln: §. 590.

—. IV., 1; Krapppfl.: Galĭum mollūgo L.; s. Nr. 1006.
—. V., 1; Borretschpfl.: Echĭum vulgāre L.; s. Nr. 1108.
—. V., 2; Doldenpfl.: Bupleurum falcātum L.; s. Nr. 3003.
—. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus prolĭfer L.; s. Nr. 2275.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Thymus serpўllum L.; s. Nr. 2088.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Saturēja montāna L.; s. Nr. 2464.

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolĭum filifōrme L.; ſ. Nr. 599.
—. XIX., 1; Korbblütler: Crinitarĭa linosўris Less.; ſ. Nr. 3018.

a. Auf ſteinigen:

—. III., 2; Graspfl.: Molinĭa serotĭna M. et K.; ſ. Nr. 3006.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Teucrĭum chamaedrys L.; ſ. Nr. 2239.

b. Auf ſonnigen, ſteinigen:

—. X., 2; Paronychienpfl.: Sclerānthus perēnnis L.; ſ. Nr. 676.
—. X., 3; Nelkenblütler: Alsīne verna Bartl.; ſ. Nr. 618.

c. Auf trocknen:

—. IV., 1; Kardenpfl.: Scabiōsa columbarĭa L.; ſ. Nr. 2080.
—. „ „ Sc. suaveŏlens Desf.; ſ. Nr. 2466.
—. „ Krapppfl.: Asperŭla cynanchĭca L.; ſ. Nr. 2265.
—. V., 2; Doldenpfl.: Peucedănum alsatĭcum L.; ſ. Nr. 1202.
—. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus prolĭfer L.; ſ. Nr. 2275.

d. Auf trocknen, ſandigen, thonigen:

—. XIX., 1; Korbblütler: Carlīna vulgāris L.; ſ. Nr. 3025.

e. Auf trocknen, ſandigen:

—. IV., 1; Krapppfl.: Asperŭla tinctorĭa L.; ſ. Nr. 2143.
—. XIII., 1; Sonnenröslein: Helianthĕmum guttātum Mill.; ſ. Nr. 1482.
—. XIX., 2; Korbblütler: Erigĕron acris L.; ſ. Nr. 3026.

f. Auf lockeren, ſandigen:

—. XIX., 2; Korbblütler: Senecĭo sylvatĭcus L.; ſ. Nr. 1080.

g. Auf ſonnigen:

—. V., 1; Glockenblümler: Campanŭla rotundifolĭa L.; ſ. Nr. 1288.

h. Auf unfruchtbaren:

—. V., 2; Doldenpfl.: Eryngĭum campēstre L.; ſ. Nr. 2271.
—. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus prolĭfer L.; ſ. Nr. 2275.
—. XIX., 2; Korbblütler: Senecĭo viscōsus L.; ſ. Nr. 1341.
—. „ „ Inŭla ensifolĭa L.; ſ. Nr. 3024.

i. Auf Kalkhügeln:

—. IV., 1; Kardenpfl.: Scabiōsa suaveŏlens Desf.; ſ. Nr. 2466.

—. X., 2; Nelkenblütler: Dianthus prolifer L.; ſ. Nr. 2275.
—. XIX., 1; Korbblütler: Jurinĕa mollis DC.; ſ. Nr. 1524.
—. XIX., 2; „ Aster amēllus L.; ſ. Nr. 3019.

k. Auf buſchigen:

—. XIX., 3; Korbblütler: Centaurēa jacēa L.; ſ. Nr. 1343.

l. Unter Geſträuch:

—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum sabaudum All.; ſ. Nr. 3028.

m. Auf graſigen:

—. II., 1; Lippenblümler: Salvĭa verticillāta L.; ſ. Nr. 1191.

n. Auf feuchten, graſigen:

—. XX., 1; Orchidee: Spirānthes autumnālis Rich.; ſ. Nr. 3027.

o. Auf ſonnigen, felſigen Schieferhügeln:

—. XIX., 2; Korbblütler: Aster amēllus L.; ſ. Nr. 3019.

p. Auf Hügeln der ſubalpinen Gegenden:

—. XIV., 2; Rachenblümler: Alectorolŏphus angustifolĭus Gmel.; ſ. Nr. 2483.

X. Auf Bergen: §. 591.

—. V., 1; Borretſchpfl.: Echĭum vulgāre L.; ſ. Nr. 1108.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Saturēja montāna L.; ſ. Nr. 2464.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Teucrĭum chamaedrys L.; ſ. Nr. 2239.
—. XIX., 1; Korbblütler: Crinitarĭa linosўris Less.; ſ. Nr. 3018.

a. Auf graſigen:

—. XIX, 2; Korbblütler: Buphthālmum salicifolĭum DC.; ſ. Nr. 3031.

b. Auf trocknen:

—. V., 2; Doldenpfl.: Peucedănum alsatĭcum L.; ſ. Nr. 1202.

c. Auf felſigen:

—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: Aconītum anthōra L.; ſ. Nr. 3030.

d. Auf Kalkbergen:

—. V., 2; Doldenpfl.: Seseli elātum L.; ſ. Nr. 3020.

e. Auf Bergwieſen:

—. V., 2; Doldenpfl.: S. colorātum Ehrh.; ſ. Nr. 2495.
—. V., 4; Studentenröschen: Parnassia palūstris L.; ſ. Nr. 2500.

f. In lichten Bergwäldern:

—. IV., 1; Kardenpfl.: Scabiōsa sylvatica L.; ſ. Nr. 2141.
—. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus supērbus L.; ſ. Nr. 1016.

§. 592. **Y. In Gebirgen:**

—. V., 2; Enzianpfl.: Gentiāna lutea L.; ſ. Nr. 2506.
—. „ „ G. pannonica Scop.; ſ. Nr. 2507.
—. „ „ G. punctāta L.; ſ. Nr. 2597.
—. „ „ G. asclepiadea L.; ſ. Nr. 3033.
—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: Aconītum cammārum L.; ſ. Nr. 3034.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Anemōne alpīna L.; ſ. Nr. 771.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Alectorolŏphus angustifolius Gmel.; ſ. Nr. 2483.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracium boreāle Fr.; ſ. Nr. 2996.

a. Auf höheren Gebirgen:

—. V., 1; Schlüſſelblümler: Primŭla minima L.; ſ. Nr. 2521.
—. XIX., 2; Korbblütler: Gnaphalium supīnum L.; ſ. Nr. 3035.

b. Auf Urgebirgen:

—. XIX., 3; Korbblütler: Centaurea nigra L.; ſ. Nr. 2162.

c. Auf Sandſteingebirgen:

—. XIX., 3; Korbblütler: C. nigra L.; ſ. Nr. 2162.

d. Auf Jurakalkgebirgen:

—. XIX., 2; Korbblütler: Buphthālmum salicifolium DC.; ſ. Nr. 3031.

e. In ſteinigen Gebirgen:

—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracium pallēscens W. et K.; ſ. Nr. 2543.

f. Auf nackten Stellen:

—. XIX., 1; Korbblütler: Crinitaria linosyris Less.; ſ. Nr. 3018.

g. Auf Grasplätzen:

—. V., 2; Enzianpfl.: Gentiāna ciliāta L.; ſ. Nr. 3036.
—. XII., 3; Roſenpfl.: Sieversĭa montāna Spr.; ſ. Nr. 2552.
—. XIX., 1; Korbblütler: Cirsĭum acaule All.; ſ. Nr. 2097.

h. Auf Gebirgswieſen:

—. XIX., 1; Korbblütler: Cardŭus deflorātus L.; ſ. Nr. 2074.
—. XIX., 3; „ Centaurēa phrygĭa L.; ſ. Nr. 2163.
—. „ „ C. nigrēscens Willd.; ſ. Nr. 2556.

i. Auf Aeckern:

—. XIV., 1; Lippenblümler: Teucrĭum botrys L.; ſ. Nr. 2405.

k. Auf Torfboden:

—. X., 1; Heidepfl.: Tetrălix septentrionālis E. Mey.; ſ. Nr. 2561.

l. In Gebirgshainen:

—. XIX., 3; Korbblütler: Centaurēa phrygĭa L.; ſ. Nr. 2163.

m. In Gebirgswäldern:

—. IV., 1; Krapppfl.: Asperŭla tinctorĭa L.; ſ. Nr. 2143.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum lucĭdum L.; ſ. Nr. 504.
—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperĭcum pulchrum L.; ſ. Nr. 1089.

n. Am Rande der Gebirgswälder:

—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: Aconĭtum lycoctŏnum L.; ſ. Nr. 2153.

Z. Auf und an Felſen: §. 593.

—. V., 1; Aralienpfl.: Hedĕra helix L.; ſ. Nr. 3081.
—. „ Veilchenpfl.: Viŏla tricŏlor L.; ſ. Nr. 525.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Berterŏa incāna DC.; ſ. Nr. 1305.
—. XV., 2; „ Diplotāxis tenuifolĭa DC.; ſ. Nr. 1313.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum lucĭdum L.; ſ. Nr. 504.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Melilōtus alba Lmk.; ſ. Nr. 2197.
—. XIX., 1; Korbblütler: Cirsĭum acaule All.; ſ. Nr. 2097.

a. In Felſenklüften:

—. V., 1; Nachtſchattenpfl.: Solānum villōsum Lmk.; ſ. Nr. 3010.

b. An schattigen Felsen:

—. X., 3; Nelkenblütler: Moehringĭa muscōsa L.; s. Nr. 1666.

c. An trocknen Felsen:

—. X., 2; Paronychienpfl.: Scleránthus perēnnis L.; s. Nr. 676.

d. Am Fuße der Felsen:

—. X., 2; Nelkenblütler: Saponarĭa officinālis L.; s. Nr. 2184.

§. 594. **A[1]. In den Alpen und Voralpen:**

—. III., 2; Graspfl.: Avēna flavēscens L.; s. Nr. 1273.
—. „ „ A. scheuchzēri All.; s. Nr. 2588.
—. „ „ Poa laxa Haenke; s. Nr. 2589.
—. V., 1; Schlüsselblümler: Soldanélla alpīna L.; s. Nr. 817.
—. „ „ Campanŭla pusílla Haenke; s. Nr. 1681.
—. V., 1; Veilchenpfl.: Viŏla tricŏlor L.; s. Nr. 525.
—. V., 2; Enzianpfl.: Gentiāna lutĕa L.; s. Nr. 2506.
—. „ „ G. pannonĭca Scop.; s. Nr. 2507.
—. „ „ G. punctāta L.; s. Nr. 2597.
—. „ „ G. asclepiadēa L.; s. Nr. 3033.
—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: Aconītum anthōra L.; s. Nr. 3030.
—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: A. cammărum L.; s. Nr. 3034.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Anemōne alpīna L.; s. Nr. 771.
3087. XIX., 1; Korbblütler: Saussurĕa latifolĭa Ledeb. (S. macrophýlla Saut.). Breitblättrige Soſſüree. Bltr. unters. spinnwebig-flockig, grundständ. aus herzf. Basis breit-eilängl.; Blütenköpfe in lockerer Doldentraube; Hülle fast walzenf., flockig; Bl. purpurn; 4; 9 bis 10; Ty. *)
—. XIX., 2; Korbblütler: Anthĕmis styriăca Vest.; s. Nr. 3039.

a. Auf den höchsten Alpen:

—. V., 1; Schlüsselblümler: Primŭla minĭma L.; s. Nr. 2521.
—. V., 2; Enzianpfl.: Gentiāna glaciālis Vill.; s. Nr. 3042.

*) Sauter's Diagnose von seiner S. macrophylla weicht von derjenigen der S. latifolia Ledebour's nur in der Angabe ab, daß die Hüllschuppen stumpf sind, während sie Ledebour spitz angibt; in Wahrheit variren sie auf beide Weise!

—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracium sphaerocephalum Rchb.; ſ. Nr. 2690.
—. XIX., 2; Korbblütler: Senecio uniflorus All.; ſ. Nr. 2693.
—. „ „ Gnaphalium supinum L.; ſ. Nr. 3035.
—. XIX., 2; Korbblütler: Achillea moschata Wulff.; ſ. Nr. 2696.
—. XIX., 2; Korbblütler: A. clavennae L.; ſ. Nr. 2697.

b. Auf den höchſten Urgebirgsalpen:

—. V., 2; Enzianpfl.: Gentiana frigida Haenke; ſ. Nr. 2729.
—. „ „ Pleurogyne carinthiaca Eschsch.; ſ. Nr. 3045.
3088. XXI., 3; Halbgras: Carex aterrima Hoppe. Raben-ſchwarze Segge. Wrz. faſerig; Blr. breit-lineal., ſcharf; Halm aufr., 3kant., ſcharf; Aehren 3 bis 5, genähert, geſtielt, aufr., die oberſte unten ♂, oben ♀; Fr. verk.-eif., zſgedr., ſchärfl.-gerand., das aufgeſetzte kurze Röhrchen mit wenig-ausgerand. Mdg.; 4; 8 bis 9; Ty., Kä.*)

c. Nächſt der Schneegrenze:

—. XIX., 2; Korbblütler: Leontopodium alpinum Cass.; ſ. Nr. 2708.

d. Auf Kalkalpen:

—. XIX., 2; Korbblütler: Senecio abrotanifolius L.; ſ. Nr. 3047.

e. Auf ſchattigen Felſen der Kalkalpen:

—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracium pallescens W. et K.; ſ. Nr. 2543.

f. Auf Voralpen:

—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: Aconitum lycoctonum L.; ſ. Nr. 2153.
—. XIX., 2; Korbblütler: Buphthalmum salicifolium DC.; ſ. Nr. 3031.

g. Auf Geröll:

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolium caespitosum Reyn.; ſ. Nr. 3048.

h. Auf Geröll höherer Alpen:

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Tr. pallescens Schreb.; ſ. Nr. 2806.

*) Iſt nur Form der C. atrata L.!

i. An naſſen Felſen:

—. V., 1; Schlüſſelblümler: Cortūsa mathiōli L.; ſ. Nr. 854.

k. In Alpenthälern:

—. V., 2; Enzianpfl.: Gentiāna amarēlla L.; ſ. Nr. 3049.

l. An feuchten Stellen:

—. V., 2; Enzianpfl.: G. utriculōsa L.; ſ. Nr. 941.

m. An Felſen:

—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum pallēscens W. et K.; ſ. Nr. 2543.

n. Auf Torf- und Morboden:

—. V., 1; Schlüſſelblümler: Soldanēlla montāna Willd.; ſ. Nr. 496.

—. VI., 1; Semede: Juncus filifōrmis L.; ſ. Nr. 1790.

o. An Alpenbächen:

—. V., 1; Schlüſſelblümler: Cortūsa mathiōli L.; ſ. Nr. 854.

p. Auf Alpentriften:

—. VI., 1; Lilienpfl.: Lloydĭa serotīna Rchb.; ſ. Nr. 2731.

—. XII., 3; Roſenpfl.: Sieversĭa montāna Spr.; ſ. Nr. 2552.

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolĭum patens Schreb.; ſ. Nr. 1816.

q. Auf höher gelegenen Weiden:

—. XIX., 2; Korbblütler: Leontopodĭum alpīnum Cass.; ſ. Nr. 2708.

r. Auf Weiden der Kalk- und Voralpen:

—. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus alpīnus L.; ſ. Nr. 2758.

s. Auf Alpenwieſen:

—. XIX., 3; Korbblütler: Centaurēa phrygĭa L.; ſ. Nr. 2163.

t. Auf ſteinigen Alpenwieſen:

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolĭum caespitōsum Reyn.; ſ. Nr. 3048.

u. Auf trocknen Bergwieſen:

—. V., 2; Enzianpfl.: Gentiāna campēstris L.; ſ. Nr. 3032.

v. In Hainen:

—. XIX., 3; Korbblütler: Centaurēa phrygĭa L.; ſ. Nr. 2163.

B¹. Auf Heiden: §. 595.

—. VIII., 1; Heidepfl.: Tetrălix cinerĕa L.; ſ. Nr. 3050.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum bohemĭcum L.; ſ. Nr. 1028.
—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hyperĭcum humifūsum L.; ſ. Nr. 2134.
—. XVIII., 2; Hartheupfl.: H. pulchrum L.; ſ. Nr. 1089.

a. Auf Torfheiden:

—. VIII., 1; Heidepfl.: Tetrălix septentrionālis E. Mey.; ſ. Nr. 2561.

C¹. Auf ſonnigen, trocknen Plätzen: §. 596.

—. IV., 1; Krapppfl.: Galĭum mollūgo L.; ſ. Nr. 1006.
—. V., 1; Nachtſchattenpfl.: *Solānum melānocerăsum Willd.; ſ. Nr. 2317.
—. V., 1; Nachtſchattenpfl.: *S. miniātum Bernh.; ſ. Nr. 2268.
—. X., 3; Nelkenblütler: Melandrĭum pratēnse Roehl.; ſ. Nr. 1113.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Thymus serpўllum L.; ſ. Nr. 2088.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum virēscens Sond.; ſ. Nr. 3000.

D¹. Auf Aengern: §. 597.

—. XIX., 2; Korbblütler: Bellis perēnnis L.; ſ. Nr. 2.
—. „ „ Achillēa millefolĭum L.; ſ. Nr. 2101.

E¹. Auf Grasplätzen und Triften: §. 598.

—. III., 2; Graspfl.: Poa annŭa L.; ſ. Nr. 14.
—. „ „ Lolĭum perēnne L.; ſ. Nr. 1281.
—. IV., 1; Wegerichpfl.: Plantāgo lanceolāta L.; ſ. Nr. 1252.
—. „ Kardenpfl.: Scabiōsa arvēnsis L.; ſ. Nr. 1283.
—. V., 2; Doldenpfl.: Pimpinēlla saxifrăga L.; ſ. Nr. 2176.
—. „ „ Sesĕli colorātum Ehrh.; ſ. Nr. 2495.
—. X., 2; Nelkenblütler: Gypsophīla murālis L.; ſ. Nr. 2234.
—. X., 3; „ Spergularĭa rubra Presl.; ſ. Nr. 576.
—. XI., 2; Roſenpfl.: Agrimonĭa procēra Wallr.; ſ. Nr. 1115.
—. XII., 3; Roſenpfl.: Potentīlla anserīna L.; ſ. Nr. 578.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Thymus serpўllum L.; ſ. Nr. 2088.

—. XIV., 1; Lippenblümler: Prunella vulgaris L.; ſ. Nr. 2277.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranium molle L.; ſ. Nr. 539.
—. " " Erodium cicutarium l'Herit.; ſ. Nr. 217.
—. XVI., 5; Pappelroſenpfl.: Malva sylvestris L.; ſ. Nr. 1225.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Medicago falcata L.; ſ. Nr. 1324.
—. " " Trifolium pratense L.; ſ. Nr. 1032.
—. " " Tr. repens L.; ſ. Nr. 597.
—. " " Tr. filiforme L.; ſ. Nr. 599.
—. " " Tr. procumbens L.; ſ. Nr. 1329.
—. " " Lotus corniculatus L.; ſ. Nr. 1239.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracium umbellatum L.; ſ. Nr. 2095.
—. XIX., 1; Korbblütler: Taraxacum officinale Mnch.; ſ. Nr. 59.
—. XIX., 1; Korbblütler: Leontodon vulgaris Kitt.; ſ. Nr. 1079.
—. XIX., 2; Korbblütler: Achillea millefolium L.; ſ. Nr. 2101.
—. XIX., 2; Korbblütler: Bellis perennis L.; ſ. Nr. 2.

a. Auf feuchten Triften:

—. V., 2; Enzianpfl.: Gentiana amarella L.; ſ. Nr. 3049.
—. VI., 1; Weiderichpfl.: Peplis portula L.; ſ. Nr. 2819.
—. XVIII., 2; Hartheupfl.: Hypericum humifusum L.; ſ. Nr. 2134.
—. XIX., 2; Korbblütler: Pulicaria dysenterica Gaertn.; ſ. Nr. 2821.

b. Auf trocknen Triften:

—. IV., 1; Kardenpfl.: Scabiosa columbaria L.; ſ. Nr. 2080.
—. V., 2; Doldenpfl.: Eryngium campestre L.; ſ. Nr. 2271.
—. XIX., 1; Korbblütler: Cirsium acaule All.; ſ. Nr. 2097.

c. Auf ſalzhaltigen Triften:

—. XIX., 2; Korbblütler: Artemisia rupestris L.; ſ. Nr. 2823.

d. Auf feuchten Sandtriften:

—. XI., 1; Weiderichpfl.: Lythrum hyssopifolia L.; ſ. Nr. 2394.

e. Auf hochgelegenen Triften:

—. V., 2; Enzianpfl.: Gentiana campestris L.; ſ. Nr. 3032.

f. Auf Gebirgstriften:

—. XII., 3; Rosenpfl.: Sieversĭa montāna Spr.; ſ. Nr. 2552.

F¹. Auf Weiden: §. 599.

—. III., 2; Graspfl.: Poa annŭa L.; ſ. Nr. 14.
—. „ „ Lolĭum perēnne L.; ſ. Nr. 1281.
—. IV., 1; Wegerichpfl.: Plantāgo lanceolāta L.; ſ. Nr. 1252.
—. XII., 3; Rosenpfl.: Potentilla anserīna L.; ſ. Nr. 578.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Prunella vulgāris L.; ſ. Nr. 2277.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: *Medicāgo satīva L.; ſ. Nr. 1323.
—. „ „ Trifolĭum pratēnse L.; ſ. Nr. 1032.
—. „ „ T. repens L.; ſ. Nr. 597.
—. „ „ T. hybrĭdum L.; ſ. Nr. 469.
—. „ „ T. filifōrme L.; ſ. Nr. 599.
—. „ „ T. procūmbens L.; ſ. Nr. 1329.
—. „ „ Lotus corniculātus L.; ſ. Nr. 1239.
—. XIX., 1; Korbblütler: Oporinĭa autumnālis Don; ſ. Nr. 2826.
—. XIX., 1; Korbblütler: Taraxăcum officināle Mnch.; ſ. Nr. 59.
—. XIX., 1; Korbblütler: Leontŏdon vulgāris Kitt.; ſ. Nr. 1079.
—. XIX., 1; Korbblütler: Cirsĭum acaule All.; ſ. Nr. 2097.
—. XIX., 2; „ Senecĭo viscōsus L.; ſ. Nr. 1341.
—. „ „ S. erucaefolĭus Huds.; ſ. Nr. 2100.
—. „ „ Achillēa millefolĭum L.; ſ. Nr. 2101.
—. „ „ Bellis perēnnis L.; ſ. Nr. 2.

a. Auf feuchten Weiden:

—. IV., 1; Kardenpfl.: Scabiōsa succīsa L.; ſ. Nr. 3052.
—. V., 2; Enzianpfl.: Gentiāna amarēlla L.; ſ. Nr. 3049.

b. Auf trocknen Weiden:

—. IV., 1; Kardenpfl.: Scabiōsa columbarĭa L.; ſ. Nr. 2080.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum rotundifolĭum L.; ſ. Nr. 560.

c. Auf fetten Weiden:

—. XIV., 1; Lippenblümler: Mentha sylvēstris L.; ſ. Nr. 2218.

d. Auf torfigen Weiden:

—. VI., 1; Semede: Juncus filifōrmis L.; ſ. Nr. 1790.

e. Auf ſalzhaltigen Weiden:

—. XIX., 2; Korbblütler: Artemisĭa rupēstris L.; ſ. Nr. 2823.

§. 600. **G¹. Auf Wiesen:**

—. IV., 1; Kardenpfl.: Scabiōsa arvēnsis L.; s. Nr. 1283.
—. V., 1; Glockenblümler: Campanŭla rotundifolĭa L.; s. Nr. 1288.
—. V., 2; Doldenpfl.: Heraclēum sphondylĭum L.; s. Nr. 1867.
—. X., 5; Schnabelpfl.: *Oxălis stricta Jacq.; s. Nr. 1260.
—. „ Nelkenblütler: Cerastĭum vulgātum L. spec.; s. Nr. 463.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Prunēlla vulgāris L.; s. Nr. 2277.
—. XVII., 4; Hülsenpfl.: *Medicāgo satīva L.; s. Nr. 1323.
—. „ „ Melilōtus officinālis L.; s. Nr. 1326.
—. „ „ Trifolĭum pratēnse L.; s. Nr. 1032.
—. „ „ T. repens L.; s. Nr. 597.
—. „ „ T. filifōrme L.; s. Nr. 599.
—. „ „ T. procūmbens L.; s. Nr. 1329.
—. „ „ Lotus corniculātus L.; s. Nr. 1239.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum pilosēlla L.; s. Nr. 1181.
—. „ „ Crepis setōsa Hall. fil.; s. Nr. 2282.
—. „ „ Taraxăcum officināle Mnch.; s. Nr. 59.
—. XIX., 1; Korbblütler: Picris hieracioïdes L.; s. Nr. 2241.
—. „ „ Oporinĭa autumnālis Don; s. Nr. 2826.
—. XIX., 1; Korbblütler: Leontŏdon vulgāris Kitt.; s. Nr. 1079.
—. XIX., 2; Korbblütler: Bellis perēnnis L.; s. Nr. 2.
—. „ „ Achillēa millefolĭum L.; s. Nr. 2101.
—. XIX., 3; „ Centaurēa jacēa L.; s. Nr. 1343.

a. Auf trocknen Wiesen:

—. IV., 1; Kardenpfl.: Scabiōsa columbarĭa L.; s. Nr. 2080.
—. „ Krapppfl.: Galĭum mollūgo L.; s. Nr. 1006.
—. V., 2; Doldenpfl.: Pimpinēlla saxifrăga L.; s. Nr. 2176.
—. „ „ Seséli coloratum Ehrh.; s. Nr. 2495.
3089. VI., 3; Zeitlosenpfl.: Colchĭcum autumnale L. Herbst-Zeitlose (Wiesensafran, Mottensafran, Licht- oder Herbstblume, Strockenbrot, Hahnenklöße, Hemdbeutel, Hosenbunte, Michaels-, Spinn- oder Uchtblume, nackte Jungfer, Michelwurz, Storchenbrot, Sohn vor dem Vater). Zwiebel 1- bis mehrblüt.; Bltr. nach den Bl. sich entwickelnd, breitlanzettl., spitz; Bl. fleischrot; Samen im nächsten Sommer reifend; 9 bis 10; ♯; ♃; ✕.
—. X., 2; Nelkenblütler: Dianthus deltoides L.; s. Nr. 1111.

—. X., 2; Nelkenblütler: D. supērbus L.; ſ. Nr. 1016.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Medicāgo falcāta L.; ſ. Nr. 1324.
—. XIX., 1; Korbblütler: Cirsĭum acaule All.; ſ. Nr. 2097.

b. Auf feuchten, naſſen Wieſen:

—. II., 1; Rachenblümler: Veronīca serpyllifolĭa L.; ſ. Nr. 424.
—. III., 1; Halbgras: Cypērus flavēscens L.; ſ. Nr. 1143.
—. „ „ C. fuscus L.; ſ. Nr. 2831.
—. „ „ Scirpus setacĕus L.; ſ. Nr. 2832.
—. III., 2; Graspfl.: Leersĭa oryzoīdes Sw.; ſ. Nr. 2999.
—. „ „ Crypsis alopecuroīdes Schrad.; ſ. Nr. 1881.
—. III., 2; Graspfl.: Lolĭum perēnne L.; ſ. Nr. 1281.
—. IV., 1; Wegerichpfl.: Plantāgo lanceolāta L.; ſ. Nr. 1252.
—. „ Kardenpfl.: Scabiōsa succīsa L.; ſ. Nr. 3052.
—. V., 1; Borretſchpfl.: Myosōtis palūstris With.; ſ. Nr. 1891.
—. V., 2; Enzianpfl.: Gentiāna pneumonānthe L.; ſ. Nr. 3053.
—. V., 2; Enzianpfl.: G. amarēlla L.; ſ. Nr. 3049.
—. „ „ G. germanĭca Willd.; ſ. Nr. 2456.
—. „ Doldenpfl.: Helosciadĭum repens Koch; ſ. Nr. 2837.
—. V., 2; Doldenpfl.: Angelĭca sylvēstris L.; ſ. Nr. 2115.
—. VI., 1; Semede: Juncus filifōrmis L.; ſ. Nr. 1790.
—. VI., 3; Knöterichpfl.: Rumex maritĭmus L.; ſ. Nr. 1899.
—. „ „ R. palūstris Sm.; ſ. Nr. 2841.
—. VIII., 1; „ Polygŏnum amphibĭum L.; ſ. Nr. 2843.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: P. persicarĭa L.; ſ. Nr. 2182.
—. „ „ P. hydropīper L.; ſ. Nr. 2117.
—. XI., 1; Weiderichpfl.: Lythrum hyssopifolĭa L.; ſ. Nr. 2394.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Ranuncŭlus sceleratus L.; ſ. Nr. 1904.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Mentha arvēnsis L.; ſ. Nr. 2213.
—. „ „ Scutellarĭa minor L.; ſ. Nr. 2844.
—. „ „ Teucrĭum scordĭum L.; ſ. Nr. 2845.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Euphrasĭa odontītes L.; ſ. Nr. 2308.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Melilōtus dentāta Pers.; ſ. Nr. 2281.
—. „ „ Trifolĭum hybrĭdum L.; ſ. Nr. 469.
—. „ „ T. fragifĕrum L.; ſ. Nr. 1908.

—. XIX., 1; Korbblütler: Cirsium palūstri-oleracĕum Schiede; ſ. Nr. 2849.
—. XIX., 1; Korbblütler: C. canum M. B.; ſ. Nr. 3055.
—. XIX., 2; „ Achillēa ptarmĭca L.; ſ. Nr. 2927.

c. Auf Sumpfwieſen:

—. IV., 1; Krapppflſ.: Galĭum palūstre L.; ſ. Nr. 2852.
—. „ „ G. trifĭdum L.; ſ. Nr. 3057.
—. X., 2; Nelkenblütler: Diānthus supērbus L.; ſ. Nr. 1016.

d. Auf ſandigen Sumpfwieſen:

—. VI., 1; Lilienpflſ.: Allĭum suaveŏlens Jacq.; ſ. Nr. 2854.

e. Auf fetten Wieſen:

—. XIV., 1; Lippenblümler: Mentha sylvēstris L.; ſ. Nr. 2218.

f. Auf Torfwieſen:

—. V., 1; Borretſchpflſ.: Myosōtis palūstris With.; ſ. Nr. 1891.
—. V., 2; Enzianpflſ.: Gentiāna pneumonānthe L.; ſ. Nr. 3053.
—. V., 2; Enzianpflſ.: G. amarēlla L.; ſ. Nr. 3049.
—. VIII., 1; Heidepflſ.: Tetrălix septentrionālis E. Mey.; ſ. Nr. 2561.
—. X., 2; Steinbrechpflſ.: Saxifrăga hircŭlus L.; ſ. Nr. 2858.

g. Auf naſſen, ſchlammigen Wieſen:

—. V., 4; Studentenröschen: Parnassĭa palūstris L.: ſ. Nr. 2500.

h. Auf ſalzhaltigen Wieſen:

—. IV., 1; Wegerichpflſ.: Plantāgo coronŏpus L.; ſ. Nr. 2862.
—. V., 5; Leinpflſ.: Linum maritĭmum L.; ſ. Nr. 3058.
—. XVII., 4; Hülſenpflſ.: Melilōtus dentāta Pers.; ſ. Nr. 2281.
—. XVII., 4; Hülſenpflſ.: Trifolĭum fragifĕrum L.; ſ. N. 1908.

i. An Wieſenrändern:

—. X., 3; Nelkenblütler: Melandrĭum pratense Roehl.; ſ. Nr. 1113.

k. Auf hochgelegenen Wieſen:

—. V., 2; Enzianpflſ.: Gentiāna campēstris L.; ſ. Nr. 3032.

l. Auf Berg- und Gebirgswiesen:

—. III., 2; Graspfl.: Molinĭa coerulĕa Mnch.; s. Nr. 2112.
—. IV., 1; Kardenpfl.: Scabiōsa sylvatĭca L.; s. Nr. 2141.
—. V., 2; Doldenpfl.: Seselĭ colorātum Ehrh.; s. Nr. 2495.
—. XIX., 1; Korbblütler: Carduus defloratus L.; s. Nr. 2074.
—. XIX., 3; Korbblütler: Centaurēa phrygĭa L.; s. Nr. 2163.
—. „ „ C. nigrēscens Willd.; s. Nr. 2556.

m. Auf feuchten Bergwiesen:

—. V., 4; Studentenröschen: Parnassĭa palūstris L.; s. Nr. 2500.

n. Auf trocknen Bergwiesen:

—. XXI., 1; Giftmilcher: Euphorbĭa nicaeēnsis All.; s. Nr. 1914.

H[1]. An feuchten, sumpfigen Orten: §. 601.

—. II., 1; Rachenblümler: Veronĭca serpyllifolĭa L.; s. Nr. 424.
—. II., 1; Lippenblümler: Lycŏpus europaeus L.; s. Nr. 2891.
—. II., 1; Lippenblümler: L. exaltātus L. fil.; s. Nr. 2892.
—. III., 1; Halbgras: Cypērus flavēscens L.; s. Nr. 1143.
—. „ „ C. fuscus L.; s. Nr. 2831.
—. „ „ Scirpus dichotŏmus L.; s. Nr. 2875.
—. „ „ Sc. setacĕus L.; s. Nr. 2832.
—. III., 2; Graspfl.: Aira uliginōsa Weihe; s. Nr. 3059.
—. „ „ Arūndo donax L.; s. Nr. 3060.
—. IV., 1; Krapppfl.: Galĭum palūstre L.; s. Nr. 2852.
—. V., 1; Borretschpfl.: Myosōtis palūstris With.; s. Nr. 1891.
—. V., 1; Borretschpfl.: M. caespitōsa Schultz; s. Nr. 1926.
—. V., 2; Doldenpfl.: Helosciadĭum repens Koch; s. Nr. 2837.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygŏnum amphibĭum L.; s. s. Nr. 2843.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: P. persicarĭa L.; s. Nr. 2182.
—. „ „ P. hydropīper L.; s. Nr. 2117.
—. X., 5; Nelkenblütler: Cerastĭum vulgātum L. spec.; s. Nr. 463.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Mentha arvēnsis L.; s. Nr. 2213.

—. XV., 2; Kreuzblütler: Nasturtĭum palūstre DC.; ſ. Nr. 1933.
—. XIX., 2; Korbblütler: Achillēa ptarmĭca L.; ſ. Nr. 2927.
—. „ „ Pulicarĭa dysenterĭca Gaertn.; ſ. Nr. 2821.
3090. XIX., 2; Korbblütler: P. vulgāris Gaertn. (Inŭla pulicarĭa L., P. prostrāta Aschrsn.). Gemeines Flöhkraut (Chriſtinchenkraut). St. meiſt graufilz., riſp.-ebenſträuß.; Bltr. längl.-lanzettl., wellig, mit abgerund. Baſisſitz., faſt umfaſſ.; Stralbl. wenig länger, als die Scheibenbl.; Blkr. ſchmutziggelb; ⊙; 9 bis 10.
—. XIX., 3; Korbblütler: Bidens cernŭa W.; ſ. Nr. 3061.
—. „ „ B. tripartīta L.; ſ. Nr. 3062.

§. 602. **I¹. An ſchattigen Orten:**

a. An ſchattigen, ſteinigen Stellen:

—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum robertiānum L.; ſ. Nr. 431.

§. 603. **K¹. An Quellen und quelligen Orten:**

—. III., 1; Fettkrautpfl.: Montĭa fontāna L.; ſ. Nr. 683.
—. IV., 1; Krapppfl.: Galĭum palūstre L.; ſ. Nr. 2852.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Nasturtĭum officināle R. Br.; ſ. Nr. 954.

§. 604. **L¹. Auf Moraſt- und Morboden:**

—. III., 2; Graspfl.: Aira uliginōsa Weihe; ſ. Nr. 3059.
—. VI., 3; Knöterichpfl.: Rumex palūstris Sm.; ſ. Nr. 2841.
—. X., 2; Steinbrechpfl.: Saxifrăga hircŭlus L.; ſ. Nr. 2858.

§. 605. **M¹. Auf Torfboden:**

—. V., 1; Borretſchpfl.: Myosōtis caespitōsa Schultz; ſ. Nr. 1926.
—. VI., 1; Semede: Juncus filifōrmis L.; ſ. Nr. 1790.
—. VIII., 1; Enzianpfl.: Chlora serotīna Koch; ſ. Nr. 2895.
—. X., 2; Steinbrechpfl.: Saxifrăga hircŭlus L.; ſ. Nr. 2858.

a. Auf Torfwieſen:

Vergl. §. 600, f.

§. 606. **N¹. Auf überſchwemmt geweſenen Stellen:**

—. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygŏnum vivipārum L.; ſ. Nr. 1837.

—. VIII., 1; Knöterichpfl.: P. pericaria L.; ſ. Nr. 2182.
—. „ „ P. hydropiper L.; ſ. Nr. 2117.
—. XI., 1; Weiderichpfl.: Lythrum hyssopifolia L.; ſ. Nr. 2394.
—. XII., 3; Roſenpfl.: Potentilla supina L.; ſ. Nr. 1369.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Nasturtium palustre DC.; ſ. Nr. 1933.

a. In Wäldern:

—. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygonum minus Huds.; ſ. Nr. 2118.

O[1]. An und in Gräben, Bächen, Flüſſen: §. 607.

—. II., 1; Rachenblümler: Veronica anagallis L.; ſ. Nr. 1955.
—. „ Lippenblümler: Lycopus europaeus L.; ſ. Nr. 2891.
—. „ „ L. exaltatus L. fil.; ſ. Nr. 2892.
—. III., 1; Halbgras: Cyperus flavescens L.; ſ. Nr. 1143.
—. „ „ Scirpus fluitans L.; ſ. Nr. 1956.
—. „ „ Sc. michelianus L.; ſ. Nr. 2908.
—. III., 2; Graspfl.: Coleanthus subtilis Seid.; ſ. Nr. 2910.
—. „ „ Leersia oryzoides Sw.; ſ. Nr. 2999.
—. „ „ Elymus arenarius L.; ſ. Nr. 2916.
—. IV., 1; Kardenpfl.: Dipsacus laciniatus L.; ſ. Nr. 2264.
—. „ „ D. pilosus L.; ſ. Nr. 2079.
—. „ Krapppfl.: Galium palustre L.; ſ. Nr. 2852.
—. IV., 4; Najadenpfl.: Potamogeton natans L.; ſ. Nr. 1963.
—. „ „ P. comprēssus L.; ſ. Nr. 2917.
—. „ „ P. obtusifolius Koch; ſ. Nr. 1969.
—. „ „ P. pectinatus L.; ſ. Nr. 1970.
—. V., 1; Vorretſchpfl.: Myosotis palustris With.; ſ. Nr. 1891.
—. V., 1; Vorretſchpfl.: M. caespitosa Schultz; ſ. Nr. 1926.
—. V., 2; Meldenpfl.: Chenopodium album L.; ſ. Nr. 2231.
—. „ „ Corispermum hyssopifolium L.; ſ. Nr. 3005.
—. V., 2; Meldenpfl.: Salsola kali L.; ſ. Nr. 2919.
—. „ Doldenpfl.: Aegopodium podagraria L.; ſ. Nr. 1012.
—. V., 2; Doldenpfl.: Cenolophium fischeri Koch; ſ. Nr. 2921.
—. V., 2; Doldenpfl.: Angelica sylvestris L.; ſ. Nr. 2115.
—. VI., 1; Weiderichpfl.: Peplis portula L.; ſ. Nr. 2819.
—. VI., 3; Knöterichpfl.: Rumex maritimus L.; ſ. Nr. 1899.
—. „ „ R. palustris Sm.; ſ. Nr. 2841.

—. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygŏnum amphibĭum L.; ſ. Nr. 2843.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: P. hydropīper L.; ſ. Nr. 2117.
—. X., 2; Nelkenblütler: Gypsophĭla murālis L.; ſ. Nr. 2234.
—. X., 5; „ Malachĭum aquatĭcum Fr.; ſ. Nr. 1241.
—. X., 5; Nelkenblütler: Cerastĭum vulgātum L. spec.; ſ. Nr. 463.
—. XI., 1; Weiderichpfl.: Lythrum salicarĭa L.; ſ. Nr. 1242.
—. „ „ L. hyssopifolĭa L.; ſ. Nr. 2394.
—. XII., 3; Roſenpfl.: Geum urbānum L.; ſ. Nr. 1077.
—. „ „ Potentĭlla supīna L.; ſ. Nr. 1369.
—. „ „ P. anserīna L.; ſ. Nr. 578.
—. XIII., 1; Nimfenpfl.: Nymphaea alba L.; ſ. Nr. 1976.
—. XIII., 2; Gichtroſenpfl.: Cimicifŭga foetĭda L.; ſ. Nr. 2062.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Ranuncŭlus aquatĭlis L.; ſ. Nr. 1978.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: R. sceleratus L.; ſ. Nr. 1904.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Mentha sylvēstris L.; ſ. Nr. 2218.
—. „ „ M. rotundifolĭa L.; ſ. Nr. 2178.
—. „ „ M. arvēnsis L.; ſ. Nr. 2213.
—. „ „ Scutellarĭa minor L.; ſ. Nr. 2844.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Scrophularĭa nodōsa L.; ſ. Nr. 1069.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Sc. aquatĭca L.; ſ. Nr. 2925.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Nasturtĭum officināle R. Br.; ſ. Nr. 954.
—. XV., 2; Kreuzblütler: N. amphibĭum R. Br.; ſ. Nr. 1979.
—. „ „ Erysīmum cheiranthoīdes L.; ſ. Nr. 1484.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Melānosināpis commūnis Sch. et Sp.; ſ. Nr. 2375.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Melilōtus alba Lmk.; ſ. Nr. 2197.
—. „ „ Trifolĭum fragifĕrum L.; ſ. Nr. 1908.
—. „ „ Lotus corniculātus L.; ſ. Nr. 1239.
—. XIX., 1; Korbblütler: Crepis biēnnis L.; ſ. Nr. 1869.
—. „ „ Sonchus asper Hall.; ſ. Nr. 1263.
—. „ „ Picris hieracioīdes L.; ſ. Nr. 2241.
—. „ „ Leontŏdon vulgāris Kitt.; ſ. Nr. 1079.
—. XIX., 2; Korbblütler: Achillēa ptarmīca L.; ſ. Nr. 2927.
—. „ „ Pulicarĭa vulgāris Gaertn.; ſ. Nr. 3090.

—. XIX., 2; Korbblütler: P. dysenterĭca Gaertn.; ſ. Nr. 2821.
—. „ „ Inula salicĭna L.; ſ. Nr. 2222.
—. „ „ *Solidāgo procēra Sol.; ſ. Nr. 2997.
—. „ „ Bellis perēnnis L.; ſ. Nr. 2.
—. „ „ Aster salĭgnus Willd.; ſ. Nr. 2928.
—. „ „ *A. parviflōrus Nees; ſ. Nr. 3063.
—. „ „ *A. leucanthĕmus Desf.; ſ. Nr. 3064.
3091. „ „ *A. novi belgĭi L. Königblaue Aſter. St. vielfach-doldentraubig-zſgeſetzt-äſtig; Stbltr. umfaſſ., lanzettl., untere klein-geſägt; Hüllblttchn. locker-abſteh.; Stral königblau; 4; 9 bis 10; ‡; Vaterland: Nordamerika.
—. XIX., 3; Korbblütler: Bidens tripartīta L.; ſ. Nr. 3062.
—. XXI., 1; Najadenpfl.: Zannichellĭa palūstris L.; ſ. Nr. 2929.
—. XXI., 1; Waſſerſternpfl.: Callitrĭche autumnālis L.; ſ. Nr. 2932.
—. XXI., 1; Giftmilcher: Euphorbĭa stricta Sm.; ſ. Nr. 1041.
—. XXI., 2; Najadenpfl.: Ruppĭa maritĭma L.; ſ. Nr. 2933.
—. XXI., 5; Hornblattpfl.: Ceratophўllum demērsum L.; ſ. Nr. 3065.
—. XXI., 5; Hornblattpfl.: C. platyacānthum Cham.; ſ. Nr. 3066.
—. XXII., 1; Najadenpfl.: Najus major Roth; ſ. Nr. 2935.

a. An ſandigen Flußufern:

—. V., 1; Paronychienpfl.: Herniarĭa hirsūta L.; ſ. Nr. 2389.
—. X., 2; Nelkenblütler: Saponarĭa officinālis L.; ſ. Nr. 2184.
—. XXI., 5; Spitzklettenpfl.: Xanthĭum macrocārpum DC.; ſ. Nr. 2305.

b. An lehmigen Flußufern:

—. XV., 2; Kreuzblütler: Diplotāxis viminĕa DC.; ſ. Nr. 1492.

c. Unter Gebüſch:

—. X., 3; Nelkenblütler: Cucubălus baccifĕrus L.; ſ. Nr. 2186.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Lamĭum maculātum L.; ſ. Nr. 190.

d. In klaren Bächen:

—. III., 1; Fettkrautpfl.: Montĭa fontāna L.; ſ. Nr. 683.

§. 608. **Pl. An und in stehenden Gewässern (Teichen, Seen):**

—. II., 1; Rachenblümler: Veronīca anagāllis L.; ſ. Nr. 1955.
—. „ Lippenblümler: Lycŏpus europaeus L.; ſ. Nr. 2891.
—. „ „ L. exaltātus L. fil.; ſ. Nr. 2892.
—. III., 1; Halbgras: Cypērus fuscus L.; ſ. Nr. 2831.
—. „ „ C. glomerātus L.; ſ. Nr. 2938.
—. „ „ Scirpus fluĭtans L.; ſ. Nr. 1956.
—. „ „ Sc. setacĕus L.; ſ. Nr. 2832.
—. „ „ Sc. micheliānus L.; ſ. Nr. 2908.
—. III., 2; Graspfl.: Coleānthus subtīlis Seid.; ſ. Nr. 2910.
—. IV., 4; Najadenpfl.: Potămogēton natans L.; ſ. Nr. 1963.
—. „ „ P. comprēssus L.; ſ. Nr. 2917.
—. „ „ P. obtusifolĭus Koch; ſ. Nr. 1969.
—. „ „ P. pectinātus L.; ſ. Nr. 1970.
—. „ „ P. densus L.; ſ. Nr. 1987.
—. V., 1; Borretſchpfl.: Myosōtis palūstris With.; ſ. Nr. 1891.
—. V., 1; Borretſchpfl.: M. caespitōsa Schultz; ſ. Nr. 1926.
—. V., 2; Doldenpfl.: Aegopodĭum podagrarĭa L.; ſ. Nr. 1012.
—. VI., 1; Weiderichpfl.: Peplis portŭla L.; ſ. Nr. 2819.
—. VI., 3; Knöterichpfl.: Rumex maritĭmus L.; ſ. Nr. 1899.
—. „ „ R. palūstris Sm.; ſ. Nr. 2841.
—. VIII., 1; „ Polygŏnum amphibĭum L.; ſ. Nr. 2843.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: P. hydropīper L.; ſ. Nr. 2117.
—. X., 2; Nelkenblütler: Gypsophĭla muralis L.; ſ. Nr. 2234.
—. X., 5; „ Cerastĭum vulgātum L. spec.; ſ. Nr. 463.
—. XII., 3; Roſenpfl.: Geum urbānum L.; ſ. Nr. 1077.
—. „ „ Potentĭlla supīna L.; ſ. Nr. 1369.
—. XIII., 1; Nimfenpfl.: Nymphaea alba L.; ſ. Nr. 1976.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Ranuncŭlus aquatĭlis L.; ſ. Nr. 1978.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Mentha arvēnsis L.; ſ. Nr. 2213.
—. XIV., 2; Rachenblümler: Scrophularĭa aquatĭca L.; ſ. Nr. 2925.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Nasturtĭum officinale R. Br.; ſ. Nr. 954.
—. XV., 2; Kreuzblütler: N. amphibĭum R. Br.; ſ. Nr. 1979.
—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolĭum fragifĕrum L.; ſ. Nr. 1908.

—. XIX., 2: Korbblütler: Pulicaria vulgāris Gaertn.; s. Nr. 3090.
—. XIX., 2; Korbblütler: P. dysenterica Gaertn.; s. Nr. 2821.
—. XIX., 2; Korbblütler: Bellis perēnnis L.; s. Nr. 2.
—. XIX., 3; „ Bidens tripartīta L.; s. Nr. 3062.
—. XXI., 1; Najadenpfl.: Caulinia flexilis Willd.; s. Nr. 3067.
—. XXI., 1; Najadenpfl.: Zannichellia palūstris L.; s. Nr. 2929.
—. XXI., 1; Najadenpfl.: Z. pedicellāta Whlbg.; s. Nr. 2944.
—. „ „ Callitriche autumnālis L.; s. Nr. 2932.
—. XXI., 2; Najadenpfl.: Ruppia maritima L.; s. Nr. 2933.
—. XXI., 3; Rohrkolbenpfl.: Sparganium natans L.; s. Nr. 2945.
—. XXI., 5; Hornblattpfl.: Ceratophyllum demērsum L.; s. Nr. 3065.
—. XXI., 5; Hornblattpfl.: C. submērsum L.; s. Nr. 3068.
—. XXII., 1; Najadenpfl.: Najas major Roth; s. Nr. 2935.

a. In Tümpeln, Lachen, Pfützen:

—. IV., 4; Najadenpfl.: Potamogēton densus L.; s. Nr. 1987.
—. XXII., 1; „ Najas major Roth; s. Nr. 2935.

b. Auf dem Sande abgelassener Teiche:

3092. V., 2: Meldenpfl.: Chenopodium humifūsum Kitt. (Ch. crassifolium glomerātum Wallr.?). Kleiner Gänsefuß. St. kurz; Aeste niedergestreckt, allseitig ausgebreit.; Blr. langgestielt, rhombisch-spießf., fast ganzrand., beiders. gleichfarb.; Knäuel einzeln, blattachselst.; Bl. sehr klein; ⊙; 9; Schönbusch b. Aschaffenburg

Q¹. An salzhaltigen Orten des Binnenlandes: §. 609.

—. II., 1; Meldenpfl.: Salicornia herbacea L.; s. Nr. 3069.
—. IV., 1; Wegerichpfl.: Plantago maritima L.; s. Nr. 1993.
—. „ „ P. coronopus L.; s. Nr. 2862.
—. V., 1; Enzianpfl.: Erythraea linariaefolia Pers.; s. Nr. 1994.
—. V., 2; Meldenpfl.: Suaeda chenopodioides M. B.; s. Nr. 3070.
—. V., 2; Meldenpfl.: Salsola kali L.; s. Nr. 2919.
—. V., 5; Leinpfl.: Linum maritimum L.; s. Nr. 3058.

—. XVII., 4; Hülſenpfl.: Melilōtus dentāta Pers.; ſ. Nr. 2281.
—. XIX., 2; Korbblütler: Artemisĭa rupēstris L.; ſ. Nr. 2823.
—. XIX., 2; Korbblütler: A. coerulēscens L.; ſ. Nr. 3075.
3093. „ „ A. maritĭma L. (A. seriphĭum Wallr.). Meerſtrands-Beifuß (Aſchenblatt, unſerer lieben Frauen Weißrauch). Bltr. 2- bis 3fach-gefied., lineal.-ſtumpf-zipf.; Köpfchen längl., gelbl., faſt ſitz.; 4; 9 bis 10; ♆; Sa., Po.
Variirt: A. salīna Willd. (ſchwächer filzig, Hüllblttchn. kahl, glänz.).
—. XIX., 2; Korbblütler: Aster tripolĭum L.; ſ. Nr. 3071.
—. XXI., 5; Meldenpfl.: Atrĭplex pedunculāta L.; ſ. Nr. 3072.
—. XXI., 5; Meldenpfl.: A. littorāle L.; ſ. Nr. 2893.

§. 610. **R¹. Am Meeresſtrande:**

—. II., 1; Meldenpfl.: Salicornĭa herbacĕa L.; ſ. Nr. 3069.
—. III., 2; Graspfl.: Elўmus arenarĭus L.; ſ. Nr. 2916.
—. IV., 1; Wegerichpfl.: Plantāgo maritĭma L.; ſ. Nr. 1993.
—. „ „ Pl. coronŏpus L.; ſ. Nr. 2862.
—. V., 1; Enzianpfl.: Erythraea linarĭaefolĭa Pers.; ſ. Nr. 1994.
—. V., 2; Meldenpfl.: Kochĭa hirsūta Nolte; ſ. Nr. 2957.
—. „ „ Suaeda chenopodioīdes M. B.; ſ. Nr. 3070.
—. V., 2; Meldenpfl.: Salsŏla kali L.; ſ. Nr. 2919.
—. V., 5; Bleiwurzpfl.: Statĭce limonĭum L.; ſ. Nr. 2960.
—. „ Leinpfl.: Linum maritĭmum L.; ſ. Nr. 3058.
—. VI., 1; Semede: Juncus baltĭcus Willd.; ſ. Nr. 2004.
—. VI., 3; Knöterichpfl.: Rumex maritĭmus L.; ſ. Nr. 1899.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Cakĭle maritĭma Scop.; ſ. Nr. 3074.
—. XIX., 2; Korbblütler: Senecĭo livĭdus L.; ſ. Nr. 1503.
—. „ „ Artemisĭa maritĭma L.; ſ. Nr. 3093.
—. „ „ Aster tripolĭum L.; ſ. Nr. 3071.
—. XXI., 1; Najadenpfl.: Zostēra marīna L.; ſ. Nr. 2009.
—. „ „ Z. nana Roth; ſ. Nr. 2010.
—. „ „ Caulinĭa fragĭlis Willd.; ſ. Nr. 1990.
—. „ „ Zannichellĭa palūstris L.; ſ. Nr. 2929.
—. XXI., 1; Najadenpfl.: Z. polycarpa Nolte; ſ. Nr. 2966.

—. XXI., 1; Najadenpfl.: Z. pedicellāta Whlbg.; ſ. Nr. 2944.
—. XXI., 2; Najadenpfl.: Ruppĭa maritīma L.; ſ. Nr. 2933.
—. XXI., 5; Meldenpfl.: Atrĭplex portulacoïdes L.; ſ. Nr. 3076.
—. XXI., 5: Meldenpfl.: A. pedunculāta L.; ſ. Nr. 3072.
—. „ „ A. littorāle L.; ſ. Nr. 2893.
—. XXII., 1; Najade: Najas major Roth.; ſ. Nr. 2935.
—. XXII., 6; Spargelpfl.: Smilax aspĕra L.; ſ. Nr. 3077.

S¹. Kulturpflanzen: §. 611

a. In Gemüſegärten:

—. XI., 1; Fettkrautpfl.: Portulāca oleracĕa L.; ſ. Nr. 1269.
—. „ „ P. satīva Haw.; ſ. Nr. 2025.
—. XIV., 1; Lippenblümler: *Origănum majorāna L.: ſ. Nr. 3078.
—. XIV., 1; Lippenblümler: *Saturēja hortēnsis L.; ſ. Nr. 2973.
—. XIV., 1; Lippenblümler: S. montāna L.; ſ. Nr. 2464.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Brassĭca oleracĕa L.; ſ. Nr. 109.
—. „ „ Nasturtĭum officināle R. Br.; ſ. Nr. 954.
—. XIX., 1; Korbblütler: *Cichorĭum endivĭa L.; ſ. Nr. 2975.
—. XIX., 2; Korbblütler: *Artemisĭa abrotănum L.; ſ. Nr. 3023.
—. XIX., 2; Korbblütler: *A. dracuncŭlus L.; ſ. Nr. 3079.
—. XXI., 9; Kürbispfl.: *Cucŭmis satīvus L.; ſ. Nr. 2366.
—. „ „ *C. melo L.; ſ. Nr. 2977.
—. „ „ *Cucurbĭta pepō L.; ſ. Nr. 2367.
—. „ „ *C. verrucōsa L.; ſ. Nr. 2978.
—. „ „ *C. melopĕpo L.; ſ. Nr. 1576.
—. „ „ *C. maxīma Duch.; ſ. Nr. 2030.

b. In Blumengärten, Anlagen u. dergl.:

—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: *Delphinĭum ajācis L.; ſ. Nr. 1398.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Adōnis autumnālis L.; ſ. Nr. 1302.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Matthiōla incāna R. Br.; ſ. Nr. 108.

§. 612. **T¹. Schmarotzer:**

a. Auf Nesseln, Hanf, Hopfen, Wicken, Weiden, Schlehen u. s. w.:

—. V., 2; Windenpfl.: Cuscŭta europaea L.; s. Nr. 2991.

b. Auf Luzerne:

—. V., 2; Windenpfl.: *C. suaveŏlens Ser.; s. Nr. 3080.

October.

§. 613. **A. In Wäldern:**

—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum boreāle Fr.; s. Nr. 2996.

a. An feuchten Stellen:

—. II., 1; Rachenblümler: Veronĭca serpyllifolĭa L.; s. Nr. 424.

—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum robertiānum L.; s. Nr. 431.

b. Auf überschwemmten Plätzen:

—. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygŏnum minus Huds.; s. Nr. 2118.

c. An lichten Stellen:

—. XIX., 1; Korbblütler: Leontŏdon vulgāris Kitt.; s. Nr. 1079.

—. XIX., 2; Korbblütler: Senecĭo sylvatĭcus L.; s. Nr. 1080.

d. An Bäumen:

—. V., 1; Aralienpfl.: Hedĕra helix L.; s. Nr. 3081.

e. An Waldrändern:

—. XIV., 1; Lippenblümler: Lamĭum album L.; s. Nr. 169.

—. XIX., 2; Korbblütler: Senecĭo sylvatĭcus L.; s. Nr. 1080.

—. „ „ Bellis perēnnis L.; s. Nr. 2.

§. 614. **B. In Hainen:**

—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum robertiānum L.; s. Nr. 431.

—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum boreāle Fr.; s. Nr. 2996.

C. In Gebüschen, Hecken, Zäunen u. dergl.: §. 615.

—. V., 1; Veilchenpfl.: Viŏla tricŏlor L.; ſ. Nr. 525.
—. V., 2; Doldenpfl.: Bupleurum falcātum L.; ſ. Nr. 3003.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Lamĭum album L.; ſ. Nr. 169.
—. „ „ L. purpurĕum L.; ſ. Nr. 10.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum robertiānum L.; ſ. Nr. 431.
—. XIX., 2; Korbblütler: Bellis perēnnis L.; ſ. Nr. 2.
—. XIX., 4; „ *Calendŭla officinālis L.; ſ. Nr. 2208.
—. XXI., 5; Meldenpfl.: Atrĭplex hastātum L.; ſ. Nr. 2210.
—. „ „ A. patŭlum L.; ſ. Nr. 2211.

a. An feuchten Stellen:

—. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygŏnum minus Huds.; ſ. Nr. 2118.

b. Unter Geſträuch:

—. V., 1; Glockenblümler: Phyteuma canēscens W. et K.; ſ. Nr. 2220.

D. In Gärten (Baum- und Grasgärten, auf Gartenland): §. 616.

—. V., 1; Schlüſſelblümler: Anagāllis arvēnsis L.; ſ. Nr. 55.
—. „ Nachtſchattenpfl.: *Solānum nigrum L.; ſ. Nr. 1254.
—. „ Veilchenpfl.: Viŏla tricŏlor L.; ſ. Nr. 525.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygŏnum aviculāre L.; ſ. Nr. 2255.
—. X., 3; Nelkenblütler: Stellarĭa medĭa Vill.; ſ. Nr. 4.
—. X., 5; Schnabelpfl.: *Oxălis stricta Jacq.; ſ. Nr. 1260.
—. „ „ *O. corniculāta L.; ſ. Nr. 1261.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Lamĭum album L.; ſ. Nr. 169.
—. „ „ L. purpurĕum L.; ſ. Nr. 10.
—. „ „ L. amplexicaule L.; ſ. Nr. 214.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Thlaspi arvēnse L.; ſ. Nr. 215.
—. „ „ Capsēlla bursa pastōris Vent.; ſ. Nr. 3.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Arăbis thaliāna L.; ſ. Nr. 58.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Erodĭum cicutarĭum l'Her.; ſ. Nr. 217.
— XIX., 1; Korbblütler: Taraxăcum officināle Mnch.; ſ. Nr. 59.
—. XIX., 2; Korbblütler: Senecĭo vulgāris L.; ſ. Nr. 218.

—. XIX., 2; Korbblütler: Bellis perēnnis L.; ſ. Nr. 2.
—. XIX., 4; „ *Calendŭla officinālis L.; ſ. Nr. 2208.
—. XXI., 1; Giftmilcher: *Euphorbĭa peplus L.; ſ. Nr. 1265.
—. XXI., 5; Meldenpfl.: Atrĭplex hastātum L.; ſ. Nr. 2210.
—. „ „ A. patŭlum L.; ſ. Nr. 2211.
—. XXII., 8; Giftmilcher: Mercurĭālis annŭa L.; ſ. Nr. 1267.

§. 617. **E. An Wegen, Straßen, Rainen, Ackerrändern, Dämmen u. dergl.:**

—. II., 1; Rachenblümler: Veronĭca agrēstis L.; ſ. Nr. 224.
—. III., 2; Graspfl.: Poa annŭa L.; ſ. Nr. 14.
—. IV., 1; Wegerichpfl.: Plantāgo major L.; ſ. Nr. 2262.
—. V., 1; Nachtſchattenpfl.: *Solānum nigrum L.; ſ. Nr. 1254.
—. „ „ *S. humĭle Bernh.; ſ. Nr. 3007.
—. „ „ *S. miniātum Bernh.; ſ. Nr. 2268.
—. „ Veilchenpfl.: Viŏla tricŏlor L.; ſ. Nr. 525.
—. V., 2; Doldenpfl.: Bupleurum falcātum L.; ſ. Nr. 3003.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygŏnum aviculāre L.; ſ. Nr. 2255.
—. X., 2; Paronychienpfl.: Scleränthus annŭus L.; ſ. Nr. 574.
—. X., 3; Nelkenblütler: Stellarĭa medĭa Vill.; ſ. Nr. 4.
—. XII., 3; Roſenpfl.: Potentĭlla anserīna L.; ſ. Nr. 578.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Lamĭum album L.; ſ. Nr. 169.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Thlaspi arvēnse L.; ſ. Nr. 215.
—. „ „ Capsēlla bursa pastōris Vent.; ſ. Nr. 3.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Diplotaxis murālis DC.; ſ. Nr. 1314.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Erodĭum cicutarĭum l'Her.; ſ. Nr. 217.
—. XIX., 1; Korbblütler: Taraxăcum officināle Mnch.; ſ. Nr. 59.
—. XIX., 1; Korbblütler: Leontŏdon vulgāris Kitt.; ſ. Nr. 1079.
—. XIX., 2; Korbblütler: Senecĭo vulgāris L.; ſ. Nr. 218.
—. „ „ S. viscōsus L.; ſ. Nr. 1341.
—. „ „ Bellis perēnnis L.; ſ. Nr. 2.
—. XXI., 5; Meldenpfl.: Atrĭplex patŭlum L.; ſ. Nr. 2211.
—. „ Amarantpfl.: Amarantus sylvēstris Desf.; ſ. Nr. 3082.
—. XIX., 5; Amarantpfl.: A. blitum L.; ſ. Nr. 2247.

F. An und auf Mauern, Lehmwänden, Dächern, Ruinen u. dergl.: §. 618.

—. III., 2; Graspfl.: Poa annŭa L.; ſ. Nr. 14.
—. V., 1; Nachtſchattenpfl.: *Solānum nigrum L.; ſ. Nr. 1254.
—. „ „ S. villōsum Lmk.; ſ. Nr. 3010.
—. „ Aralienpfl.: Hedĕra helix L.; ſ. Nr. 3081.
—. XII., 3; Roſenpfl.: Potentīlla anserīna L.; ſ. Nr. 578.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Lamĭum album L.; ſ. Nr. 169.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Diplotāxis murālis DC.; ſ. Nr. 1314.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Erodĭum cicutarĭum l'Her.; ſ. Nr. 217.
—. XIX., 2; Korbblütler: Bellis perēnnis L.; ſ. Nr. 2.
—. XXI., 4; Neſſelpfl.: Parietarĭa ramiflōra Mnch.; ſ. Nr. 2225.
—. XXI., 5; Meldenpfl.: Atrĭplex patŭlum L.; ſ. Nr. 2211.

G. In und um Dörfer, Städte, menſchliche Wohnungen: §. 619.

—. IV., 1; Neſſelpfl.: Parietarĭa ramiflōra Mnch.; ſ. Nr. 2225.
—. V., 1; Aralienpfl.: Hedĕra helix L.; ſ. Nr. 3081.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygŏnum aviculare L.; ſ. Nr. 2255.
—. XII., 3; Roſenpfl.: Potentīlla anserīna L.; ſ. Nr. 578.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Lamĭum album L.; ſ. Nr. 169.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Erodĭum cicutarĭum l'Her.; ſ. Nr. 217.
—. XIX., 2; Korbblütler: Bellis perēnnis L.; ſ. Nr. 2.
—. XXI., 5; Meldenpfl.: Atrĭplex hastātum L.; ſ. Nr. 2210.
—. „ „ A. patŭlum L.; ſ. Nr. 2211.
—. „ Amarantpfl.: Amarāntus blitum L.; ſ. Nr. 2247.

H. Auf Schutt, unbebauten Stellen, wüſten Dorfplätzen: §. 620.

—. V., 1; Nachtſchattenpfl.: *Solānum nigrum L.; ſ. Nr. 1254.
—. X., 3; Nelkenblütler: Stellarĭa medĭa Vill.; ſ. Nr. 4.
—. „ „ Alsīne verna Bartl.; ſ. Nr. 618.
—. X., 5; Schnabelpfl.: *Oxălis stricta Jacq.; ſ. Nr. 1260.
—. „ „ *O. corniculāta L.; ſ. Nr. 1261.
—. XII., 3; Roſenpfl.: Potentīlla anserīna L.; ſ. Nr. 578.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Lamĭum album L.; ſ. Nr. 169.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Thlaspi arvēnse L.; ſ. Nr. 215.
—. „ „ Capsēlla bursa pastōris Vent.; ſ. Nr. 3.

—. XV., 2; Kreuzblütler: Diplotāxis murālis DC.; ſ. Nr. 1314.
—. XIX., 1; Korbblütler: Leontŏdon vulgāris Kitt.; ſ. Nr. 1079.
—. XIX., 4; Korbblütler: *Calendŭla officinālis L.; ſ. Nr. 2208.
—. XXI., 5; Meldenpfl.: Atrĭplex hastātum L.; ſ. Nr. 2210.
—. „ „ A. patŭlum L.; ſ. Nr. 2211.
—. „ Amarantpfl.: Amarāntus blitum L.; ſ. Nr. 2247.

§. 621. **I. Auf Aeckern:**

—. II., 1; Nachenblümler: Veronīca agrēstis L.; ſ. Nr. 224.
—. V., 1; Schlüſſelblümler: Anagāllis arvēnsis L.; ſ. Nr. 55.
—. „ Nachtſchattenpfl.: *Solānum nigrum L.; ſ. Nr. 1254.
—. „ Veilchenpfl.: Viŏla tricŏlor L.; ſ. Nr. 525.
—. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygŏnum aviculāre L.; ſ. Nr. 2255.
—. X., 2; Paronychienpfl.: Sclerānthus annŭus L.; ſ. Nr. 574.
—. X., 3; Nelkenblütler: Stellarĭa medĭa Vill.; ſ. Nr. 4.
—. X., 5; „ Spergŭla arvēnsis L.; ſ. Nr. 1394.
—. „ Schnabelpfl.: *Oxălis stricta Jacq.; ſ. Nr. 1260.
—. „ „ *O. corniculata L.; ſ. Nr. 1261.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Lamĭum purpurĕum L.; ſ. Nr. 10.
—. XIV., 1; Lippenblümler: L. amplexicaule L.; ſ. Nr. 214.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Thlaspi arvēnse L.; ſ. Nr. 215.
—. XV., 2; „ Diplotaxis murālis DC.; ſ. Nr. 1314.
—. „ „ Arăbis thaliāna L.; ſ. Nr. 58.
—. XIX., 2; Korbblütler: Senecĭo vulgāris L.; ſ. Nr. 218.
—. „ „ Bellis perēnnis L.; ſ. Nr. 2.
—. XXI., 1; Giftmilcher: *Euphorbĭa peplus L.: ſ. Nr. 1265.
—. „ „ E. falcata L.; ſ. Nr. 2349.
—. XXI., 5; Meldenpfl.: Atrĭplex hastātum L.; ſ. Nr. 2210.
—. „ „ A. patŭlum L.; ſ. Nr. 2211.
—. XXII., 8; Giftmilcher: Mercurialis annŭa L.; ſ. Nr. 1267.

a. Kulturpflanzen:

—. III., 1; Schwertelpfl.: *Crocus satīvus All.; ſ. Nr. 3083.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Brassĭca oleracĕa L.; ſ. Nr. 109.
—. XIX., 3; Korbblütler: *Helianthus tuberōsus L.; ſ. Nr. 3084.

b. Unter der Saat:

—. IV., 1; Krapppfl.: Galĭum tricŏrne With.; ſ. Nr. 2370.

c. Auf Brachen:

—. X., 2; Paronychienpfl.: Scleränthus perēnnis L.; ſ. Nr. 676.
—. XIX., 2; Korbblütler: Senecĭo sylvatĭcus L.; ſ. Nr. 1080.

d. Auf feuchten Aeckern:

—. II., 1; Rachenblümler: Veronīca serpyllifolĭa L.; ſ. Nr. 1629.

e. Auf Sandfeldern:

—. V., 1; Borretſchpfl.: Heliotropĭum europaeum L.; ſ. Nr. 2388.
—. V., 2; Meldenpfl.: Kochĭa arenarĭa Roth; ſ. Nr. 3015.
—. X., 2; Paronychienpfl.: Scleränthus perēnnis L.; ſ. Nr. 676.
—. X., 5; Nelkenblütler: Spergŭla arvēnsis L.; ſ. Nr. 1394.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Erodĭum cicutarĭum l'Her.; ſ. Nr. 217.

K. Auf fettem, ſchwerem Boden: §. 622.

—. X., 5; Schnabelpfl.: *Oxălis corniculāta L.; ſ. Nr. 1261.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum boreāle Fr.; ſ. Nr. 2996.

L. Auf Sandboden: §. 623.

—. III., 3; Paronychienpfl.: *Polycārpon tetraphўllum L.; ſ. Nr. 3016.
—. X., 2; Paronychienpfl.: Scleränthus perēnnis L.; ſ. Nr. 676.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Erodĭum cicutarĭum l'Her.; ſ. Nr. 217.
—. XIX., 2; Korbblütler: Senecĭo livĭdus L.; ſ. Nr. 1503.

a. Auf Sandfeldern:

Vergl. §. 622, e.

b. Auf feuchtem Sandboden:

—. VIII., 1; Knöterichpfl.: Polygŏnum minus Huds.; ſ. Nr. 2118.
—. X., 5; Nelkenblütler: Spergŭla arvēnsis L.; ſ. Nr. 1394.

M. Auf Kalkboden: §. 624.

—. XIX., 2; Korbblütler: Artemisĭa camphorāta Vill.; ſ. Nr. 3085.

§. 625. **N. Auf Lehmboden:**

a. Auf sandigem Lehmboden:

—. XXI., 1; Giftmilcher: *Euphorbia exigŭa L.; s. Nr. 1547.

§. 626. **O. Auf Mergelboden:**

—. IV., 1; Krapppfl.: Galĭum tricōrne With.; s. Nr. 2370.

§. 627. **P. Auf Thonboden:**

—. IV., 1; Krapppfl.: Galĭum tricōrne With.; s. Nr. 2370.

§. 628. **Q. Auf steinigem Boden:**

—. V., 1; Nachtschattenpfl.: Solānum villōsum Lmk.; s. Nr. 3010.

—. XIX., 2; Korbblütler: Artemisĭa austriăca L.; s. Nr. 3021.

a. An schattigen, steinigen Stellen:

—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum robertiānum L.; s. Nr. 431.

b. In Steinbrüchen:

—. V., 1; Nachtschattenpfl.: Solānum villōsum Lmk.; s. Nr. 3010.

—. XIX., 2; Korbblütler: Senecĭo sylvatĭcus L.; s. Nr. 1080.

c. Auf Schlackenhalden:

—. X., 3; Nelkenblütler: Alsīne verna Bartl.; s. Nr. 618.

§. 629. **R. In Weinbergen:**

—. III., 1; Schwertelpfl.: *Crocus satīvus All.; s. Nr. 3083.

—. XIX., 2; Korbblütler: *Artemisĭa abrotănum L.; s. Nr. 3023.

—. XXI., 1; Giftmilcher: Euphorbĭa falcāta L.; s. Nr. 2349.

—. XXI., 5; Amarantpfl.: Amarāntus blitum L.; s. Nr. 2247.

§. 630. **S. Auf Anhöhen und Hügeln:**

—. V., 2; Doldenpfl.: Bupleurum falcātum L.; s. Nr. 3003.

a. Auf sonnigen, steinigen Hügeln:

—. X., 2; Paronychienpfl.: Scleränthus perēnnis L.; s. Nr. 676.

—. X., 3; Nelkenblütler: Alsīne verna Bartl.; s. Nr. 618.

b. Auf trocknen Sandhügeln:

—. XIX., 2; Korbblütler: Senecĭo sylvatĭcus L.; s. Nr. 1080.

c. Auf unfruchtbaren Hügeln:

—. XIX., 2; Korbblütler: S. viscōsus L.; ſ. Nr. 1341.

d. Unter Geſträuch:

—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum sabaudum All.; ſ. Nr. 3028.

T. In Gebirgen: §. 631.

—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: Aconītum cammărum L.; ſ. Nr. 3034.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Anemōne alpīna L.; ſ. Nr. 771.
—. XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum boreāle Fr.; ſ. Nr. 2996.

a. Auf hohen Bergen:

—. V., 1; Schlüſſelblümler: Primŭla minĭma L.; ſ. Nr. 2521.

U. Auf und an Felſen: §. 632.

—. V., 1; Aralienpfl.: Hedĕra helix L.; ſ. Nr. 3081.
. „ Veilchenpfl.: Viŏla tricŏlor L.; ſ. Nr. 525.

a. Auf trocknen Felſen:

—. X., 2; Paronychienpfl.: Scleränthus perēnnis L.; ſ. Nr. 676.

b. Auf Kalkfelſen:

—. XIX., 2; Korbblütler: Artemisĭa camphorāta Vill.; ſ. Nr. 3085.

c. In Felſenklüften:

—. V., 1; Nachtſchattenpfl.: Solānum villōsum Lmk.; ſ. Nr. 3010.

V. In den Alpen und Voralpen: §. 633.

—. V., 1; Veilchenpfl.: Viŏla tricŏlor L.; ſ. Nr. 525.
—. XIII., 2; Hahnenfußpfl.: Aconītum cammărum L.; ſ. Nr. 3034.
—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Anemōne alpīna L.; ſ. Nr. 771.
—. XIX., 1; Korbblütler: Saussurĕa latifolĭa Ledeb.; ſ. Nr. 3087.

a. Auf den höchſten Alpen:

—. V., 1; Schlüſſelblümler: Primŭla minĭma L.; ſ. Nr. 2521.

b. In Alpenthälern:

—. V., 2; Enzianpfl.: Gentiāna amarēlla L.; ſ. Nr. 3049.

c. Auf trocknen Bergwiesen:

—. V., 2; Enzianpfl.: G. campēstris L.; s. Nr. 3032.

§. 634. **W. An sonnigen, trocknen Stellen:**

—. V., 1; Nachtschattenpfl.: *Solānum miniātum Bernh.; s. Nr. 2268.

§. 635. **X. Auf Grasplätzen und Triften:**

—. III., 2; Graspfl.: Poa annŭa L.; s. Nr. 14.
—. V., 2; Enzianpfl.: Gentiāna amarēlla L.; s. Nr. 3049.
—. XII., 3; Rosenpfl.: Potentīlla anserīna L.; s. Nr. 578.
—. XVI., 2; Schnabelpfl.: Erodĭum cicutarĭum l'Her.; s. Nr. 217.
—. XIX., 1; Korbblütler: Taraxăcum officināle Mnch.; s. Nr. 59.
—. XIX., 1; Korbblütler: Leontŏdon vulgāris Kitt.; s. Nr. 1079.
—. XIX., 2; Korbblütler: Achillēa millefolĭum L.; s. Nr. 2101.
—. XIX., 2; Korbblütler: Bellis perēnnis L.; s. Nr. 2.

a. Auf hochgelegenen Triften:

—. V., 2; Enzianpfl.: Gentiāna campēstris L.; s. Nr. 3032.

§. 636. **Y. Auf Aengern:**

Vergl. §. 635.

§. 637. **Z. Auf Weiden:**

—. III., 2; Graspfl.: Poa annŭa L.; s. Nr. 14.
—. XII., 3; Rosenpfl.: Potentīlla anserīna L.; s. Nr. 578.
—. XIX., 1; Korbblütler: Taraxăcum officināle Mnch.; s. Nr. 59.
—. XIX., 1; Korbblütler: Leontŏdon vulgāris Kitt.; s. Nr. 1079.
—. XIX., 1; Korbblütler: Oporinĭa autumnālis Don; s. Nr. 2826.
—. XIX., 2; Korbblütler: Senecĭo viscōsus L.; s. Nr. 1341.
—. „ „ Bellis perēnnis L.; s. Nr. 2.

a. Auf feuchten Weiden:

—. V., 2; Enzianpfl.: Gentiāna amarēlla L.; s. Nr. 3049.

§. 638. **A[1]. Auf Wiesen:**

—. X., 5; Schnabelpfl.: *Oxălis stricta Jacq.; s. Nr. 1260.

—. XIX., 1; Korbblütler: Taraxăcum officināle Mnch.; ſ. Nr. 59.
—. XIX., 1; Korbblütler: Oporinĭa autumnālis Don; ſ. Nr. 2826.
—. XIX., 1; Korbblütler: Leontŏdon vulgāris Kitt.; ſ. Nr. 1079.
—. XIX., 2; Korbblütler: Bellis perĕnnis L.; ſ. Nr. 2.

a. Auf feuchten, naſſen Wieſen:

—. II., 1; Rachenblümler: Veronīca serpyllifolĭa L.; ſ. Nr. 424.
—. III., 1; Halbgras: Cypērus fuscus L.; ſ. Nr. 2831.
—. V., 2; Enzianpfl.: Gentiāna amarēlla L.; ſ. Nr. 3049.

b. Auf trocknen Wieſen:

—. VI., 1; Zeitloſenpfl.: Colchĭcum autumnāle L.; ſ. Nr. 3089.

c. Auf hochgelegenen Wieſen:

—. V., 2; Enzianpfl.: Gentiāna campēstris L.; ſ. Nr. 3032.

B[1]. An feuchten, ſumpfigen Orten: §. 639.

—. II., 1; Rachenblümler: Veronīca serpyllifolĭa L.; ſ. Nr. 424.
—. VI., 1: Halbgras: Cypērus fuscus L.; ſ. Nr. 2831.
—. III., 2; Graspfl.: Arūndo donax L.; ſ. Nr. 3060.
—. XIX., 2; Korbblütler: Pulicarĭa vulgāris Gaertn.; ſ. Nr. 3090.

C[1]. An Quellen und quelligen Orten: §. 640.

—. XV., 2; Kreuzblütler: Nasturtĭum officināle R. Br.; ſ. Nr. 954.

D[1]. Auf Torfboden: §. 641.

—. VIII., 1; Enzianpfl.: Chlora serotīna Koch; ſ. Nr. 2895.

E[1]. An und in Gräben, Bächen, Flüſſen: §. 642.

—. V., 2; Meldenpfl.: Salsŏla kali L.; ſ. Nr. 2919.
—. XII., 3; Roſenpfl.: Potentīlla anserīna L.; ſ. Nr. 578.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Nasturtĭum officināle R. Br.; ſ. Nr. 954.
—. XIX., 1; Korbblütler: Leontŏdon vulgāris Kitt.; ſ. Nr. 1079.

—. XIX., 2; Korbblütler: Pulicaria vulgāris Gaertn.; s. Nr. 3090.
—. XIX., 2; Korbblütler: Bellis perēnnis L.; s. Nr. 2.
—. " " *Aster novi belgii L.; s. Nr. 3091.
—. XXI., 1; Wasserſternpfl.: Callitriche autumnālis L.; s. Nr. 2932.

§. 643. **F². An und in ſtehenden Gewäſſern (Teichen, Seen):**

—. III., 1; Halbgras: Cypērus fuscus L.; s. Nr. 2831.
—. XV., 2; Kreuzblümler: Nasturtium officināle R. Br.; s. Nr. 954.
—. XIX., 2; Korbblütler: Pulicaria vulgāris Gaertn.; s. Nr. 3090.
—. XIX., 2; Korbblütler: Bellis perēnnis L.; s. Nr. 2.
—. XXI., 1; Wasserſternpfl.: Callitriche autumnālis L.; s. Nr. 2932.

§. 644. **G¹. An ſalzhaltigen Orten des Binnenlandes:**

—. V., 2; Meldenpfl.: Salsola kali L.; s. Nr. 2919.
—. XIX., 2; Korbblütler; Artemisia maritima L.; s. Nr. 3093.
—. XXI., 5; Meldenpfl.: Atriplex pedunculāta L.; s. Nr. 3072.

§. 645. **H¹. Am Meeresufer:**

—. V., 2; Meldenpfl.: Salsola kali L.; s. Nr. 2919.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Cakile maritima Scop.; s. Nr. 3074.
—. XIX., 2; Korbblütler: Senecio livīdus L.; s. Nr. 1503.
—. " " Artemisia maritima L.; s. Nr. 3093.
—. XXI., 1; Najadenpfl.: Zannichellia polycārpa Nolte; s. Nr. 2966.
—. XXI., 5; Meldenpfl.: Atriplex portulacoides L.; s. Nr. 3076.
—. XXI., 5; Meldenpfl.: A. pedunculāta L.; s. Nr. 3072.

§. 646. **I¹. Kulturpflanzen:**

a. In Gemüſegärten:

—. XV., 2; Kreuzblütler: Nasturtium officināle R. Br.; s. Nr. 954.
—. XV., 2; Kreuzblütler: Brassica oleracea L.; s. Nr. 109.
—. XIX., 2; Korbblütler: *Artemisia abrotānum L.; s. Nr. 3023.

—. XXI., 9; Kürbispfl.: *Cucŭmis melo L.; ſ. Nr. 2977.
—. „ „ *Cucurbīta pepō L.; ſ. Nr. 2367.
—. „ „ *C. verrucōsa L.; ſ. Nr. 2978.
—. „ „ *C. melopĕpo L.; ſ. Nr. 1576.
—. „ „ *C. maxĭma Duch.; ſ. Nr. 2030.

a. In Blumengärten:

—. XV., 2; Kreuzblümler: *Matthiōla incāna R. Br.; ſ. Nr. 108.

November.

A. In Wäldern: §. 647.

a. An Baumſtämmen:

—. V., 1; Aralienpfl.: Hedĕra helix L.; ſ. Nr. 3081.

b. An Waldrändern:

—. XIX., 2; Korbblütler: Bellis perēnnis L.; ſ. Nr 2.

B. In Gebüſchen, Hecken, Zäunen u. dergl.: §. 648.

—. XIV., 1; Lippenblümler: Lamĭum purpurĕum L.; ſ. Nr. 10.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Capsēlla bursa pastōris Vent.; ſ. Nr. 3.
—. XIX., 2; Korbblütler: Bellis perēnnis L.; ſ. Nr. 2.

C. Auf Gartenland, in Gras- und Baumgärten: §. 649.

—. X., 3; Nelkenblütler: Stellarĭa medĭa Vill.; ſ. Nr. 4.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Lamĭum purpurĕum L.; ſ. Nr. 10.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Capsēlla bursa pastōris Vent.; ſ. Nr. 3.
—. XIX., 2; Korbblütler: Senecĭo vulgāris L.; ſ. Nr. 218.
—. „ „ Bellis perēnnis L.; ſ. Nr. 2.

D[1]. An Wegen, Ackerrändern, Dämmen u. dergl.: §. 650.

—. III., 2; Graspfl.: Poa annŭa L.; ſ. Nr. 14.
—. X., 2; Nelkenblütler: Stellarĭa medĭa Vill.; ſ. Nr. 4.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Capsēlla bursa pastōris Vent.; ſ. Nr. 3.

§. 651. **E. In und um Dörfer, Städte, menschliche Wohnungen:**

—. III., 2; Graspfl.: Poa annŭa L.; s. Nr. 14.
—. V., 1; Aralienpfl.: Hedĕra helix L.; s. Nr. 3081.
—. XV., 1; Kreuzblütler: Capsĕlla bursa pastōris Vent.; s. Nr. 3.

§. 652. **F. An und auf Mauern, Lehmwänden, Ruinen u. dergl.:**

—. V., 1; Aralienpfl.: Hedĕra helix L.; s. 3081.

§. 653. **G. Auf Schutt, unbebauten Stellen u. dergl.:**

—. XV., 1; Kreuzblümler: Capsĕlla bursa pastōris Vent.; s. Nr. 3.
—. XIX., 2; Korbblütler: Senecĭo vulgāris L.; s. Nr. 218.

§. 654. **H. Auf Aeckern:**

—. X., 3; Nelkenblütler: Stellarĭa medĭa Vill.; s. Nr. 4.
—. XIV., 1; Lippenblümler: Lamĭum purpurĕum L.; s. Nr. 10.
—. XV., 1; Kreuzblümler: Capsĕlla bursa pastōris Vent.; s. Nr. 3.
—. XIX., 2; Korbblütler: Senecĭo vulgāris L.; s. Nr. 218.
—. „ „ Bellis perēnnis L.; s. Nr. 2.

§. 655. **I. Auf und an Felsen:**

—. V., 1; Aralienpfl.: Hedĕra helix L.; s. Nr. 3081.

§. 656. **K. Auf Grasplätzen und Triften:**

—. III., 2; Graspfl.: Poa annŭa L.; s. Nr. 14.
—. XIX., 2; Korbblütler: Bellis perēnnis L.; s. Nr. 2.

§. 657. **L. Auf Aengern:**

Vergl. §. 656.

§. 658. **M. Auf Weiden:**

Vergl. §. 656.

§. 659. **N. Auf Wiesen:**

Vergl. §. 656.

§. 660. **O. In Blumengärten:**

—. XV., 2; Kreuzblümler: *Matthiōla incāna R. Br.; s. Nr. 108.

Dezember.

A. In schattigen Wäldern: §. 661.

—. XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Helleborus niger L.; s. Nr. 1.

B. Auf Wiesen, Weiden, Aeckern, an Wegen u. s. w.: §. 662.

—. XIX., 2; Korbblütler: Bellis perennis L.; s. Nr. 2.

C. An Wegen, auf Aeckern u. a. v. a. O.: §. 663.

—. XV., 1; Kreuzblümler: Capsella bursa pastoris Vent.; s. Nr. 3.

D. Auf Aeckern, in Gärten u. s. w.: §. 664.

—. X., 3; Nelkenblütler: Stellaria media Vill.; s. Nr. 4.

Verbesserungen.

Erster Band.

S. 25 stelle nach Z. 9 v. o.: Nuß; Wasserpfl. . . . Wassernuß. Trapa L.
„ 52 Z. 16 v. o. l. Chimaphīla.
„ 401 „ 13 „ „ „ Chimaphīla.
„ 423 „ 1 v. u. l. Chimaphīla.
„ 457 „ 20 v. o. l. schwach.
„ 493 „ 8 „ „ „ crista statt crus.
„ 641 „ 2 „ „ „ E. statt L.

Zweiter Band.

S. 57 Z. 13 v. u. l. Rainen statt Rinnen.
„ 79 „ 7 „ „ „ Oplismĕnus.
„ 89 „ 8 „ „ „ Bauhin.
„ 147 „ 19 v. o. l. fischēri statt fleischēri.
„ 240 „ 17 „ „ und S. 402 Z. 17 v. o. lies statt Nr. 3059 S. 506.
„ 354 lies Seitenzal 354 statt 534.

Nachträge.

Erster Band.

S. 175 stelle nach Z. 15 v. u.: III., 1; Schwertelpfl.: Trichonĕma bulbocodĭum Ker. Europäische Fadennarbe. Perigon abstehend, regelm., violet oder weißl., innen von der Basis bis zur Mitte gesättigt gelb; 4; 2 bis 3; grasige Orte in Istrien.

S. 177 stelle nach Z. 17 v. o.: V., 1; Rachenblümler: Pulmonarĭa saccharāta Mill. Gefleckte Lungenkraut. Aeußere Bltr. der nichtblüh. Wrzköpfe eif., plötzl. in den schmalgeflüg. Stiel zsgezog., weißlich gefleckt; Bl. lila oder weiß; 4; 3 bis 4; Spaa (?), nicht bei Garz i. Po.

S. 179 stelle nach Z. 16 v. o.: XXII., 2; Weide: Salix grandifolĭa Ser. Großblättrige Weide. Kätzchen sitz., fruchttrag. kurzgestielt; Bltr. gradspitz.; Nebenbltr. nierenf.; ♄; 3 bis 4; Wälder (Voralpen, Schwarzwald).

S. 188 stelle nach Z. 20 v. u.: V., 1; Wegdornpfl.: Rhamnus alatērna L. Lederblättriger Wegdorn. Strauch mit wechselst. Aesten; Bltr. immergrün; ♄; 3 bis 4; felsige Orte in Istrien.

S. 193 stelle nach Z. 15 v. u.: XV., 2; Kreuzblütler: Malkolmĭa maritĭma R. Br. See-Malkolmie. Bl. purpurrot; Schote lineal., stielrund, am Ende mit kegelf., aus 2 Platten verwachs. Narbe; 4; 3 bis 4; Fiume.

S. 195 stelle nach Nr. 118: V., 1; Nachtschattenpfl.: Scopolīna viridiflōra Freyer. Grünblumige Skopolie. Bl. einfarbig grün; Kapselfr. rundl.; 4; 4 bis 5; Kr.

S. 210 stelle nach Nr. 212: VI., 1; Lilienpfl.: Ornithogălum bouchéānum Aschrsn. Grünblütige Vogelmilch. Bl. außen lauchgrün, innen weiß, durchscheinend-grün-streifig, in dichterer Traube; Innenleiste der Stbf. oben mit spitzem Zahne; Fruchtk. von Griffellänge; 4; 4 bis 5; ×; Sa., Brd., Schl.

S. 213 stelle nach Nr. 228: VI., 1; Lilienpfl.: O. refrāctum Kit. Zurückgebrochene V. Bl. reinweiß, grün-rückenstreifig; untere fruchttrag. Blstiele spreizend-hinabgeschl., mit aufstreb. Fr.; 4; 4 bis 5; Triest.

S. 213 stelle nach Z. 22 v. o.: XVII., 4; Hülsenpfl.: Securigĕra coronīlla DC. Gelbe Beilwicke. Bl. gelb; Hülse zw. den Samen mit Eindrücken, aber nicht in Glieder zerfallend; ⊙; 5 bis 6; Istrien.

S. 217 stelle nach Z. 6 v. o.: XVII., 4; Hülsenpfl.: Scorpiūrus subvillōsus L. Halbzottiges Skorpionskraut. K. kurz, glock., 5zähn., durch die beiden oberen verwachs. Zähne fast 2lipp.; Bl. gelb; Hülse zirkelf.-zurückgerollt; ⊙; 5 bis 6; Istrien.

S. 217 stelle nach Z. 20 v. o.: XIV., 2; Rachenblümler: Trixāgo latifolĭa Rchb. Breitblättrige Trixago. Bl. purpurn; Staubb. nicht grannenlos; K. 4zähn.; Kapf. 2fächr., in einen Schnabel verschmäl.; Samen rippig, Rippen flügellos; ⊙; 4 bis 5; Istrien.

S. 223 stelle nach Z. 11 v. u.: XX., 1; Orchidee: Serapĭas trilŏba Viv. Dreilappige Ständelwurz. Hinteres Glied der Lippe kurz und schmal, Lappen kaum bemerklich, das vordere 3spalt.; 4; 4 bis 5; Südostdeutschl.

S. 225 stelle nach Z. 14 v. o.: V., 1; Rachenblümler: Pulmonarĭa mollis Wolff. Weiches Lungenkraut. St., Bltr. und K. weich- und drüsenharig; Bltr. der nichtblüh. Wrz.-köpfe ellipt.-lanzettl. und lanzettl., in den breitgeflüg. Stiel verschmäl.; Bl. zieml. groß, blau; 4; 4; Rh., W., Bay. — P. angustifolĭa-officinālis Krause findet sich mit den Merkmalen der Eltern unter den letzteren in Schl., Pr., Pf. u. M.; var.: P. parviflōra Knapp (Bl. kleiner).

S. 232 stelle nach Z. 9 v. o.: IV., 1; Wegerichpfl.: Plantāgo lagōpus L. Zottiger Wegerich. Deckbltr. zugesp., trockenhäut., an der Spitze bärtig-zott., kahl; Samenträger beiders. 1samig; Blkrröhre kahl; 4; 4 bis 5; Istrien.

S. 232 stelle nach Z. 10 v. o.: VI., 1; Narzissenpfl.: Narcissus tazētta L. Tazette. Nebenkr. becherf., ganzrand., gelb; 4; 4 bis 5; ‡; Istrien.

S. 232 stelle nach Z. 13 v. o.: XVII., 4; Hülsenpfl.: Trifolĭum suffocātum L. Sand-Klee. Bl. im Köpfchen gestielt, aufr., weiß; die beiden oberen Kzähne länger; 4; 4 bis 5; Istrien.

S. 236 stelle nach Nr. 327: VI., 1; Narzissenpfl.: Narcissus biflōrus Curt. Zweiblütige Narzisse. Nebenkr. schüsself., am Rande farblos; 4; 4 bis 5; Istrien.

S. 237 stelle nach Z. 6 v. o.: XVII., 4; Hülsenpfl.: Lotus ornithopodioïdes L. Vogelfußartiger Schotenklee. Köpfchen 3- bis 5blüt.; Bl. gelb; Hülse zsgedr.; 2|; 4 bis 6; Istrien.

S. 244 stelle nach Z. 15 v. o.: XXII., 2; Weide: Salix patŭla Ser. (S. oleïfolĭa Ser., S. salviaefolĭa Koch, S. incánaaurĭta Wimm.). Ausgebreitete Weide. Bltr. längl.-lanzettl., spitz, unters. graufilz., runz.-aderig; Kätzchen sitz., gekrümmt; Kapf. filz., Stielchen von dopp. Honigdrüsenlänge; Griff. kurz; ♄; 4 bis 5; Ufron in Oestr.-Schl. (♀).

S. 275 stelle nach Z. 16 v. o.: V., 1; Geisblattpfl.: *Lonicēra tatarĭca L. Tatarische Lonizere. Bltr. herz-eif., kahl; Blütenst. kaum von Blütenlänge; Kr. hellrot; Beere gelb oder scharlachrot; ♄; 5; ‡; Vaterland: Sibirien.

S. 275 daselbst: V., 1; Geisblattpfl.: L. implēxa Aid. Verflochtene L. Bl. quirlig und köpfig, das endst. Köpfchen sitz.; Griff. rauhharig; Kr. rot, etwas kleiner als bei L. caprifolĭum; ♄; 5 bis 7; Istrien.

S. 279 stelle nach Nr. 543: XVII., 4; Hülsenpfl.: Trifolĭum lappacĕum L. Kletten-Klee. Aehren an der Basis nackt; K. 20nervig; Bl. rötlichweiß; ♄; 5 bis 6; Istrien.

S. 288 füge zu Nr. 585: Sorĭa austrĭaca Desv. (Euclidĭum austriăcum R. Br.) ist in Mä. und Ungarn einheimisch und wurde einmal auf Schutt bei Neustadt-Eberswalde gefunden.

S. 290 füge zu Nr. 602: Podospērmum calcitrapifolĭum DC., mit aufr. mittl. und ligenden und aufstreb. seitenständ. St., soll im Thale der Sauer unweit Trier (zw. Olk und Rahlingen) vorkommen.

S. 295 stelle nach Z. 22 v. o.: XVII., 2; Erdrauchpfl.: *Platycāpnos spicātus Bernh. (Fumarĭa spicāta L.). Aehrige Breitfrucht. Blattzipf. lineal.; Traube kopfig; Kbltr. eilanzettl., ganzrand., von 1/3 Krlänge; Bl. grünlichweiß, rotspitzig; Schötchen eif., flach-gedr.; ☉; 5; ‡; ✕.

S. 297 stelle nach Z. 21 v. u.: V., 1; Borretschpfl.: Lycōpsis variegāta L. Bunter Krummhals. Traube oben nackt, meist einzeln; Bl. azurblau, mit 5 weißen Linien; ☉; 5 bis 6; Istrien.

S. 297 stelle nach Z. 11 v. u.: VI., 1; Lilienpfl.: Ornithogălum stachyoïdes Schult. Ziestartige Vogelmilch. Deckbltr. eif., plötzlich in eine lange Spitze zsgezog.; Krbltr. reinweiß, auf der untern Seite breit-grünstreifig; Blütenst. abstehend, später angedr.; 2|; 5 bis 6; Südösterreich.

S. 297 stelle nach Z. 19 v. u.: V., 1; Veilchenpfl.: Viŏla rothomagēnsis Desf. Rauhhariges Veilchen. St. ästig; Bltr. gekerbt; Mittelzipf. der Nebenbltr. ganzrand.; Bl. fattblau; 2; 5 bis 10; Spaa, Weidenbachthal.

S. 299 stelle nach Nr. 646: XVII., 4; Hülsenpfl.: Medicāgo tuberculāta Willd. Höckeriger Schneckenklee. Blütenst. 1- bis 3blüt; Bl. gelb; Hülse wehrlos, Windungen nicht queraderig, sondern aderlos; ☉; 5 bis 6; Istrien.

S. 236 stelle nach Nr. 327: Ornithogălum chloränthum Saut. Grünblumige Vogelmilch. Bl. genähert-traubig, weiß, außen breit-grünstreifig; 2; 4 bis 5; Oberösterreich.

S. 302 stelle nach Nr. 659: XVII., 4; Hülsenpfl.: *Lupīnus lutĕus L. Gelbe Lupine (Wolfs- oder Feigbohne). Bltr. gefing., Bltchn. längl.; Bl. quirlig, sitz., gelb; Oberl. des K. 2theil., Unterl. 3zähn.; ☉; 5 bis 6; ♈; Vaterland: Südeuropa.

*L. angustifolĭus L. Blaue L. Bltr. gefing., Bltchn. lineal., angedr.-weichharig; Bl. wechselst., kurz-gestielt, blau; Oberl. des K. 2spalt., Unterl. fast 3spalt.; ☉; 5 bis 6; ♈; Vaterland: Südeuropa.

*L. albus L. Weiße L. Bltr. gefing., Bltchn. verk.-eif.-längl.; Bl. wechselst., gestielt, weiß; Oberl. des K. ungetheilt, Unterl. 3zähn.; ☉; 5 bis 6; ♈; Vaterland: Orient.

L. hirsūtus L. Rauhe L. (gemeine oder blaue L.). St. weit-abstehend-behart; Bl. blau; ☉; 5 bis 6; ×; ↕; Istrien.

S. 322 stelle nach Nr. 743: XXI., 5; Becherblütler: Quercus coccifĕra L. Kermes-Eiche. Bltr. dornig-gezähnt, kahl, ausdauernd; ♄; 5; Istrien.

Q. suber L. Kork-Eiche. Rinde ritzig, schwammig; Bltr. ausdauernd, unten grau oder filzig; ♄; 5; ♈; ⚓; Istrien.

S. 322 stelle nach Z. 12 v. u.: V., 2; Doldenpfl.: Ptychōtis amoīdes Koch. Ammiähnliches Faltenohr. Bl. weiß; Krbltr. 2spalt.-ausgerand., in der Mitte mit Querfalte; 2 Hüllbltchn. spatelig und harspitz., 3 derselben pfriemlich; 2; 5; Istrien.

S. 322 stelle nach Z. 7 v. u.: XII., 3; Rosenpfl.: Potentīlla patens W. et K. Ausgebreitetes Fingerkraut. Bltr. 5- und 7zäl.; Hare des St. etwas angedr.; Bl. gelb; Nüßchen runzel., unberand.; 2; 5; Mä., Schl.

P. pilōsa Willd. Behartes F. St. aufr., langrauhharig und kurz-filz.; Bltr. 5zäl., Bltchn. der unteren

verk.-eif.-längl.; Bl. gelb; Fr. mit sehr schmalem, geschärftem Kiele; 4; 5 bis 6; Th., Schl.

S. 322 stelle nach Z. 1 v. u.: XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Thalictrum minus L. Kleine Wiesenraute. St. kahl, zuweilen hin- und hergebogen; Blchn. rundl. oder keilig-verk.-eif.: Aehrchen der Blattsch. kurz, abgerund., etwas absteh.; Verzweigungen der Blattst. durch hervortret. Linien kant.; 4; 5 bis 6. Varirt: sylvaticum Koch (Verzweigungen der Blattst. zsgedr.-stielrund, schwach-kant.; Schl., Pf., Pr. u. s. w.). — Th. flexuōsum Bernh. (Th. collinum Wallr., Th. jacquinianum Koch, Th. kochii Fr.) mit meist aufr. mittl. Aesten der Rispe. — Th. medium Jacq. hat größere, an den St. angedr. Oehrchen, kleine, gelbl. Bl., während des Blühens aufgericht. Stbgf. und kleinre Fr. (Drebkau b. Kottbus).

S. 340 stelle nach Z. 4 v. u.: XIX., 1; Korbblütler: Hieracium lanātum Vill. Wolliges Habichtskraut. Bltr. bläulich-grün oder zottig-grauharig, dicht-wollig-filzig, die der nichtblüh. Wrzköpfe überwinternd, deutlich-federharig; Bl. gelb; 4; 5 bis 6; Wallis.

S. 345 stelle nach Nr. 834: XIX., 2; Korbblütler: Senecio nebrodensis L. Nebrodischer Baldgreis. St. ebensträußig; Bltr. kahl oder etwas wollig; Außenkelch 6- bis 12blättr.; Achänen grauflaumig; Bl. gelb, die des Randes absteh. Zungenbl.; 4; 5 bis 6.

S. 357 stelle nach Z. 19 v. o.: XVII., 4; Hülsenpfl.: Trifolium cherlēri L. Cherler's Klee. Aehren an der Basis behüllt; K. 20nervig; Bl. weißl., zuletzt rötl.; 4; 5 bis 6; Istrien.

S. 357 daselbst: XIX., 1; Korbblütler: Urospermum dalechampii Desf. Dalechamp's Schwanzsame. Hauptk. 1-fach, weichflaumig, Blchn. von gleicher Länge und Gestalt; Pappus federig-stralig; Bl. sämmtl. zungenf., schwefelgelb; 4; 5 bis 6; Istrien.

U. picroides Desf. Bitterkrautähnlicher S. Wie vor., aber der Hauptk. borstig-steif; Bl. schwefelgelb; 4; 5 bis 6; Istrien.

S. 357 stelle nach Nr. 892: III., 2; Graspfl.: *Hordeum strictum Desf. Steife Gerste. Halm über der Wrz. zwiebelig-aufgetrieben; Aehrchen längl.; 4; 5 bis 6; Oldendorf in W. (ausgesäet).

S. 358 stelle nach Z. 16 v. u.: XVII., 4; Hülsenpfl.: Trifolium tomentōsum L. Filziger Klee. Kschlund kahl, offen, der Rücken des K. mit den beiden oberen Zähnen nach

dem Verblühen vergröß., aufgeblasen, häutig, netzaderig; Blütenst. kürzer als das Blatt; Bl. rosenrot; 4; 5 bis 6; Istrien.

S. 359 stelle nach Z. 9 v. u.: III., 2; Grasp fl.: Lamarckĭa aurĕa Mnch. Goldene Lamarckie. Geschlechtslose Aehrchen vielblüt.; ♂ 1blüt., mit Ansatz zur 2. Bl.; Federnarbe an der Basis hervortretend; 4; 5 bis 6; Istrien.

S. 363 stelle nach Z. 1 v. u.: III., 2; Grasp fl.: Lolĭum rigĭdum Gaud. Starrer Lolch. Wrz. nur mit blüh. Halmen; Aehrchen 5- bis 10blüt.; Spelzen häut., obere lanzettl.; 4; 6 bis 7; Istrien.

S. 370 stelle nach Z. 13 v. u.: XXII., 2; Weide: Salix cuspidāta Schultz (S. tetrāndra L., S. meyeriāna W., S. fragĭli-pentāndra Wimm.). Zugespitzte W. Nebenbltr. halb-herzf., schief; jede Bl. mit 3 bis 5 Stbgf.; Bltr. eilanzettl., langzugesp.; ziemlich hoher ħ; 5; selten (Hamb., M., Po., Pr, Leipz., Breslau, Berlin).

S. 383 stelle nach Z. 16 v. o.: V., 5; Bleiwurzpfl.: Statīce cancellāta Bernh. Gegitterte Seestrandsnelke. Filzig, kurzharig; Bl. ährenst.; Aehre einseitswendig; Bl. rot; 4; 5 bis 6; Istrien.

S. 383 stelle nach Z. 18 v. u.: XII., 2; Rosenpfl.: Pyrus scandĭca Babingt. (Sorbus scand. Fr., Crataegus arĭa var. scand. L.). Schwedische Eberesche. Bltr. eif., gelappt, unters. filz., Lappen parallel, vorn abgerund., durch den mittl. Zahn stachelsp.; Fr. scharlachrot; ħ; 5; ↕; Hiddensee, Oxhöft, Danzig.

S. 383 füge zu Nr. 979: V., 5; Nelkenblütler: Cerastĭum tetrāndum Curt. (Esmarchĭa cerastoīdes Rchb.), von C. glutinōsum durch schmälere, längl.-lineal., fast spatelf. untere Bltr., breitere, eif., krautige Deckbltr. und die Vierzal der Blütentheile unterschieden, ward früher auf den friesischen Inseln Manoe und Sylt gefunden.

S. 384 stelle nach Nr. 985: XVII., 4; Hülsenpfl.: Lotus cytisoīdes L. Geiskleeartiger Schotenklee. Angedr.-grauharig; Köpfchen 3- bis 5blüt.; Bl. gelb; Hülse stielrund; 4; 5 bis 6; Istrien.

S. 388 stelle nach Z. 9 v. u.: XIV., 2; Rachenblümler: Orobānche cervarĭae Suard (O. brachysepăla et alsatĭca F. Schultz, O. bartlingĭi Griseb., O. buekiāna Koch et O. buekiāna var. thalheimĭi Aschrsn., O. libanotĭdis einiger Aut.). Harfstrang-Sommerwurz. Braungelb; Blkr. glock.-röhrig, über dem ganzen Rücken gleichm.-

ſtark-gekr.; Oberl. abgerund., ganz oder ſchwach-ausgerand., hervorgeſtr., etwas helmf., Unterl. herabgebog., Mittellappen ein wenig größer; Stbf. kahl, an der Baſis plötzl. verbreitert; 4; 6; auf Peucedănum cerv., Libanōtis mont., Medicāgo sat. et Coronilla varĭa ſchmarotzend; Bö., Brd., Rh. (?). — O. teucrĭi F. Schultz, auf Thymus serpyllum ſchmarotzend, hat eine röhrig-glock., dunkelrote, nach der Baſis hellere, faſt dunkelviolete Blkr.; 4; 5; Rh., Zweibrücken.

S. 390 ſtelle nach Nr. 1004: III., 2; Graspfl.: Glycerĭa remōta Fr. (Poa lithuanĭca Gorski). Entferntähriger Schwaden. Riſpe faſt einſeitswendig, nickend; Aeſte bogig-überhäng., hardünn; Blattſch. ſtielrund; Spelzen gewölbt; 4; 6; Pr.

S. 397 ſtelle nach Z. 1 v. o.: XX., 1; Orchidee: Platanthēra montāna Rchb. fil. (P. chlorāntha Custer, P. wankelĭi Rchb. fil., Conopsidĭum platanthērum Wallr., Orchis montāna Schmidt). Grünblütige Kukuksblume. Sporn fadenf., nach hinten faſt keulenf.; Staubbeutelfächer oben genähert, unten auseinandergehend; ſonſt wie P. bifolĭa Rchb.; 4; 6 bis 7; ſelten.

S. 398 ſtelle nach Nr. 1047: III., 2; Graspfl.: Glycerĭa nemorālis Uechtr. et Körn. Wald-Schwaden. Riſpe ausgebreit., ſchlank; Aeſte 3 bis 5; Aehrchen meiſt 7blüt., gelbbraun; äußere Spelze ſehr ſtumpf, 7nervig, mit 3 ſtarken, bis zur Spitze gehenden, und 4 mit ihnen abwechſ., kürzeren Nerven; 4; 6; Schl.

S. 405 ſtelle nach Z. 12 v. o.: V., 2; Doldenpfl.: Trochiscānthes nodiflōrus Koch. Knotenblütige Rädchenblüte. Krbltr. lang-benagelt, ſpatelig-verk.-eif., mit einem Zeck., einwärts-gebog. Läppchen; Bl. weiß; 4; 6 bis 8; Ty.

S. 419 ſtelle nach Nr. 1149: XVII., 4; Hülſenpfl.: Orōbus variegātus Ten. Bunte Walderbſe. St. kant.; Bltr. 2- bis 3parig; Bl. purpurn, mit ſatten Linien auf der Fahne; Hülſe fein-drüſenrauh; 4; 6 bis 7; Südöſterreich.

S. 443 ſtelle nach Z. 18 v. o.: VI., 1; Lilienpfl.: Ornithogălum arcuātum Steffen. Bogiggekrümmte Vogelmilch. Blütenſt. in einem rechten Winkel abſteh., die fruchttrag. bogig-gekr. und aufſtreb.; Bl. gelb; 4; 6; Oe.

S. 476 ſtelle nach Nr. 1399: XIV., 2; Rachenblümler: Linarĭa triphylla Mill. (Antirrhīnum triphylla L.). Dreiblättriges Leinkraut. Bltr. zu 3; Bl. gelblichweiß, Gaumen dottergelb, Sporn violet; Pfl. kahl; ☉; 6 bis 7; ‡; Iſtrien.

S. 485 stelle nach Z. 4 v. o.: III., 2; Graspfl.: Bromus arduënnēnsis Kth. (Libertĭa ard. Lej., Michelarĭa bromoidĕa Dum.). Ardennen-Trespe. Rispe abstehend, zuletzt überhäng.; Bl. aus eif. Basis verschmäl.; Unterspelze 9nervig, am Rande unterhalb der Mitte beiderseits mit einem eif., häutigen Zahne; ♂; 6 bis 7; ✕; Ardennen.

S. 488 stelle nach Nr. 1471: XVII., 4; Hülsenpfl.: Lathyrus stans Viv. Stehende Platterbse. Blütenst. grannenlos, an der Basis geglied., 1- bis 2blüt.; Bltr. 1- bis 2-parig; Bl. lila; Fruchtk. kahl; Samen glatt; ☉; 6 bis 7; Fiume.

S. 519 stelle nach Nr. 1575: III., 2; Graspfl.: *Sorghum halepēnse Pers. Morhirse (Mohrenhirse, Sorgho, Durrah, Negerkorn, Dochen, Kuskussu, Guineakorn). Obere Bl. ♂; untere Kronspelze 2spitz., mit einer Granne zw. den Spitzen; ☉; 6 bis 7; ♆.

S. 521 stelle nach Z. 4 v. u.: XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Thalictrum elātum Jacq. Hohe Wiesenraute. St. an den Gelenken grade; Bl. und Stbgf. grade hervorgestreckt; Pfl. nicht flaumharig; Bl. grüngelbl.; ♃; 6 bis 7; Fiume.

S. 528 stelle nach Z. 15 v. o.: V., 5; Leinpfl.: Linum angustifolĭum Huds. Schmalblättriger Lein. St. zalreich; Kbltr. fast von Kapsellänge; Bl. blau; ☉; 6 bis 7; Istrien.

S. 550 stelle nach Z. 15 v. o.: XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum andryaloīdes Vill. Wolldistelblättriges Habichtskraut. Bltr. graufilzig, die der nichtblüh. Wrzköpfe überwinternd, mit deutl. Federharen; Bl. gelb; ♃; 6 bis 7; Wallis.

S. 551 stelle nach Z. 8 v. u.: XVII., 4; Hülsenpfl.: Genĭsta dalmatĭca Bartl. Dalmatischer Ginster. St. dornig; Dornen bogig, 4kant.; Kzähne von dopp. Röhrenlänge; Bl. traubig, endst., gelb; ♄; 6 bis 7; Inseln Cherso und Osero.

S. 551 stelle nach Z. 11 v. u.: X., 3; Nelkenblütler: Silēne sedoīdes Jacq. Fetthennenähnliches Leinkraut. St. oberw. gabelspalt., nebst den Blütenst. und K. kurzharig; Krbltr. ungetheilt, bekränzt, rosenrot; Fruchtträger 4mal kürzer, als die längl. Kapsel.; ♃; 6 bis 7; Insel Osero.

S. 554 stelle nach Nr. 1679: V., 1; Schlüsselblümler: Primŭla dinyāna Lagger. Dinyanische Schlüsselblume. Bltr. nicht knorpelrandig, keilig, am oberen Ende geschweift oder gezähnelt, Zähne grannenlos; Bl. purpurn; ♃; 6 bis 7; graubündener A.

P. latifolĭa Lapeyr. Breitblättrige Schl. Bltr. von der Mitte nach der Spitze gezähnt-gesägt, beiderf. zerstreut-kurzharig, drüsenharig-gewimp.; Schlund wie bei vor. deckklappenlos; Bl. purpurn; 4; 6 bis 7; A.

P. pedemontana Thomas. Piemonteser Schl. Schlund nicht bepudert; Bltr. am Rande bepudert; Stbgf. des kurzgriffel. Geschlechts etwas über der Mitte der Röhre eingefügt; 4; 6 bis 7; A.

S. 555 stelle nach Nr. 1701: X., 2; Steinbrechpfl.: Saxifrăga diapensoĭdes Bell. Diapensienartiger Steinbrech. St. dicht-klebharig; Bltr. nicht dachig, auf dem Rücken konvex, oberf. punkt.; Bl. weiß; 4; 6 bis 7; Schweiz.

S. 560 stelle nach Z. 4 v. u.: XVI., 2; Schnabelpfl.: Geranĭum aconitifolĭum l'Her. Eisenhutblättriger Storchschnabel. St. oberw. drüsenlos-flaumharig; Bltr. handf.-7spalt., eingeschn.-gezähnt; Bl. weiß, purpurn-geadert; 4; 6 bis 8; Wallis.

S. 578 stelle nach Z. 11 v. o.: XV., 2; Kreuzblütler: Hugueninia tanacetifolĭa Rchb. Rainfarnblättrige Hugueninie. Bl. gelb; Schoten lineal., 2schneidig; Samen in jedem Fache 1reihig; ☉; 6; Wallis.

S. 598 stelle nach Z. 22 v. u.: V., 1; Glockenblümler: Wahlenbergĭa erĭnus Lk. Gabelspaltige Wahlenbergie. Bltr. verk.-eif.-längl.; Bl. blau; Kapselklappen an der Spitze aufspr.; 4; 6 bis 8.

S. 602 stelle nach Z. 11 v. v.: V., 2; Doldenpfl.: Ferulāgo galbanifĕra Koch. Harzige Birkwurzel. Krbltr. rundl., ganz, mit einwärts-gebog. Läppchen, gelb; 4; 6 bis 7; Kr., Ty.

S. 630 stelle nach Nr. 1971: V., 1; Sperrkrautpfl.: *Collomĭa grandiflōra Dougl. Großblütige Kollomie. Aufr.; Bltr. lanzettl., oberste eif.-lanzettl., ganzrand. oder gesägt; Kzipf. breit-lanzettl., stumpf; Blkrsaum vertieft, Schlund erweit.; Bl. erst gelb, dann rötl.; ☉; 6 bis 7; ‡; Vaterland: Nordamerika. (Th., Schl., Rh., M.)

S. 632 stelle nach Nr. 1977: XIII., 3; Hahnenfußpfl.: Thalĭctrum exaltātum Gaud. Erhöhte Wiesenraute. Rispe fast ebensträußig; Blütenst. fiederig-zsgesetzt; Oehrchen der Blattsch. kürzer, als der Durchmesser der Blattsch.; 4; 6 bis 7; südl. Schweiz.

S. 635 stelle nach Z. 5 v. u.: XXII., 2; Weide: Salix hegetschweilĕri Heer. Hegetschweiler's Weide. Nebenbltr. halb-herzf., gradspitz.; Kätzchen gestielt, Stiel beblätt.;

Kapselstielchen etwa von dopp. Honigdrüsenlänge; ♄; 6 bis 7; Inn, Reus.

S. 643 stelle nach Z. 22 v. o.: XIII., 2; Hahnenfußpfl.: Delphinĭum staphysagrĭa L. Scharfer Rittersporn (Stefans- oder Läusekörner). Bltr. 5spalt., Lappen ganz oder 3spalt.; Blütenstielbasis mit 3 Deckbltchn.; K. blau; Kr. weißl.; ♂; 6 bis 7; ⧧; ⚡; Istrien.

S. 643 stelle nach Z. 12 v. u.: XV., 1; Kreuzblümler: Lobularĭa maritĭma Desv. Meerstrands-Lobularie. Stbgf. ungeflüg., ungezähnt; Bl. weiß; ⊙; 6 bis 8; Fiume.

S. 643 stelle nach Z. 1 v. u.: XVII., 4; Hülsenpfl.: Lathy̆rus inconspicŭus L. Kleinblütige Platterbse. Bltr. 1- bis 2parig; Blütenst. 1- bis 2blüt., an der Basis geglied., grannenlos; Bl. bläulich; Fruchtk. seidenzottig; Samen glatt; ⊙; 6 bis 7; Istrien.

S. 644 stelle nach Nr. 2013: XVII., 4; Hülsenpfl.: Lotus angustissĭmus L. Schmaler Schotenklee. Bl. einzeln oder zu 2, gelb; Hülse grade, sehr schlank, von 5- bis 6-facher Kelchlänge; ♃; 6 bis 7; Istrien. — Der ähnliche L. edūlis L., eßbarer Sch., von der Insel Sansego hat gebog. und gedunsene Hülsen von 2- bis 3facher Kelchlänge.

S. 644 stelle nach Z. 6 v. u.: XIX., 2; Korbblütler: Evax pygmaea Pers. Zwerg-Evax. Bl. schmutzigweiß; ♃; 6 bis 7; Adriameer.

S. 644 stelle nach Z. 3 v. u.: XVII., 4; Hülsenpfl.: Trifolĭum resupinātum L. Verkehrtblumiger Klee. Kschlund kahl, offen; Blütenst. von Blattlänge; Bl. rosenrot, umgekehrt; ♃; 6 bis 7; Istrien.

S. 646 stelle nach Nr. 2016: IV., 1; Hornstrauchpfl.: *Cornus stolonifĕra Mchx. (C. alba Auct.). Weißbeerige Kornelle. St. oft niedergebeugt, wurzelnd, absteh.-ästig; Bltr. ellipt. oder ellipt.-eif., unters. grünlichgrau; Bl. in flachen, zur Blütezeit hüllenlosen Trugdolden, weiß; Zweige im Herbst blutrot; Steinfr. kug., weiß; ♄; 6 bis 7; ‡.

S. 653 stelle nach Nr. 2047: XIV., 2; Rachenblümler: Orobānche cervarĭae Suard. (Vergl. oben Bemerkung zu S. 388.)

Zweiter Band.

S. 7 stelle nach Z. 23 v. u.: V., 1; Nachtschattenpfl.: *Nicándra physaloides Gaertn. Judenkirschenartige Giftbeere. St. kant.-ästig; Bltr. eif. oder ellipt., bucht., eckig; Bl. achselst., überhäng., weißl., hellblau-gesäumt; ☉; 7 bis 9; ♀; ↕; Vaterland: Peru.

S. 35 stelle nach Z. 10 v. v.: V., 1; Geisblattpfl.: Lonicēra etrūsca Savi. Etrurische Lonizere. Bl. kopfst., purpurn, innen weiß; Köpfchen gestielt; oberste Bltr. zsgewachsen und völlig durchwachsen; ♄; 7 bis 8.

S. 43 stelle nach Z. 13 v. u.: XXI., 9; Kürbispfl.: *Sicyos angulāta L. Eckiger Stichling. St. kletternd, ästig, mit Winkelranken; Bltr. gestielt, herzf., 3- bis 5eck., gezähnt, rauh; Bl. klein, in achselst. Träubchen, schmutzigweiß, grünaderig; Fr. klein, eif.; ☉; 7 bis 9; ↕; Vaterland: Nordamerika.

S. 74 stelle nach Z. 13 v. u.: IV., 1; Wegerichpfl.: Plantāgo cynops L. Strauchiger Wegerich. St. strauchig, ästig, an der Basis ligend, beblätt.; ♄; 7 bis 8.

S. 84 stelle nach Z. 17 v. u.: XIV., 2; Rachenblümler: *Linaria simplex DC. Einfacher Frauenflachs. Kahl; K. und Blütenst. drüsenharig; Bltr. lineal., unterste zu 4; Bl. hellgelb, fein-violetstreifig, in kopf. Traube; ☉; 7 bis 8; ✕. (Mit fremdem Samen eingeschleppt.)

S. 92 stelle nach Nr. 2371: V., 2; Doldenpfl.: Orlaya platycārpos Koch. Breitfrüchtiger Breitsame. Aeußere Krbltr. stralend, tief-2spalt.; Blbltr. von Fruchtknotenlänge, weiß; ☉; 7 bis 8; ✕; Istrien.

S. 96 stelle nach Z. 17 v. u.: X., 2; Nelkenblütler: Gypsophila acutiflōra Fisch. Spitzblättriges Gipskraut. Kzipf. an der Spitze zurückgekr.; Bl. weiß oder rötlich; ☉; 7 bis 8; Unterösterreich.

S. 108 stelle nach Z. 8 v. u.: III., 2; Graspfl.: Melica bauhīni All. Bauhin's Perlgras. Spelze von der Basis bis über die Mitte wimperharig; 4; 7; Istrien.

S. 126 stelle nach Z. 7 v. u.: III., 2; Graspfl.: Imperāta cylindrica Beauv. Walzige Imperate. Klapp. ein 3spelz., dünnhäut. Bälglein einschließend; Narbe sprengwedelf., unter der Spitze der Bl. hervortretend; 4; 7 bis 8; Istrien.

S. 139 stelle nach Nr. 2487: V., 1; Rachenblümler: Verbāscum

montānum Schrad. Berg-Wollkraut. Bltr. gekerbt, gelbfilz.; Blütenst. kürzer als der K.; Bl. gelb; Stbfwolle weiß; die beiden längeren Stbf. 3- bis 4mal länger als ihr auf der einen Seite kurz-herablauf. Staubb.; ♂; 7 bis 8; Mittelrhein, Mosel, früher bei Halle a. d. S., Freiburg a. d. U.

S. 143 stelle nach Z. 3 v. o.: X., 5; Dickblattpfl.: Sedum aurĕum Wirtg. Goldgelbe Fetthenne. Stämmchen verk.-kegelf.; Bltr. meist purpurrot, sonst dunkelgrün, an der Basis mit zugesp. Sporn; Bl. goldgelb, schwach-wohlriechend; 4; 6 bis 7; Rh. (Wol nur Abart von S. elĕgans Lej., wie auch S. trevĕricum Rossbach. — *S. hybrĭdum L. und *S. spurĭum M. B. kommen bisweilen verwildert vor.)

S. 154 stelle nach Z. 9 v. o.: XIV., 1; Lippenblümler: Micromerĭa juliāna Benth. Julianische Mikromerie. Ebensträußchen der Quirle fast stiellos, aufr., gleich hoch; K. 13riefig; Bl. purpurn; 4; 7 bis 8.

M. graeca Benth. Griechische M. Ebensträußchen gestielt, etwas einseitswendig; sonst wie vor.; 4; 7 bis 8.

S. 156 stelle nach Z. 20 v. o.: XIV., 1; Lippenblümler: Siderītis scordioīdes L. Schweizer Gliedkraut. Halbstrauchig; Bl. gelb; Stbgf. und Griff. in der Kronröhre verborgen; ♄; 7 bis 8; Jura.

S. 165 stelle nach Nr. 2572: X., 5; Dickblattpfl.: Sedum elĕgans Lej. Zierliche Fetthenne. Stämmchen kugelf.; Bltr. graugrün, an der Basis vorgezogen, etwas gespornt; Kzipf. abgerund.-stumpf; Bl. gelb; 4; 7 bis 8; Maastricht.

S. 167 stelle nach Nr. 2579: XII., 3; Rosenpfl.: Potentīlla petīoculāta Gaud. Stielblättriges Fingerkraut. Bltchn. kurz-gestielt, verk.-eif.-längl.; Bl. gelb; Stbf. rauhharig; Nüßchen zottig; 4; 7 bis 8; Schweiz.

S. 168 stelle nach Z. 9 v. u.: XIV., 1; Lippenblümler: Stachys italĭca Mill. Italischer Ziest. Obere Bltr. sitz., fast 3eck.-eif.; Quirle reichblüt.; Bl. purpurn; 4; 7 bis 8; Istrien.

S. 171 stelle nach Nr. 2595: V., 1; Veilchenpfl.: Viŏla comollĭa Mass. Veltliner Veilchen. Bltr. ganzrand.; Griff. aufstreb., oben keulig; Sporn etwas länger, als die Anhängsel der Kbltr.; Bl. fattviolet; 4; 7 bis 8; Schweiz.

S. 172 stelle nach Nr. 2598: V., 2; Enzianpfl.: Gentiāna charpentiēri L. Charpentier's Enzian. K. glock., abgeschn., kurz-2zähn.; Bl. gelb; Staubb. frei; 4; 7 bis 8; Schweiz.

S. 187 stelle nach Nr. 2682: X., 3; Nelkenblütler: Silēne vallesĭa L. Walliſer Leimkraut. St. raſig, niederlig.; K. 10nervig, aderig, rauh; Bl. oben ſchwach roſen-, unten blutrot; 24; 7; Schweiz.

S. 190 stelle nach Z. 1 v. u.: XVII., 4; Hülſenpfl.: Trifolĭum saxatĭle L. Felſen-Klee. Aehren an der Baſis behüllt; Schlund mit Harring; K. 10nervig, bei der Frucht eif.; Bl. weißl.; 24; 7 bis 8; Wallis.

S. 193 stelle nach Z. 2 v. o.: XII., 3; Roſenpfl.: Potentĭlla multifĭda L. Vielſpaltiges Fingerkraut. Bltr. wenigparig-geſied.; Wrz. vielköpf., 3blüh. Stgl. und Bltrbüſchel, welche erſt im nächſten Jahre blühen; Bl. gelb; 24; 7 bis 8.

S. 194 stelle nach Z. 6 v. o.: V., 1; Veilchenpfl.: Viŏla cenisĭa L. Ganzblättriges Veilchen. Bltr. ganzrand.; Griff. aufſtreb., oben keulig; Sporn von Länge der Anhängſel der Kbltr.; Bl. fattviolet; 24; 7 bis 8; A.

S. 204 stelle nach Nr. 2764: XIX., 1; Korbblütler: Hieracĭum jacquīni Vill. Jacquin's Habichtskraut. St. meiſt 2köpf. oder von der Baſis an äſtig, mit abſteh., 1- bis 2köpf. Aeſten; Bl. gelb; Bltr. grasgrün, nicht zottig; 24; 7 bis 8; A.

S. 204 stelle nach Z. 10 v. o.: X., 5; Dickblattpfl.: Sedum atrātum L. Geſchwärzte Fetthenne. Wrz. dünn; St. einzeln; Krbltr. von dopp. Kelchlänge, weiß oder grüngelblich, Mittelnerv grün; 24; 7 bis 8; A.

S. 210 stelle nach Z. 7 v. u.: V., 2; Enzianpfl.: Gentiāna thomasĭi Hall. fil. Thomas' Enzian. Blütenſchlund nackt; Staubb. frei; Bl. purpurn, bei einer Varietät violet-punkt.; 24; 7 bis 8; A.

S. 221 stelle nach Nr. 2813: XIX., 2; Korbblütler: Santolīna chamae-cyparīssus L. Zipreſſenartige Heiligenpflanze. Halbſtrauchig, dünnfilz., gewürzhaft riechend; Bltr. lineal., 4fach-gezähnt; Bl. gelb; ♄; 7 bis 8; ↕; Wallis, Steiermark.

S. 221 stelle nach Nr. 2874: XIX., 2; Korbblütler: Pulicarĭa viscōsa Cassini. Klebriges Flohkraut. St. und Bltr. flaumig, klebrig; Bl. gelb; 24; 7 bis 8; Trieſt.

S. 231 stelle nach Z. 4 v. o.: VI., 3; Zeitloſenpfl.: Colchĭcum alpīnum DC. Alpen-Zeitloſe. Bltr. lineal-lanzettl., ſtumpf; Bl. fleiſchfarben; 24; 7 bis 8; ⫩; Wallis.

S. 240 stelle nach Z. 5 v. o.: V., 5; Bleiwurzpfl.: Statĭce purpŭrea Koch. Purpurfarbne Seeſtrandnelke. Aeußerſte Hüllbltchn. ſtumpf, ſtachelſp., innere ſehr ſtumpf, wehrlos; Bltr. 1nervig; Krbltr. abgeſchn., ſattpurpurn; 24; 7 bis 8.

S. 240 stelle nach Z. 16 v. o.: XVII., 4; Hülsenpfl.: Lathyrus palūster L. (Orŏbus pal. Rchb.). Sumpf-Platterbse. Blattst. flügellos; Blttr. 2- bis 3parig; Nebenblttchn. mehrmal kleiner als die Blttchn.; Blütentraube reichblüt.; Bl. blau; 4; 7 bis 8.

S. 252 stelle nach Z. 18 v. u.: XVI., 5; Rosenpappelpfl.: Abutĭlon avicēnnae Gaertn. Avizenna's Abutilon. K. einfach; Bl. rot; 4; 7 bis 8; Istrien.

S. 269 stelle nach Z. 5 v. o.: XIX., 2; Korbblütler: *Silphĭum perfoliātum L. St. 4seit., kahl; Blttr. ei-deltaf., grobgesägt, zieml. kahl, gestielt, obere verwachs.; Blttchn. des Hauptk. breit-eif.; Randbl. stralend; Randachänen dopp.-geflüg., begrannt; 4; 7 bis 8; ‡; Rhein; Vaterland: Nordamerika.

S. 270 stelle nach Z. 8 v. u.: VI., 3; Knöterichpfl.: Rumex domestĭcus Hartm. Hausampfer. Untere Blttr. aus ei- oder fast herzf. Basis längl. oder breit-lanzettl., wellenf. und kraus; innere Zipf. der Fruchthülle fast rundl.-herzf.; 4; 7 bis 8; Hamb., Ostfriesland, Obergablenz bei Chemnitz.

R. ucranĭcus Bess. Ukrainischer A. Untere Blttr. längl., stiel-verschmäl., mittl. längl.-lineal., geöhrt, obere lineal.; innere Zipf. der Fruchthülle rauten-eif., beiders. mit 3 borstenf. Zähnen, welche kürzer sind als der Längsdurchmesser der Zipf.; Pfl. zur Fruchtzeit rot; ⊙; 7 bis 8; Pr. — R. steinĭi Beck., mit breit-längl., an der Basis herzf. unteren, aus der abgerund. Basis lanzettl. mittl. und lanzettl. oberen Blttn., ward früher am Mainufer beobachtet.

S. 271 stelle nach Z. 5 v. o.: XIX., 3; Korbblütler: *Rudbeckĭa laciniata L. Geschlitzte Rudbeckie. St. ästig, kahl; untere Blttr. fiederspalt., mit eif., spitzen, 3lapp. Zipf., mittl. fast 3theil., obere eif., gezähnt; Blütenst. sehr lang; Scheibenbl. bräunl., Stralbl. gelb; 4; 7 bis 8; ‡; Hamb., Lübeck, Berlin, Schl.; Vaterland: Nordamerika. — *R. hirta L. ward in Schl. bei Bischwitz am Berge verwildert gefunden.

S. 274 stelle nach Z. 4 v. o.: IV., 4; Najadenpfl.: Potamogēton rutĭlus Wolfg. (P. caespitōsus Nolte). Rötliches Laichkraut. Rasenartig; St. zsgedr., ästig; Blttr. verschmäl.-zugesp., 3nervig; Blütenst. länger als die 6- bis 8blüt. Aehre; Fr. klein, längl.-ellipt., stumpf-rückig; Pfl. später meist rötl.; 4; 7 bis 8; Hamb., Brd., Wittenberg, Köslin, Berendt, Lyck.

S. 276 stelle nach Nr. 2944: XXI., 1; Nixenpfl.: Vallisnerĭa spirālis L. Schraubenstengelige Vallisnerie. Bltr. grasartig; Bl. klein, die der ♀ auf der Spitze fadenf., schraubenf.-gewund. Stiele, die sich zur Blütezeit bis zur Wasseroberfläche ausdehnen, wo sie von den ♂, die sich von ihren kurzen Stielen ablösen und emporsteigen, befruchtet werden; ♃; 7 bis 8; Seen in Ty.

S. 281 stelle nach Nr. 2960: V., 5; Bleiwurzpfl.: Statĭce gmelīni Willd. Gmelin's Seestrandsnelke. Bltr. 1nervig; Aeste weit-absteh.; Aestchen zurückgebog.; Bl. ährenst., rot; Aehren einseitswend.; Pfl. kahl; ♃; 7 bis 8; Istrien.

S. 287 stelle nach Z. 13 v. o.: XIX., 2; Korbblütler: *Chrysanthĕmum coronarĭum L. (Pinardĭa coronarĭa Less.). Gekrönte Wucherblume. St. ästig, kahl; Bltr. vorn breiter, dopp.-fiederspalt.; Bl. gelb; ⊙; 7 bis 8; ‡; Vaterland: Südeuropa.

S. 287 stelle nach Z. 12 v. u.: XVI., 5; Pappelrosenpfl.: *Malva mauritiāna L. Mauretanische Käspappel. St. fast kahl, steif-aufr.; Krbltr. dunkel, fast blutrot, breit, weniger tief-ausgerand.; Blattst. nur auf der obern Fläche weichharig; Blütenst. kahl, kurz; ⊙; 7 bis 9; ‡; Vaterland: Berberei, Südeuropa. — *M. crispa L. entflieht zuweilen, wie vor., den Gärten. *M. dethardingĭi Lk. ward früher einmal in Mecklenburg bei Alt-Karin und Petschow gefunden.

S. 291 stelle nach Z. 6 v. o.: XIV., 2; Rachenblümler: Orobānche kochĭi F. Schultz. Koch's Sommerwurz. Kbltchn. mehrnervig, 2spalt.; Blkr. röhrig-glock., auf dem Rücken fast grade, sehr schwach-gekrümmt; Stbgf. gleichlang, von der Basis bis zur Mitte behart; ♃: 7 bis 8; schmarotzt auf Antherĭcum ramōsum u. a. Pfl. (Schl., Bö.).

S. 294 stelle nach Z. 10 v. o.: XX., 1; Orchidee: Gymnadenĭa cucullāta Rich. (Orchis cucull. L.). Kapuzenförmige Höswurz. Knollen querlängl., bisweilen stumpf-2lapp.; Bltr. längl., spitz, an der Basis keilf.; Lippe 3theil.; Sporn zilindrisch-fadenf., wenig kürzer als der Fruchtk.; Bl. fleischfarben, Lippe weißl. oder rosenrot; ♃; 8; Pr. (Sarkau).

S. 359 stelle nach Nr. 16 v. u.: V., 2; Enzianpfl.: Gentiāna chloraefolĭa Nees (G. campēstri-germanĭca Griseb.). Bitterlingsblättriger Enzian. St. von der Basis an sehr ästig; untere Bltr. längl.-spatelf., obere breit-eif., spitz oder stumpfl.; Blütentheile 5zäl.; Kzipf. ungleich, die

beiden äußeren breit-eif., groß; Bl. violet; ⊙; 8 bis 10; Jena, Kyffh., Schl.

S. 376 stelle nach Nr. 3042: V., 2; Enzianpfl.: Gentiāna tenēlla Rottb. Zarter Enzian. Bltr. zieml. spitz; K. 4- bis 5theil.; Bl. blau; 4; 8 bis 9; A.

S. 402 stelle nach Nr. 3057: IV., 1; Kardenpfl.: Succīsa austrālis Rchb. Südlicher Teufelsabbiß. Lappen des äußern K. kurz, stumpf, der innere ohne Borsten; Bl. blau; 4; 8 bis 9.

Lateinisches Register.

(Die fetter gedruckten Ziffern des Registers beziehen sich auf die Seitenzal des 2. Bandes.)

A.

Abacosa
dumetorum 401.
Abama
ossifragum 623.
Abies
alba 273.
excelsa 274.
larix 223.
pectinata 273.
Abietinae 117.
Abutilon **506.**
Acalypheae 121.
Acarna
cyanoides 504.
Acer 50.
campestre 249.
monspessulanus 222.
platanoides 196.
pseudoplatanus 203.
saccharinum 204.
trilobatum 222.
vile 249.
Aceras 93.
anthropophora 338.
hircina 269.
pyramidalis 265.
Acerineae 151.
Achillea 87.
alpestris **12.**
ambigua **150.**
atrata **208.**
cartilaginea **268.**
clavennae **189.**
clusiana **208.**
dentifera **150.**
denuntata **190.**
distans **150.**
impunctata **189.**
lanata **12. 150.**
macrophylla **216.**
magna **150.**
millefolium **12.**
moschata **189.**
nana **192.**
nobilis **53.**
odorata **116.**
ptarmica **268.**
setacea **12.**
stricta **150.**
tanacetifolia **150.**
tomentosa 586.
Achyrantheae 124.
Achyrophorus 83.
helveticus 569.
maculatus **15.**
radicatus 413.
uniflorus 569.
Acinos
thymoides **94.**
vulgaris **94.**
Aconitum 62.
anthora **358.**
bernhardianum **361.**
cammarum Jacq. **361.**
cammarum L. 422.
cernuum **361.**
intermedium 422.
lycoctonum **27.**
myococtonum **27.**
napellus 538.
neomontanum 422.
paniculatum **361.**
stoerkeanum 422.
teliphonum **27.**
variegatum **361.**
vulparia **27.**
Acorus 45. 47.
calamus 618.
Actaea 61.
alpina 251.
cimicifuga **3.**
racemosa **3.**
spicata 251.
vulgaris 251.
Actinocyclus
secundus 249.
Adenophora 32.
lilifolia **28.**
suaveolens **28.**
Adenostyles 84.
albifrons **150.**
alpina **181.**
glabra **181.**
Adonis 63.
aestivalis 303.
anomala 487.
autumnalis 453.
flammea 487.
maculatus 303.
miniatus 303.
vernalis 219.
Adoxa 50.
moschatellina 176.
Adoxeae 142.
Aegilops 22.
incurvata 382.
ovata 296.
triaristata 296.
triuncialis 296.
Aegopodium 38.
podagraria 391.
Aesculus
hippocastanum 285.
Aethionema 70.
saxatile 347.
Aethusa 38.
bunius **135.**
cynapium **35.**
cynapoides **36.**
Agathophytum 33.
bonus henricus 450.
glaucum 450.
rubrum **48.**
Agraphis 45.
nutans 199.
Agrimonia 57.
agrimonoides 501.
eupatoria 410.
odorata 410.
pilosa **3.**

procera 410.
Agropyrum
acutum 642.
caninum 398.
elymogenes **280.**
junceum 642.
repens 447.
strictum **280.**
Agrostemma 56.
coronaria 656.
flos cuculi 261.
githago 475.
Agrostideae 112.
Agrostis 18.
alba **28.**
alpina **203.**
aristata **33.**
arundinacea 417.
australis 296.
calamagrostis **203.**
canina **223.**
capillaris **28.**
gigantea **28.**
hispida **33.**
interrupta 471.
maritima **28.**
miliacea 590.
minima 189.
pallida **28.**
rubra **28.**
rupestris **212.**
spica venti 471.
stolonifera **28. 33.**
sylvatica 417.
tenella **33.**
vivipara **33.**
vulgaris **33.**
Aira 19.
alpina 439.
aquatica 604.
caespitosa 439.
canescens 499.
capillaris 305.
caryophyllea 309.
coerulea **15.**
cristata 291.
discolor **407.**
flexuosa 406.
montana 406. 439.
praecox 232.
uliginosa **407.**
wibeliana 439.
Ajuga 65.
alpina 251.
bugula 252.
chamaepitys 491.
genevensis 251.
montana 251.
pyramidalis 427.
reptans 252.
Ajugoideae 131.
Albacosa
dumetorum 401.
Albersia
blitum **53.**
Albucea
nutans 210.
Alchemilla 25.
alpina 449.
aphanes 297.
arvensis 297.
fissa **156.**
hybrida 254.
montana 254.
palmatifida **156.**
pentaphylla **192.**
pubescens 567.
truncata 567.
vulgaris 254.
Aldrovandia 43.
vesiculosa **274.**
Alectorolophus 67.
alpestris **148.**
alpinus **160.**
angustifolius **138.**
grandiflorus 493.
hirsutus 493.
major 493.
minor 362.
parviflorus 362.
pubens 493.
pulcher **160.**
Alisma 48.
arcuatum 630.
graminifolia 630.
lanceolatum 630.
latifolium 630.
natans 621. 630.
parnassifolium **251.**
plantago 630.
ranunculoides 618.
Alismaceae 113.
Alliaceen 115.
Alliaria 72.
officinalis 202.
strictissima 441.
Allium 45.
acutangulum **243.**
ampeloprasum **284.**
arenarium 432. 474.
ascalonicum 648.
carinatum 524.
cepa 648.
descendens 648.
fallax **243.**
fistulosum 384.
flavum 496.
flexum 524.
kermesinum **107.**
magicum 557.
montanum 507.
moschatum
multibulbosum 556.
nigrum 556.
ochroleucum **173.**
oleraceum **83.**
ophioscorodon 648.
pallens
paniculatum
porrum 647. **284.**
reticulatum **122.**
roseum
rotundum **284.**
sativum 648.
saxatile **164.**
schoenoprasum 545.
scorodoprasum 432.
sibiricum 545.
sphaerocephalum 474.
strictum **122.**
suaveolens **240.**
subhirsutum
ursinum 254.
victorialis **246.**
vineale 474.
Alnus 97.
acutiloba 227.
alpina 354.
glutinosa 192.
incana 227.
pubescens 227.
viridis 354.
Alopecurus 16.
agrestis 472.
fulvus 616.
geniculatus 604.
nigricans 361.
pratensis 360.
utriculatus 365.
Alsine 55.
aretoides 568.
australis 294.
austriaca **175.**
biflora
caespitosa 294.
facchinii 294.
filicaulis **175.**
gerardi 294.
hispida 294.
incana **175.**
jacquini 491.
lanceolata 578.
laricifolia **175.**
leptophylla 294.
marginata **278.**
media 171.
peploides 643.

recurva **191.**
rostrata 491.
rubella **187.**
rubra 285.
sedoides **187. 198.**
segetalis 486.
setacea **122.**
stricta 558.
tenuifolia 463.
verna 294.
villarsii **175.**
viscosa 463.
Alsineae 159.
Alsinanthe
stricta 558.
Althaea 74.
borealis 456.
cannabina **40.**
hirsuta **40.**
officinalis **44.**
pallida 469.
sylvestris 437.
vulgaris 455.
Alyssineen 153.
Alyssum 69.
alpestre 332.
argenteum 318.
bertolonii 318.
calycinum 216.
campestre 287. 333.
clypeatum 227.
edentulum 231.
gemonense 231.
incanum 453.
medium 231.
minimum 498.
montanum 333.
murale 318.
petraeum 231.
saxatile 312.
utriculatum 232.
wulfenianum **177.**
Amarantaceae 124.
Amaranteae 124.
Amarantus 98.
adscendens **53. 54.**
berchtoldi **440.**
blitum **53.**
diffusus **54.**
prostratus **54.**
retoflexus **317.**
sylvestris **440.**
viridis **53.**
Ambrosiaceae 140.
Amelanchier 59.
vulgaris 219.
Amelia
media 401.
minor 195. 403.
Ammadenia
peploides 643.
Ammi 38.
majus **82.**
Ammineae 144.
Ammophila
arenaria **108.**
baltica **279.**
Ampelideae 150.
Ampelopsis
hederacea **35.**
quinquefolia **35.**
Amygdaleae 164.
Amygdalus 58.
amara 195.
communis 194.
macrocarpa 195.
microcarpa 195.
nana 195.
persica 195.
rotunda 195.
Anacamptis 93.
pyramidalis 265.
Anacharis
alsinastrum 382.
Anacyclus 88.
officinarum 302.
Anagallideae 126.
Anagallis 29. 31.
arvensis 18'.
coerulea 212.
phoenicea 181.
tenella 625.
Anarrhinum 68.
bellidifolium **154.**
Anchusa 28.
angustifolia 378.
arvalis 466.
arvensis 285.
italica 524.
leptophylla 378.
micrantha 466.
officinalis 466.
orientalis
vulgaris 466.
Andromeda 51.
calyculata 244.
polifolia 338.
Andromedeae 133.
Andropogon 18.
allionii 549.
angustifolius **57.**
gryllus 601.
ischaemum **57.**
Andropogoneae 112.
Androsace 29.
alpina 565.
bryoides **199.**
carnea **151.**
chamaiasme 350.
elongata 214.
glacialis 565.
lactea 342.
maxima 213.
obtusifolia 538.
septentrionalis 292.
villosa 342.
Androsaceae 126.
Andryala
chondrilloides 506.
Anemone 63.
alba 330.
alpina 330.
baldensis **190.**
biflora 202.
bogenhardiana 185.
burseriana 330.
coerulea 202.
hackelii 185.
halleri 185.
hepatica 176.
hirsuta 202.
hortensis 174.
intermedia
lutea 330.
micrantha 202.
montana
narzissiflora 343.
nemorosa 202.
officinalis 185.
patens 219.
pratensis 220.
pulsatilla 185.
ranunculoides 204.
rubra 202.
sulphurea L. 202.
sulphurea Prtzl.
sylvestris 258.
trifolia 227.
vernalis 174.
Anemoneae 146.
Anethum 36.
foeniculum 481.
graveolens 647.
Angelica 37.
archangelica 542.
carvifolia **2.**
littoralis 542.
montana **16.**
nidus **16.**
pratensis **399.**
pyrenaica
sylvestris **15.**
Angeliceae 145.
Angelium
verticillare **139.**
Antennaria 87.
alpina 562.

carpathica 562.
dioica 290.
Anthemideae 140.
Anthemis 87.
agrestis 460.
alpina **183.**
altissima 470.
arvensis 460.
austriaca **78. 86.**
cota 470. **78.**
cotula **100.**
discoidea 528.
flaccida 528.
hybrida 528.
kitaibelii **374.**
monantha 528.
montana **374.**
neilreichii **78.**
nobilis 445.
pallida 528.
ruthenica **78.**
simplex 528.
styriaca **374.**
tinctoria 528.
virescens **78.**
Anthericum 46.
calyculatum 584.
liliago 540.
liliastrum 581.
ossifragum 623.
ramosum 405.
Anthoxanthum 15. 18.
odoratum 319.
Anthriscus 40.
alpestris 260.
cerefolium 260.
fumarioides 573.
genuina 260.
nemorosa 260.
nodosa 275.
scandix 275.
sylvestris 260.
tenuifolia 260.
trichosperma 260.
vulgaris 275.
Anthrolobium
scorpioides 303.
Anthyllis 75. 77.
alpestris 318.
maritima 318.
montana 327.
polyphylla 318.
vulneraria 317.
Antirrhineae 128.
Antirrhinum 68.
arvense **93.**
cymbalaria 464.
elatine **102.**
linaria **39.**
majus 405.
minus 476.
monspessulanum **51.**
odorum **282.**
orontium **77.**
pellisseriana 315.
repens **51.**
triphylla **499.**
Apargia 82.
alpina **160.**
autumnalis **228.**
hispida 404.
saxatilis **124.**
sudetica 404.
taraxaci **193. 228.**
tergestina **124.**
Apera
interrupta 471.
spica venti 471.
Aphaca
vulgaris 458.
Aphanes
arvensis 297.
Apium 37.
graveolens 617.
petroselinum 451.
Apocyneae 132.
Apocynum 35.
venetum **250.**
Aposeris 80.
foetida 267.
Aquifoliaceae 129.
Aquilegia 62.
alpestris 425.
alpina 425. 559.
atrata 425.
atraviolaceae 425.
einseliana 559.
haenkeana 425.
nigricans 425.
pratensis 425.
pyrenaica 559.
sternbergii 425.
viscosa 559.
vulgaris 425.
Arabideae 153.
Arabis 72.
alpina 335.
arenosa 306.
auriculata 221.
bellidifolia 560.
brassiciformis 331.
ciliata 228. 348.
coerulea **200.**
conferta 252.
crantziana 231.
crispata 335.
declinata 335.
elongata 252.
gerardi 256. 311.
glastifolia 311. 621.
halleri 334.
hirsuta 252.
longisiliqua 311.
muralis 340.
oppositifolia 252.
ovirensis 334.
patula 221.
pauciflora 331.
petraea 231.
planisiliqua Pers. 311.
planisiliqua Rchb. 256.
praecox 230.
procurrens 230.
pumila 560.
rupestris 228.
sagittata 311.
saxatilis 560.
serpyllifolia
stolonifera 334.
stricta
sudetica 252.
thaliana 181.
turrita 270.
verna 243.
vochinensis **211.**
Arachnida theophrasti **89.**
Aracium
paludosum 404.
Araliaceae 143.
Aralinae 143.
Arbuteae 134.
Arbutus 51.
alpina 343.
unedo 224.
uva ursi 273.
Archangelica 37.
officinalis 542.
sativa 542.
Arctium
bardana **41.**
carduelis **180.**
lappa **41.**
minus **41.**
personata **149.**
tomentosa **41.**
Arctostaphylos
alpina 343.
officinalis 273.
procumbens 273.
uva ursi 273.
Aremonia 57.
agrimonioides 501.
Arenaria 51.
aretioides 568.
arvensis 475.
bavarica 506.
biflora **197.**

caespitosa 294.
campestris 285.
ciliata **198.**
fasciculata 491.
graminifolia 406.
grandiflora 337.
heteromalla **122.**
leptodados 444.
liniflora **175.**
marginata **278.**
marina **225.**
marschlinsii 444.
media **278.**
obtusa 578.
pentandra 220.
peploides 643.
polygonoides 578.
quadricalvis **187.**
rostrata 491.
rubra 285. **225.**
segetalis 486.
serpyllifolia 443.
setacea **122.**
tenuifolia 463.
thesiifolia 578.
trinervia 250.
uliginosa 558.
verna 294.
villosa 549.
viscida 444.
viscidula 463.
vulgaris 444.
Arenarieae 159.
Aretia
helvetica **199.**
vitaliana **184.**
Argemoneae 152.
Argyrolobium
linneanum 317.
Aristolochia 95.
clematitis **43.**
pallida 332.
rotunda 217.
sipho
Aristolochieae 121.
Armeniaca
vulgaris 194.
Armeria 43.
alpina **213.**
campestris 451.
halleri 451.
maritima 451.
plantaginea **104.**
purpurea 451.
vulgaris 451.
Armoracia
amphibia 634.
austriaca 609.
rusticana 436.
Arnica 90.
montana 539.
Arnoseris 80.
minima **98.**
pusilla **98.**
Aroideae 110.
Aronia
rotundifolia 219.
Aronicum 89.
bauhini **182.**
clusii **182.**
doronicum **182.**
glaciale **182.**
latifolium **182.**
scorpioides **182.**
Arrhenatherum 20.
avenaceum 429. 472.
bulbosum 429.
elatius 429. 472.
Artemisia 85.
abrotanum **350.**
absinthium **73.**
austriaca **346.**
campestris **316.**
camphorata **452.**
caerulescens **427.**
dracunculus **429.**
gallica **476.**
glacialis **193.**
laciniata **243.**
lanata **182.**
maritima **476.**
mertensiana **243.**
mutellina **189.**
nana
pontica **221.**
rupestris **225.**
salina **476.**
saxatilis **452.**
scoparia **109.**
seriphium **476.**
spicata **189.**
tanacetifolia **374.**
tournefortiana
vulgaris **42.**
Arthrolobeae
orthoploceae 156.
pleurorrhizeae 156.
Arthrolobium
ebracteatum 303.
Artocarpeae 120.
Arum 95.
arisarum 319.
dracunculus 562.
italicum 319.
maculatum 255.
Aruncus
sylvester 419.
Arundo 20.
arenaria **108.**
baltica **279.**
calamagrostis **33. 233.**
donax **407.**
epigeios **33.**
festucacea **261.**
littorea **261.**
montana 408.
neglecta 604.
phragmites **261.**
pseudophragmites H. **261.**
pseudophragmites S. 603.
speciosa **203.**
stricta 604.
sylvatica 418.
tenella **169.**
varia 408.
Asarineae 121.
Asarum 57.
europaeum 179.
Asclepiadeae 133.
Asclepias
vincetoxicum **35.**
Asparagineae 114.
Asparagus 46.
acutifolius 432.
altilis 432.
officinalis 432.
scaber 432.
tenuifolius 276.
Asperifoliae 131.
Asperugo 28.
procumbens 275.
Asperula 24.
aparine **47.**
arvensis 297.
commutata **170.**
cynanchica **59.**
galioides 322.
glauca 322.
laevigata 529.
longiflora **170.**
montana **24.**
odorata 248.
rivalis **47.**
taurina 254.
tinctoria **24.**
Asphodelus 46.
albus 351.
Aster 89.
alpinus **183.**
amellus **342.**
annuus **53.**
canus **294.**
hirsutus **183.**
leucanthemus **419.**
linosyris **341.**

novi belgii **473.**
pannonicus **425.**
parviflorus **418.**
salicifolius **268.**
salignus **268.**
tripolium **425.**
Asterineae 140.
Asteriscus 88.
aquaticus **96.**
Astarocephalus
columbaria **7.**
suaveolens **130.**
succisa **395.**
Asteroideae 140.
Astilbe
aruncus 419.
Astragaleae 166.
Astragalus 78.
alpinus **178.**
arenarius 325. 428.
argenteus
aristatus
asper 363.
austriacus 516.
baeticus 483.
campestris **178.**
cicer 458.
danicus 325.
depressus 349.
exscapus 311.
glycyphyllos 395.
hypoglottis 325.
incurvus 317.
leontinus **216.**
microphyllus 325. 458.
monspessulanus 229.
montanus 561.
onobrychis 534.
oroboides **210.**
pilosus 515.
purpureus **178.**
sulcatus 593.
vesicarius 575.
Astrantia 35.
carinthiaca 420.
carniolica 420.
epipactis 187.
gracilis 420.
major 420.
minor **186.**
vulgaris 420.
Athamanta 39.
cervaria **20.**
cretensis 579.
libanotis **7.**
meum **160.**
mathioli
oreoselinum **129.**
sibirica **2.**
Athrolobium
ebracteatum 492.
Atossa
sepium 206.
Atragene 63.
alpina **176.**
Atriplex 98.
acuminata **70.**
album **79.**
angustifolium **30. 43.**
calotheca **43.**
hastatum **43.**
hortense **57.**
laciniatum **43. 79.**
latifolium **43.**
littorale **254.**
marinum **255.**
nitens **70.**
oblongifolium **70.**
patulum **30. 43**
pedunculata **425.**
portulacoides **428.**
roseum **79.**
ruderale **43.**
tataricum **70.**
triangularis **43.**
Atripliceae 123.
Atropa 31.
belladonna **1.**
carniolica 199.
Atropeae 128.
Aurantia
amara **288.**
dulcis **288.**
hierochuntica **288.**
sinensis **288.**
Avena 20.
airoides 564.
alpestris **169.**
alpina 552.
argentea **169.**
brevis 472.
caryophyllea 369.
chinensis **87.**
distichophylla **184.**
elatior 429. 472.
fatua 472.
flavescens 446.
fragilis 605.
hybrida **81.**
intermedia **81.**
nuda **81.**
orientalis **81.**
planiculmis **245.**
praecox 232.
pratensis 423.
precatoria 429.
pubescens 274.
pusilla 232.
sativa 480.
scheuchzeri **169.**
sempervirens **203.**
strigosa 472.
subspicata 564.
tenuis 512.
Aurantiaceae 149.
Axolopha
hirsuta **40.**
Azarolus
hybrida 268.
Azalea 30.
procumbens 554.

B.

Baldingera 18.
arundinacea 627.
Ballota 66.
alba 436.
foetida 436.
nigra 435.
ruderale 436.
ruderalis 436.
viridis 436.
vulgaris 435.
Balloteae 131.
Balsamineae 149.
Barbaraea 72.
arcuata 280.
hirsuta 280.
intermedia 215.
lyrata 280.
parviflora 378.
praecox 215.
stricta 378.
verna 215.
vulgaris 280.
Bartschia 67.
alpina 537.
odontites **71.**
Batrachium
aquatile 632.
baudotii 633.
confervoides 633.
divaricatum 633.
fluitans 633.
hederaceum 241.
hololeucum 639.
marinum 633.
Bellidiastrum 89.
michelii 332.
Bellis 87.
perennis 171.
Berberideae 147.
Berberis 45.
vulgaris 261.
Berteroa 69.
incana 453.
Berula

angustifolia **235.**
Beta 34.
cicla **89.**
foliosa **89.**
maritima **280.**
rapacea **89.**
vulgaris **89.**
Betonica 66.
alopecuros **176.**
glabrata 394.
hirsuta **140.**
hirta 394.
officinalis 394.
stricta 394.
Betula 99.
alba 198.
alnus 192.
ambigua 198.
arrecta 198.
carpatica 198.
dubia 198.
fruticosa 371.
glutinosa 192. 198.
harcinica 198.
humilis 371.
incana 227.
laciniata 198.
nana 336.
odorata 198.
ovata 354.
pendula 198.
pubescens 198.
verrucosa 198.
Betulineae 118.
Biasolettia 326.
tuberosa 85. 90.
Bidens 85.
bipinnata **100.**
cannabina **409.**
cernua **408.**
hybrida **409**
minima **409.**
mixta **409.**
pinnatifida **409.**
pygmaea **409.**
radiata **409.**
tenuis **409.**
tripartita **409.**
Bifora 42.
radians 486.
Biscutella 69.
ambigua **105.**
hispida
laevigata **105.**
Blitum 34.
bonus henricus 450
capitatum **72.**
crassifolium **48.**
glaucum 450.
rubrum **48.**
virgatum **54.**
Blysmus
compressus 622.
rufus 640.
Bonjeania 77.
hirsuta 528.
Borkhausia 81.
foetida 459.
intybacea 310.
praecox 310.
rhoeadifolia 459.
setosa **66.**
taraxacifolia 310.
Borragineae 131.
Borragineae 27.
Borrago 28.
officinalis **54.**
Brachypodium 22.
dystachium
loliaceum 473. 605.
pinnatum **6.**
poa 585.
sylvaticum 390.
tenuiflorum 310.
Brassica 72.
acephala 194.
aestiva 215.
aloides 194.
alpina 331.
austriaca 503.
botrytis 194.
capitata 194.
cheiranthus 455.
depressa 301.
esculenta 216.
gemmifera 194.
gongylodes 194.
hyberna 215.
napobrassica 216.
napus 215.
nigra **93.**
oleïfera 301.
oleracea 194.
orientalis 299.
rapa 301.
sabauda 194.
salinaria 194.
sylvestris 194.
teltowensis 216.
Brassiceae 153.
Braya 72.
alpina **177.**
pinnatifida **177.**
supina **107.**
Briza 21.
media 596.
minor 296.
Bromus 20.
agrestis 447.
angustifolius 447.
arduennensis **500.**
arvensis 430.
asper 400.
brachystachys 490.
commutatus 296.
confertus 216.
diandrus 284.
elatior 591.
erectus 447.
giganteus 389.
glomeratus 408.
hordaceus **81.**
inermis 447.
longiflorus **303.**
madridensis 284.
maximus 315.
mollis 281.
montanus 447.
multiflorus 296.430.**81.**
patulus 296.
perennis 447.
pinnatus 390. **6.**
pratensis 296. 447.
racemosus 296.
rigidus 283.
secalinus **81.**
serotinus 400.
simplex 296.
squarrosus 499.
stenophyllus 447.
sterilis 461.
strictus 490.
tectorum 283.
triflorus 421.
velutinus **81.**
versicolor 430.
vulgaris **81.**
Bryonia 101.
alba 438.
dioica 439.
Buceras 77.
corniculatum 299.
monspeliacum 457.
Buglosson 466.
Bulliarda 26.
aquatica **258.**
prostrata **258.**
vaillantii 380.
Buniadeae 155.
Bunias 71.
cakile **282. 427.**
erucago 476.
orientalis 445.
Bunium
bulbocastanum 485.
Buphthalmeae 140.
Buphthalmum 88.

aquaticum **96.**
salicifolium **358.**
speciosum **163.**
spinosum 619.
succisaefolium **358.**
Bupleurum 37.
affine **2.**
aristatum **135.**
exaltatum **139.**
falcatum **304.**
gerardi **35.**
graminifolium **172.**
junceum **128.**
longifolium 431.
odontites **133.**
protractum 485.
ranunculoides **204.**
rotundifolium 485.
semicompositum **283.**
stellatum **186.**
tenuissimum **242.**
trifidum **305.**
Burgsdorfia
montana **95.**
Butomeae 113.
Butomus 51.
umbellatus 631.
Buxineae 121.
Buxus 97.
sempervirens 186.

C.

Cacalia
albifrons **150.**
alpina **181.**
saracenica **215.**
Cacosciadium
sylvestre 260.
Cacteae 164.
Cactus
opuntia 276.
Caesalpineae 167.
Cakile 71.
maritima **282. 427.**
Cakilineae 155.
Calamagrostis 18.
acutiflora 408.
arenaria **108.**
argentea **203.**
arundinacea 417.
arund. — epig. 408.
baltica **279.**
epigeios **33.**
gaudiniana **233.**
glauca **33.**
halleriana 603.
huebneriana **33.**
lanceolata **233.**
laxa **261.**
littorea **261.**
montana 408.
neglecta 604.
nutans 604.
pulchella 604.
stricta 604.
sylvatica 417.
tenella **169.**
varia 408. 603.
Calamintha
acinos **94.**
alba **120.**
alpina **176.**
clinopodium **14.**
grandiflora
hederacea 197.
nepeta
officinalis **3.**
subnuda **114.**
thymifolia **120.**
Calendula 91.
arvensis 479.
officinalis **43.**
Calendulaceae 139.
Calepina 71.
corvini 288.
Calla 95.
palustris 418.
Callianthemum 63.
coriandrifolium 569.
rutaefolium 187.
Callianthemeae 147.
Callitriche 96.
alata
angustifolia 373.
autumnalis **269.**
caespitosa 373.
decussata **269.**
hamulata **269.**
intermedia 373.
linealis
minima 373.
platycarpa **269.**
stagnalis **269.**
stellata 373.
truncata **269.**
verna 373.
vernalis 373.
virens **269.**
Callitrichineae 118.
Calluna 49.
vulgaris 402.
Caltha 63.
palustris 239.
Calthaceae 147.
Camelina 69.
austriaca 609.
dentata 495.
glabrata 287.
microcarpa 287.
pilosa 287.
sativa 287.
sylvestris 287.
Camelineae 154.
Campanula 32.
aggregata
alpina 580.
barbata 568.
baumgartenii 450.
bononiensis **47.**
caespitosa **153.**
carnica 555.
cenisia
cervicaria 409.
congesta 529.
decloetiana
elliptica 529.
excisa
farinosa 529.
foliata 568.
garganica
glomerata 529.
graminifolia 526.
hederacea **15.**
hirta 450.
hybrida 485.
latifolia 420.
liliifolia **28.**
linifolia 555.
medium
morettiana 521.
patula 391.
persicifolia 402.
procumbens 450.
pubescens 554.
pulla 570.
pusilla 554.
pyramidalis **48.**
rapunculoides **304.**
rapunculus 450.
rhomboidalis **139.**
rotundifolia 450.
scheuchzeri 555.
sibirica 329.
speciosa 529.
speculum 485.
spicata 576.
squamata 568.
tenuifolia 450.
thaliana **47.**
thyrsoidea 555.
trachelium 400.
uniflora 555.
urticaefolia 409.
valdensis 555.
velutina 450.
zoysii **201.**

Campanulaceae 135.
Campanuleae 135.
Cannabis 103.
sativa 484.
Caprites
claviculata 394.
Capparis 61.
ovata 464.
spinosa 463.
Cappariceae 156.
Capraria
gratioloides **259.**
Caprifoliaceae 142.
Capsella 69.
bursa pastoris 171.
pauciflora 312.
procumbens 359.
Cardamine 73.
acaulis 200.
alpina **177.**
amara 200.
asarifolia 585.
bulbifera 204.
dentata 200.
enneaphylla 199.
grandiflora 200.
hayneana 200.
hirsuta 203.
hirta 201.
impatiens 255.
intermedia 203.
matthioli 200.
multicaulis 203.
opitzii 201.
paludosa 200.
parviflora 619.
petraea 231.
pratensis 200.
resedifolia **148.**
subalpina 201.
sylvatica 201.
trifolia 177.
Cardaria
draba 287.
Cardiolepis
dentata 287.
Carduineae 138.
Carduus 84.
acanthifolius **238.**
acanthoides 438.
acaulis **11.**
albidus 460.
alpestris **6.**
arctioides **180.**
arvensis **67.**
candicans **67.**
canus **400.**
cirsoides **6.**
collinus **68.**
crassifolius **6.**
crispo — nut.
crispus 438. **11.**
cyanoides 504.
defloratus **5.**
eriophorus **67.**
hamulosus **67.**
heterophyllus **144.**
lanceolatus 459.
marianus **52.**
mollis 504.
multiflorus **116.**
nitidus **121.**
nutans **67.**
palustris 399.
pannonicus **143.**
personata **149.**
platylepis **209.**
polyanthemos 438. **67.**
pycnocephalus 460.
rivularis 597.
serratuloides 143.
tataricus **400.**
tenuiflorus 460.
tenuifolius **149.**
tuberosus 505.
Carex 96.
acuta 241. 369.
acutiformis 241.
agastachys 270.
alba 204.
alpestris 227.
amblylepis 369.
ampullacea 241.
approximata 566.
arenaria 236. 367.
argyroglochin 368.
aristata 184.
aterrima **461.**
atrata 345.
atrofusca **374.**
axillaris 253. 610.
balbisii **283.**
baldensis 352.
banatica
bicolor **193.**
biformis 369.
binervis 356. 588.
boenninghausiana 368. 610.
brizoides 253.
buxbaumii 335.
caespitosa 239. 369.
canescens 361.
capillaris 563.
capitata 353.
chlorocarpa 369.
chodorrhiza 376.
ciliata 190.
clandestina 184.
clavaeformis 256.
crassa 374.
collina 322.
corynophora 369.
curta 361.
curvata 184.
curvula **190.**
custoriana 245.
cyperoides 501.
davalliana 239.
decolorans
decumbens 235.
depauperata 198.
diandra 368.
digitata 204.
dioica 245.
distans 209.
disticha 367.
divisa 321.
divulsa 234.
drejeri 239.
drymeia 198.
echinata 368.
elongata 368.
ericetorum 190.
erythrostachys 256.
extensa **283.**
ferruginea 346. 563.
fertilis 369.
filiformis 178. 243.
firma 563.
flacca 256.
flava 361.
foetida **209.**
frigida 541.
fuliginosa **377.**
fulva 369.
gaudiniana 245. 368.
gebhardii **196.**
glauca 256.
goodenoughii 369.
gracilis Curt. 369.
gracilis Wimm. 237.
grypos 368.
guestfalica
gynobasis 227.
gynomane 219.
heleonastes 311.
helvola 373.
hirta 370.
hirtaeformis 370.
hordeiformis 234.
hordeistychos 234.
hornschuchiana 369.
hornsch.-flava 369.
hosteana 369.
humilis 184.
incurva 562.

inflata 243.
intermedia 367.
irrigua **190.**
juncifolia 562.
kochiana 241.
laevigata 611.
laevis 245.
lagopina 566.
lasiocarpa 243.
lepidocarpa 309.
leporina 368.
leptostachys 201.
leucoglochin 354.
ligerica 253.
limosa 369.
linkii 219.
linnaeana 245.
lipsiensis 309.
loliacea 253. 376.
longifolia 203.
ludibunda 610.
marssoni 361. **239.**
maxima 270.
melaena 369.
membranacea 190.
metteniana
michelii 198.
microglochin 353.
microstachya 368. 369.
microstylla 368.
microstylis **209.**
mielichhoferi 563.
mönchiana 369.
montana 178. 322.
mucronata 466.
multiculmis 368.
muricata 234. 368.
muricata-remota 253.
neglecta 239.
nemorosa Lumn. 234.
nemorosa Reb. 374.
nigra 369. **190.**
nitida 221.
nutans 241.
obtusangula 241.
obtusata 221.
oederi 309.
ohmülleriana 546.
ornithopoda 204.
ovalis 368.
pacifica 239.
pallescens 369.
pallida 184.
paludosa 241.
panicea 239. 338.
paniculata 368.
paradoxa 368.
pauciflora 351.
pediformis
pendula 270.
personata 369.
persoonii 253.
pilosa 205.
pilulifera 235.
polyrrhiza 203.
praecox Jacq. 178.
praecox Rchb. 184.
prolixa 369.
pseudo-arenar.
pseudo-cyperus 620.
psyllophora 367.
pulicaris 367.
punctata 611. **283.**
recurva 256.
remota 253.
remota-briz. 546.
remota-panic. 610.
repens 368.
rhynchocarpa 563.
rigida 546.
riparia 374.
rostrata 241.
rupestris 566.
saxatilis 546.
scabra 239.
schreberi 184.
secalina 234.
sempervirens 346.
sieberiana 239.
spadicea 241.
sparsiflora 338.
spicata 221.
splendica 243.
spreta 239.
stellulata 368.
stenophylla 221.
sterilis 369.
stonolifera 178.
stricta 237.
strigosa 201.
supina 322.
sylvatica 198.
tenella 253.
tenuis 571.
teretiuscula 368.
tetanica 338.
tetrastachya 373.
tomentosa 265.
tricostata 369.
trinervis 369.
tripartita **209.**
turfosa 238. 369.
uliginosa 622.
umbrosa Hoppe 203.
umbrosa Host. 178.
uniflora **193.**
ustulata **374.**
vaginata 338.
vahlii **154.**
verna 178.
vesicaria 241. 243.
virens 234.
vulgaris 369.
vulpina 374.
Carlina 84.
acanthifolia **181.**
acaulis **115.**
aggregata **116.**
alpina **115. 353.**
caulescens **116. 353.**
corymbosa 514.
lanata **181.**
longifolia **354.**
nebrodensis **354.**
simplex **116.**
subacaulis **115. 353.**
vulgaris **353.**
Carlineae 135.
Carpesium 85.
abrotanoides **6.**
cernuum **6. 42.**
Carpinus 98.
betulus 199.
duinensis 231.
ostrya 279.
Carthameae 138.
Carthamus 84.
lanatus **163.**
tinctorius **91.**
Carum 37.
bulbocastanum 485.
carvi 481.
divaricatum
verticillatum 602.
Caryophylleae 158.
Cassiniaceae 135.
Castalia
alba 631.
Castanea 98.
sativa 254.
vesca 254.
vulgaris 254.
Catabrosa 19.
aquatica 604.
Catapodium
halleri 585.
tenuiflorum 310.
Cathartolinum
pratense 591.
Caucalideae 145.
Caucalis 41.
daucoides 485.
grandiflora **92.**
helvetica **92.**
latifolia **82.**
leptophylla 486.
muricata 486.

Caulinia 95.
flexilis **424.**
fragilis 639.
Celastrinae 168.
Celtideae 120.
Celtis 34.
australis 226.
Cenchrus
racemosus 498.
Cenolophium
fischeri **264.**
Centaurea 91.
adonidifolia 518.
alba **166.**
amara **69.**
austriaca **31.**
axillaris 504.
benedicta **91.**
calcitrapa **69.**
ciliata 504.
carstiana **121.**
cirrata **31.**
collina 518
cristata 590.
crupina 540.
cyanus 304.
decipiens **161.**
diffusa 590.
integrifolia 504.
jacea 460.
jaceo-nigra **161.**
karstiana **121.**
kotschyana
maculosa **69.**
monocephala **31.**
montana 504.
nervosa **31.**
nigra **30.**
nigrescens **31. 161. 214.**
nigro-jacea **161.**
paniculata **69.**
phrygia **31.**
pratensis **161.**
pseudophrygia **31.**
radiata **31.**
rhaponticum **180.**
rupestris 517.
scabiosa 414.
serrata 504.
solstitialis **87.**
sordida 534.
splendens
transalpina **214.**
vochinensis **214.**
Centaurieae 138.
Centranthus 12.
ruber 542.
Centrophyllum 83. 84.
lanatum **163.**
Centunculus 23.
minimus 462.
Cephalanthera 94.
ensifolia 421.
grandiflora 421.
pallens 421.
rubra 405.
xiphophyllos 421.
Cephalaria
pilosa **6.**
Ceramanthe 68.
vernalis 280.
Cerastieae 159.
Cerastium 56.
aggregatum 233.
alpinum 538.
anomalum 358.
apetalum 307.
aquaticum 440.
arvense 208.
banaticum 558.
brachypetalum 309.
castratum 307.
divaricatum 183.
eglandulosum 307.
glabratum 538.
glabriusculum **175.**
glaciale **175.**
glanduliferum 538.
glomeratum 307.
grandiflorum 558.
glutinosum 183.
gracile 183.
holosteoides 261.
lanatum 538.
lancifolium **175.**
laricifolium 208.
latifolium **175.**
latif. alpestre **175.**
longirostre 261.
macilentum 183.
manticum 249.
murale 261.
notatum 261.
obscurum 183.
ovatum **202.**
pedunculatum **175.**
pellucidum 183.
pumilum 183.
ramosissimum 261.
semidecandrum 182. 183.
strictum 208.
strigosum 309.
suffruticosum 558.
sylvaticum 419.
tetrandum **498.**
triviale 261.
villosum 538.
viscarium 183.
viscidum 183.
viscosum 183. 261. 307. 309.
vulgatum 261. 307.
Cerasus
acida 232.
dulcis 178.
duracina 179.
hispanica 179.
juliana 179.
sylvestris 178.
Ceratocephalus 63.
falcatus 183.
orthoceras 219.
Ceratophylleae 117.
Ceratophyllum 99.
apiculatum **419.**
demersum **419.**
gibbum **419.**
muticum **424.**
oxyacanthum **419.**
platyacanthum **419.**
submersum **424.**
Cercis 53.
siliquastrum 218. 320.
Cereales 112.
Cerefolium
sativum 260.
Ceriuthe 28.
alpina 580.
aspera **170.**
glabra 580.
major **170.**
minor 431.
Chaerophyllum 38.
aromaticum 415.
aureum 432.
bulbosum 408.
cicutaria 409.
elegans **199.**
hirsutum **19.**
hladnikianum 573.
odoratum 267.
sativum 260.
sylvestre 260.
temulum 424.
verticillatum **199.**
villarsii 409.
Chaetospora
ferruginea 365.
nigricans 365.
Chaiturus 65.
leonuroides **4.**
marrubiastrum **4.**
Chamaedaphne
calyculata 244.
Chamaelodon

procumbens 554.
Chamaemespilus 58.
Chamaenerion
angustifolium **7.**
dodonaei **147.**
obscurum **45.**
palustre **147.**
parviflorum **16.**
roseum 18.
Chamorchis 93.
alpina **183.**
Chamaeplium
officinale 464.
Chamagrostis 17.
minima 189.
Chamomilla
officinalis 479.
Cheiranthus 71.
alpinus 323. 344.
cheiri 292.
fruticulosus
incanus 193.
sinuatus 230.
sylvestris 492.
tristis 339.
Cheirinia
cheiranthus 492.
Chelidonieae 152.
Chelidonium 61.
corniculatum 475.
glaucium 497.
laciniatum 277.
majus 277.
Chenopodeae 123.
Chenopodieae 123.
Chenopodina
maritima **425.**
Chenopodium 34.
acutifolium **49.**
album **49.**
ambrosioides 441.
bonus henricus 450.
botrys 462.
crassif.-glomerat. **475.**
cymoso-racem **49.**
ficifolium **309.**
foetidum **49.**
glaucum 450.
humifusum **475.**
hybridum **49.**
intermedium **60.**
maritimum **425.**
melanospermum **60.**
murale **49.**
olidum **49.**
opulifolium **60.**
polyspermum **49.**
rhombifolium **60.**
rubrum **48.**
spicato-racem **49.**
urbicum **60.**
vulgare **49.**
vulvaria **49.**
Cherleria 55.
sedoides **198.**
Chilochloa
aspera 296.
Chimaphila 52.
umbellata 401.
uniflora 423.
Chironia
centaurium 391.
Chlora 49.
perfoliata 359.
serotina **257.**
Chondrilla 81.
acantophylla **11.**
glabra **11.**
juncea **11.**
latifolia **11.**
muralis **5.**
prenanthoides **141.**
rigens **11.**
Chondrilleae 136.
Chrysanthemum 87.
alpinum **375.**
arenarium **507.**
atratum **182.**
ceratophylloides **182.**
chamomilla 479.
coronopifolium **182.**
corymbosum 414.
inodorum **42.**
leucanthemum 414.
montanum 562.
parthenium **53.**
segetum **94.**
tanacetum **68.**
vulgare **68.**
Chrysocoma
linosyris **341.**
Chrysoplenium 50.
alternifolium 224
oppositifolium 210.
Cicendia 24.
filiformis **106.**
Cicer 78.
arietinum 483.
Cicerbita
alpina **152.**
corymbosa 396.
muralis 5.
Cicercula
sativa 302.
Cichoriaceae 136.
Cichorinae 137.
Cichorium 80.
endivia **285.**
intybus 459.
Cicuta 37.
tenuifolia 606.
virosa 606.
Cicutaria
aquatica 606.
Cimicifuga 62.
foetida **3.**
racemosa **3.**
Cineraria 88.
alpestris 423.
alpina **149.**
arachnoidea **217.**
aurantiaca 574.
campestris 415.
capitata 574.
crassifolia 423.
crispa 537.
crispata 537.
crocea 537.
flosculosa 574.
glabrata 574.
integrifolia 423.
longifolia 582.
palustris **241.**
papposa 537.
pratensis **218.**
rivularis 537.
schkuhrii 537.
sibirica 615.
spathulifolia 423.
sudetica 537.
Circaea 14.
alpina 400.
alpino-lut. **23.**
intermedia **23.**
lutetiana **18.**
lutetiano-alp.
vulgaris **18.**
Circeaceae 163.
Cirsium 84.
acarna
acaule **11.**
acaule-oler. **113.**
acaule-tuber. **143.**
ambiguum 601.
anglicum 535.
argenteum **67.**
arvense **67.**
bulboso-oler. **238.**
bulbosum 505.
bulboso-acaule **143.**
cano-oler. **400.**
canum **400.**
carniolicum 597.
caulescens **11.**
decoloratum **113. 238.**
dioicum **144.**
eriophorum **67.**

erisithales **213.**
freyerianum 504.
glutinosum **213.**
heterophyllum **144.**
heter.-rivulare 601.
horridum **67.**
hybridum **238.**
indivisum **144.**
kocheanum **162.**
lachenalii **113. 238.**
lacteum **238.**
lanceolatum 459.
lanceol.-olerac. **238.**
medium **143.**
mite **67.**
neglectum **67.**
nemorale 460.
ochroleucum
oler.-acaule **238.**
oleraceum **238.**
oler.-rivul. **218.**
palustre 399.
palustri-bulbos. **162.**
palustri-oler. **238.**
pal.-rivulare 583.
palul.-tuberos. **162.**
pannon.-palustre 615.
pannonicum **143.**
parviflorum **238.**
pauciflorum **196.**
pinnatifidum **144.**
polyanthemon **67.**
praemorsum **218.**
rigens **113. 238.**
rivulare 597.
salisburgense 597.
semidecurrens **162.**
semipectinatum **218.**
serratuloides 517. **143.**
setosum **11.**
sonchifolium **238.**
spinos.-erisith. **214.**
spinosissimum **200.**
subalpinum 583.
tataricum **400.**
tricephalodes 597.
tuberoso-acaule 504.
tuberosum 505.
vulgare **144.**
zizianum **143.**
Cissus
hederacea **35.**
Cistineae 156.
Cistus 61.
alpestris 526.
apenninus 502.
canus 507.
creticus
guttatus 491.
helianthemum 412.
marifolius 507.
oelandicus 526.
salvifolius 314.
vinealis 507.
Citrullus
vulgaris **286.**
Citrus
aurantium **288.**
limetta **287.**
limonium **287.**
medica **287.**
vulgaris **287.**
Cladium 15.
germanicum **248.**
mariscus **248.**
Clematideae 146.
Clematis 62.
erecta 412.
flammula 513.
integrifolia 608.
recta 412.
vitalba **29.**
viticella 277.
Clinopodium
vulgare **14.**
Clypeola 71.
jonthlaspi 213.
Cnicus 91.
benedictus **91.**
dubius **11.**
erisithales **214.**
lanceolatus 459.
oleraceus **238.**
parviflorus **238.**
praemorsus **218.**
salisburgensis 597.
Cnidium 39.
apioides **120.**
monnieri **36.**
silaus 598.
venosum **21.**
Cobresia 96.
caricina **190.**
Cochlearia 69.
anglica 383.
armoracia 436.
brevicaulis 570.
coronopus **56.**
danica 383.
draba 287.
groenlandica 350.
officinalis 350.
pyrenaica 350.
rhizobotrya 570.
rusticana 436.
saxatilis 571.
Coeloglossum
albidum 265.
viride 610.
Coelospermeae 146.
Coilanthe
purpurea **171.**
Colchiaceae 113.
Colchiceen 114.
Colchicum 47.
alpinum **505.**
autumnale **466.**
Coleanthus 18.
subtilis **261.**
Collomia
grandiflora **501.**
Colutea 78.
arborescens 437.
cruenta 319.
orientalis 319.
Comarum 60.
palustre 440.
supinum 466.
Compositae 135.
Coniferae 117.
Conioselinum 36.
fischeri **147.**
tataricum **147.**
Conium 38.
maculatum **36.**
Conopsidium
plantantherum 252.
Convallaria 46.
bifolia 269.
latifolia 266.
majalis 249.
multiflora 254.
polygonatum 254.
verticillata 268.
Convolvulaceae 131.
Convolvulus 30.
althaeoides
arvensis 443.
cantabrica 513.
sepium 431.
soldanella **280.**
Conyza 86.
squarrosa **69.**
Corallorrhiza 94.
innata 547.
Coreopsis
bidens **409.**
Coriandrum 41.
cicuta 606.
majus 481.
sativum 481.
Coringia
orientalis 299.
perfoliata 299.
thaliana 181.
Corisanthereae 140.
Corispermum 34.

intermedium **426.**
hyssopifolium **309.**
marschallii **104.**
nitidum **321.**
squarrosum
Corneae 143.
Cornus 25.
alba **502.**
mas 207.
sanguinea 430.
stolonifera **502.**
suecica 390.
Coronaria
flos cuculi 261.
tomentosa 656.
Coronilla 79.
coronata 508.
cretica
emerus 331.
minima
montana 508.
scorpioides 303.
vaginalis 507. 527.
varia 458.
Coronilleae 166.
Coronopus
didymus **77.**
ruellii **56.**
squamatus **56.**
Corrigiola 42.
littoralis 461.
Cortusa 29.
matthioli 349.
Corydalis 75.
acaulis 293.
bulbosa 176.
capnoides 517.
cava 197.
clavicurlata 394.
digitata 176.
fabacea 206.
intermedia 206.
lobelii 178.
lutea 465.
ochroleuca 465.
pumila 178.
solida 176.
tuberosa 197.
Corylus 98.
avellana 172.
colurna 172.
tubulosa 173.
Corymbiferae 139.
Corynephorus
canescens 499.
Cotoneaster 59.
integerrimus 220.
tomentosa 655.
vulgaris 220.
Cotula 85.
coronopifolia **68.**
Cracca
major 437.
monanthos 458.
tenuifolia 437.
villosa 304.
Crambe 71.
glabrum 299.
maritima 383.
tatarica 298.
Crassula 44.
istriaca
rubens 297.
Crassulaceae 161.
Crassuleae 161.
Crataegus 58.
aria 268.
azarolus 208.
cuneïfolia 250.
hybrida 268.
monogyna 250.
oxyacantha 250.
pinnatifida 250.
scandicans 268.
torminalis 258.
Crepideae 136.
Crepis 81.
adenuntha 324.
agrestis 479.
alpestris **114.**
aurea **180**
biennis 324. 600.
blattarioides 574.
bulbosa
capitata **218.**
chondrilloides 506. **201.**
foeniculacea 506.
foetida 459.
froelichiana 345.
glandulosa 459.
grandiflora **151.**
graveolens 459.
hieracioides **162.**
hispida **66.**
hyoseridifolia **201.**
incarnata 345.
integrifolia **201.**
intybacea 310.
jacquini **201.**
jubata **193.**
lodomiriensis 600.
montana **200.**
neglecta 213.
nicaeensis 324.
paludosa 404.
pinnatifida 479.
polymorpha 479.
praecox 310.
praemorsa 272.
pratensis **218.**
pulchra **46.**
pygmaea
rhaetica **201.**
rhoeadifolia 459.
rubra
scabra 324.
setosa **66.**
sibirica **151.**
succisifolia **161.**
taraxicifolia 310. **151.**
tectorum 465.
vesicaria
virens 479.
vulgaris **201.**
Crinitaria 85.
linosyris **341.**
Critamus 38.
agrestis **55.**
falcaria **55.**
pastinacifolia 573.
Crithmum 36.
maritimum **280.**
Crocus 16.
sativus **447.**
variegatus 187. 191.
vernus 187.
Crucianella 24.
angustifolia 495.
molluginoides **119.**
Cruciferae 152.
arthrolobeae 155.
nucamentaceae 154.
siliculosae 153.
siliquosae 153.
Crupina 91.
vulgaris 540.
Crypsis 17.
aculeata **249.**
alopecuroides 604.
Cucubalus 54.
bacciferus **37.**
behen 424.
chloranthus **32.**
italicus 324.
otites 261.
pumilio 569.
tataricus **271.**
viscosus 451.
Cucumis 101.
flexuosus **91.**
melo **286.**
sativus **91.**
Cucurbita 101.
lagenaria **91.**
maxima 649.
melopepo 520.
pepo **91.**

verrucosa **286.**
Cucurbitaceae 121.
Cupidocarpus
rupestris 120.
Cupressineae 117.
Cupressus 100.
sempervirens 174.
Cupuliferae 119.
Cuscuta 34.
epilinum **291.**
epithymum 653.
europaea 653. **291.**
hassiaca **431.**
lupuliformis 653.
major **291.**
minor 653.
monogyna 653.
planiflora **291.**
racemosa **431.**
schkuhriana **291.**
suaveolens **431.**
trifolii 653.
urticearum **291.**
vicieae **291.**
vulgaris **291.**
Cuscutina
suaveolens **431.**
Cyclamen 29.
europaeum 226.
Cydonia 59.
vulgaris 385.
Cymbalaria
muralis 464.
Cymbidium
corallorrhiza 547.
Cynanchum
vincetoxicum **35.**
Cynareae 137.
Cynarocephaleae 137.
Cynodon 17.
dactylon **81.**
Cynoglossum 28.
bicolor 449.
germanicum 420.
lappula 449.
montanum 420.
officinale 449.
pictum 468.
scorpioides 206.
sylvaticum 420.
Cynosurus 21.
coeruleus 187.
cristatus 591.
durus 309.
echinatus 307.
Cyperaceae 111.
Cyperus 15.
badius **154.**
esculentus **330.**
flavescens 417.
fuscus **232.**
glomeratus **272.**
longus **260.**
monti **248.**
serotinus **248.**
thermalis **154.**
virescens **232.**
Cypripedium 95.
calceolus 541.
Cytisus 76.
alpinus 352.
argenteus 317.
austriacus 406.
biflorus 219.
capitatus 311.
fragrans **293.**
glabrescens
hirsutus 267.
holopetalus 327.
laburnum 197.
nigricans 405.
prostratus 333.
purpureus 321.
radiatus 327.
ramentaceus **293.**
ratisbonensis 219.
sagittalis 258.
sessilifolius 258.
spinescens
supinus 219. 323.
weldeni **293.**
Czackia
liliastrum 581.

D.

Dactylis 21.
glomerata 408.
maritima 641.
Danthonia 20.
calicina 544.
decumbens 544.
provincialis 544.
Dantia
palustris **258.**
Daphne 49.
alpina 339.
blagayana 531.
cneorum 347.
collina 185.
laureola 204.
mezereum 172.
striata 557.
Daphnoideae 122.
Datura 30.
stramonium 442.
Datureae 128.
Daucineae 145.
Daucus 41.
carota 451.
Dejeuxia
sylvatica 417.
Delphinium 62.
ajacis 298. 475.
consolida 298.
elatum **143.**
fissum 531.
hybridum 531.
staphysagria **502.**
Dentaria 72.
bulbifera 204.
digitata 585.
enneaphyllos 199.
glandulosa 204.
pentaphyllos 585.
pinnata 200.
polyphyllos 199.
trifolia 244.
Deschampsia
caespitosa 439.
Diantheae 158.
Dianthus 54.
alpestris 392.
alpinus **202.**
arenarius 496.
armeria **20.**
atrorubens 325.
barbatus **147.**
caesius 257.
carthusianorum 261.
caryophyllus 463.
ciliatus 552.
deltoides 409.
glacialis **196.**
glaucus
liburnicus 530.
monspessulanus **134.**
neglectus
plumarius **114.**
prolifer **61.**
sanguineus 320.
saxifraga **100.**
seguierii **8.**
speciosus 392.
superbus 392.
sylvaticus **8.**
sylvestris **174.**
vaginatus 325.
velutinus **61.**
waldsteinii 134.
wimmeri
Dichodon
anomalum 358.
cerastoides **187.**
Dictamnus 53.
albus 418.
fraxinella 418.
Digitaleae 127.

Digitalis 68.
acutiflora 393.
ambigua 393.
ambiguo-lutea **125.**
ferruginea 548.
fuscescens
grandiflora 393.
laevigata **165.**
lanata 393.
lutea 436.
media **125.**
micrantha 425.
obtusiflora 393.
ochroleuca 393.
parviflorus 436.
purpurascens 420.
purpurea 423.
purpureo-lutea 420.
Digitaria 17.
ciliaris 442.
filiformis 446.
glabra 446.
humifusa 446.
sanguinalis 442.
Digraphis
arundinacea 627.
Dioscoreae 115.
Diosmeae 148.
Diotis
atriplicina **425.**
Diplachne
serotina **311.**
Diplotaxis 72.
caulescens 455.
muralis 454.
scapigera 455.
tenuifolia 454.
viminea 494.
Dipsaceae 141.
Dipsacus 23.
fullonum **34. 58.**
laciniatus **58.**
pilosus **6.**
sylvester **34.**
Doellia 54.
Donax
arundinaceus **407.**
borealis **261.**
Dondia
epipactis 187.
Dondisia
epipactis 187.
Doronicum 89.
austriacum 505.
bellidiastrum 332.
caucasicum 506.
columnae 506.
pardalianches 313.
scorpioides 347.
Dorycnium 77.
herbaceum **115.**
suffruticosum 512.
Draba 71.
aïzoides 225.
carinthiaca **188.**
ciliata 314.
confusa 560.
contorta 346.
fladnitziensis **192.**
frigida **188.**
incana 346.
johannis
lapponica **192.**
muralis 292.
nemoralis 292.
sauteri 572.
stellata 570.
stylaris 560.
thomasii 560.
tomentosa **197.**
traunsteineri **188.**
verna 173.
wahlenbergii **192.**
zahlbruckneri
Dracocephalum 65.
austriacum 328.
moldavica **25.**
ruyschiana 394.
Drosera 43.
anglica 615. **241.**
intermedia 615.
longifolia 615. **241.**
obovata **241.**
rotundifolia **240.**
Droseraceae 157.
Dryadeae 164.
Dryas 60.
octopetala **155.**
Drypideae 159.
Drypis 42. 54.
spinosa 511.
Dysenterica
squarrosa **225.**
vulgata **225.**

E.

Ebulum
humile **7.**
Echinanthriscus
vulgaris 275.
Echinaria 17.
capitata 284.
Echinochloa 17. 19.
crus galli **79.**
Echinodorus
natans 621.
parnassifolius **251.**
ranunculoides 618.
Echinops 92.
banaticus **128.**
exaltatus
ritro **136.**
sphaerocephalus **53.**
Echinopsideae 139.
Echinopsilon
hirsutus **280.**
Echinospermum 28.
deflexum 502.
lappula 449.
squarrosum **48.**
Echium 27.
eglandulosum 409.
italicum **74.**
plantagineum 495.
rubrum 535.
strictum 409.
subalpinum 409.
violaceum
vulgare 409.
wierzbickii 409.
Elaeagneaa 122.
Elaeagnus 25.
angustifolius 372. 617.
Elatine 50.
alsinastrum 251.
hexandra 631.
hydropiper 626.
triandra **259.**
Elatineae 160.
Elatinoides
hastifolia **102.**
Eleogiton
fluitans 627.
Eleusine
dura 309.
Elodea
canadensis 382.
Elodes
palustris **241.**
Elssholzia 66.
cristata **74.**
patrini **74.**
Elymus 19. 22.
arenarius **262.**
caninus 398.
crinitus 383.
europaeus 390.
Elyna 96.
spicata 562.
Empetreae 121.
Empetrum 102.
nigrum 225.
Endiusa
hirsuta 437.
Endymion
non scriptus 199.

nutans 199.
Enodium
caeruleum **15.**
Ephedra 105.
distachya 550.
monostachya 498.
Ephemerum
nemorum 398.
Epilobeae 163.
Epilobium 49.
adnatum **45.**
alpinum **147.**
alsinefolium **156.**
anagallidifolium **147.**
angustifolium **7.**
angustissimum **147.**
chodorrhizum **17.**
collinum **17.**
denticulatum **147.**
dodonaei **147.**
durieui **17.**
fleischeri **147.**
grandiflorum 398.
hirsutum 398. **16.**
hypericifolium **17.**
intermedium 399.
lanceolatum **17.**
molle **16. 45.**
montanum **16.**
nutans **147.**
obscurum **45.**
origanifolium **156.**
palustre **240.**
parviflorum **16.**
pubescens **16.**
roseum **18.**
rosmarinifolium **147.**
schmidtianum **45.**
spicatum **7.**
tetragonum **45.**
trigonum 543.
virgatum **17.**
Epimedium 24.
alpinum 226.
Epipactis 94.
atropurp.-micr. **23.**
ensifolia 421.
grandiflora 421.
helleborine **23.**
latifolia **23.**
microphylla **23.**
nidus avis 402.
ovata 400.
pallens 421.
palustris 416.
rubra 405.
viridiflora **23.**
Epipogium 94.
aphyllus **13.**
gmelini **13.**
Eragrostis 21.
major **96.**
megastachya **96.**
minor 490.
pilosa 473.
poaeformis 490.
poaeoides 490.
Eranthis **64.**
hiemalis 172.
Erica 49.
calluna 402.
carnea 174.
cinerea **389.**
tetralix **162.**
vulgaris 402.
Ericaceae 133.
Ericeae 133.
Ericineae 133.
Erigeron 89.
acer **354.**
acris **354.**
alpinus **183.**
angulosus **206.**
annuus **53.**
brachyglossum **354.**
canadensis **87.**
droebachensis **206.**
glabratus **183.**
grandiflorus **183.**
oligocephalus **183.**
podolicus **355.**
serotinus **355.**
uniflorus **183.**
villarsii **130.**
viscosum **163.**
Erinus 68.
alpinus 560.
lanceolatus 351.
Eriophorum 15.
alpinum 244.
angustifolium 239.
capitatum 353.
gracile 375.
latifolium 239.
polystachium 239. 375.
pubescens 239.
scheuchzeri 244. 353.
triquetrum 375.
vaginatum 244.
Eritrichium 28.
nanum 197.
Erodium 74.
ciconium 469.
cicutarium 211.
maculatum 211.
malacoides 455.
melanostigma 211.
moschatum 278.
pilosum 211.
pimpinellifolium 211.
Erophila
americana 173.
verna 173.
vulgaris 173.
Erucastrum 72.
incanum
inodorum 455.
obtusangulum 461.
pollichii 455.
Ervilia
sativa 487.
Ervum 78.
cassubicum 405.
ervilia 487.
gracile 478.
hirsutum 437.
lens 484.
lenticula 488.
monanthos 458.
nigricans 217.
orobus 279.
pisiforme 418.
sylvaticum 418.
tetraspermum 413.
Eryngium 35.
alpinum **172.**
amethystinum **371.**
campestre **60.**
maritimum 632.
planum 598.
Erysimum 72.
alliaria 202.
alpinum 331. 344.
austriacum 503.
barbarea 280.
canescens 323.
cheiranthoides 492.
cheiranthus 344.
cheiriflorum 508.
crepidifolium 288.
diffusum 323.
durum 323.
helveticum 344.
hieracifolium Jacq. 508.
hieracifolium L. 280. 288.
lanceolatum 344. 508.
longisiliquosum
ochroleucum 344.
odoratum 508.
officinale 464.
orientale 299.
perfoliatum 299.
praecox 215.
pumilum 344.
repandum 303.
rhaeticum 344.

strictum 280.
suffruticosum 288.
thalianum 181.
virgatum 280.
Erythraea 30.
angustifolia 391. 641.
capitata 391.
centaurium 391.
divaricata 391.
inaperta 593.
linariifolia 641.
officinalis 391.
pulchella 593.
pusilla 593.
ramosissima 593.
spicata **280.**
Erythronium 46.
dens-canis 188.
Esculus
hippocastanum 285.
Esmarchia
cerastoides **498.**
Eualsineae 159.
Euclidium 70.
austriacum **495.**
syriacum 287.
Eupatorieae 140.
Eupatorium 85.
cannabinum **238.**
Euphorbia 100.
amygdaloides 253.
angutata 321.
caciogala 460.
carniolica 397.
chamaesyce 499.
cyparissias **103.**
dulcis 198.
epithymoides 231.
esula 460. 461.
exigua 509.
falcata **87.**
foetida 397.
fragifera 313.
gerardiana 460.
helioscopia 212.
lathyris **69.**
linariaefolia 460.
lucida 610.
micrantha 397.
mollis 422.
montana 264.
myrsinites
nana 612.
nicaeensis 612.
palustris 373.
pannonica 612.
paralias 644.
peplis **282.**
peploides
peplus 445.
pilosa 422.
pinea
phatyphyllos **79.**
procera 422.
retusa 510.
salicifolia 264.
saxatilis 312.
segetalis **100.**
solysequa 198.
stricta 397.
tithymalus **79.**
verrucosa 313.
villosa 422.
virgata 264.
wulfenii 253.
Euphorbiaceae 120.
Euphorbieae 121.
Euphrasia 67.
acutifolia **103.**
alpina **103.**
gracilis **103.**
lutea **23.**
micrantha **103.**
minima **103.**
nemorosa **103.**
obtusifolia **103.**
odontites **71.**
officinalis **103.**
picta **103.**
pratensis **103.**
rostkoviana **103.**
salisburgensis **103.**
serotina **71.**
tricuspidata **103.**
verna **71.**
viscosa
Eurotia 97.
ceratoides **346.**
Eusium
latifolium **235.**
Euxobus
viridis **53.**
Evax
pygmaea **502.**
Evonymus 33.
europaeus 248.
latifolia 345.
verrucosus 248.
Exacum
filiforme **106.**

F.

Faba
vulgaris 483.
Fabaceae 166.
Fagopyrum
esculentum **89.**
tataricum **83.**
Fagus 98. 99.
castanea 254.
sylvatica 253.
Falcaria
rivini 573.
Farsetia 69.
clypeata 227.
incana 453.
Fedia
dentata **80.**
morisonii **80.**
olitoria 213.
Ferula 35.
ferulago **243.**
Ferulago
galbanifera **501.**
Festuca 21.
alpina 356.
amethystina 356.
arenaria 428.
arundinacea 604.
aspera 400.
aurata 356.
borealis **261.**
brinkmanni 473.
bromoides 259. 446.
calamaria 421.
canescens 415.
capillata
curvula 415.
decumbens 544.
distans 605.
drymeia 421.
dumetorum 428.
duriuscula 389. 414.
elatior 591. 604.
elongata 473.
erecta 447.
festucaceum 473.
flavescens **212.**
fluitans 628.
gaudini 356.
gigantea 389.
glauca 415.
glomerata 408.
gracilis 356. 390.
guestfalica 415.
halleri 356.
heterophylla 389.
inermis 447.
lachenalii 585.
laxa 553.
loliacea 473. 605.
maritima **279.**
montana 421. 447.
myurus 259. 274.
nemoralis 415.
nemorum 389.
nigrescens 389.

nigricans 389.
ovina 355.
pannonica 415.
pilosa **184.**
pinnata **6.**
poaeformis **184.**
pratensis 591.
procumbens 641.
pseudo-myurus 259.
pulchella **184.**
pumila **203.**
rhaetica **184.**
rubra 427.
scheuchzeri **184.**
sciuroides 446.
serotina **311.**
spadicea 564.
speciosa 447.
spectabilis 564.
sudetica 356.
sylvatica 421.
tenuiflora 310.
tenuifolia 356.
thalassica **279.**
uniglumis 283.
vaginata 415.
valesiaca 415.
varia **212.**
violacea 356.
vivipara 356.
vulgaris 355. 415.
Ficaria 63.
ranunculoides 177.
verna 177.
Ficus 97.
carica 188.
Filago 86.
alterniflora **68.**
arvensis **86. 101.**
brachiata **101.**
caespitosa **68.**
gallica **102.**
germanica **68.**
gymnopus **68.**
minima **101.**
montana **86. 101.**
multicaulis **101.**
ramosa **68.**
ramosissima **101.**
spatulata **102.**
squarrosa **68.**
stricta **68.**
Fimbristylis
dichotoma **249.**
Fluminia
arundinacea **261.**
Foeniculum 38.
capillaceum 481.
officinale 481.
vulgare 481.
Fragaria 60.
collina 277.
elatior 176.
hagenbachiana 324.
moschata 176.
sterilis 178.
vesca 197.
viridis 277.
Frangula
alnus 248.
vulgaris 248.
Fraxinus 13.
atrovirens 195.
crispa 195.
excelsior 195.
ornus 247.
pendula 195.
Freyera 41.
tuberosa 326.
Fritillaria 46.
meleagris 190.
pyrenaica 341.
tenella 223.
Fulmaria
rivini **55.**
vulgaris **55.**
Fumana
procumbens 507.
Fumaria 75.
acrocarpa 477.
apiculata 283.
bulbosa 176. 197.
capnoides 517.
capreolata 278.
cava 197.
densiflora 493.
fabacea 206.
grandiflora 283.
halleri 176.
intermedia 206.
linearifolia 283.
lutea 465.
micrantha 493.
muralis 465.
officinalis 283.
parviflora 299.
petteri
prehensilis 494.
pumila 178.
rostellata 493.
scandens 283.
solida 176.
spicata **495.**
tenuiflora 477.
vaillantii 299.
vulgaris 293.
wirtgenii 477.
Fumariaceae 151.

G.

Gagea 46.
arvensis 213.
liottardi 350.
lutea 208.
minima 205.
pratensis 205.
pusilla 191.
saxatilis 350.
spathacea 200.
stenopetala 205.
Galanthus 45.
nivalis 180.
Galatella 89.
cana **294.**
linosyris **341.**
Galega 76. 78.
officinalis 461.
Galegeae 164
Galeobdolon 66.
luteum 197.
Galeopsis 66.
angustifolia **113.**
bifida **39.**
canescens **84.**
cannabina **17.**
galeobdolon 197.
grandiflora **51.**
integrifolia **84.**
intermedia **84.**
ladanum **84.**
latifolia **84.**
ochroleuca **51.**
pubescens **14.**
tetrahit **17. 38.**
versicolor **17.**
walterina **14.**
Galinsoga 90.
parviflora **86.**
Galium 24.
agreste **28.**
alpestre 390.
anglicum **94.**
aparine **28.**
aristatum 390. 419.
baldense **212.**
bauhini
bocconi 390.
boreale **7.**
cruciata 260.
cruciatum 260.
divaricatum **94.**
echinospermum **28.**
elatum 390.
ellipticum **27.**
erectum
eriophyllum 390.

glabratum 605.
glaucum 322.
gracile **94.**
helveticum **212.**
hercynicum 541.
hirtum 390.
hyssopifolium **7.**
infestum **28.**
intermedium **7.**
laeve 390.
laevigatum 419.
laevipes 260.
lapeyrousian
leiophyllum 408.
linifolium 419.
lucidum 576.
mollugo 390.
multicaule 390.
nemorosum 390.
ochroleucum
palustre **239.**
parisiense **94.**
pedemontanum 315.
pumilum 524.
purpureum **119.**
rotundifolium **27.**
rubioides **7. 249.**
rubrum 512.
saccharatum 485.
saxatile 541.
scabrum 390.
spurium **45.**
supinum 390.
sylvaticum **24.**
sylvestre 390.
tenerum **28.**
tenuissimum **94.**
trachyphyllum 408.
tricorne **92.**
trifidum **401.**
tyrolense 390.
uliginosum 605.
vaillantii **28.**
valantia **92.**
vernum 220.
vero-mollugo 408.
verrucosum 485.
verum 408.
Gastridium 18.
australe 296.
lendigerum 296.
Gaudinia 22.
fragilis 605.
Gaya
simplex **210.**
Gelasia 82.
villosa 602.
Genista 76.
anglica 357.
arcuata 655.
dalmatica **500.**
diffusa 323.
elatior 413.
germanica 257.
holopetala 327.
lucida 413.
ovata 523.
pilosa 259.
procumbens 511.
pubescens 413.
sagittalis 258.
scariosa 526.
sericea 587.
sylvestris 327.
tinctoria 413.
triangularis 526.
Genisteae 166.
Gentiana 34.
acaulis 556.
aestiva 227.
amarella **385.**
asclepiadea **361.**
axillaris **385.**
bavarica **185.**
brachyphylla 227.
campestris **360.**
carinthiaca **378.**
centaurium 391.
charpentieri **504.**
chloraefolia **507.**
ciliata **365.**
cruciata 513.
elongata **185.**
excisa **378.**
filiformis **106.**
frigida **196.**
frölichii **185.**
gaudiana
germanica **124.**
glacialis **376.**
imbricata **172. 185.**
lutea **147.**
nana **186.**
nivalis **186.**
nutans **186.**
obtusifolia **145.**
pannonica **147.**
perfoliata 359.
pneumonanthe **398.**
prostrata **185. 186.**
pulchella 593.
pumila **185.**
punctata **171.**
purpurea **171.**
pyramidalis **145. 385.**
spathulata **145.**
sylvestris **385.**
tenella **508.**
thomasii **505.**
uliginosa **385.**
utriculosa 370.
verna 227.
vulgaris 227.
Gentianeae 132.
Geracium
parviflorum 345.
praemorsa 272.
Geraniaceae 148.
Geranieae 149.
Geranium 74.
aconitifolium **501.**
argenteum 566.
bohemicum 394.
ciconium 469.
cicutarium 211.
columbinum 304.
dissectum 278.
divaricatum **39.**
lucidum 269.
malacoides 455.
macrorrhizum 348.
molle 278.
moschatum 278.
nodosum 252.
palustre 399.
phaeum 334.
pratense 440.
pusillum 278.
pyrenaicum 264.
robertianum 256.
rotundifolium 278. 282.
sanguineum 266.
sibiricum **56.**
sylvaticum 255.
viscidulum 282.
Geum 60.
hispidum 403. **222.**
inclinatum 518.
intermedium Ehrh. 403.
intermedium Willd. 403.
montanum **160.**
pyrenaicum 518.
reptans **187.**
rivale 258.
rivale-urban. 403.
strictum **222.**
sudeticum 518.
urbanum 403.
urbano-rivale 403.
willdenowii 403.
Githago
segetum 475.
Gladiolus 16.
boucheanus 247.
communis 362.

illyricus 357.
imbricatus 397.
neglectus 247.
paluster 247.
pratensis 247.
segetum 295.
Glaucium 61.
corniculatum 475.
flavum 497.
luteum 497.
phoeniceum 475.
tricolor 475.
Glaux 27.
maritima 382.
Glechoma 66.
hederacea 197.
hirsuta 197.
Globularia 23.
angustifolia 312.
cordifolia 342.
depressa 312.
latifolia 312.
nana 342.
nudicaulis 553.
squarrosa 312.
vulgaris 311.
Globularineae 125.
Glyceria 21.
airoides 604.
altissima **262.**
aquatica Prsl. 604.
aquatica Whlbg. **262.**
distans 605.
festucaeformis **279.**
fluitans 628.
intermedia 605.
maritima **279.**
nemoralis **499.**
plicata 628.
racemosa 628.
remota **499.**
spectabilis **262.**
Glycyrrhiza 78.
glabra **90.**
Gnaphalieae 139.
Gnaphalium 86.
arenarium **108.**
arvense **86.**
dioicum 290.
divaricatum **100.**
fuscatum **389.**
fuscum **362.**
germanicum **68.**
leontopodium **192.**
luteo-album **106.**
montanum **101.**
nanum **100.**
neglectum **86.**
norvegicum **362.**
nudum **100.**
rectum **389.**
strictum **389.**
subsimplex **100.**
supinum **362.**
sylvaticum **389.**
uliginosum **100.**
umbrosum **389.**
virgatum **389.**
Goodyera 94.
repens **32.**
Graphephorum
festucaceum **261.**
Gramineae 112.
Gratiola 14.
officinalis **224.**
Gratioleae 127.
Gregoria 29.
vitaliana **185.**
Grossulariaceae 163.
Gymnadenia 93.
albida 265.
conopsea 367.
friwaldskyana **161.**
odoratissima 545.
Gypsophila 53.
acutiflora **503.**
cuculata **507.**
fastigiata 491.
muralis **49.**
paniculata **164.**
prostrata **138.**
repens **138.**
serotina **49.**
vaccaria **37.**

H.

Habenaria
albida 265.
viridis 610.
Hacquetia 35.
epipactis 187.
Halianthus
peploides 643.
Halimus
pedunculata **425.**
peploides 643.
portulacoides **428.**
Halorrhagidaceen 162.
Hedera 33.
helix **433.**
quinquefolia **35.**
Hedysareae 166.
Hedysarum 79.
obscurum 544.
onobrychis 301.
Helenieae 140.
Heleocharis
acicularis 625.
fluitans 627.
multicaulis 624.
ovata 616.
palustris 603.
uniglumis 603.
Heliantheae 140.
Helianthemum 61.
alpestre 526.
apenninum 502.
canum 507.
chamaecistus 412.
fumana 507.
grandiflorum 412.
guttatum 491.
obscurum 412.
oelandicum 507.
polifolium 502.
salicifolium
tomentosum 507.
vineale 507.
vulgare 412.
vulgatum 412.
Helianthus 90.
annuus **73.**
tuberosus **447.**
Helichrysum 86.
angustifolium **134.**
arenarium **108.**
Heliotropeae 131.
Heliotropium 28.
europaeum **97.**
Helleborine
spiralis **355.**
Helleborineae 147.
Helleborus 64.
atrorubens 181.
dumetorum 181.
foetidus 181.
hiemalis 172.
laxus 181.
niger 171.
odorus 181.
purpurascens 181.
viridis 181.
Helminthia 82.
echioides 438.
Helosciadium 38.
inundatum **250.**
nodiflorum **263.**
repens **235.**
Hemerocallis 46.
flava 607.
fulva 607.
Hepatica 63.
nobilis 176.
triloba 176.
Heracleum 36.
alpinum **25.**

asperum **199.**
austriacum **213.**
elegans **199.**
sibiricum **25.**
silifolium **213.**
sphondylium 598.
Herminium 93.
monorchis 588.
Herniaria 27. 33.
alpina **109.**
glabra 490.
hirsuta **97.**
incana 357.
puberula 490.
Hesperideae 149.
Hesperis 71.
alliaria 202.
matronalis 278.
runciniata 252.
tristis 295.
verna 243.
Heteropogon
allionii 549.
Hibisceae 149.
Hibiscus 75.
trionum **64.**
Hieracium 81.
acutifolium 526.
affine **5.**
albidum **179.**
albo-barbatum 426.
albovillosum **148.**
aliflorum
alpestre **114.**
alpinum **148.**
ambiguum 334.
amplexicaule **179.**
andrylaloides
anglicum **155.**
angustifolium 396. 566. **179.**
apiculatum 426.
atratum **149.**
atricapillum **148.**
attenuatum 426.
autumnale **356.**
aurantiacum 561.
auricula 458. 459. 589.
barbarossa 426.
barbatum **188.**
bauhini 589.
bellidifolium **149.**
bienne 600.
bifidum 426. **155.**
bifurcum 526. 533.
boreale **293.**
brachiatum 526.
bracteolatum **149.**
bupleurifolium **158.**
bupleuroides **180.**
candolleï **180.**
carpaticum **10.**
cerinthoides **179. 216.**
chondrilloides **201.**
cinereum 527. **155.**
collinum Auct. 458.
collinum Fr. 334.
collinum Rchb. 589.
concolor 426.
cordifolium **149.**
coronopifolium **10.**
cotoneïfolium **158.**
croaticum **162.**
cydonifolium Vill. **179.**
cymosiforme **155.**
cymosum L. 523.
cymosum Rchb. 279.
cymosum Spr. 527. **155.**
cymosum Schltz. 459.
dendatum **180.**
denticulatum **158.**
diaphanum 259.
dubium 458. 459.
echioides 527. **155.**
elatum **149.**
ellipticum 426.
elongatum **158.**
fallax 589.
fissiflorum **149.**
flagellare 517.
flexuosum **179.**
florentinum 586. 589.
floribundum 359. 533.
foetidum 459.
furcatum 533. **188.**
glaberrimum **180.**
glabratum **149.**
glabrescens **148.**
glanduliferum **194.**
glaucum **204.**
glomeratum 279.
gothicum 396.
gracile **155.**
graminifolium **180.**
grandiflorum **151.**
halleri Hoppe **148.**
halleri Vill. **148.**
hirsutum 396. 589.
hoppeanum 561.
humile 259. 576.
hyoseridifolium **201.**
inapertum **149.**
incanum 426. 503.
incisum 561.
integrifolium **10. 162.**
intybaceum **179.**
jacquinii **505.**
junceum **11.**
laciniatum 259.
lactucella 458.
laevigatum **5.**
lanatum **497.**
lanceolatum **11.**
lasiophyllum **155.**
latifolium **149. 179.**
laxiflorum 589.
lawsonii **155.**
leptocaulon **10.**
leptophyllum **148.**
linearifolium **11. 180.**
longifolium **216.**
luxurians **149.**
lycopifolium **179.**
macrocephalum **180.**
macrophyllum **179.**
maculatum 259. 396.
micranthemum 259.
molle **161. 162.**
monocephalum 426. **10.**
montanum **200.**
multicaule 589.
murorum 259. 396.
nestleri 279. 523.
nemorum 396.
nigrescens **149.**
obscurum 589.
oleraceum 444.
pallescens **155.**
pallidum **155.**
paludosum 404.
pedunculatum 526.
peleterianum 426.
perfoliatum **158.**
piliferum **189.**
pilosella 426.
pilosellaeforme 426.
pilos.-cymos. 533.
pilos.-echioides 533.
piloselloides 589.
pilosum **180.**
plumbeum 259.
polyanthemon **10.**
polyphyllum **180.**
porrifolium **114.**
praealtum 589.
praealt.-pilos. 526.
praemorsum 272.
pratense 458.
prat.-pilos. 533.
prenanthoides **157.**
pseudo-cerinthe **179.**
pulmonarioides **179.**
pulmonarium 396.
pumilum **149.**
pygmaeum **149.**

racemosum **11.**
ramosum 259. **149.**
reticulatum **158.**
retzii 561.
rigidum **5.**
rothianum 527. **155.**
rotundatum 259.
rupestre 576. **155.**
rupicaprae **149.**
sabaudum **293. 356.**
sabinum **14.**
saxatile **204.**
schraderi **189.**
scorzonerifolium **149.**
serotinum **11.**
setigerum 527. **155.**
setosum 589.
speciosum **200.**
sphaerocephalum **188.**
staticaefolium 578.
stoloniflorum 426. 517. 533.
strictissimum **158.**
strictum **179.**
stylosum **149.**
succisaefolium **161.**
sudeticum **148.**
sylvaticum 396.
sylvestre **293.**
tectorum 465.
tridentatum **5.**
triviale 426.
tubuliflorum **149.**
umbellatum **10.**
versicolor 359.
villosissimum **148.**
villosum **149.**
virens 479.
virescens **300.**
vulcanicum **155.**
vulgare 259.
vulgatum 396.
willdenowii **155.**
Hierochloa 19.
australis 177.
borealis 604.
odorata 604.
repens 604.
Himantoglossum 93.
hircinum 269.
viride 610.
Hinterhubera
pauciflora 312.
procumbens 359.
Hippocastaneae 151.
Hippocastanum 48.
vulgare 285.
Hippocrepis 79.
comosa 290.
unisiliquosa 290.
Hippophaë 102.
rhamnoides 188.
Hippuridaceen 162.
Hippuris 12.
fluitans **259.**
lacustris **259.**
tetraphylla **259.**
vulgaris **259.**
Hirschfeldia 73.
adpressa 289.
Hladnickiana
golacensis 556.
pastinacifolia 573.
Holcus 19.
avenaceus 429.
borealis 604.
lanatus 247.
mollis 414.
odoratus 604.
Holoschoenus
exserens **233.**
filiformis **233.**
vulgaris **233.**
Holosteum 23.
umbellatum 180.
Homogyne 86. 88.
alpina 352.
discolor 562.
sylvestris 352.
Honckeneja 54.
peploides 643.
Hoppea 89.
sibirica 615.
Hordeum 18. 19.
distichon 481.
hexastichon 300.
marinum 447.
maritimum 383.
murinum 448.
nodosum 596.
pratense 596.
pseudo-murinum 448.
secalinum 596.
strictum **497.**
vulgare 481.
zeocriton 481.
Horminum
pyrenaicum **211.**
Hornungia
petraea 221.
Hottonia 29.
palustris 630.
Hossonieae 126.
Hugueninia
tanacetifolia **501.**
Humulus 103.
lupulus **12.**
Hutchinsia 70.
alpina 346.
brevicaulis **198.**
petraea 221.
Hyacinthineen 115.
Hyazinthus
botryoides 211.
comosus 211.
non scriptus 199.
racemosus 218.
Hydrilla
dentata 640.
verticillata 640.
Hydrocharideae 116.
Hydrocharis 104.
morsus ranae **277.**
Hydrocotyle 35.
vulgaris **22.**
Hydrocotylineae 144.
Hygrobieae 162.
Hyoscyameae 128.
Hyoscyamus 30.
albus
agrestis 430.
niger 430.
pallidus 430.
scopolia 199.
Hyoseris
foetida 267.
minima **98.**
Hypechusa
lutea 478.
Hypecoeae 152.
Hypecoum 25.
pendulum 475.
Hypericineae 150.
Hypericum 80.
barbatum 264.
coris **126.**
delfinense **5.**
dubium **5.**
elegans 506.
elodes **241.**
glandulosum **21.**
hirsutum **5.**
humifusum **20.**
liottardi **21.**
montanum 396.
kohlianum 506.
perforatum **5.**
pulchrum 405.
pumilum **21.**
quadrangulare **18.**
quadrangulum **5.**
richeri **178.**
tetrapterum **18.**
tridentatum **5.**
veronense **5.**
Hypochoerideae 136.
Hypochoeris 83.

glabra 479.
helvetica 569.
intermedia 479.
maculata **15.**
montana **200.**
radicata 413.
simplex 479.
uniflora 569.
vulgaris 479.
Hypopityaceen
Hypopitys
glabra 654.
multiflora 654.
Hyssopeae 130.
Hyssopus 65.
officinalis **50.**

I.

Iberis 70.
amara 495.
boppardensis 539.
campestris 453.
cepeaefolia 333.
divaricata 539.
intermedia 539.
nudicaulis 214.
pinnata 453.
rotundifolia **202.**
saxatilis
umbellata 511.
Ilex 26.
aquifolium 267.
Ilicineae 129.
Illecebreae 160.
Illecebrum 27. 30. 33.
verticillatum 492.
Impatiens 32.
noli tangere **15.**
parviflora **72.**
Imperata
cylindrica **503.**
Imperatoria 35.
ostruthium 538.
palustris **399.**
verticillare **139.**
Inula 90.
bellidiflora **53.**
britanica **239.**
bubonium **245.**
conyza **69.**
crithmoides **282.**
dysenterica **224.**
ensifolia **353.**
germanica **69.**
graveolens
helenium **42.**
hirta **69.**
hybrida **69.**
media
montana **163.**
oculus christi 523.
pulicaria **470.**
salicina **46.**
squarrosa **245.**
suaveolens
vaillantii
viscosa **163.**
Irasekia
tenella 623.
Irideae 115.
Iris 16.
bohemica 257.
fieberi
florentina 291.
germanica 291.
graminea 361.
lutescens 326.
nudicaulis 257.
pallida 291.
pseud-acorus 364.
pumila 233.
sambucina 291.
sibirica 269.
spuria 365.
squalens 512.
variegata 325.
Isatideen 155.
Isatis **70.**
tinctoria 288.
Isnardia 25.
palustris **258.**
Isolepis
acicularis 625.
holoschoenus **233.**
micheliana **260.**
Isopyrum 63.
thalictroides 178.
Ittnera
najas **270.**

J.

Jasione 31. 33.
littoralis 450.
major 450.
montana 450.
perennis 406.
Jasioneae 135.
Jasmineae 129.
Jussieueae 163.
Juglandaceen 166.
Juglans 99.
regia 217.
Juncaceae 113.
Juncagineae 113.
Juncus 47.
acutiflorus **16.**
acutus 383.
albidus 400.
alpinus 584.
angustifolius 400.
arcticus **173.**
articulatus 607.
atratus **21.**
balticus 642.
bottnicus **251.**
bufonius 500.
bulbosus 596. **251.**
campestris 182.
capitatus 500.
castaneus 556.
communis 500.
compressus 596.
conglomeratus 500.
diffusus 500. 618.
effuso-glaucus 500.
effusus 500.
fasciculatus 501.
filiformis 575.
fluitans 607.
fusco-ater 584.
gerardi **251.**
glaucus 618.
gracilis 501.
heptangulus **21.**
hostii 565.
jaquini 556.
lamprocarpus 607.
maritimus 607. 281.
maximus 420.
melananthos **21.**
monanthos 565.
nemorosus 182. 400.
nigritellus 398.
obtusiflorus 504.
paniculatus 618.
pilosus 196. 400.
pygmaeus 500.
ranarius 501.
setiformis 607.
sphaerocarpus 501.
spicatus 565.
squarrosus 417.
stygius **208.**
subnodulosus **16.**
sylvaticus Huds. 420.
sylvaticus Reich. **16.**
supinus 398.
tenageia 501.
tenuis 461.
trifidus 565.
triglumis 575.
uliginosus 398.
vaillantii 501.
vernalis 196.
Juniperus 105.

biasoletii 384.
communis 177.
macrocarpa 384.
nana 355.
sabina 227.
Jurinea 83.
cyanoides 504.
mollis 504.
pollichii 504.

K.

Kentrophyllum
lanatum **163.**
Knautia
alpina **24.**
arvensis 448.
dipsacifolia **24.**
hastata **24.**
hybrida
lancifolia **24.**
longifolia
montana **24.**
sylvatica **23.**
vulgata **24.**
Kobresia 96.
caricina **190.**
Kochia 34.
arenaria **334.**
hirsuta **280.**
prostrata **97.**
scoparia **75.**
Koeleria 21.
cristata 291.
glauca 309.
hirsuta 564.
Kohlrauschia
prolifera **61.**

L.

Labiatae 129.
Labium veneris **34.**
Lactuca 81.
muralis **5.**
perennis 438.
quercina 396.
sagitata
saligna **66.**
sativa **66. 285.**
scariola **66.**
stricta 396.
sylvestris **66.**
viminea
virosa **155.**
Lactuceae 136.
Ladanum
segetum **113.**
Lagurus 17.
ovatus 519.
Lamarckia
aurea **498.**
Lamieae 130.
Lamium 66.
album 202.
amplexicaule 211.
amplex.-purpur. 209.
dissectum 209.
galeobdolon 197.
guestfalicum 209.
hybridum 209.
incisum 209.
intermedium 298.
maculatum 206.
orvala 202.
purpureum 173.
purpur.-amplex. 298.
Lampsana 80.
communis 413.
foetida 267.
Lampsaneae 137.
Lappa 83.
glabra **41.**
major **41.**
minor **41.**
officinalis **41.**
tomentosa **41.**
Lappago
racemosa 498.
Lappula
deflexa 502.
myosotis 449.
Larbrea
aquatica 266. 440.
Larix
decidua 223.
europaea 223.
Laserpitium 37.
alpinum **172.**
aquilegifolium **172.**
archangelica **218.**
asperum 420.
gaudini **172.**
glabrum 420.
hirsutum **186.**
latifolium 420.
libanotis 420.
marginatum **157.**
nitidum **173.**
peucedanoides **173.**
pruthenicum **2.**
siler **172.**
simplex **210.**
trilobum 525.
Lasiagrostis
calamagrostis **203.**
Lastila
hirsuta 488.
Lathraea 67.
squamaria 195.
Lathyrus 79.
albus 329.
angulatus 300.
annuus
aphaca 458.
bithynicus 279.
cicera 307.
esculentus 484.
gramineus
hallersteineri 440.
heterophyllos **4.**
hirsutus 488.
inconspicuus **502.**
intermedius **10.**
latifolius **138.**
lens 484.
lenticula 488.
macrorrhizus 197.
maritimus **282.**
montanus 197.
montis 222.
mutabilis 407.
niger 405.
nigricans 217.
nissolia 478.
ochraceus 344.
paluster **506.**
pannonicus 329.
pisiformis 407
platyphyllos **10.**
pratensis 439.
purpureus
pyrenaicus 198.
sativus 302.
sepium 440.
setifolius 222.
sphaericus 300.
stans **500.**
sylvester 395.
tenuifolius 198.
tuberosus **40.**
unijugus **5.**
vernus 197.
Laurineae 122.
Laurus 51.
nobilis 193. 244.
Lavendula 64.
angustifolia **140.**
spica **140.**
vera **140.**
Lavatera 74.
thuringiaca **10.**
Ledum 52.
palustre 377.
Leersia 18.
oryzoides **294.**

Leguminosae 165.
Lemna 13.
arrhiza 381.
gibba 381.
minor 380.
polyrrhiza 381.
trisulca 380.
Lens
esculenta 484.
Lentibulariae 126.
Leontodon 82.
alpinus 504.
angustifolius 504.
aurantiacus **160.**
aureum **180.**
autumnalis **228.**
berinii 577.
caucasicus 404.
crispus **124.**
hastilis 404.
hirtum 587.
hispidus 404.
hyoseroides 404.
incanus 503.
opimus 404.
pyrenaicus **160.**
saxatilis **124.**
squamosus **160.**
taraxacum 181.
tenuiflorus 504.
vulgaris 403.
Leontodonteae 137.
Leontopodium 86.
alpinum **192.**
Leonurus 65.
cardiaca 427.
chaiturus **4.**
galeobdolon 197.
marrubiastrum **4.**
Lepidineae 154.
Lepidium 70.
campestre 453.
didymum **76.**
draba 287.
graminifolium 454.
latifolium 641.
perfoliatum 287.
petraeum 221.
procumbens 359.
ruderale 436.
sativum 436.
scapiferum 214.
Lepidopharyngideae 131.
Lepigonum
marginatum **278.**
marinum **278.**
medium **225.**
rubrum 285.
segetale 486.
Leptocarpaea
loeselii 454.
Lepturus 18.
cylindricus 382.
filiformis 642.
incurvatus 382.
Leucanthemum 87.
alpinum 562.
atratum 562.
vulgare 414.
Leucoïum 45.
aestivum 337.
vernum 173.
Leucorchis 94.
albida 265.
friwaldii **161.**
Levisticum 36.
officinale **288.**
paludapifolium **288.**
Libanotis 40.
athamanthoides
cretensis 579.
montana **2. 7.**
sibirica **2.**
vulgaris **7.**
Libertia
arduennensis **500.**
Ligularia
sibirica 615.
Ligusticum 39.
austriacum **161.**
ferulaceum
levisticum **288.**
peleponnesiacum **139.**
seguieri **210.**
Ligustrum 14.
vulgare 429.
Lilaceae 128. 129.
Liliaceae 114.
Lilium 46.
bulbiferum 398.
candidum **55.**
carniolicum 351.
martagon 391.
Limnanthemum 29.
nymphaeoides 617.
Limnochloë
caespitosa 356.
parvula **273.**
pauciflora 603.
Limodorum 94.
abortivum 332.
Limosella 68.
aquatica **258.**
Limoselleae 127.
Linaceen
Linaria 63.
alpina **207.**
arvensis **93.**
chloraefolia **135.**
commutata
cymbalaria 464.
elatine **102.**
genistifolia **135.**
halepensis
italica **132.**
litoralis
loeselii **282.**
maritima **282.**
minor 476.
odora **282.**
pelisseriana 315.
simplex **503.**
spartea
spuria **95.**
striata **51.**
tournefortii
triphylla **499.**
vulgaris **39.**
Lindera
odorata 267.
Lindernia 68.
pyxidaria **259.**
Linearieae 150.
Linnaea 68.
borealis **32.**
Linosyris
vulgaris **341.**
Linum 43.
africanum 482.
alpinum 556.
alternum 517.
angustifolium **500.**
austriacum **61.**
bienne 482.
catharticum 591.
corymbulosum 522.
crepitans 482.
cribrosum 189.
flavum 522.
gallicum 468.
hirsutum 524..
humile 482.
maritimum **403.**
montanum 556.
narbonense 530.
nodiflorum 494.
perenne 406.
pertusum 556.
radiola **106.**
regale 482.
sativum 482.
spicatum 517.
strictum 517.
tenuifolium 508.
usitatissimum 482.
viscosum 556.
vulgare 482.

Liparis 95.
loeselii 616.
Listera 94.
cordata 419.
ovata 400.
Lithospermum 27.
apulum
arvense 284.
officinale 284.
purpur.-coeruleum 267.
Littorella 97.
lacustris **253.**
uniflora **253.**
Lloydia 46.
serotina **210.**
Lobelia 31.
dortmanna **250.**
Lobeliaceae 135.
Lobularia
maritima **502.**
Lolium 22.
arvense 473.
boucheanum **224.**
bromoides 617.
complanatum 473.
cristatum 408.
festucaceum 605.
italicum **224.**
linicola 473.
linicolum 473.
multiflorum 617. **224.**
perenne 448.
remotum 473.
rigidum **498.**
robustum 473.
speciosum 473.
temulentum 473.
tenue 448.
Lomatogonium
carinthiacum **379.**
Lonicera 32.
alpigena 226.
caerulea 555.
caprifolium 260.
implexa **495.**
nigra 223.
periclymenum 424.
tatarica **495.**
xylosteum 259.
Lonicareae 142.
Lorantheae 142.
Loranthus 44.
europaeus 247.
Loroglossum
hircinum 269.
Loteae 166.
Lotus 77.
angustissimus **502.**
arvensis 439.
corniculatus 439.
cytisoides **498.**
dorycnium **115.**
edulis **502.**
hirsutus 528.
major 439.
ornithopodioides **495.**
siliquosus 461.
tenuifolius 439.
tetragonolobus **285.**
uliginosus 439.
villosus 439.
vulgaris 439.
Lunaria 70.
annua 230.
biennis 230.
rediviva 256.
Lupinaster
pentaphyllos 407.
Lupinus
albus **496.**
angustifolius **496.**
hirsutus **496.**
luteus **496.**
Lupus
salictarius **12.**
Luzula 47.
albida 400.
angustifolia 400.
campestris 182.
congesta 182.
cuprina 401.
erecta 249.
flavescens 310.
forsteri 343.
fuliginosa 401.
glabrata 570.
lutea **213.**
maxima 420.
multiflora 249.
nemorosa 182. 400.
nivea 570.
nutans 182.
pallescens
pediformes 182. 343.
pilosa 196.
rubella 401.
spadicea 556.
spicata 565.
sudetica 182.
sylvatica 420.
vernalis 196.
Lychnanthus
scandens **37.**
Lychnideae 159.
Lychnis 55.
alba 410.
alpina 565.
coronaria 656.
dioica 256. 410.
diurna 256.
flos cuculi 261.
flos jovis **215.**
githago 475.
rubra 256.
sylvestris 256.
vespertina 410.
viscaria 286.
Lycium
barbarum 432.
Lycopsis 28.
arvensis 285.
orientalis 294.
pulla 302.
variegata **495.**
Lycopus 13.
europaeus **254.**
exaltatus **254.**
Lysimachia 29.
aurantiaca 596.
ciliata 617.
guestfalica 596.
impunctata 606.
linum stellatum
nemorum 398.
nummularia 391.
paludosa 596.
punctata 605.
suaveolens 391.
thyrsiflora 418.
verticillata 605.
vulgaris 596.
Lysimachieae 126.
Lythraceen 163.
Lythrum 57.
bracteosum 440.
hyssopifolia **99.**
salicaria **440.**
thymifolia **99.**
virgatum 618.
vulgare 440.

M.

Macedonica
cerasa 204.
Magisterium
verticillatum **139.**
Majanthemum 25.
bifolium 269.
convallaria 269.
Malabaila 41.
hacquetii 556.
Malachicae 159.
Malachium 56.
aquaticum 440.

Malaxis 95.
loeselii 616.
monophyllos 417.
paludosa **257.**
Malkolmia
maritima **493.**
Malum cotoneum 385.
Malus
assyrica **287.**
medica **287.**
Malva 74.
alcea **64.**
borealis 456.
dethardingii **507.**
crispa **507.**
excisa **64.**
fastigiata **64.**
henningii 456.
littoralis 455.
mauritiana **507.**
morenii **64.**
moschata 515.
neglecta 455.
nicaeensis **64.**
pusilla 456.
rotundifolia 455. 456.
sylvestris 437.
thuringiaca **10.**
vulgaris 455.
Malvaceae 149.
Malveae 149.
Marrubium 66.
candidissimum **76.**
creticum **76.**
paniculatum **76.**
pannonicum **76.**
pauciflorum **76.**
peregrinum **76.**
vulgare **39.**
Marrubieae 131.
Maruta 87.
cotula **100.**
Matricaria 87.
chamomilla 479.
inodora **42.**
leucanthemum 414.
maritima **42.**
parthenium **53.**
salina **42.**
Matthiola 71.
incana 193.
sinuata 230.
varia 339.
Medicago 76.
apiculata 303.
arabica 299.
carstiensis 344.
corymbifera
denticulata 487.
disciformis
falcata 456.
gerardi 293.
glomerata 477.
graeca 289.
littoralis 384.
lupulina 263.
maculata 294.
marginata 299.
marina 383.
minima 289.
mollissima 289.
muricata 379.
orbicularis 477.
polymorpha 289. 299.
prostrata 477.
pubescens 384.
radiata **85.**
rigidula 384.
sativa 456.
scutellata 299.
terebellum 379.
tribuloides 384.
truncatula 384.
tuberculata **496.**
vulgaris 263.
willdenowiana 263.
Melampyrum 67.
arvense 476.
barbatum 476.
commutatum **4.**
cristatum 413.
nemorosum **9.**
nemorum **9.**
pratense **4.**
sylvaticum **151.**
vulgatum **4.**
Melandryum 54.
album 410.
dubium 443.
noctiflorum **56.**
pratense 410.
pumilio 569.
rubrum 256.
sylvestre 256.
Melanosinapis
communis **93.**
Melica 19.
bauhini **503.**
ciliata 408.
coerulea **15.**
glauca
nebrodensis
nutans 247.
taurica
uniflora 247.
Melilotus 77.
alba arguta **40.**
albus **40.**
arvensis 457.
coeruleus 457. 599.
dentatus **65.**
gracilis 289.
indica 477.
italicus **65.**
leucanthus **40.**
macrorrhizus 457.
officinalis Desr. 457.
officinalis L. 457.
officinalis Willd. 457.
palustris 457.
parviflorus 457.
petitpierreanus 457.
sulcatus 477.
vulgaris 457. **40.**
Melissa 64.
acinos **94.**
alba **120.**
alpina **176.**
calamintha **3.**
clinopodium **14.**
grandiflora **217.**
nepeta **111.**
officinalis **38.**
pulegium **114.**
rotundifolia **95.**
stricta **156.**
thymifolia **120.**
Melisseae 130.
Melitteae 130.
Melittis 61.
grandiflora 251.
melissophyllum 251.
Melo vulgaris **286.**
Mentha 66.
adopersa **252.**
aquatica **252.**
aquat.-sylvestr. **266.**
arvensis **44.**
balsamita **46.**
brittingeri **46.**
canescens **46.**
citrata **252.**
crispa **266.**
crispata **46.**
dentata **44.**
dubia **252.**
gentilis
hercynica **46.**
hirsuta **252.**
langii **266.**
macrostachya **38.**
nemorosa **46.**
nepetoides **266.**
odorata **252.**
officinalis **266.**
parviflora **44.**
patrini **74.**

piperita **266.**
pratensis **44.**
pulegium **224.**
rotundifolia **38.**
rubra **44.**
rugosa **38.**
sativa **44. 252.**
suaveolens **38.**
sylvestris **45.**
undulata **46.**
velutina **46.**
viridis **46.**
vulgaris **44.**
Menthoideae 129.
Menyantheae 132.
Menyanthes 29.
nymphaeoides 617.
paradoxa 366.
trifoliata 365.
Mercurialis 104.
annua 445.
ovata 316.
perennis 200.
Mespilus
amelanchier 219.
chamaemespilus 536.
cotoneaster 220.
germanica 392.
monogyna 250.
oxyacantha 250.
Meum 40.
athamanticum **160.**
mutellina 536.
Mibora
verna 189.
Michelaria
bromoidea **500.**
Micromeria
graeca **504.**
juliana **504.**
Micropus 85. 91.
erectus 636.
supinus **271.**
Microstylis
monophylla 417.
Milium 18.
effusum 255.
Mimulus
guttatus **248.**
luteus **248.**
Minuartia 23.
fastigiata 491.
Moehringia 54.
acifolia 550.
diversifolia 506.
heterophylla 506.
muscosa 550.
obtusa 578.
polygonoides 578.
ponae 506.
trinervia 250.
villosa 549.
Moenchia 26.
erecta 214.
mantica 249.
quaternella 214.
Molinia 21.
coerulea **15.**
serotina **311.**
variabilis **15.**
Molospermum 39.
cicutarium **139.**
Monardeae 130.
Moneses 52.
grandiflora
uniflora 423.
Monochlamydeen
Monotropa 52.
hirsutus 654.
hypophegea 654.
hypopitys 653.
Monotropeae 134.
Montia 16.
arvensis 306.
fontana 306.
minor 306.
repens 306.
rivularis 306.
Moraceen
Moriformes 120.
Morus 97.
alba 279.
cedrona 387.
nigra 279.
Mulgedium 81.
alpinum **152.**
macrophyllum **152.**
plumieri **152.**
Muscari 45.
botryoides 212.
comosum 212.
racemosum 218.
Myagrum 70.
austriacum 609.
dentatum 495.
paniculatum 487.
perenne 454.
perfoliatum 303.
pinnatifidum 495.
rugosum 476.
saxatile 571.
sativum 287. 495.
Mycelis
muralis **5.**
Mylinum
carvifolium **2.**
Myogalum
boucheanum **493.**
nutans 210.
Myopteron
incanum 453.
Myosotis 28.
alpestris 200.
arenaria 214.
arvalis 200.
arvensis 214. 258. 320 474.
caespitosa 617.
collina 319.
decumbens 200.
gracilis 200.
hispida 319.
intermedia 474.
lactea 200.
lappula 449.
lingulata 617.
nana **197.**
nemoralis 606.
palustris 606.
repens 606.
robusta 200.
scorpioides 606.
scorp.-collina 258.
sparsiflora 374.
stricta 214.
strigulosa 606.
sylvatica 200.
variabilis 200.
versicolor 258.
virginea 606.
Myosurus 63.
minimus 215.
Myrica 102.
gale 240.
Myriceae 118.
Myricaria 74.
germanica 578.
Myriophyllum 99.
alternifolium 509.
spicatum 620.
verticillatum **277.**
Myrrhis 41.
aromatica 415.
aurea 432.
bulbosa 408.
hirsuta **19.**
odorata 267.
temula 424.
Myrtaceae 164.
Myrtus 58.
communis 590.

N.

Najades 110.
Najas
flexilis **424.**

fluviatilis **270.**
major **270.**
marina **270.**
minor 639.
Narcisseae 115.
Narcissus 45.
biflorus **494.**
poëticus 236.
pseudo-narcissus 188.
tazetta **494.**
Nardosmia 86.
laevigata 174.
Nardus 15.
stricta 361.
Narthecium 46.
ossifragum 623.
Nasturtium 70. 73.
amphibium 631.
anceps 634.
apetalum 608.
aquaticum 631.
armoracioides 634.
astylon 493.
auriculatum 634.
austriacum 609.
fontanum 375.
lippicense 314.
microcarpum 609.
microphyllum 375.
officinale 375.
pachycarpum 609.
palustre 619.
pyrenaicum 362.
riparium 634.
silifolium 375.
sylvestre 493.
terrestre 619. 634.
trifolium 375.
variifolium 634.
Naumburgia
thyrsiflora 418.
Nenuphar
luteum 632.
Neogaya 39.
simplex **210.**
Neottia 94.
latifolia 400.
nidus avis 402.
ovata 400.
repens **32.**
spiralis **355.**
Neottidium
nidus avis 402.
Nepeta 67.
cataria 435.
glechoma 197.
nepetella
nuda **9.**
pannonica **9.**
Nepeteae 130.
Neslea 70.
paniculata 487.
Nicandra
physaloides **503.**
Nicotiana 30.
latissima **88.**
macrophylla **88.**
rustica 481.
tabacum **88.**
Nicotianeae 128.
Nigella 62.
arvensis **83.**
damascena 282.
sativa **90.**
Nigritella 93.
angustifolia 582.
fragans **214.**
globosa 416.
suaveolens **214.**
Nissolia
aphaca 458.
uniflora 479.
Noccaea
alpina 346.
brevicaulis **198.**
Nonnea 28.
erecta 302.
pulla 302.
Nucamentaceae
diplecolobeae 155
euclidieae 155.
notorrhizeae 155.
orthoploceae 155.
peltariaceae 155.
pleurorrhizeae 155.
Nuphar 61.
intermedium **275.**
luteum 632.
minimum **275.**
pumilum **275.**
sericeum 632.
Nymphaea 61.
alba 631.
biradiata 632.
candida 632.
circumvallata 632.
depressa 632.
erythrocarpa 632.
intermedia 632.
kosteletzkyi 632.
lutea 632.
melocarpa 632.
neglecta 632.
oocarpa 632.
parviflora 632.
rotundifolia 632.
semiaperta 632.
sphaerocarpa 632.
splendens 632.
urceolatia 632.
venusta 632.
Nymphaeaceae 116.

O.

Obione
pedunculata **425.**
portulacoides **428.**
Ocymoideae 129.
Odontites
lutea **23.**
rubra **71.**
Oenanthe 39.
aquatica **250.**
fistulosa 606.
lachenalii 606.
megapolitana 606.
peucedanifolia 607.
phellandrium **250.**
pimpinelloides 607.
silaifolia 614.
tabernaemontanae606
Oenothera 49.
biennis **55.**
muricata 636.
Olea 14.
europaea 518.
Oleaceen
Oleïneae 128.
Omalotheca
supina **362.**
Omphalodes 28.
scorpioides 206.
verna 203.
Onagrariae 162.
Onobrychideae 166.
Onobrychis 79.
arenaria 515.
montana 391.
sativa 301.
viciaefolia 301.
Ononis 75.
angustifolia 456.
arvensis 456.
cherleri 561.
columnae 560.
hircina 456.
mitis 456.
mollis 589.
natrix 589.
pilosa 589.
procurrens 456.
pusilla 560.
reclinata 589.
repens 456.
rotundifolia 344.
spinosa 456.

violacea 456.
Onopordon 84.
acanthium **41.**
elongatum **41.**
illyricum **41.**
Onosma 28.
arenarium 428.
echioides 539.
stellulatum 536.
Ophioscorodon
ursinum 254.
Ophrys 93.
aestivalis 400.
alpinus **183.**
anthropophora 338.
apifera 240.
arachnites 338.
araneïfera 265.
bertolonii
cordata 419.
corallorrhiza 547.
fuciflora 338.
insectifera 240. 263.
loeselii 616.
monophyllos 417.
monorchis 588.
muscifera 263.
myodes 263.
nidus avis 402.
ovata 400.
paludosa **257.**
spiralis **355.**
Oplismenus
crus galli **79.**
Oporinia 82.
autumnalis **228.**
monocephala **228.**
paludosa **228.**
pratensis **228.**
runcinata **228.**
Opuntia 58.
ficus indica 276.
vulgaris 276.
Orchideae 115.
Orchis 92.
abortiva 332.
albida 265.
angustifolia 367.
aphylla **13.**
austriaca
biermanni 367.
bifolia 252.
brachyglossa 252.
conopsea 367.
coriophora 609.
cucullata **499.**
ecalcarata 367.
elodes **507.**
fuciflora 338.
fusca 281.
galeata 265.
globosa 416.
hircina 269.
incarnata 263. 367.
lanceolata 367.
latifolia 367.
laxiflora 366.
maculata 367.
majalis 367.
mascula 337.
militaris 265. 281. 335.
montana **499.**
morio 356.
morio mas 337.
nigra 582.
obtusiflora 335.
odoratissima 545.
pallens 263. 266.
palustris 366.
papilionacea 239.
purpurea 263. 265. 281.
pyramidalis 265.
rivini 265.
sambucina 263.
simia 265. 335. 337.
speciosa 337.
spitzelii 582.
stenoloba
suaveolens **214.**
tephrosanthos 335.
traunsteineri 367.
tridentata 265. 337.
ustulata 329.
variegata 337.
vulgaris 337.
Oreochloe
disticha **184.**
Origaneae 130.
Origanum 64.
compactum **8.**
hirtum
lanuginosum **8.**
majorana **428.**
majoranoides **428.**
obtusifolium **8.**
umbrosum **8.**
vulgare **8.**
Orlaya 41.
grandiflora **92.**
platycarpos **503.**
Ornithogalum 46.
arcuatum **507.**
arvense 213.
bohemicum 213.
bouchéanum **493.**
collinum 208.
comosum 276.
fistulosum 350.
luteum 208.
minimum 205. 213.
nutans 210.
personii 208.
pratense 205.
pusillum 191.
pyrenaicum 581.
refractum **494.**
saxatile 213.
schreberi 205.
spathaceum 200.
stachyoides **495.**
stenopetalum 205.
sulphureum 343.
sylvaticum 208.
tenuifolium 208.
umbellatum 208.
villosum 213.
Ornithopus 79.
compressus 492.
ebracteatus 492.
perpusillus 273.
sativus 483.
scorpioides 303.
Ornus 14.
europaea 247.
Orobanche 67.
alba 652.
alpestris 652.
alsatica **498.**
amethystea 652.
arenaria **289.**
artemisiae camp. 651.
barbata 652.
bartlingii **498.**
brachysepala **498.**
buekiana **498.**
buekii 388.
caryophyllacea 651.
cervariae **498.**
cirsii 650.
cirsii-oler. 650.
coerulea 652.
coerulescens 652.
cruenta 649.
elatior 651.
epythymum 650.
erubescens 653.
flava **289.**
galii 651.
hederae 652.
hygrophila 650.
kochii **498.**
laxiflora 651.
libanotidis **496.**
loricata 651.
lucorum **290.**
major 388.

mathenii 650.
medicaginis 388.
minor **290.**
neottioides **291.**
pallens 651.
pallidiflora 650. 652.
papyracea 651.
picridis 651.
procera 650.
purpurea 652.
ramosa 653.
rapum 388.
rubens 388.
rubiginosa 650.
rubra 650.
salviae 652.
sauteri 650.
scabiosae 650.
sparsiflora 650.
speciosa 652.
teucrii **499.**
torquata 651.
tubiflora 651.
vulgaris 651.
Orobanchcae 126.
Orobus
albus 329.
aphaca 458.
asphodeloides 329.
luteus 344.
maritimus **282.**
niger 405.
nissolia 478.
paluster **506.**
pisiformis 407.
pratensis 439.
pyrenaicus 198.
sylvaticus 279.
tenuifolius 198.
tuberosus 197.
variegatus **499.**
vernus 197.
versicolor 329.
viscioides 574.
Orontiaccen 110.
Orontium
arvense **77.**
Orthosporum
bonus henricus 450.
crassifolium **48.**
glaucum 450.
rubrum **48.**
Oryza
clandestina **294.**
Ostericum 36.
palustre **399.**
pratense **399.**
Ostrya 98.
carpinifolia 279.
vulgaris 279.
Osyris 102.
alba 397.
Oxalideae 148.
Oxalis 56.
acetosella 196.
corniculata 444.
stricta 444.
Oxycoccos 49.
palustris 615.
Oxyria 47.
digyna 576.
reniformis 576.
Oxytropis 78.
campestris **178.**
cyanea **195.**
foetida
halleri
lapponica **211.**
montana 325. 561.
pilosa 515.
triflora **195.**
uralensis 344.
velutina 344.

P.

Padus
vulgaris 200.
Paederota 14.
ageria 575.
bonarota 575.
chamaedrifolia 576.
zannichelii **192.**
Paeonia 61.
banatica 210.
corallina 197.
lobata 210.
officinalis 210.
peregrina 210.
promiscua 197.
pubens 210.
Paconiceae 147.
Paliurus 32.
aculeatus 340.
Pallenis 88.
spinosa 619.
Panicum 19.
capillare **72.**
ciliare 442.
crus galli **79.**
dactylon **81.**
filiforme 446.
germanicum **88.**
glabrum 446.
glaucum **81.**
humifusum 446.
ischaemum 446.
italicum **88.**
miliaceum 480.
milium 480.
sanguinale 442.
undulatifolium
verticillatum 442.
viride **54.**
Papaver 61.
alpinum 567.
argemone 302.
dubium 302.
hybridum 302.
rhoeas 298.
somniferum 482.
Papaveraceae 152.
Papavereae 152.
Papilionaceae 165. 166.
Paradisea
liliastrum 581.
Parallosa
monanthos 458.
Parietaria 25.
diffusa **48.**
erecta **34.**
judaica **48.**
officinalis **34.**
ramiflora **48.**
Parideen 114.
Paris 50.
quadrifolia 254.
Parnasseae 157.
Parnassia 43.
palustris **144.**
Paronychia 27. 33.
capitata **220.**
Paronychieae 160.
Passerina 49.
annua 490.
Pastinaca 36.
fleischmanni **120**
opaca **120.**
sativa **2.**
selinoides **357.**
Pediculares 127.
Pedicularis 68.
acaulis 344.
asplenifolia **195.**
barellieri 583.
comosa **17.**
fasciculata **177.**
flammea 349.
foliosa **4.**
friederici augusti **17.**
hacquetii **176.**
incarnata **200.**
jacquini **188.**
lanata **212.**
palustris 366.
portenschlagii 568.
recutita 346.
rosea **177.**

rostrata **187.**
sceptrum carolinum 399.
sudetica 542.
sylvatica 361.
tuberosa 583.
versicolor 349.
verticillata **212.**
Peltaria 71.
alliacea 335.
Pennisetum
glaucum **81.**
italicum **88.**
verticillatum 442.
viride **54.**
Pentable 43.
mantica 219.
Pentaphyllon
lupinaster 407.
Peplis 45.
portula **224.**
Peristylus
albidus 265.
viridis 610.
Persica 58.
vulgaris 195.
Petasites 87.
albus 223.
hybrida 191.
niveus 187.
officinalis 191.
spurius 193.
tomentosus 193.
vulgaris 191.
Petrocallis 70.
pyrenaica 572.
Petroselinum 37.
sativum 451.
segetum 451.
Peucedaneae 145.
Peucedanum 35.
alsaticum 431.
austriacum **131.**
cervaria **20.**
chabraei **230.**
montanum **132.**
officinale **116.**
oreoselinum **129.**
ostruthium 538.
palustre **30.**
parisiense
rablense **172.**
schottii **230.**
silaus 598.
sylvestre **30.**
venetum
verticillare **139.**
vetteri **230.**
Phaca 78.
alpina **178.**
astragalina **178.**
australis 561.
frigida 561.
lapponica **211.**
oroboides **210.**
Phaenopus 81.
vimineus **133.**
Phalangium
ramosum 405.
Phalaris 17.
aquatica
arundinacea 627.
aspera 296.
canariensis **88. 330.**
minor
oryzoides **294.**
phleoides 520.
picta 627.
sylvaticum 521.
Phaseoleae 167.
Phaseolus 77. 79.
coccineus 649.
communis 484.
compressus 484.
ellipticus 484.
multiflorus 649.
nanus 484.
sphaericus 484.
vulgaris 484.
Phelipaea
arenaria **289.**
coerulea 652.
ramosa 652.
Phellandrium
aquaticum **250.**
mutellina 536.
Philadelphus 58.
coronarius 276.
Phillyrea 14.
media 185.
Phleum 17.
alpinum 581.
arenarium 500.
aspernm 296.
boehmeri 520.
bulbosum 442.
cristatum 501.
echinatum
michelii 581.
nodosum 442.
phalaroides 520.
pratense 441.
tenue
trigynum 581.
viride 296.
Phlomis
tuberosa 412.
Phlomitis 65.
tuberosa 412.
Phoeniscopus
muralis **5.**
vimineus **133.**
Phragmites 20.
communis **261.**
vulnerans **261.**
Physalis 31.
alkekengi 430.
Physocaulus
nodosus 276.
Phyteuma 32.
betonicaefolia 555.
canescens **46.**
comosum **164.**
cordatum 555.
fistulosum 545.
globulariaefolium **171.**
halleri 572.
hemisphaericum **171.**
humile **163.**
michelii 555.
nigrum 391.
orbiculare 545.
pauciflorum **185.**
persicifolium 555.
scheuchzeri **170.**
scorzoneraefolium 555.
sieberi 555.
spicatum 398.
Phytolacca 56.
decandra **89.**
Phytolacceae 124.
Picea
excelsa 274.
vulgaris 274.
Picris 82.
echioides 438.
hieracioides **52.**
Pilosella
latifolium 517.
pedunculare 517.
Pimpinella 37.
anisum **89.**
bunius **135.**
dioica **141.**
dissectifolia **35.**
glauca **141.**
magna **29.**
major **35.**
peregrina
poteriifolia **35.**
saxifraga **35.**
tragium 551.
Pinardia
coronaria **507.**
Pinguicula 14.
alpina 229.
grandiflora 336.

gypsophila 336.
longifolia 336.
vulgaris 336.
Pinus 96.
abies Dur. 273.
abies L. 274.
austriaca 273.
cembra 567.
excelsa 273.
larix 223.
maritima 273.
mughus 350.
nigricans 273.
obliqua 350.
picea Dur. 274.
picea L. 273.
pinaster 273.
pinea 656.
pumilio 350.
rotundata 273. 350.
rubra 273.
strobus 397.
sylvestris 273.
uliginosa 350.
uncinata 350.
Piptatherum 18.
multiflorum 590.
paradoxum 389.
Pistacia 103.
lentiscus 224.
terebinthus 224.
Pistiaceae 110.
Pisum 78.
arvense 301.
elatius
leptolobum 483.
maritimum **282.**
quadratum 484.
ramulare 64⁰.
saccharatum 483.
sativum 301.
umbellatum 301.
Plantagineae 125.
Plantago 23.
alpina 553.
altissima 238.
arenaria **96.**
aspera 553.
atrata 553.
carinata **133.**
contostachya 448.
cornuti **242.**
coronopus **242.**
cynops **503.**
graminea 640.
indica **96.**
lagopus **494.**
lanceolata 442.
laxiflora 442. 448.
major **58.**
maritima 640.
media 448.
pilosa
polystachia 442.
psyllium **88.**
ramosa **96.**
recurvata
sericea 515.
sphaerocephala 442.
serpentina 641.
subulata 641.
victorialis 515.
vulgaris 442. 448.
wulfenii 640.
Plataneae 119.
Platanus 99.
acerifolia 387.
occidentalis 246. 387.
orientalis 387.
orient.-acerif. 387.
Platanthera 93.
bifolia 252.
chlorantha 253.
macroglossa 253.
montana **499.**
solstitialis 252.
viridis 610.
wankelii 253.
Platycapnos
spicatus **495.**
Pleurogyne 34.
carinthiaca **378.**
Pleurospermum 41.
austriacum **161.**
Plumbagineae 125.
Plumbago
europaea **323.**
Poa 21.
airoides 604.
alpina 580.
altissima **262.**
angustifolia 605.
annua 173.
aquatica **262.**
aspera 390.
badensis 580.
brevifolia 580.
bulbosa 284. 580.
caesia 390.
cenisia **146.**
coarctata 390.
compressa 447.
concinna 284.
cristata 291.
distans 605.
disticha **184.**
distichophylla **146.**
dura 309.
eragrostis 490.
fertilis 605.
festucaeformis **279.**
firmula 390.
flexuosa **146.**
fluitans 628.
glauca 390.
halleri **146.**
hybrida 398.
langeana 447.
laxa **170.**
lithuanica **499.**
maritima **279.**
minor 580. **207.**
montana 390.
nemoralis 389.
palustris 605.
pilosa 473.
pratensis 357.
procumbens 641.
pumila 342.
remota 398.
rigida 284.
rigidula 390.
rupestris 641.
salina 605.
serotina 605.
sudetica 397.
trinervata 421.
trivialis 596.
uniflora 389.
vivipara 284. 580.
vulgaris **146.**
Pocockia 76.
radiata **85.**
Podospermum 82.
calcitrapifolium **495.**
jacquinianum 290.
laciniatum 290.
muricatum 290.
octangulare 290.
Polemoniaceae 132.
Polemonium 30.
coeruleum 431.
Pollichia
galeobdolon 197.
Polycarpeae 160.
Polycarpon 23.
tetraphyllum **335.**
Polycnemeae 124.
Polycnemum 16.
arvense **96.**
majus **96.**
verruculosum **96.**
Polygala 75.
alpestris 263.
amara L. 263.
amblyptera 263.
austriaca Koch 263.

calcarea 263.
chamaebuxus 394.
comosa 263.
depressa 263.
major 320.
nicaeensis 263.
officinalis 263.
oxyptera 263.
serpyllacea 263.
trivialis 263.
vulgaris 262.
Polygaleae 151.
Polygonatum
anceps 254.
majale 249.
multiflorum 254.
officinale 254.
verticillatum 268.
Polygoneae 123.
Polygonum 49.
alpinum
amphibium **236.**
angustifolium **16.**
aphyllum **55.**
aviculare **55.**
bistorta 416.
braunii **16.**
convolvulus 443.
crispum **55.**
decumbens **55.**
dubium **16.**
dumetorum **37.**
erectum **55. 236.**
fagopyrum **89.**
graminifolium **55.**
hydropiper **16.**
lapathifolium **37.**
laxiflorum **16.**
maritimum
minus **16.**
mite **16.**
natans **236.**
nodosum **37.**
persicaria **16. 36.**
prostratum **37.**
pusillum **16.**
repens **236.**
scabrum **37.**
strictum **16.**
tataricum **83.**
viviparum 586.
vulgare **37. 55.**
vulgaris **16.**
Polypogon 17.
littoralis **279.**
monspeliensis 382.
Pomaceae 165.
Populago
palustris 239.
Populus 104.
alba 177.
alba-tremula 177.
balsamifera 218.
canadensis 218.
canescens 177.
dilatata 183.
italica 183.
latifolia 218.
monilifera 218.
nigra 179.
pyramidalis 183.
tremula 177.
Porrum
cepa 648.
commune 647.
ophioscorodon 648.
scorodoprasum 432.
vineale 474.
Portulaca 57.
oleracea 445.
sativa 445. 648.
Portulaceae 161.
Potamogeton 26.
acutifolius 638.
alpinus 628.
angustifolius 628.
caespitosus **506.**
coloratus 638.
complanatus **262.**
compressus 629. **262.**
crispus 629.
decipiens **207.**
densus 638.
dichotomus 629.
explanatus 628.
filiformis **274.**
fluitans 628.
gramineus 629.
heterophyllus 629.
hornemanni 638.
lucens 629.
marinus **274.**
mucronatus 629.
natans 628.
nitens 629.
oblongus 628.
obscurus 628.
obtusifolius 629.
oederi 629.
parnassifolius 628.
pectinatus 629.
perfoliatus 629.
plantagineus 638.
polygonifolius 628.
praelongus **207.**
pusillus **262.**
rigidus 629.
rufescens 628.
rutilus **506.**
scoparius 629.
serratus 628. 638.
setaceus 638.
spathulatus 628.
terrestris 629.
trichoides **273.**
zizii 629.
zosterifolius **262.**
Potentilla 60.
acaulis 202.
alba 250.
albo-sterilis 251.
alpestris 201.
anserina 286.
arenaria 201.
argentea 262.
aurea 544.
brauneana **211.**
buquoyana 270.
canescens 523.
caulescens 571.
chrysantha 410.
cinerea 201.
clusiana **191.**
collina 262.
comosa 201.
erecta
fragaria 178.
fragariastrum 178.
frigida **187.**
fruticosa
grandiflora 202. **194.**
güntheri 262.
heptaphylla 270.
hirta **226.**
hybrida 251.
incana 201.
inclinata 523.
micrantha 185.
minima **211.**
mixta **62.**
multifida **505.**
nemoralis 401.
nitida **197.**
nivea 567.
norvegica 501.
opaca 202.
palustris 440.
patens **496.**
patula 320.
petiolulata **504.**
pilosa **496.**
procumbens 401.
procumb.-rept. **62.**
pusilla 202.
recta 257.
reptans 452.
rubens 201.

ruderalis 262.
rupestris 257.
salisburgensis 201.
sericea 286.
sordida 262.
splendens 251.
sterilis 178.
supina 466.
sylvestris 404.
thuringiaca 270.
tormentilla 404.
trifoliata 202.
verna 201.
viscosa 286.
vulgaris 201. 628.
wiemaniana 262.
Poterium 100.
glaucescens 284.
polygamum 326.
sanguisorba 284.
Prenanthes 80.
chondrilloides **141.**
muralis **5.**
purpurea **26.**
tenuifolia **26.**
viminea **133.**
Primula 29.
acaulis 186.
allionii 554.
auricula 342.
calycina 228.
candolleana **194.**
carniolica 187.
ciliata 342.
clusiana 230.
columnae 196.
crenata 342.
dinyana **500.**
elatior 179.
farinosa 229.
floerkeana 554.
glaucescens 228.
glutinosa **194.**
grandiflora 186.
hirsuta 554.
inflata 238.
integrifolia **194.**
latifolia **500.**
longiflora 554.
minima **151.**
officinalis 195.
pedemontana **500.**
pubescens 342.
rhaetica
spectabilis 230.
suaveolens 190.
truncata 554.
venusta 341.
veris 179. 195.
villosa 554.
vulgaris 186.
Primulaceae 125.
Primuleae 126.
Prismatocarpus
speculum 485.
Prunella 65.
alba 528.
grandiflora **116.**
vulgaris **62.**
Prunus 58.
armeniaca 194.
avium 178.
cerasifera 245.
cerasus 232.
chamaecerasus 201.
coactanea 178.
damascena 246.
domestica 246.
fruticans 178.
grandiflora 202.
husmanni 178.
juliana 246.
insititia 246.
insit. claudiana 246.
mahaleb 204.
meyeri 178.
padus 200.
petraea 222.
pusilla 202.
spinosa 178.
Psamma
arenaria **108.**
baltica **279.**
Psilathera
tenella 564.
Psilurus 17.
nardoides 305.
Ptarmica
barrellieri **183.**
oxyloba **183.**
schouwii **183.**
vulgaris **268.**
Ptychotis 38.
amoides
heterophylla **135.**
Pubicaria
viscosa **163.**
Pulegium 65.
vulgare **224.**
Pulicaria 90.
bellidiflora **53.**
dysenterica **224.**
prostrata **470.**
vulgaris **470.**
Pulmonaria 28.
angustifolia 176. 268.
azurea 176.
mollis **494.**
oblongata 268.
officinalis 195.
parviflora **494.**
saccharata **493.**
Pulsatilla
alba 330.
alpina 330.
lutea 330.
patens 219.
pratensis 220.
vernalis 174.
vulgaris 184.
Pulsatilleae 146.
Punica 58.
granatum 433.
Pycreus
serotinus **248.**
Pyrethrum 87.
alpinum **375.**
corymbosum 414.
halleri **182.**
inodorum **42.**
macrophyllum **143.**
parthenium **53.**
Pyrola 52.
arenaria 392.
chlorantha 428.
intermedia 392.
media 401. 428.
minor 408.
rosea 408.
rotundifolia 392.
secunda 249.
umbellata 401.
uniflora 423.
virens 428.
Pyrus 59.
amygdaliformis
aria 268.
aria-aucuparia 267.
aria-torminalis 268.
aucuparia 250.
chamaemespilus 536.
communis 196.
cydonia 385.
domestica 250.
hybrida 267.
intermedia 268.
latifolia 268.
malus 196.
scandica 268.
torminalis 258.

Q.

Quercus 99.
apennina 322.
cerris 269.
coccifera **496.**
ilex 322.

pedunculata 199.
pubescens 253.
racemosa 199.
robur 199. 253.
sessiliflora 253.
sessilis 253.
suber **496.**

R.

Radiola 26.
linoides **106.**
millegrana **106.**
multiflora **106.**
Ramischia
secunda 249.
secundiflora 249.
Ranunculaceae 146.
Ranunculeae 147.
Ranunculus 63.
aconitifolius 559.
acer 251.
acris 251.
albus **193.**
alpestris 558.
anemonoides 187.
aquatilis 632.
arvensis 303.
auricomus 201.
bachii 633.
baudotii 633.
bulbosus 262.
caespitosus 633.
cassubicus 199. 201.
cervicornis 201.
circinatus 633.
confusus 639.
crenatus **196.**
divaricatus 633.
eriocalyx 559.
falcatus 183.
ficaria 177.
flabellatus 201.
flammula 608.
fluitans 633.
fluviatilis 633.
gelidus **193.**
glacialis **193.**
gouani 559.
gracilis 559.
hederaceus 241.
heterophyllus 632. 633.
hirsutus 303.
hybridus 573.
illyricus 298.
incisifolius 201.
lanuginosus 393.
lingua **265.**
lycoctonifolius 559.
montanus 559.
muricatus 333.
nanus 559.
ophioglossifolius 373.
palustris 201.
pantothrix 633.
parnassifolius 565.
parviflorus 373.
paucistamineus 633.
peltatus 633.
petiveri Coss. 639.
petiveri Koch 633.
peucedanifolius 633.
phathora 573.
philonotis 303.
pinnatus **253.**
plantagineus 582.
platanifolius 559.
polyanthemos 264.
polymorphus 201.
pyrenaeus 582.
pygmaeus **379.**
renifolius 633.
reniformis 201.
repens 620. **253.**
reptans 608.
reticulatus 303.
roseus **193.**
rutaefolius 187. 569.
sardous 303.
sceleratus 608.
schraderianus 373.
seguieri 559.
stagnalis 633.
steveni 251.
sylvaticus 393.
tappeineri **379.**
tenellus 559.
terrestris 633.
thora 581.
traunfellneri 559.
tripartitus 639.
trisectus 633.
truncatus 633.
velutinus
villarsii 559.
Raphaneae 156.
Raphanistrum
arvense 288.
arvensis 288.
lampsana 288.
segetum 288.
sylvestre 288.
Raphanus 71.
griseus 648.
niger 649.
oleifer 649.
radicula 648.
radiola 648.
raphanistrum 288.
sativus 648.
Rapistrum 71.
perenne 454.
rugosum 476.
Reseda 57.
lutea 468.
luteola 452.
phyteuma 452.
Resedaceae 156.
Rhamneae 168.
Rhamnus 32.
alaterna **493.**
alpina 348.
cathartica 248.
frangula 248.
infectoria 314.
pumila 346.
rupestris 579.
saxatilis 345.
tinctoria 320.
Rhaponticum
scariosum **180.**
Rhinantheae 127.
Rhinanthus
alectorolophus 493.
alpinus **160.**
crista galli 362. 493.
major 493.
minor 362.
villosus 493.
Rhizobotrya
alpina 570.
Rhodiola 104.
rosea 537.
Rhodoraceae 134.
Rhododendron 52.
chamaecistus 345.
ferrugineum 568.
hirsutum 557.
Rhodothamnus 51.
chamaecistus 345.
Rhoeadeae 152.
Rhus 42.
coriaria **286.**
cotinus 647.
radicans 400.
toxicodendron 400.
typhina 647.
Rhynchospora 15.
alba **256.**
fusca 376.
Rhytispermum
arvense 284.
Ribes 33.
alpinum 248.
fleischmanni 248.
grossularia 176.
hladnickii 248.
nigrum 200.

petraeum 224.
reclinatum 208.
rubrum 201
scopolii 248.
uva crispa 208.
Ribesiae 163.
Robinia 78.
pseud-acacia 395.
Roripa
amphibia 634.
austriaca 609.
palustris 619.
pyrenaica 362.
sylvestris 493.
Rosa 60.
alpina 537.
arvensis 393.
baltica 631.
bicolor 433.
canina 410.
centifolia 434.
ciliatopetala 434.
cinnamomea 277.
collina 411.
coriifolia 435.
eglanteria 433.
gallica 513.
gentilis 317.
glandulosa 573.
hampeana 537.
lucida 631.
lutea 433.
mitissima 434.
muscosa 434.
pimpinellifolia 433.
pomifera 502.
pomponia 434.
provincialis 434.
pumila 513.
punicea 433.
pyrenaica 537.
resinosa 434.
reversa 343.
rostrata 411.
rubiginosa 410.
rubrifolia 434.
rupestris 537.
sempervirens 511.
serpens 393.
spinosissima 433.
spinulifolia
tomentosa 393.
turbinata 434.
villosa 502.
vulgaris 411.
Rosaceae 164.
Roseae 165.
Rottboellia
filiformis 642.
incurvata 383.
Rubia 24.
tinctorum **34.**
Rubiaceae 141.
Rubus 60.
agrestis 258.
aquaticus 258.
apiculatus 412.
arvensis 258.
bellardi 422.
caesius 258.
candicaus 411.
carpinifolius 411.
chamaemorus 336.
corylifolius 403.
discolor 411.
dumetorum 403.
ferox 403.
fruticosus 411.
fusco-ater 412.
glandulosus 422.
hirtus 422.
horridus 411.
hystrix 412.
idaeus 251.
macrophyllus 411.
menkeï 412.
nemorosus 403. 412.
nitidus 411.
pallidus 403.
plicatus 411.
pseudo-caesius 258.
pseudo-idaeus 258.
radula 411.
rosaceus 412.
saxatilis 257.
tomentosus 403. 411.
umbrosus 258. 411.
vestitus 411.
villicaulis 411.
vulgaris 411.
wahlenbergii 403.
Rudbeckia
hirta **506.**
laciniata **506.**
Rumex 47.
acetosa 402.
acetosella 451.
acutus 398.
alpinus 557.
angustifolius 451.
aquaticus **236.**
arifolius **173.**
conglomeratus 398.
crispus **55.**
cristatus 433.
digynus 576.
domesticus **506.**
glomeratus 398.
heterophyllus **251.**
hydrolapathum **236.** **251.**
latifolius 451.
maritimus 608.
maximus **251.**
multifidus 451.
nemolapathum 398.
nemorosus 392.
nivalis **173.**
obtusifolius **13.**
paluster **235.**
patientia **61.**
pratensis 433.
pulcher 443.
pygmaeus 451.
sanguineus 392.
scutatus 292.
steinii **236.**
sylvestris **13.**
ucranicus
viridis 392.
Ruppia 13.
maritima **270.**
rostellata **270.**
Ruscus 106.
aculeatus 178.
hypoglossum 178.
Ruta 52.
angustifolia **164.**
bracteosa **164.**
divaricata **164.**
graveolens **164.**
holopetala **164.**
intermedia **164.**
patavina
Rutaceae 148.
Ruteae 148.

S.

Sabina
officinalis 227.
vulgaris 227.
Sabulina 23.
caespitosa 294.
obtusa 578.
viscosa 463.
tenuifolia 463.
Sabulineae 159.
Sagina 26.
apetala 291.
bryoides 585.
ciliata 494.
depressa 494.
erecta 214.
glabra **211.**
linnaei 542.
maritima 382.

nodosa **107.**
patula 494.
procumbens 297.
saxatilis 542.
stricta 382.
subulata 428.
Saginaria 55.
Sagineae 159.
Sagittaria 99.
sagittifolia 635.
Salicariae 163.
Salicineae 118.
Salicorneae 123.
Salicornia 13.
fruticosa
herbacea **424.**
Salix 101.
acuminata 192.
acuminata Sm. 239.
acutifolia 192.
alba 238.
ambigua 257. 354.
amygdalina 240.
angustifolia 234.
arbuscula 583.
arenaria 234.
aurita 256. 354.
austriaca 189.
babylonica 387.
bicolor 229. 270.
buxifolia 563.
caprea 177.
capr.-phylic. 229.
cinerea 192.
cladostemma 189. 257.
coerulea 238.
corruscans 354.
cuspidata **498.**
cyclostigma 193.
daphneola 563.
daphnoides 192.
dasyclados 193.
depressa 234.
discolor 189.
doniana 189.
finmarchia 354.
fissa 192.
forbyana 240.
fragilis 209.
fragili-alba 209.
fusca 234.
glabra 354.
glauca 564.
grandifolia **493.**
hastata 336.
hegetschweileri **501.**
helix 189.
herbacea **190.**
hippophaëfolia 192.
hippophaëf.-vimin. 193.
holosericea 230.
hoppeana 240.
incana 229.
incubacea 234. 257.
jacquinia 354.
lambertiana 189.
lanceolata 238. 242.
lapponum 563.
lauriana 229.
livida 234.
longifolia 238.
meyeriana **498.**
mollissima 193.
myrsinitis 354.
monandra 189.
myrtilloides 354.
nigricans 354.
oleïfolia **495.**
patula **495.**
pentandra 210.
phylicifolia 229. 270.
polyandra 210.
pomeranica 192.
pontederana 189.
praecox 192.
pruinosa 192.
prunifolia 583.
purpurea 189.
repens 234.
reflexa 190.
reticulata 566.
retusa 354.
rosmarinifolia 234.
rubra 192.
rugosa 256.
russeliana 209.
salviaefolia 227. **495.**
seringeana 230.
serpyllifolia 354.
silesiaca 336.
smithiana 238.
speciosa 240.
spuria 563.
starkeana 234.
stipularis 193.
stylaris 354.
tetrandra **498.**
triandra 249.
triandra-vimin. 193.
uliginosa 256.
undulata 242.
viminali-caprea 238.
vimin.-purpur. 192.
vimin.-triandra 192.
viminalis 242.
vitellina 238.
vulgaris 234.
waldsteiniana 583.
Salsola 34.
hirsuta **280.**
kali **263.**
soda **280.**
Salsoleae 124.
Salvia 13.
aethiopis 446.
austriaca 325.
clandestina
glutinosa **13.**
nemorosa **33.**
officinalis 646.
pratensis 407.
sclarea 446.
sylvestris **33.**
verticillata 429.
Salzwedelia
argentea 317.
Sambuceae 142.
Sambucus 42.
ebulus **7.**
humilis **7.**
laciniata 249.
nigra 249.
racemosa 204.
Samoleae 126.
Samolus 29. 31.
valerandi **242.**
Sanguisorba 25.
glaucescens 284.
minor 284.
officinalis 546.
Sanicula 35.
europaea 256.
Saniculeae 144.
Santalaceae 122.
Santolina
chamae-cyparissus **505.**
Saponaria 53.
diurna 256.
lutea
noctiflora **56.**
ocymoides
officinalis **37.**
vaccaria **37.**
vespertina 410.
Sarothamnus 76.
scoparius 252.
vulgaris 252.
Satureja 67.
hortensis **285.**
montana **129.**
pygmaea **122.**
rupestris **120.**
variegata
Satureïneae 130.
Satyrium
albidum 265.
epipogium **13.**

hircinum 269.
nigrum 582.
repens **32.**
viride 610.
Saussurea 84.
alpina **181.**
discolor **181.**
pygmaea **202.**
Saxifraga 53.
acutifolia **153.**
adscendens 348.
aizoides **206.**
aizoon **153.**
androsacea 566.
angustifolia **208.**
arachnoidea **167.**
aspera 577.
atro-purpurea 557.
biflora 567.
bryoides **153.**
bulbifera 364.
burseriana 346.
caesia 571.
caespitosa 312.
chlorantha **208.**
cernua **168.**
clusii
cotyledon **174.**
controversa 348.
crocea 557.
crustata **186.**
cuneïfolia **174.**
decipiens 312.
diapensoides **501.**
elatior **153. 187.**
exarata **152.**
facchinii **165.**
geranioides 550.
granulata 261.
hieracifolia **208.**
hirculus **241.**
hirsuta 341.
hostii **187.**
hypnoides 339.
kochii 567.
latifolia **208.**
leucanthemifolia **208.**
moschata 557.
muscoides 557.
mutata 577.
nana 312.
nivalis 510.
oppositifolia 538.
paradoxa **204.**
patens 578.
pedemontana 565.
petraea 550.
planifolia **164. 165.**
ponae 550.
pusilla **153.**
recta **153.**
retusa **215.**
riparia **153.**
rotundifolia 557.
rudolfiana 539.
sedoides **205.**
seguieri 194.
sponhemica 312.
squarrosa **199.**
stellaris **207.**
stenopetala **201.**
sternbergii 312.
subacaulis **208.**
tenella **174.**
tridactylites 214.
umbrosa 541.
valdensis 571.
vandelli 350.
Saxifrageae 161.
Scabiosa 23.
agrestis 534.
alpina **24.**
arvensis 448.
australis **234.**
brachiata 530.
canescens **130.**
columbaria **6.**
collina 448.
dentata 448.
dipsacifolia
fleischmanni 554.
graminifolia 553.
gramuntia 534.
hastata **24.**
hladnikiana **139.**
integrifolia 448.
lancifolia **24.**
leucantha **125.**
longifolia 553.
lucida **146.**
montana **24.**
multiseta
norica **146.**
ochroleuca **97.**
pinnatifida 448.
suaveolens **130.**
succisa **395.**
sylvatica **23.**
transsylvanica **1.**
tridactylites 214.
trivialis 448.
ucranica **139.**
vestina
vulgaris 418.
vulgata **24.**
Scandicineae 145.
Scandix 40.
anthriscus 275.
australis
cerefolium 260.
fumarioides 573.
infesta **36.**
nodosa 275.
odorata 267.
pecten-veneris 302.
Schelhammeria
capitata 501.
Scheuchzeria 47.
palustris 353.
Schmidtia
utriculosa **261.**
Schoberia
maritima **425.**
Schoenodorus
calamarius 421.
pratensis 591.
Schoenus
albus **256.**
compressus 622.
ferrugineus 365.
fuscus 376.
mariscus **248.**
mucronatus
nigricans 365.
rufus 640.
Schollera
oxycoccos 615.
Scilla 46.
amoena 208.
autumnalis
bifolia 177.
italica 241.
verna 241.
Scirpus 15.
acicularis 625.
alpinus 356.
baeothryon 603.
bifolius 640.
caespitosus 356.
caricis 622.
carinatus 627.
clathratus **233.**
compressus 622.
dichotomus **249.**
digynus **261.**
duvalii 627.
fluitans 627.
glaucus 627.
gracilis **138.**
holoschoenus **233.**
humilis **273.**
lacustris 372.
tereschii 625.
littoralis
maritimus **261.**
michelianus **260.**
mucronatus L. **260.**

mucronatus Poll. **260.**
multicaulis 624.
nanus **273.**
ovatus 616.
palustris 603.
parvulus **273.**
pauciflorus 603.
pollichii **260.**
pungens **260.**
radicans **233.**
rothii **260.**
rufus 640.
savii 625.
setaceus **233.**
supinus **249.**
sylvaticus 247.
tabernaemontani 627.
trigonus 627.
triqueter **260.**
uniglumis 603.
Scleranthеae 160.
Scleranthus 53.
annuus 285.
intermedius **98.**
perennis 305.
polycarpus **111.**
verticillatus **111.**
Sclerochloa
dura 309.
procumbens 641.
Scolochloa
festucacea **261.**
Scolymeae 137.
Scolymus 80.
hispanicus **66.**
Scopolia
carniolica 199.
Scopolina 30.
atropoides 199.
viridiflora **493.**
Scorpiurus
subvillosa **494.**
Scorzonera 82.
alpina 351.
angustifolia 265.
aristata 351.
asphodeloides 600.
austriaca 222.
edulis 600.
glastifolia 600.
grandiflora 351.
hispanica 600.
humilis 265.
laciniata 290.
lanata 265.
montana 600.
octangularis 290.
parviflora 366.
plantaginea 265.
purpurea 413.
rosea 413.
Scorzonereae 136.
Scrophularia 68.
aquatica **266.**
balbisii **266.**
canina 308. 542.
chrysanthemifolia 542.
crenata **267.**
ehrharti **267.**
hoppii 308.
laciniata
neesii **267.**
nodosa 401.
peregrina
scopolii **25.**
vernalis 280.
Scrophularineae 126. 127.
Scutellaria 64.
alpina
columnae **237.**
galericulata **17.**
hastifolia **17.**
minor **237.**
Scutellarineae 130.
Scylacium
vernale 280.
Secale 22.
cereale 481.
Securigera
coronilla **494.**
Sedum 56.
acre 452.
acriforme **97.**
album **165.**
anacampseros 576.
annuum 463.
anopetalum **50.**
atratum **505.**
aureum **504.**
boloniense **97.**
cepaea **167.**
crassicaule **50.**
dasyphyllum 463.
elegans **504.**
fabaria **24.**
glaucum **175.**
hispanicum **175.**
lividum **24.**
maximum **24.**
purpurascens **24.**
purpureum Lk. **24.**
purpureum Tsch. **24.**
reflexum **50.**
repens **151. 194.**
rhodiola 537.
rubens **151.**
rupestre **50.**
sexangulare **97.**
stellatum
telephium **24.**
trevericum **504.**
villosum 535.
viride **50.**
Selinum 36.
carvifolia **2.**
cervaria **20.**
chabraei **230.**
palustre **30.**
seguieri **210.**
sylvestre **15. 21.**
Sempervivеae 161.
Sempervivum 57.
arachnoideum **198.**
arenarium **33.**
braunii **195.**
doellianum **198.**
funkii **175.**
globiferum **33. 165.**
hirtum **154.**
montanum **151.**
soboliferum **33.**
tectorum **50.**
villosum **198.**
wulfenii **198.**
Senebiera 71.
coronopus **56.**
didyma **76.**
pinnatifida **77.**
Senebiereae 155.
Senecio 86. 88.
abrotanifolius **381.**
alpina 423. **149.**
angustifolius **26.**
anthoraefolius **12.**
apenninus **182.**
aquaticus **229.**
arachnoides **217.**
aurantiacus 574.
auriculatus **150.**
barbaraeifolius **42.**
brachychaetus 582.
cacaliaster **215.**
campester 415.
carniolicus **193.**
cordatus **150.**
cordifolius **150.**
crispatus 537.
crispus 537.
croaticus **215.**
denticulatus 404.
doria **18.**
doronicum **181.**
erraticus **42.**
erucaefolius **11.**
fluviatilis 635.
fuchsii **26.**
gallicus 644.

germanicus **26.**
glabrescens **182.**
incanus **197.**
jacobaea **6.**
jacquinianus **26.**
lanatus **217.**
lividus 404. 497.
lyratifolius **181.**
napifolius **12.**
nebrodensis **497.**
nemorensis **26.**
octoglossus **26.**
orientalis **182.**
ovatus **26.**
paludosus **268.**
paluster **241.**
papposus 537.
polycephalus **182.**
pratensis **218.**
riparius **268.**
rotundifolius **182.**
rupestris 346.
salicifolius **26.**
saracenicus L. 635.
saracenicus Wallr. **26.**
scopolii **217.**
spatulaefolius 423.
squalidus 644.
subalpinus **150.**
sylvaticus 401.
tenuifolius **11.**
tomentosus **182.**
uniflorus **189.**
vernalis 396.
viscosus 460.
vulgaris 211.
Senecioneae 139.
Senecionideae 139.
Serapias 93.
cordigera 274.
grandiflora 421.
helleborine **23.**
latifolia **23.**
lingua 321.
longifolia 416.
microphylla **23.**
palustris 416.
pseudo-cordigera 274.
rubra 405.
triloba **494.**
xiphophyllum 421.
Serpicula
verticillata 640.
Serratula 83.
alpina **181.**
arvensis **67.**
cyanoides 504.
discolor **181.**
heterophylla **121.**
mollis 504.
nitida **121.**
pollichii 504.
radiata 507.
rhaponticum **180.**
tinctoria **5.**
Serratuleae 137.
Seseli 39.
annuum **142.**
bienne **142.**
coloratum **142.**
elatum **343.**
glaucum **152.**
gonani **343.**
hippomarathrum **115.**
libanotis **7.**
montanum **152.**
osseum
tortuosum **168.**
turbith **172.**
varium **120.**
venosum **21.**
Seselineae 145.
Sesleria 21.
coerulea 187.
disticha **184.**
elongata **166.**
microcephala 564.
sphaerocephala **184.**
tenuifolia 339.
tenella 564.
Setaria 19.
glauca **81.**
italica **88.**
verticillata 442.
viridis **54.**
Sherardia 24.
arvensis 297.
Sibbaldia 44.
procumbens **187.**
Sicyos
angulata **503.**
Sideritis 65. 66.
montana **95.**
romana **95.**
scordioides **504.**
Siebera
cherlerioides 568.
Sieglingia
decumbens 544.
Sieversia 60.
montana **160.**
reptans **187.**
Silaus 39.
pratensis 598.
Silene 54.
acaulis 577.
alpestris **195.**
alpina 424.
anglica 486.
angustifolia 424.
annulata 486.
armeria **157.**
baccifera **37.**
behen 424.
chlorantha **32.**
conica 305.
conoidea 486.
dichotoma 285.
diurna 256.
exscapa 577.
gallica 486.
glauca 424.
glutinosa 558.
inflata 424.
italica 324.
linicola 505.
livida 409.
maritima 424.
nemoralis 405.
noctiflora **56.**
nutans 409.
oleracea 424.
otites 261.
pratensis 410.
pubescens 424.
pudibunda 558.
pumilio 569.
quadridentata 558.
quadrifida 557.
quinquevulnera 486
rupestris **153.**
saponaria **37.**
saxifraga **114.**
sedoides **500.**
sylvestris 486.
tatarica **271.**
vallesia **505.**
venosa 424.
vespertina 383.
viscosa 451.
Sileneae 158.
Siler 40.
aquilegifolium 525.
trilobum 525.
Silerineae 145.
Siliculosae
planivalvatae 153.
scaphatae 154.
Silphium
perfoliatum **506.**
Silybeae 138.
Silybum 83.
marianum **52.**
Sinapis 73.
alba 482.
arvensis 487.
cheiranthus 455.

incana 289.
nigra **93.**
orientalis 487.
schkuhriana 487.
Sison 38.
amomum **112.**
inundatum **250.**
podagraria 391.
verticillatum 602.
Sisymbreae 153.
Sisymbrium 73.
acutangulum 293.
alliaria 202.
amphibium 634.
anceps 634.
arenosum 306.
austriacum 293.
columnae **454.**
contortum 293.
eckartsbergense 293.
erucastrum 455.
irio 454.
lippizense 314.
loeselii 454.
multisiliquosum 293.
murale 454.
nasturtium 375.
obtusangulum 465.
officinale 464.
palustre 619.
pannonicum 289.
pinnatifidum **177.**
pyrenaicum 362.
ropipa 634.
sinapistrum 289.
sophia 288.
strictissimum 441.
supinum **107.**
sylvestre 493.
tenuifolium 454.
terrestre 634.
thalianum 181.
vimineum 494.
Sium 38.
angustifolium **235.**
falcaria **55.**
latifolium **235.**
nodiflorum **263.**
repens **235.**
sisarum **89.**
Smegmanthe 53.
glandulosa **174.**
ocymoides **174.**
pyrenaica **174.**
Smilacina
bifolia 269.
Smilacineen 114.
Smilax 103.
aspera **428.**
Smirneae 146.
Smyrnium 41.
perfoliatum 221.
Solaneae 128.
Solanum 31.
dulcamara 430.
humile **312.**
melanocerasum **74.**
miniatum **59.**
nigrum 442.
tuberosum **88.**
villosum **318.**
Soldanella 29.
alpina 342.
minima 568.
montana 268.
pusilla 565.
Solidago 89.
doronicum **181.**
glabra **46.**
procera **293.**
virga aurea **6.**
Sonchus 81.
alpinus **152.**
arvensis **101.**
asper 444.
ciliatus 444.
fallax 444.
intermedius **102.**
laevis 444.
maritimus **102.**
oleraceus 444.
paluster **237.**
plumieri **152.**
uliginosus **102.**
Sorbus 58.
aria 268.
aucuparia 250.
chamaemespilus 536.
domestica 250.
fennica 267.
hybrida 267.
latifolia 268.
scandica **498.**
sudetica 536.
torminalis 258.
Sorghum
halepense **500.**
Soria
austriaca **485.**
Soyeria
grandiflora **151.**
hyoseridifolia **201.**
montana **200.**
sibirica **151.**
Sparganum 96.
erectum 620. **270.**
fluitans 620.
natans **276.**
ramosum **270.**
simplex 620.
Spartianthus
junceus 321.
Spartium 76.
junceum 321.
radiatum 327.
scoparium 252.
Spathaceae 114.
Specularia 32.
hybrida 485.
speculum 485.
vulgaris 485.
Spergella 56.
glabra **211.**
glandulosa **107.**
macrocarpa 542.
nodosa **107.**
pubescens **107.**
saginoides 542.
subulata 428.
Spergula 56.
arvensis 475.
maxima 475.
morisonii 220.
nodosa **107.**
pentandra 214. 220.
saginoides 542.
sativa 475.
subulata 428.
vernalis 220.
vulgaris 475.
Spergularia 55.
campestris 285.
marginata **278.**
marina **225.**
media **278.**
rubra 285.
salina **225.**
segetalis 486.
semidecandra 486.
Spinacia 103.
inermis 281.
oleracea 281.
spinosa 281.
Spiraea 60.
aruncus 419.
carpinifolia **30.**
chamaedryfolia 327.
decumbens 343.
filipendula 392.
hyperidifolia 327.
oblongifolia 327.
salicifolia 407.
ulmaria 399.
ulmifolia 340.
Spiraeceeae 165.
Spiranthes 93.
aestivalis 400.

autumnalis **355.**
spiralis **355.**
Spirodela
polyrrhiza 381.
Stachydeae 130.
Stachys 66.
alpina 420.
ambigua 439.
annua **93.**
arvensis **99.**
betonica 394. 453.
germanica **73.**
italica **504.**
lanata
maritima 643.
palustris 495. 608.
palustri-sylvat. 439.
procumbens 453.
recta 453.
sylvatica 394.
Staphylea 42.
pinnata 268.
Staphyleaceae 168.
Statice 43.
alpina **213.**
armeria 451.
behen **281.**
cancellata **498.**
caspia **281.**
elongata 451.
furfuracea **281.**
globulariaefolia **281.**
gmelini **507.**
limonium **281.**
maritima 451.
plantaginea **104.**
pseudo-limon. **281.**
purpurea **505.**
scoparia **281.**
serotina **281.**
Staurogeton
trisulca 380.
Stellaria 54.
alsine 266.
bracteata 266.
bulbosa 199.
cerastoides **187.**
crassifolia 608.
dilleniana 266.
frieseana **45.**
glauca 399.
graminea 250. 266. 399.
holostea 201.
longifolia **45.**
media 171.
neglecta 171.
nemorum 250.
palustris 399.
uliginosa 266.
umbrosa 392.
viscida 358.
Stellateae 141.
Stellera
annua 490.
passerina 490.
Stenactis 89.
annua **53.**
bellidiflora **53.**
Stipa 18.
capillata 501.
pennata 502.
Stratiotes 105.
aloides 621.
Streblidia
ferruginea 365.
Streptopus 46.
amplexifolius 422.
Sturmia
minima 189.
loeselii 616.
Suaeda 34.
chenopodioides **425.**
hirsuta **280.**
maritima **425.**
Suaedineae 124.
Subularia 70.
aquatica 639.
Subularineae 154.
Subulina
setacea **122.**
Succisa
australis **508.**
praemorsa **395.**
pratensis **395.**
Sweertia 34.
carinthiaca **378.**
perennis **162.**
Symphytum 29.
bohemicum 280.
bulbosum 318.
cordatum
macrolepis 318.
officinale 280.
patens 280.
tuberosum 195.
Synanthereae 135.
Syntherisma
ciliaris 442.
glabrum 446.
vulgare 442.
Syrenia 72.
angustifolia 308.
Syringa 14.
vulgaris 207.

T.

Tabacoferae 128.
Tamariscineae 163.
Tamarix
gallica 578.
germanica 578.
Tamus 103.
communis 202.
Tanacetum 86.
corymbosum 414.
leucanthemum 414.
parthenium **53.**
vulgare **68.**
Taraxacum 81.
alpestre 181.
bacheri 181.
dens leonis 181.
laevigatum 181.
leontodon 181.
leptocephalum 181.
nigricans 181.
officinale 181.
palustre 181.
serotinum 181.
tenuifolium 181.
Tarchonantheae 140.
Taxus 105.
baccata 224.
Teesdalia 70.
iberis 214.
nudicaulis 214.
petraea 221.
Telekia 88.
cordifolia **163.**
speciosa **163.**
speciosissima 540.
Telephieae 160.
Telephium 42.
imperati **169.**
Telmatophace
gibba 381.
Tetragonolobus 77.
purpureus **285.**
siliquosus 461.
Tetralix 49.
cinerea **389.**
septentrionalis **162.**
Teucrium 65.
botrys **102.**
bracteata **51.**
chamaedrys **51.**
chamaepitys 491.
flavum 549.
foliosa **51.**
glabra **51.**
montanum **111.**
polium **122.**
pubescens **51.**
scordioides
scordium **237.**
scorodina **9.**
Thalictrum 62.

alpinum **214.**
angustifolium L. **213.**
angustifoliumJacq.435.
angustissimum 435.
aquilegifolium 251.
bauhini **213.**
bauhinianum 435.
collinum 286. **497.**
elatum **500.**
exaltatum **501.**
flavum 608.
flexuosum 286. **497.**
foetidum **114.**
galioides **213.**
heterophyllum 435.
jacquinianum 286.**497.**
kochii **497.**
laserpitifolium **213.**
leyii 529.
lucidum **213.**
majus 286.
medium **497.**
minus **497.**
montanum
morisonii 513.
nigricans 435. 608.
nutans 286.
rufinerve 513.
simplex 529.
sylvaticum 286.
vulgare 286.
Thapsieae 145.
Thelaia
chlorantha 428.
intermedia 392.
media 401.
rotundifolia 392.
Therebinthaceae 167.
Thesium 27.
alpinum 260.
comosum 264. 415.
divaricatum **126.**
ebracteatum 264. 415.
humifusum 488.
humile 489.
intermedium 337.
linophyllum 337. 423.
montanum 423.
pratense 533.
ramosum 489.
rostratum 579.
tenuifolium 260.
Thlapsi 69.
alliaceum 298.
alpestre 210.
alpinum 225.
arvense **211.**
bursa pastoris 171.
calaminare
campestre 453.
cepaeifolium 333.
montanum 653.
perfoliatum 211.
praecox 175.
procumbens 359.
rotundifolium **202.**
Thlaspideae 154.
Thrincia 83.
hirta 587.
leysseri 587.
Thymelaea
passerina 490.
Thymeleaea 122.
Thymus 64.
acinos **94.**
alpinus **176.**
angustifolius **9.**
chamaedrys **9.**
citriodorus **9.**
communis **9.**
diffusus **9.**
duinensis **120.**
glabratus **9.**
lanuginosus **9.**
montanus **9.**
pannonicus **9.**
pulegioides
serpyllum **8.**
simplex **9.**
sylvestris **9.**
vulgaris 648.
Thysselinum
palustre **30.**
Tilia 61.
acuminata **3.**
europaea 393. **3.**
grandifolia 393.
intermedia **3.**
microphylla **3.**
mollis 393.
parvifolia **3.**
pauciflora 393.
platyphyllos 393.
ulmifolia **3.**
vulgaris **3.**
Tiliaceae 149.
Tillaea 26.
aquatica **258.**
muscosa 305.
prostrata **258.**
Tithymalus
amygdaloides 253.
angulatus 321.
cyparissias **103.**
dulcis 198.
esula 460.
exiguus 509.
falcatus **87.**
gerardianus 460.
helioscopius 212.
lathyris **69.**
lucidus 610.
palustер 373.
peplus 445.
platyphyllos **79.**
procerus 422.
segetalis **100.**
strictus 397.
verrucosus 313.
virgatus 264.
Tofieldia 47.
borealis **186.**
calyculata 584.
glacialis 584.
Tommasinia
verticillaris **139.**
Tordylium 36.
anthriscus 402.
apulum
latifolium **82.**
maximum **60.**
nodosum 327.
Torilis 40.
anthriscus 275. 402.
helvetica **92.**
heterophylla 440.
infesta **36.**
neglecta **36.**
nodosa 327.
Tormentilla 60.
erecta 404.
reptans 401.
Torminaria 58.
Tozzia 67.
alpina **156.**
Tragopogon 82.
canus 594.
crocifolius
floccosus 594.
heterospermus 594.
major 459.
minor 363.
orientalis 363.
porrifolius 384.
pratensis 363.
tommasinii 364.
tortilis 363.
vulgaris 363.
Tragus 17. 19.
racemosus 498.
Trapa
natans 636.
Trapeae 162.
Traunsteinera
globosa 416.
Tribulus 52.
terrestris 463.

Trichodium
caninum **223.**
Trichonema
bulbocodium **493.**
Trientalis 48.
europaea 249.
Trifoleae 166.
Trifolium 77.
agrarium 404. 458.
alexandrinum 641.
alpestre 404.
alpinum 566.
angustifolium 593.
arvense 477.
aureum 404.
badium 561.
caespitosum **383.**
campestre 458. 478.
cherleri **497.**
elegans 508.
filiforme 290.
flexuosum 395.
fragiferum 609.
glomeratum
hybridum 263.
incarnatum 300.
kochianum **65.**
lappaceum **495.**
lupinaster 407.
majus 458.
maritimum 509.
medium 395.
melil. coerul. 457.
melil. indicus 457.
melil. officin. 457. **40.**
micranthum
minus 290. 458.
montanum 266.
multistriatum 643.
nigrescens 289.
noricum **188.**
ochroleucum 417.
pallescens **216.**
pallidum 289.
pannonicum 609.
parisiense 581.
parviflorum 321.
patens 581.
pratense 395.
procumbens 290. 457. 458.
pseudo-proc. 458.
recurvatum 643.
repens 289.
resupinatum **502.**
rubens 395.
sativum 395.
saxatile **505.**
scabrum 306.
simplex 478.
spadiceum 399.
stellatum 489.
striatum 510.
subterreanum 263.
suffocatum **494.**
tomentosum **497.**
vesiculosum 642.
vulgare 395.
Triglochin 47.
maritima 625.
palustre **235.**
Trigonella 76.
coerulea 599.
corniculata 299.
foenum graecum 482.
gladiata
monspeliaca 457.
Trinia 37.
glauca **141.**
henningii **141.**
jacquini **141.**
kitaibelii 2.
pumila **141.**
vulgaris **141.**
Triodia 20.
decumbens 544.
Tripleurospermum
inodorum **42.**
Tripolium
vulgare **425.**
Trisetum
flavescens 446.
tenue 512.
Triticum 22.
acutum 642.
aestivum 480.
affine 642.
amyleum 480.
arvense 447.
biflorum **167.**
caesium
caninum 398.
compositum 480.
dicoccum 480.
dumetorum 447.
durum 480.
giganteum 642.
glaucum 628.
hibernum 480.
intermedium 628.
junceum 642.
leersianum 447.
littorale 628.
monococcum 480.
pinnatum **6.**
polonicum 481.
pungens 642.
repens 447.
rigidum **262.**
sativum 480.
spelta 480.
strictum **280.**
sylvaticum 390.
turgidum 480.
vulgare 480.
Trixago
latifolia **494.**
Trochiscanthes
nodiflorus **499.**
Trollius 63.
altissimus 337.
europaeus 337.
humilis 337.
Tuberaria
variabilis 491.
Tulipa 46.
sylvestris 201.
Tulipaceae 115.
Tunica
prolifera **61.**
rigida **100.**
saxifraga **100.**
Turbith 39.
matthioli **172.**
Turgenia 40.
latifolia **82.**
Turritis 72.
glabra 262.
loeselii 454.
patula 221.
pauciflora 331.
rupestris 228.
Tussilagineae 140.
Tussilago 88.
alba 223.
alpina 352.
discolor 562.
farfara 173.
hybrida 191.
nivea 187.
paradoxa 187. 193.
petasites 191.
ramosa 223.
spuria 193.
tomentosa 193.
Typha 96.
angustifolia 619.
elatior 619.
latifolia 619.
minima 579.
Typhineae 111.

U.

Udora 102.
occidentalis 640.
pommerana 640.
verticillata 640.

Ulex 76.
europaeus 184.
Ulmaceae 120.
Ulmaria 60.
filipendula 392.
pentapetala 399.
Ulmus 34.
campestris 196.
carpinifolia 196.
ciliata 176.
corylifolia 196.
effusa 176.
micrantha 176.
montana 196.
pedunculata 176.
suberosa 176.
tetrandra 176.
vulgaris 196.
Umbelliferae 143.
orthospermeae 144.
solenospermeae 145.
Urachne
paradoxa 389.
Urospermum
dalechampii **497.**
picroides **497.**
Urtica 97.
dioica **12.**
dodartii
oblongata **12.**
pilulifera 445.
urens 438.
urentissima 445.
Urticeae 119.
Utricularia 14.
bremii **248.**
intermedia 626.
major **248.**
minor **258.**
neglecta **248.**
pulchella **248.**
spectabilis **248.**
vulgaris 626.
Utricularinae 126.
Uvularia
amplexifolia 422.

V.

Vaccaria 54.
parviflora **37.**
pyramidata **37.**
vulgaris **37.**
Vaccinieae 134.
Vaccinium 49.
idaeum 273.
intermedium 273.
myrtillo-vit. id. 273.
myrtillus 249.
oxycoccos 615.
uliginosum 353.
vitis idaea 272.
Vaillantia 24.
muralis 315.
Valantia 24.
aparine 485. **92.**
cruciata 260.
Valeriana 16.
angustifolia 389.
celtica 567.
collina 389.
dentata **80.**
dioica 305.
elongata 566.
exaltata 389.
locusta 213. 471. **80.**
montana 419.
multiceps 389.
officinalis 389.
olitoria 213.
phu 270.
rubra 542.
saliunca **184.**
sambucifolia 389.
saxatilis 571.
supina **191.**
tripteris 536.
tuberosa 323.
vesicaria 471.
vulgaris 389.
Valerianeae 141.
Valerianella 16.
auricula **91.**
carinata 212. 471.
dentata DC. **91.**
dentata Poll. **80.**
echinata 212.
eriocarpa 295.
hamata 471.
lasiocarpa **80.**
leiocarpa **80.**
mixta **80.**
morisonii **80.**
olitoria 213.
tridentata **91.**
vesicaria 471.
Vallisneria
spiralis **507.**
Veratreen 114.
Veratrum 47.
album 582.
lobelianum 582.
nigrum **27.**
Verbascum 30.
adulterinum **227.**
blattaria 449.
collinum **131.**
cuspidatum **108.**
flocossum 496.
lanatum **7.**
lychnitis **59.**
lychn.-flocc. 496.
lychn.-pulverul. 496.
mönchii **59.**
montanum **503.**
nigro-thapsus **131.**
nigrum **7.**
orientale **7.**
phlomoides **338.**
phoeniceum **19.**
pilosum 449.
pseudo-blattaria
pulverulentum 496.
schottianum **7.**
schraderi **14. 108.**
speciosum **137.**
thapsiforme **108.**
thapsif.-nigrum **227.**
thapsonigrum **131.**
thapsophoeniceum **97.**
thapsus **14. 108.**
thomaeanum **131.**
versiflorum **97.**
Verbasseae 128.
Verbena 68.
officinalis 453.
Verbenaceae 129.
Veronica 14.
acinifolia 213.
adscendens 212.
agrestis 212.
alpina 577.
alternifolia **44.**
anagallis 626.
anagalloides 626.
aphylla 564.
arvensis 182.
austriaca 281.
barrellieri **132.**
beccabunga 626.
bellidioides 538.
buxbaumii 211.
canescens **133.**
chamaedrys 259.
ciliata 212.
clusii **132.**
crassifolia **133.**
crenulata **43.**
cristata **133.**
curvata 255.
cymbalaria 207.
dentata 281.
didyma 182. 212.
fenticulosa
filiformis 211.
foliosa **44.**
fruticulosa **169.**

hederifolia 207.
hospita 211.
hybrida
incana **133.**
integrifolia 626.
latifolia 429.
longibracteata 626.
longifolia **43. 44.**
maritima **44.**
media **43.**
montana 269.
nana 182.
officinalis 388.
opaca 180.
orchidea **133.**
paludosa **133.**
paniculata 281. **44.**
parmularia 603.
peregrina 212.
persica 211.
pilosa 260.
polita 182.
polyanthos 182.
praecox 182.
prostrata 216.
pseudo-chamaedrys 429.
pulchella 212.
romana 182.
rosea 626.
saxatilis 349.
schmidtii 281.
scutellata 603.
serpyllifolia 255.
spicata **132.**
spuria **44.**
squamosa **132. 133.**
subspicata 388.
succulenta 214.
tenella 627.
teucrium 429.
tournefortii 211.
triphyllos 181.
urticifolia 207.
verna 214.
vulgaris 182. **132.**
vulgata 212.
Veroniceae 127.
Vesicaria 69.
utriculata 232.
Viborgia
acmella **86.**
parviflora 86.
Viburnum 42.
lantana 259.
opulus 249.
tinus 188.
Vicia 78.
angustifolia 437.
articulata 458.
bithynica 279.
cassubica 405.
cordata 437.
cracca 437.
dasycarpa 304.
dumetorum 401.
ervilia 487.
faba 483.
gerardi
glabrescens 304.
gracilis 478.
grandiflora 478.
hirsuta 437.
hirta 478.
hybrida 488.
lathyroides 180.
lutea 478.
monantha 458.
montana 206.
multiflora 405.
narbonensis 478.
ochroleuca 206.
onobrychoides
oroboides 574.
orobus 279.
pannonica 488.
peregrina 300.
pisiformis 418.
sativa 300.
sepium 206.
sylvatica 279. 418.
tenuifolia 437.
tetrasperma 413.
villosa 304.
Vicieae 167.
Vignea
disticha 367.
schreberi 184.
Villarsia
nymphaeoides 617.
Vinca 31.
herbaceae 233.
major 207.
minor 195.
Vincetoxicum 35.
album **35.**
officinale **35.**
Viola 32.
alba 179. 218.
allionii 272.
alpina **171.**
ambigua 196.
arenaria 272.
arvensis 275.
biflora 334.
billotii 366.
calaminaria **147.**
calcarata **185.**
canina 202.
cenisia **505.**
collina 196.
comollia **504.**
elatior 255.
epipsila 347.
ericetorum 203.
flavicornis 203.
glauca 272.
grandiflora **147.**
hirta 196.
lactea 355. 366.
lactiflora 196.
lancifolia 355.
lucorum 203.
lutea **146.**
mirabilis 203.
montana 203.
multicaulis **147.**
nemora 196.
nemoralis 205.
odorata 179.
palustris 370.
palustri-ulig. 347.
parvula 196.
persicifolia 255. 366.
pinnata 343.
pratensis 366.
recta 366.
rothomagensis **496.**
riviniana 196.
rupestris 272.
rupii 205.
scanica 347.
scaturiginosa 177.
schultzii 205. 234.
sciaphila 196. 230.
stagnina 366.
stricta 366.
suavis 185.
sudetica **147.**
sylvestris 196.
tricolor 275.
turfosa 205.
uliginosa 177.
umbrosa 196.
Violarieae 158.
Viscago
vulgaris 286.
Viscaria 55.
alpina 565.
purpurea 286.
viscosa 286.
vulgaris 286.
Viscum 102.
album 24 .
Vites 150.
Vitex 68.
agnus castus **121.**

Vitis 32.
hederacea **35.**
idaea 273.
laciniosa 645.
sylvestris 645.
vinifera 645.
Vogelia
paniculata 487.
Vulpia 20.
myurus 259.
pseudo-myurus 259.
sciuroides 446.
uniglumis 283.

W.

Wahlenbergia 31.
erinus **501.**
hederacea **15.**
Wahlenbergieae 135.
Weingaertneria
canescens 499.
Wiborgia
acmella **86.**
parviflora **86.**
Wiggersia
lathyroides 180.
minima 180.
sepium 206.
Willemetia 81.
apargioides 583.
Wolffia
michelii 381.
Wulffenia 14.
carinthiaca **169.**

X.

Xanthium 98.
italicum **70.**
macrocarpum **70. 71.**
orientale **70.**
riparium **70.**
saccharatum **70.**
spinosum **70.**
strumarium **70.**
Xantholinum
nodiflorum 494.
Xeranthemeae 139.
Xeranthemum 86.
annuum 589.
cylindraceum 589.
inapertum **221.**
radiatum 589.

Z.

Zahlbrucknera 53.
paradoxa **204.**
Zannichellia 96.
gibberosa **269.**
major **269.**
palustris **269.**
pedicellata **276.**
polycarpa **282.**
repens **269.**
Zea mays 96. 484.
Zilleae 155.
Zizyphus 32.
vulgaris 645.
Zostera 95.
marina 644.
nana 644.
nolteï 644.
Zygophylleae 148.

Deutsches Register.

(Die fetter gedruckten Ziffern des Registers beziehen sich auf die Seitenzal des 2. Bandes.)

A.

Abbiß 361.
Abrahamsstrauch **121.**
Abrandkraut **350.**
Absint **73.**
Abutilon **506.**
Ackerandorn **73.**
Ackerbrand 476.
Ackerdistel **67.**
Ackereichel **41.**
Ackererbse 301.
Ackergauchheil 181.
Ackerkamille 460. 475. **94.**
Ackerklapper 493.
Ackerklee 477.
Ackerknautie 448.
Ackerleinkraut **93.**
Ackerlolch 473.
Ackermann 618.
Ackermelisse **94.**
Ackermennig 410.
Ackermohn 302.
Ackernissolie 458.
Ackerröte 297.
Ackerrose 393.
Ackersalat **101.**
Ackersenf 487.
Ackerskabiose 448.
Ackerspark 475.
Ackerveilchen 275.
Ackerwinde 443.
Ackerziest **99.**
Adamsapfel **287.**
Adlerblume 425.
Aehrenlilie 46.
Affenbeere 615. **241.**
Affengesicht 263.
Affenschädel **77.**
Affodill 351.
Alterkamille **100.**
Altermennig 257.
Alterquendel 45. **224.**
Alterseme 182.
Alterwollkraut **227.**
Ahlkirsche 200.
Ahorn 50.
Ahorne 151.
Akelei 62. 425.
Aklei 425.
Akazie 395.
Alant 90.
Alante 140.
Aldrovande 43.
Alkanne 466.
Allerleiluft 298.
Allelnja 196.
Allermannsharnisch 362. **246.**
Alpbalsam 568.
Alpenaster **183.**
Alpendorant **156.**
Alpendost 84.
Alpenglöckchen 9.268.342.
Alpenhafer **169.**
Alpenklee 466.
Alpenleinkraut **207.**
Alpenmannstreu **172.**
Alpenmelisse **176.**
Alpenmohn 567.
Alpenrausch 226.
Alpenrebe 63.
Alpenrose 52. 568.
Alpenscharlei **211.**
Alpentimian **176.**
Alpentozzie **156.**
Alpenveilchen 226.
Alpenwaldrebe **176.**
Alpenzeitlose **505.**
Alpknoblauch **246.**
Alpkraut 442. **238.**
Alplattich 86. 88.
Alplilge 46.
Alppfaff 438. 442.
Alpranken 430.
Alpraute **350.**
Alpröschen 51.
Alte Mägde 239.
Altermannsbart **29.**
Altemannskraut **87. 224. 354.**
Althee **44.**
Amarant 98.
Amarantblütige 124.
Amarantgewächse 124.
Ammi 38.
Ampfer 47.
Amselbeere 248.
Amurettengras 596.
Andorn 66.
Andorne 131.
Andromeda 51.
Angelika 542.
Anis **89.**
Aniskerbel 41. 267.
Ankeballi 541.
Antoninskraut **62.**
Antonskraut **267.**
Apfelbaum 59. 196.
Apfelrose 502.
Apfelsine **288.**
Apostemkraut 448. **7.**
Aprikose 194.
Araliazeen 143.
Arbuse **286.**
Ardennentreffe **500.**
Arnika 90.
Aroideen 110.
Aron 95. 255.
Aronsstab 255.
Arve 567.
Aschenblatt **476.**
Aschenpflanze 88.
Aschlauch **647.**
Aschwurzel 418.
Asenholz 267.
Asklepiadeen 133.
Aspe 177
Aster 89.
Astränze 420.
Astrantie 420.
Atlasbeerbaum 258.
Aufbart **13.**
Augentrost **103.**
Augenwurz 579. **20.**
Augenwurzel 389.
Augenzier 466.

B.

Babyloniſche Weide 387.
Bachbunge 626.
Bachburgel **224.**
Bachtrommel 626.
Backenklee 77.
Badekraut **225.**
Balderbracken 479.
Baldgreis 211.
Baldrian 16.
Baldriane 141.
Baldenkraut **58.**
Ballote 66.
Balſamſtauden 134.
Bandweide 238. 242.
Bangenkraut **36.**
Bärenbeere 258. 273.
Bärenklau 36.
Bärenklaudiſtel 438.
Bärenkraut **14.**
Bärenlauch 254.
Bärenohr 243.
Bärenſchote 395. 458.
Bärentatze 318. 598.
Bärentraube 273.
Bärenwurz 40. 181.
Barbarakraut 72.
Barbenkraut 215. 280.
Barbenkreſſe 215.
Barkhauſie 459.
Bartgerſte 481.
Bartgräſer 112.
Bartgras 18.
Bartſchie 67.
Bartwurz 94.
Baſilienquendel **3.**
Baſtardhafer **81.**
Baſtardklee 263.
Baſtardmohn 302.
Batate **447.**
Batengel 216.
Batzenroſe 434.
Bauernroſe 434.
Bauernſchminke 284.
Bauernſenf 70. 211.
Bauerntabak 481.
Baumpaltſchen 458.
Bazille 36.
Becherblume 100. 284.
Becherblütler 119.
Beerenmiſpel 219.
Beerheide 226.
Beerwinkel 196.
Beifuß 85.
Beilkraut 458.
Beilwicke **494.**
Beinholz 207. 259. 429.
Beinwell 280.
Beinwurz 90. 270.
Benedikte **91.**
Benediktenkraut 403.
Berberize 261.
Berberitzen 147.
Berbesbeere 261.
Bergadonis 219.
Bergahorn 203.
Bergamotte **287.**
Bergheilwurz **7.**
Berghirſchheil **129.**
Berghopfen **39.**
Bergklee 266.
Berglinſe **178.**
Bergmaßlieben 89.
Bergmännchen 185. 220. 330.
Bergmeliſſe **3.**
Bergpeterſilie **20. 129.**
Bergrohr 408.
Bergſanikel **224.**
Bergſeſel **152.**
Berle **235.**
Bermudagras **81.**
Berſtkraut **36.**
Berteree 453.
Bertram **268.**
Bertramgarbe **268.**
Bertramwurz 87.
Berufkraut 89. 251. 318. 453. **87. 93.**
Beſchreikraut 251. 453. **93.**
Beſenbeifuß **109.**
Beſenginſter 252.
Beſenheide 49. 402.
Beſenkraut 252.
Beſenpfriemen 252.
Beſenſtrauch 76.
Bethlehemsſtern 208.
Betonie 66.
Bettlerſeil 431.
Bettlerskraut 277.
Bettlersläuſe 485. **41. 70.**
Biberklee 365. 392.
Bibernell **35.**
Bibernelle 284. **29.**
Biberwurz **43.**
Bickbeere 249.
Bienenblümchen 240.
Bienenheide 402.
Bienenklee 289.
Bienenkraut **38.**
Bienenneſt 363.
Bienenſaug 64. 202.
Bienſauge 251.
Bifolie 177.
Bigarrade **288.**
Bilſe 430.
Bilſenkraut 30.
Bilſenkräuter 128.
Bingelkraut 104.
Binſe 47.
Birke 99.
Birkwurzel **501.**
Birnbaum 59. 196.
Birnkraut 249. 392.
Biſamdiſtel **67.**
Biſambiazinte 212.
Biſamkraut 50. 176.
Biſammalve 515.
Biſchofshut 226.
Bitterdiſtel **91.**
Bitterich **52.**
Bitterklee 29. 365.
Bitterkraut. 82. **52.**
Bitterkreſſe 200.
Bitterling 49. **52. 162.**
Bitterlinge 151.
Bitterſüß 430.
Blaſenbaum 430.
Blaſenkirſche 430.
Blaſenklee 609.
Blaſennuß 268.
Blaſenſchötchen 69.
Blaſenſenne 437.
Blaſenſtrauch 78. 437.
Blattkohl 194.
Blattkraut 194.
Blaubeere 249.
Blaue Elſter 422.
Blauer Heinrich 409.
Blaugras **15.**
Bleiwurz **323.**
Blende **89.**
Blumenbinſe 631.
Blumenbohne 649.
Blumengras 201.
Blumenkohl 194.
Blumenrohr 631.
Blumenſchwertel 631.
Blumenſimſe 47.
Blutauge 440.
Blutbohnenbaum 321.
Blutkraut 546. **55.**
Blütenaſche 14. 247.
Blütenſchraube **356.**
Bluthirſe 442.
Blutkraut 266.
Blutnelke 261.
Blutsſchierling **36.**
Blutströpfchen 303. 409. 453. 487.
Blutwurzgänſerich 404.
Bocksauge **241.**
Bocksbart 82. 220.

Bocksbeere 258.
Bocksbohne 365.
Bocksdorn 395. 432.
Bockbaraklee **40.**
Bocksborn 457. 482.
Bockskraut 461. **5.**
Bocksmelde **49.**
Bockspetersilie **35.**
Bocksriemenständel 269.
Bockswurz **2.**
Bogenbaum 224.
Bohne 483.
Bohnen 167.
Bohnenbaum 76. 197.
Bohnenkraut 67.
Bolle 648.
Borragineen 131.
Borretsch 28.
Borstengras 15. **54. 81.**
Borstenhirse 19. **54.**
Borstenschwanz 17.
Brabanter Klee 240.
Brachdistel **60. 67.**
Brachklee 477.
Brachrübe 301.
Brackendistel **60.**
Bräsling 277.
Brahm 321.
Bramranke 258.
Brand **9.**
Brandkraut 65. 412. **8. 29.**
Brandlilie 398.
Brandspitzköpfe 139.
Brandspitzköpfige 139.
Braune Mägde 303.
Brauner Hafer 480.
Braunheil 528.
Braunkopfdisteln 138.
Braunrodel 366.
Braunschupper 126.
Braunwurz 68.
Braut in Haren 282.
Brautrose 434.
Brauttreue 402.
Brahe 72.
Brecherbse 301.
Brechhafer 605.
Brein 480.
Breitkölbchen 93.
Breitsame **92.**
Brenndolde 39. **21.**
Brennkraut 608.
Brennnessel 97.
Brennsat **21,**
Brennwurz 251. 277. 608.
Brillenschötchen 69.
Brockenbirke 336.
Bröckelkohl 194.
Brokoli 194.
Brombeere 60.
Brotfruchtbäume 120.
Brotklee 599.
Bruchbeere 353.
Bruchkraut 27. 33. 490.
Bruchweide 209.
Brummelbären 258.
Brunnenkresse 73.
Brunnheilige **252.**
Brustalant **42.**
Brustwurzel 542.
Bubenstral **58.**
Buche 98. 99.
Bucheln 119.
Buchsbaum 97. 186.
Buchweizen **89.**
Buchwinde 443.
Büchsenkraut **259.**
Büchsennelken 159.
Bürstengras 17. 361.
Bürzeldorn 52.
Buffbohne 432.
Bullgraven 353.
Bulliarde 26.
Bullkraut 240.
Bunge 29. 31.
Bunzenkeule 619.
Burgunderrose 434.
Burkhardskraut **57.**
Buschanemone 202.
Buschbohne 484.
Butterampfer **251.**
Butterblätter **251.**
Butterblume 239. **43.**
Butterfäßchen 632.
Butterfaß 608.
Butterklee 365.
Butterkraut 336.
Butterrose 337.
Butterstiel 408.
Butterweckenkraut **236. 251.**
Buxbäume 121.

C.*)

Chausseepappel 183.
Chinakraut **254.**
Christdorn 250. 267.
Christinchenkraut **224. 470.**
Christofskraut 61.
Christusauge 523. **342.**
Christusdorn 410.
Christuslanze **254.**
Christwurz 181. 219.
Christwurzel 198. 582.

D.

Dachwurz **50.**
Danthonie 20.
Darrgras 177.
Dauerklee 456.
Daun **17. 38.**
Deutsche Akmelle **409.**
Deutsche Kappern 239.
Deutsche Luzerne 456.
Deutsche Narde **140.**
Deutscher Bertram **268.**
Deutscher Ingwer 255.
Deutscher Klee 395.
Dickblatt 44.
Dickblätter 161.
Diebesband 644.
Dill 36. 481. 647.
Dingel 94.
Dinkel 480.
Dintenbeere 429.
Dioskoreen 115.
Diosmeen 148.
Diptam 53.
Distel *84.*
Distelpflanzen 137.
Distelsalat 444.
Dochen **500.**
Dockenblätter **236.**
Dotter 287.
Doldengewächse 143.
Doldenkirsche 204.
Döllie 54.
Donnerbart **50.**
Donnerbesen **50.**
Donnerblatt **50.**
Donnerblume 448.
Donnerbohne **50.**
Donnerdistel **60.**
Donnergrün **50.**
Donnerkraut **238.**
Donnernelke 409
Donnernessel 438.
Dopheide 49.
Doppelranke 72.
Dorant 405. **8.**
Dorantwurz 313.
Dornapfel 442.
Dorndisteln 138.
Dorngras 17.

*) Vergl. auch K und Z!

Dornkopf 88.
Dorsche 216.
Dort **81.**
Doft 130.
Dosten 64. 130.
Dotter 69. 287.
Dotterblume 63. 239.
Dottergewächse 154.
Dotterkraut 487.
Dotterweide 238.
Drachenampfer **55.**
Drachenblut **55.**
Drachenblutkraut **238.**
Drachenmaul **211.**
Drachenkopf 65.
Drachenwurz 416. 418.
Dragon **429.**
Dragonbeifuß **429.**
Draftengel 267.
Drehling 93.
Dreborche **356.**
Drehzungenständel 269.
Dreiblatt 395.
Dreinigkeitsblume 542.
Dreifaltigblümchen 249.
Dreifaltigkeitsblümchen 275.
Dreifaltigkeitsblume 460.
Dreikörniger Hafer 480.
Dreizack 47.
Dreizackständel 610.
Dreizahn 20.
Dreschlein 482.
Drosevazeen 157.
Drosselbeere 249. 250.
Drottelblume 268.
Drudenbeere 249.
Drudenblüte 200.
Drudenblume 199.
Drudenfuß 247.
Drüsenglocke 32.
Drüswurz 606.
Dryade 60.
Dulldill 430.
Dukatenröschen 426.
Dünnschwanz 18.
Durchwachs 211. 485.
Dürlitze 207.
Dürlitzen 143.
Dürre Henne **26.**
Dürrwurz 86. **225.**
Dummbart **224.**
Durrah **500.**

E.

Ebereſche 58. 250.
Eberraute **350.**
Eberreis **350.**
Eberritte **350.**
Eberwurz 84.
Echenbaum 224.
Eckerbſe 484.
Edelfichte 273.
Edeltanne 273.
Edelweiß 86. **192.**
Efen 33.
Efeue 143.
Efenwein **35.**
Egelkraut 608. **240.**
Ehrenkranz **132.**
Ehrenpreis 14.
Ehrenpreisler 127.
Eibe 224.
Eibenbaum 224.
Eibiſch 74.
Eiche 99.
Eicheln 119.
Eichenmiſtel 247.
Eichhornſchwanz 446.
Eierblume 195.
Eierbohne 484.
Eierſchale 402.
Einange 52.
Einbeere 50.
Einblatt 269. **144.**
Einkorn 480.
Eiſenhart 68. 453.
Eiſenhut 62.
Eiſenkraut 453.
Eiſenkräuter 129.
Eläagneen 123.
Elend **60.**
Elfklatte 247.
Eline 96.
Eller 97.
Ellern 118.
Elsbeerbaum 258. 268.
Elsbeere 58. 258.
Elſenſtrauch 200.
Elsholzie 66.
Elſterbaum 192.
Emmer 480.
Empetreen 121.
Endivie **285.**
Engelblume 426.
Engelchen 236.
Engelkraut 540.
Engelſteinlein 187.
Engelthierroſe 433.
Engliſche Diſtel **115. 353.**
Engliſcher Spinat **61.**
Engliſcher Weizen 480.
Engliſches Raigras 448.
Entenflott 380.
Entengras 628. **262.**
Entengries 380.
Entengrün 380.
Enzian 132.
Eppich **7.**
Eppig **433.**
Erbſe 78.
Erdapfel **89. 447.**
Erdartiſchocke **447.**
Erdbeerbaum 224.
Erdbeere 60.
Erdbeerklee 609.
Erdbeerſpinat 34.
Erdbirne **89. 447.**
Erdbrot 226.
Erdefeu 197.
Erdgalle 391. **144. 224.**
Erdeicheln 485.
Erdkiefer 494.
Erdkraut **41.**
Erdmandel **41. 330.**
Erdnüßchen **41.**
Erdnuß 485. **330.**
Erdnußkümmel 485.
Erdpfau 412.
Erdrauch 75.
Erdrauche 151.
Erdrübe 216.
Erdſcheibe 29. 226.
Erdſpinnenkraut 405.
Erdweich **37.**
Erle 97.
Erve 78.
Erzengel 202.
Eſche 13. 195.
Eſchenwurz 418.
Eſchlauch 648.
Esdragon **429.**
Eſelsdiſtel 84. **41. 67.**
Eſelsohren 301.
Eſelsohren 255.
Eſparſette 79. 301.
Eſpe 177.
Eſper 301.
Eſſigbaum 647. **286.**
Eſſigdorn 261.
Eſſigroſe 513.
Eſtragon **429.**
Europäiſcher Thee 388.
Eurotie 97.
Evax **502.**
Evenbaum 224.
Ewiger Klee 456.

F.

Fackelbaum 273.
Fackeldiſtel 58. 276.
Fackelkraut **14.**
Fadengriffel 308.
Fadenklee 290.

Fadenkraut 24. 86. **68. 86.**
Fadennarbe **493.**
Färbermeier **24.**
Färberdistel **5.**
Färberresede 452.
Färberröte **34.**
Färberscharte **5.**
Färberwaid 288.
Färberwau 452.
Fahnenhafer 472.
Fahnwicke 78.
Fallkraut 89. 540.
Falsche Akazie 395.
Falsche Quecke **28.**
Falscher Waid 409.
Falsches Fallkraut **225.**
Faltenklee 77.
Faltenohr 38. **496.**
Falzblume 85. 91.
Farbendisteln 138.
Farnkraut 401.
Farsetie 453.
Fasanenkraut **12.**
Fasanenschwanz 432.
Faulbaum 200. 248. 430.
Faule Grete 283. **35.**
Federball **277.**
Federbinse 239.
Federblatt 630.
Federgarbe 630.
Federgras 502.
Federkraut 509. 620. **6. 277.**
Federnelke **114.**
Feenkrönlein 332.
Feigbohne **496.**
Feige 97. 188.
Feigenkaktus 276.
Feigenwarzeneppich 608.
Feigwurzel 177.
Feinstral 89. **53.**
Feldahorn 249.
Feldbazillen **55.**
Feldbeifuß **316.**
Feldenzian **360.**
Felderbse 301.
Feldkalaminte **94.**
Feldkatze **68.**
Feldklee 263. 457. 478.
Feldkresse 453. **56.**
Feldkümmel 477.
Feldlöwenmaul **77.**
Feldmannstreu **60.**
Feldminze **44.**
Feldmohn 298.
Feldquendel **9.**
Feldrante 283.
Feldrose 393.
Feldrüster 196.
Feldsalatbaldrian 213.
Feldsandistel **101.**
Feldtimian 8.
Feldtrespe 281.
Feldwinde 443.
Feldziest **99.**
Felsenbeifuß **225.**
Felsenbirne 59. 219.
Felsenkirsche 222.
Felsenklee **505.**
Felsenlauch **164.**
Felsenmispel 219.
Felsennelke **100.**
Felsenstrauch 30.
Femel 484.
Fenchel 38. 481.
Fennich **54. 81.**
Ferkelkraut 83. 479.
Ferkelkrautgewächse 136.
Ferkelwurz **116.**
Fettgans 336.
Fetthenne 56.
Fettkraut 14.
Fettkräuter 161.
Fettprimeln 126.
Feueräuglein 229.
Feuerblume 298.
Feuerbohne 649.
Feuerkraut 398. **8.**
Feuerlilie 398.
Feuerröschen 453.
Feuerwurz 438.
Fichte 273. 274.
Fichtenspargel 653.
Fieberklee 365.
Fieberkraut 391. **17.**
Filzkraut 412. **68. 86. 291.**
Filzrose 393.
Fimmel 484.
Fingerblätter 165.
Fingergras 17.
Fingerhut 68.
Fingerhutpflanzen 127.
Fingerkraut 60.
Finkensame 287.
Fioringras **28.**
Fischerblume **275.**
Fischkraut 241. 632. **224.**
Fischmelde **49.**
Fischminze **252.**
Fischschwanz 440.
Fisole 484.
Fistelkraut 366.
Flachs 482.
Flachssalat 306.
Flachsseide 653. **291.**
Flachswürger **291.**
Flammenkraut **29.**
Flammenlippe 412.
Flaschenkürbis **91.**
Flatterrüster 176.
Flechtgras **28.**
Fleischblume 200. 261.
Fleischerbesen 178.
Fleischkraut 436.
Fleuchteufel **5.**
Flieder 14. 207.
Fliederblütler 129.
Fliegenbaum 196.
Fliegenblümchen 263.
Fliegenblume 93.
Fliegenfalle **250.**
Fliegenkirsche 259.
Flinkerchen 596.
Flittergras 596.
Flitterschmiele 406.
Flockenblume 91.
Flöhkraut **36. 354.**
Flohknöterich **16. 36. 236.**
Flohkraut 90. **224.**
Flohkrautalant **224.**
Flohpfeffer **236.**
Flohsame 425.
Flügelerbse 461.
Flughafer 472.
Flunkergras 502.
Flurziest **99.**
Flußampfer **251.**
Föhre 273.
Förge 273.
Forche 273.
Fransenbinse **249.**
Fransenkante **379.**
Franzosenkraut **86.**
Französisches Raigras 429.
Franzweizen **89.**
Frauenbiß 494. **51.**
Frauenblatt **45.**
Frauenblümchen **144.**
Frauendistel **41.**
Frauenfenchel 481.
Frauenflachs **39.**
Frauenkraut **189.**
Frauenmantel 25.
Frauenrose 434.
Frauensäckel 258.
Frauenschühlein 439.
Frauenschuh 95. 541.
Frauenspiegel 485.
Freibeutelige 140.
Freisamkraut 275.
Freudenkraut 479.
Freyere 41.
Friedlos 29.
Froschbiß 104.
Froschdistel **52.**

Froschkraut 241. 632. **52.**
Froschkräuter 147.
Froschlattich 629.
Froschlöffel 48.
Froschpeterlein **235. 250.**
Froschpfeffer 608.
Froschtatze 214.
Froschwegerich 418. 630.
Früheiche 199.
Frühkraut 194.
Frühlingsknotenblume 173.
Fuchsbaum **90.**
Fuchsbeere 258.
Fuchs
Fuchsrose 433.
Fuchsschwanz 16. 440. 441.
Fuchstraube 254. 443.
Fuchswedel 277.
Fünfaderkraut 442.
Fünfblatt 60. 440.
Fünffingerkraut 262.
Fünfling 56. **107.**
Furmannsblume **108.**
Futterklee 395.
Futterwicke 300.

G.

Gagel 102.
Gageln 118.
Galatelle 89.
Galinsoge 90.
Gamander 65. 259.
Gamswurzel 634.
Gänseblümchen 87. 171.
Gänseblume 87. 286. 414.
Gänseblumen 140.
Gänsedistel 81. 444. **101.**
Gänsefingerkraut 286.
Gänsefuß 34.
Gänsekohl 252.
Gänsekraut 286.
Gänsekrautgewächse 153.
Gänsekresse 72. **2. 235.**
Gänsekropf 87. **100.**
Gänserich 286.
Garbe **12.**
Garbenkraut **12.**
Gartenampfer **61.**
Gartenbohne 484.
Gartengleiße **35.**
Gartenhahn **350.**
Gartenkerbel 260.
Gartenkohl 194.
Gartenkresse 436.
Gartenkürbis **91.**
Gartenlattich **285.**
Gartenlauch 648.
Gartenmelde **57.**
Gartenmichel **90.**
Gartennelke 463.
Gartenquendel 648.
Gartenrettich 648.
Gartenrose 434.
Gartensalat **66.**
Gartenschierling **35.**
Gartentimian 648.
Gaspeldorn 184.
Gauchbart 459.
Gauchhafer 462.
Gauchheil 29. 31.
Gauchklee 196.
Gauchnelke 261.
Gaude 452.
Gaudinie 22. 605.
Gaye **210.**
Gebauter Hafer 480.
Gebirgsklapper **160.**
Gedenkemein 203
Geduldskraut **61.**
Geelradl 361.
Gegenstoß **54.**
Geilwurz 93. 274.
Geisbart 392. 399.
Geisblatt 254.
Geisblatte 142.
Geisblattgewächse 142.
Geisblume 608.
Geisfuß 391.
Geisklee 197. 461.
Geiskleegewächse 166.
Geiskräuter 166.
Geisraute 76. 78.
Gelasie 82.
Gelbdistel **238.**
Gelber Lakei 292.
Gelbe Rose 433.
Gelbe Rübe 451.
Gelber Wegwart **11.**
Gelbholz 647.
Gemeiner Hafer 480.
Gemsewurzel **58.**
Gemskraut 313.
Gemswurz 89.
Gemswurzel 342.
Gemüsekohl 194.
Gemüselauch **83.**
Georginischer Hafer 480.
Gerbersumach **286.**
Germer 47.
Gerste 18. 19.
Gerstenhafer 480.
Gespenst 653.
Gichtkraut 52. 401. 608. **224.**
Gichtrose 197.
Gichtrübe 438.
Gideon **240.**
Giersch 38. 391.
Giftbeere **503.**
Gifthahnenfuß 608.
Giftlattich **155.**
Giftmilcher 120.
Giftsalat **155.**
Giftsumach 400.
Giftwicke 458.
Giftwüterich 606.
Giftwurzel **35.**
Gilbbeere 314.
Gilbkraut 452. **5.**
Gilbweiderich 391. 596.
Gimpelbeere 429.
Ginster 76. 166.
Gipskraut 53.
Glanz **88.**
Glanzdisteln 139.
Glanzgras 17. 627. **88.**
Glanzpetersilie **35.**
Glanzschmellen 439.
Glaskirsche 179.
Glaskraut 25.
Glasschmalz 13.
Glasweide 209.
Glatthafer 472.
Gleiße 38.
Gliederhülsengewächse 166.
Gliedermelden 123.
Gliedkraut 65. 66. 248. 453.
Gliedweich **37.**
Glockenblume 32.
Glockenblumen 135.
Glockenblümler 135.
Glockenheide **162. 389.**
Glücksmännchen **58. 246.**
Gnadenkraut 14.
Gnadenkrautgewächse 127.
Godeskraut **96.**
Goldäpfel 149.
Goldblume 414. **43.**
Golddistel 80.
Golddisteln 137.
Goldgras 319.
Goldgünsel 252.
Goldhafer 446.
Goldholz **286.**
Goldkraut 211.
Goldklee 289. 404. 457.
Goldköpfchen 312.
Goldlilie 398.
Goldlack 71. 292.
Goldmilz 224.
Goldnessel 66.
Goldregen 197.

Goldröschen 412.
Goldrute 89.
Goldsteinbrech 224.
Goldstern 46. 208.
Goldveilchen 224.
Goldwurz 392. **224.**
Goodyere 94.
Gottesgnadenkraut **224.**
Gotteshand **12.**
Gottesheil **62.**
Gottesbölzchen **350.**
Gottesbut 425.
Gottesvergeß 435.
Gottvergessen **39.**
Götzenholz 177.
Granate 58. 433.
Gränke 338.
Grannenhirse 17. 19.
Grannenhirsegras 18.
Grasblume 463.
Grasgilgelein 405.
Graskecher 300.
Graslilie 405.
Grasnelke 43. 451. **104.**
Grasstern 390.
Graswurzel **81.**
Grauerle 227.
Graukresse 69. 453.
Graumantel 608.
Grauvappel 177.
Grausenf 73.
Grauweide 192.
Green 436.
Gregorie 29.
Grensing **12.**
Gretel im Grünen 282.
Griechisches Heu 482.
Griken **89.**
Grindkraut 211.
Grindwurz **13. 55.**
Großbatengel 388.
Großer Heinrich **42.**
Großmuttererbse 649.
Grundbirne **89.**
Grundfeste 81.
Grundfestkräuter 136.
Grundheil 388. **129.**
Grüblinge **89.**
Grünling 95.
Grünsaftler 121.
Guineakorn **500.**
Gundelrebe 66. 197.
Gundermann 197.
Güldenkreuzkraut 260.
Güldenwundkraut 251. **6.**
Günsel 65.
Günseln 131.
Gurke 101. **91.**
Gurkenkraut 647.
Gutberat 630.
Guter Heinrich 450.

H.

Haberwurz 384.
Habichtskraut 81.
Hachelkopf **15.**
Hackenschar 450.
Hacquetie 35.
Haden **16. 89.**
Haderlos 596.
Hadernessel 438.
Händelwurz 367.
Hängebirke 198.
Hänsel am Weg **55.**
Hafer 20.
Haferdistel **67.**
Haferpflaume 246.
Haferschlehe 246.
Haferwurz 82. 363. 459.
Haftdolde 41.
Hagebuche 199.
Hagebutte 410.
Hagedorn 250.
Hagfeirebe **29.**
Hahnebutten 410.
Hahnenfuß 63.
Hahnenfußgewächse 146.
Hahnenkamm 301. 362. 366. 493. **409.**
Hahnenklöße **466.**
Hahnenkopf 262. 453.
Hahnensporn 197. **79.**
Hainampfer 392.
Hainbuche 98. 199.
Hainsimse 400.
Hakquetie 35.
Halbgräser 111.
Halbheiden 133.
Halbpferd **55.**
Halimus **426.**
Halskraut 409.
Hammerwurz 582.
Händelkraut 182.
Hanf 103.
Hanfblume 653.
Hanfnessel **17. 38.**
Hanftod 652. 653. **38.**
Hangelweide 387.
Harblume 85. **341.**
Hargras 19. 22. **28.**
Hariger Mann 330.
Harkelkraut 258.
Harlekin 356.
Harnischkraut 214.
Harstrang 35. **20.**
Hartgras 309.
Harthen 5.
Hartheugewächse 150.
Hartkraut **350.**
Hartriegel 207. 429. 430.
Harzbirke 198.
Hasel 172.
Haselnuß 172.
Haselstrauch 98. 172.
Haselwurz 57. 179.
Hasenbram 257.
Hasenbrötchen 596.
Hasenklee 318. 477.
Hasenkohl 196. 414.
Hasenlattich 80. 82.
Hasenlöffel 630.
Hasenohr 37.
Hasenöhrchen 37. **66.**
Hasenscharte 598.
Hasenstrauch 252.
Hauhechel 75.
Hausampfer **506.**
Hauslaub **50.**
Hauslauch 57. **50.**
Hausmark **160.**
Hausminze **266.**
Hauswurz **50.**
Hauswurze 161.
Hechtstuhl 629.
Heckenisop **224.**
Heckenkirsche 259.
Heckenknöterich **37.**
Heckenrose 410.
Heckensame 76. 184.
Heckenwicke 401.
Hederich 72. 487.
Heide 49. 402.
Heidekorn 443.
Heidekraut 402.
Heidelbeere 49.
Heidewegtritt **16. 89.**
Heidekorn **89.**
Heidel **16. 89.**
Heiden 133.
Heidenelke 409.
Heideschnuck 252.
Heidesegge 150.
Heidnisch Wundkraut 635. **6.**
Heil aller Schäden 256.
Heil aller Welt 181. 403.
Heiland **7.**
Heilandsdistel **52.**
Heildistel 91. **91.**
Heilender **7.**
Heiligegeistwurzel 270.
Heiligenpflanze **505.**
Heilkraut 598.
Heilwurz 40. 579. **68.**
Heiternessel 438.
Helenenkraut **42.**

Hellerkraut 69. 211.
Hellerkräuter 154.
Helmbusch 197.
Helmkraut 64.
Helmminzen 130.
Helmwurz 206.
Hemdbeutel **466.**
Herbstblume **466.**
Herbstzeitlose **466.**
Herkuleskeule **91.**
Herkuleswurz 632.
Herre 338.
Herrenblümchen **144.**
Herrenkohl 194.
Herrenzippel 215.
Herrenschmuck **5.**
Herrgottschuh 439.
Hergottschuhelein 318.
Herrgottsfleisch 261.
Herrgottslöffel **240.**
Herrgottsrückenkraut **12.**
Herzblatt **144.**
Herzblümchen **144.**
Herzblümelein **54.**
Herzenbleiche **224.**
Herzengleich **224.**
Herzenstrost **38.**
Herzgespann 427.
Herzkohl 194.
Herzkraut 427.
Herzkirsche 179.
Herzrösel 208.
Herzwurz 176.
Heublume 448.
Hexenbesen 247.
Hexenkraut 14. 251. 389. **5.**
Hexenmilch 445.
Hexenstrang 227. **29.**
Hexenzwirn **29.**
Hildebrand **7.**
Himbeere 251.
Himmelblau 311.
Himmelbrand 272.
Himmelfartsblume 262.
Himmelsblümelein 227.
Himmelsbraud **14.**
Himmelsbrot 247.
Himmelsgerste 481.
Himmelshaken 653.
Himmelskehr **42.**
Himmelskraut **14.**
Himmelskuh **42.**
Himmelsleiter 30. 431.
Himmelslilie 291.
Himmelsschlüssel 195.
Himmelsschwade **81.**
Himmelsstern 236.
Himmelsthau 247.
Hirschauge **20.**
Hirschbaum 617.
Hirschbirne 220.
Hirschbrunst 226.
Hirschdorn 248.
Hirschdost **238.**
Hirschgras **16.**
Hirschgünsel **238.**
Hirschhar 361.
Hirschholder 203. 249.
Hirschhorn **56.**
Hirschhornsumach 647.
Hirschkolbensumach 647.
Hirschkraut 430. **20.**
Hirschmelde **15.**
Hirschmorelle **20.**
Hirschpetersilie **20.**
Hirschsprung 461.
Hirschsprungkräuter 160.
Hirschweichsel **1.**
Hirschwundkraut 482. **238.**
Hirschwurz 39. **7.**
Hirschzunge 416.
Hirse 19. 480.
Hirsegras 18.
Hirsenfennich 418.
Hirsengras 255.
Hirtennadel 278.
Hirtentäschelkraut 171.
Hirtentasche 171.
Hochmut 392.
Höswurz 367.
Hohldotter 70. 454. 487.
Hohlrippe 41.
Hohlzahn 66. **84.**
Holler 207. 249.
Holunder 42. 207. 249.
Holunderblütige 142.
Honigbeere 251.
Honigblümchen **108.**
Honigblume **38.**
Honiggras 19. 247. 604.
Honigklee 263. 289. 457.
Honigmelisse 251.
Honignesseln 130.
Honigthau 247.
Honkeneje 54.
Hopfen 103.
Hopfenbuche 98.
Hopfenfilzkraut 653.
Hopfenklee 263.
Hopfenseide 653. **291.**
Hopfenwolle 653.
Hoppee 89.
Hornbaum 199.
Hornblatt 99. **419.**
Hornblattgewächse 117.
Hornklee 176.
Hornköpfchen 63. 183.
Hornkraut 56.
Hornkümmel 298.
Hornmohn 61.
Hornnelken 159.
Hornstrauch 430.
Hosenbunte **466.**
Hosenlatz 541.
Hufeisenklee 79. 290.
Hufklee 290.
Huflattich 88. 173.
Huflattiche 140.
Hügelmeier **59.**
Hühnerbiß **37.**
Hühnerdarm 207.
Hühnerfußgras **57.**
Hühnergift **37.**
Hühnerhirse **79.**
Hühnermilch 208.
Hühnertraubchen 452.
Hühnerwurz 266.
Hülsen 267.
Hülsengewächse 165.
Hugueninie **501.**
Hukwurzel 409.
Hundebeere 223.
Hundekot 361.
Hundemilch **103.**
Hundertkopf **60.**
Hundsauge **42.**
Hundsbaum 248.
Hundsbeere 259.
Hundsblüte **225.**
Hundsdistel **100.**
Hundsdürlitzen 430.
Hundsgerste 448.
Hundsgift **250.**
Hundsgras 408. **28.**
Hundshar 239.
Hundskamille 87. 445. **100.**
Hundskohl 445. **250.**
Hundskopf **77.**
Hundskürbis 438.
Hundslattich 83.
Hundslauch 254.
Hundsläufte 459
Hundsmelde 450.
Hundsnase **39.**
Hundsnelke **37.**
Hundspeterlein **35.**
Hundspetersilie **35.**
Hundsrauke 72.
Hundsrippe 442.
Hundsrose 410.
Hundsseich 436.
Hundsstrauch 430.
Hundstod 35. **250.**
Hundsveilchen 202.
Hundsweizen 398. **9.**
Hundswolle **250.**

Hundswürger **35.**
Hundswurz 265.
Hundszahn 17. 46. 188. 408.
Hundszahngras
Hundszorn **115. 353.**
Hundszunge 28. 449.
Hungerblümchen 71. 173.
Hungerblume 173.
Husarenkraut 409.
Hutchinsie 70.
Hutschepatsch 410.
Hydrille 640.

J.

Ibisch 74. **44. 64.**
Ibische 149.
Igelklette **70.**
Igelkolben 96.
Igelkopf 620.
Igellock **419.**
Igelnüßchen 449.
Igelsame 28.
Igelsknospe 620.
Igelskolbe 620.
Igelskraut 620.
Igelsnuß 442.
Immenblatt 251.
Immenblätter 130.
Immergrün 195.
Immerschön 402.
Immerschönkraut 402.
Immortelle 86. **108.**
Imperate **503.**
Indische Sonne **73.**
Irideen 115.
Irrbeere **1.**
Isnardie 25.
Isenbaum 224.
Isope 130.
Italisches Raigras **224.**
Ivenkraut **102.**

J.

Jakobskraut 6.
Jakobskreuzkraut **6.**
Jasione 31.
Jasioneen 135.
Jasmin 276.
Jasminblütler 129.
Jasmineen 128.
Jasonsblume 31. 33.
Jehovablümchen 541.
Je länger je lieber 260.
Jerichorose 260.
Jerusalemsgerste 481.
Jesusblümchen 275. 541.
Jesushand 367.
Jesuswurz- **68.**
Johannisbeere 33.
Johannisblume **9. 94.**
Johannisblut 305. **5.**
Johannisgürtel **42.**
Johanniskerze **14.**
Johanniskraut 80. 390. 408.
Johannisredel 399.
Josefsblume 363. 459.
Josefsstab 276.
Judendorn 645.
Judasbaum 53.
Judassilberling 256.
Judendeckel 430.
Judendorn 32. 645.
Judenfeder 239.
Judenhütlein **15.**
Judenkirsche 31.
Judenkricken 442.
Judenruten 252.
Jüngling **108.**
Jungfer im Grünen 282.
Jungferkraut **42.**
Jungferaugenbrauen **12.**
Jungfernblüte **240.**
Jungferngras 201.
Jungfernnabel 541.
Jungfernnelke 409.
Jungfernrebe **35.**
Jungfernrose 434.
Jungfernschön 254.
Jungfernweck **116.**
Jungfernwein **35.**
Junggesellenknöpfe 424.
Junkagineen 113.
Junkerblume 227.
Junkerholz 259.
Junothränen 453.
Jurinie 83.

K.

Kaffeestrageł 483.
Kälberkern **36.**
Kälberkropf 38. 391.
Kälberscheere 408.
Käsbeeren 232.
Käsekraut **285.**
Käskohl 194.
Kaiserblume **37.**
Kaiserkrone 46.
Kaisersalat **429**
Kaiserwurz 420. 538.
Kakteen 164.
Kalbsblume **94.**
Kalbsisop **285.**
Kalbskümmel **285.**
Kalbsnase 476. **77. 93.**
Kalbszwiebel **285.**
Kalenderkraut 494. **51.**
Kalepine 71.
Kalikraut **263.**
Kalmus 45. 47.
Kameelheu 631.
Kamferbeifuß **452.**
Kamille 479.
Kammgras 21.
Kanariengras **88.**
Kanarienhirse **88.**
Kanariensame **88.**
Kannenblume 276. 450. 631.
Kapperngewächse 156.
Kappenblume 538.
Kappern 61.
Kapselheiden 133.
Kapuzinerzipfel **15.**
Karden 141.
Kardobenedikte **91.**
Karfiol 194.
Karlsdistel **115. 353.**
Karotte 451.
Karthäuserblume **37.**
Karthäusernelke 261.
Kartoffel **88.**
Käseblume 171. 414.
Käsepappel 437.
Kaspern 232.
Kastanie 98.
Katarinenblume **39.**
Katzenauge 202. 206.
Katzenblut 453. **73.**
Katzenbuckel 389.
Katzendälpli **192.**
Katzeneier 269.
Katzengerste 448.
Katzengesicht 285. **38.**
Katzenhall **259.**
Katzenhelm **259.**
Katzenigel **409.**
Katzenklee 477.
Katzenkorn 360. 448.
Katzenkraut 435. **9.**
Katzenliebe 435.
Katzenmelisse 435.
Katzenminze 67. 435. **9.**
Katzenminzen 130.
Katzennessel 435.
Katzenpeterlein **35.**
Katzenpfötchen 87. 426. 477. **108.**
Katzenpfote **14.**
Katzenschwanz 65. **259.**
Katzensperre 456.
Katzensteert **259,**
Katzenwedel **259.**

Katzenwurzel 389.
Katzenzagel **259.**
Kaulinie 95. 639.
Keilmelde **426.**
Kellerhals 172.
Kerbel 40.
Kermesbeere **90.**
Kermeseiche **496.**
Kernobst 165.
Kerzenwollkraut **59.**
Kerze ohne Licht **19.**
Keuschbaum **121.**
Kibitzei 190.
Kibitzfett 336.
Kicher 78.
Kichererbse 483. **41.**
Kicherling 302.
Kiefer 273.
Kienporst 377.
Kirsche 178.
Kirschpflaume 245.
Klanglein 482.
Klapper 67. 493.
Klappernuß 268.
Klapperrose 298.
Klappertopf 362. 493.
Klatschmohn 298. 302.
Klatschrose 298.
Klauenschote 273.
Kleben **291.**
Kleber **28.**
Klebkraut **28.**
Klebnelke 54. 286.
Klee 77.
Kleeartige 166.
Kleiderbaum 387.
Kleiner Dorant **77.**
Kleiner Mohn 302.
Kleinglocken 443.
Kleingriffel 417.
Kleinling 23.
Klein Wodendung **36. 250.**
Klette 83.
Klettenkerbel 40.
Kletterklee **495.**
Klingender Hans 493.
Klumptöpfchen 337.
Knabenkraut 92.
Knackelbeere 277.
Knackererbse 484.
Knackrose 298.
Knackweide 209.
Knäuel 53.
Knäuelgras 21.
Knautie 448.
Knicker **55.**
Knieholz 350.
Knoblauch 648.
Knoblauchsheberich 72. 202.
Knoblauchkraut 202.
Knoblauchsranke 202.
Knollen **89.**
Knollenkraut 78.
Knopfnelke **61.**
Knörich 55. 486.
Knörpel 452.
Knörrich **225.**
Knorpelblume 27. 30. 33.
Knorpelkraut 16.
Knorpelkräuter 124. 160.
Knorpelsalat 81. **11.**
Knorpelsalate 136.
Knotenblume 45.
Knotenfuß 46.
Knotenkraut 463.
Knöterich 49.
Knöteriche 123.
Kobresie 96.
Kölerie 21.
Kölle **285.**
Königsbrand **14.**
Königskerze 449. **7. 19.**
Königskerzen 128.
Königslein 482.
Köpernikel 536.
Kohl 72.
Kohldistel **238.**
Kohlgewächse 153.
Kohlrabi 194.
Kohlreps 215.
Kohlrübe 216.
Kohlsat 215.
Kolbengras 360.
Kolbenrohr 619.
Kolbensumach 647.
Kolchiazeen 113.
Kollomie **501.**
Kolza 215.
Konradskraut **5.**
Kopfgras **248.**
Kopfklee 395.
Kopfkohl 194.
Kopfkraut 194.
Kopfsalat **285.**
Kopfständel 94.
Kopfweide 209.
Korallenwurz 94.
Korbblütler 135.
Korbweide 242.
Koriander 41.
Korkeiche **496.**
Korkulme 176.
Korn 481.
Kornblume 304. 475.
Kornelle 25. 207.
Kornellkirsche 25. 207.
Kornelinskirsche 430.
Kornflockenblume 304.
Kornrade 475.
Kornröslein 475.
Kornrose 475.
Kortuse 29.
Krachmandel 195.
Kraftkraut **68.**
Kraftwurz 313.
Kragenblume 85. **6.**
Krähenbeere 226.
Krähenfuß 71. 211. **56 242.**
Kräutlein Schabab 282.
Krallenklee 273.
Krambeere **241.**
Krampfdistel **41.**
Krampfkraut 399.
Kranichbeere 615. **241.**
Kranichschnabel 211.
Kranzrade 656.
Krapp 24. **34.**
Krappe 141.
Kratzbeere 258.
Kratzdistel 84.
Krauseminze **46. 266.**
Krausdistel **60.**
Krautrübe 216.
Krebsblume **96.**
Krebsdistel **41.**
Krebskraut 305.
Krebsscheere 621.
Krebsweide 242.
Krebswurz 416.
Kresse 70.
Kressenkräuter 154.
Kreuzbeere 248.
Kreuzblatt 24.
Kreuzblume 75. 367.
Kreuzblütige 152.
Kreuzblütler 152.
Kreuzdorn 248.
Kreuzenzian 513.
Kreuzholz 247.
Kreuzkraut 86. 88.
Kreuzraute **164.**
Kreuzspinne 265.
Kreuzwurz 211. **91.**
Kriechen 246.
Krötenbalsam **252.**
Krötenbiß **277.**
Krötendille **100.**
Krötenflachs **37.**
Krötenbaus 380.
Krötenkraut 394. 463.
Krötenminze **252.**
Krötenpeterlein **35.**
Kronbeere 272.
Kronenbeere. 353.

Kronenkraut 42. 51.
Kronjasmin 276.
Kronwicke 79. 458.
Kronwickengewächse 166.
Krümling **11.**
Krummhals 28. 285.
Krummholztanne 350.
Krupine 91.
Küchenschelle 185. 220.
Küchenzwiebel 648.
Kugelbinse **233.**
Kugelblume 23.
Kugelblütler 125.
Kugelbohne 484.
Kugeldistel 92.
Kugeldistelu 139.
Kugelnessel 445.
Kuhblume 81. 239.
Kuhdill **42.**
Kuhdille 479. **100.**
Kuhkraut 445. **37.**
Kuhmaul 598.
Kuhnelke 54.
Kuhpastinak 598.
Kuhpeterlein 408.
Kuhschelle 185. 220.
Kuhseifenkraut **37.**
Kuhthecke 249.
Kuhweizen 476.
Kuksblume 200. **251.** 252. 261. 610.
Kuksgünsel 252.
Kukkshafer 462.
Kukumer **91.**
Kukurbitazeen 121.
Kümmel 37.
Kummer 173.
Kunigundenkraut **238.** **409.**
Kürbis 101.
Kuskussu **500.**

L.

Lakkraut 24.
Laichkraut 26.
Lämmerbüschen 477.
Lämmerklee 289.
Lämmerlattich **66.**
Lämmersalat 80. 213. 411. **98.**
Lämmerschwanz **12.**
Lamarckie **498.**
Lammkraut **98.**
Landreitgras **33.**
Landschilf **33.**
Landsknecht **67.**
Lanzettdistel 460.
Lappenblümler 152.
Lappenblume 25.
Lappenkelch 34.
Lärche 223.
Lärchennelke 558.
Lärchentanne 223.
Läusekörner **502.**
Laserkraut 37.
Laische 350.
Lattich 81.
Lattiche 136.
Lauch 45.
Lauchhederich 202.
Läuchel 202.
Lauchzwiebel 647.
Laugenblume 85.
Laurineen 122.
Läusegras 475.
Läusekraut 68. 181.
Lavatere 74.
Lavendel 64. **140.**
Lavendelheide 244. 338.
Leberbalsam 68.
Leberblümchen 63. 176.
Leberdistel 441.
Leberklette 410.
Leberkraut 176.
Leckenstaude 350.
Leckermaul 39. **210.**
Ledigblume 282.
Leersie 18.
Legföhre 350.
Lehmmistel 247.
Leichenkraut 626.
Leimkraut **157.**
Lein 43. 482.
Leinblatt 27.
Leingewächse 150.
Leindotter 287.
Leinkraut 68. **341.**
Leinseide **291.**
Leinwolle **291.**
Lenne 196.
Lentibularien 126.
Leopardenwürger 313. **58.**
Lerchenblume 195.
Lerchenklaue 298.
Lerchensporn 75. 197. 465.
Levkoje 71. 193.
Lichtblume **466.**
Lichtnelke 55. **157.**
Lichtnelken 159.
Lidweich 256. **37.**
Liebäugel 285.
Liebäuglein 466.
Liebesgras 21. 596.
Liebeskraut **5.**
Liebfrauengras 604.
Liebstöckel 36. **210.**
Liesch 619.
Liesche 113.
Lieschgras 17.
Liguster 14.
Lilak 207.
Lilie 46.
Liliengewächse 114.
Lilium konvallium 249.
Limette **287.**
Limone **287.**
Linde 61.
Linden 149.
Lindernie 68.
Linnäe 68.
Linse 484.
Linsenbaum 437.
Linsenerve 413.
Linsenwicke 487.
Lippenblümler 129.
Lloydie 46.
Lobelie 31.
Lobelien 135.
Lobularie **502.**
Löchersame 42. 486.
Lochschlund 68.
Löffelblume 202.
Löffelkraut 69. 177. 350.
Löffelkresse 350.
Löffelkräuter 113.
Lolch 22.
Lolchtrespe 22. 605.
Löwenfuß 254. **192.**
Löwenmaul 68. **39.** **93.**
Löwenmaulgewächse 128.
Löwenschwanz 65. 427.
Löwenzahn 82. 181.
Löwenzahngewächse 137.
Lolchtrespe **6.**
Lonizere 32.
Lorbeer 51.
Lorbeerbaum 193.
Lorbeerweide 210.
Lotwurz 28.
Lungenblume **398.**
Lungenenzian **398.**
Lungenkraut 28. 195.
Lupine **496.**
Lupinenklee 407.
Luzerne 456.
Luzernewürger **431.**

M.

Mädesüß 60. 392. 399.
Mägdehülle **6.**
Magenklee 365.
Magenstärk **139.**
Magenwurz 255. 618.
Mahalebkirsche 204.
Maibirke 198.

Maiblume 46. 229. 249.
Maiglöckchen 249.
Maililie 249.
Majoran **429.**
Mairübe 301.
Mais 96. 484.
Malabaile 41.
Malkolmie **493.**
Maludenwurz **147.**
Malve 74.
Mandel 58. 194.
Mangold 34. **89.**
Mannaesche 247.
Mannagras 628. **262.**
Mannaschwingel 628.
Mannelgrannengras 429.
Männerkrieg **42.**
Männertreu 259.
Mannsharnisch 292.
Mannsschild 29.
Mannsschildprimeln 126.
Mannstreu 35. **353.**
Marbel 47.
Marenklatte 247.
Marentakken 430.
Maressig 436.
Margaretenkraut **12.**
Margaretennelke 261.
Margaretenröslein 303.
Margendreher 263.
Mariamagdalenenblume **140.**
Marienblatt **45.**
Marienblume 414.
Marienbistel 83. **52.**
Marienflachs **39.**
Marienglöckchen 249.
Mariengras 1. 297. 502. 604.
Marienhandschuh 425.
Marienhirse 604.
Marienkelchglas 443.
Marienkraut **111.**
Marienmantel 254.
Mariennessel 435.
Marienpalm **241.**
Marienpalme 615.
Marienrädchen 424.
Marienschuh 541.
Marienschlüsselbund 186.
Mariensiegel 254.
Marienstrauch **241.**
Marienthränen 284. 367.
Marientröpfchen **114.**
Marienwurzel 389.
Marterdorn 434.
Marterrose 410.
Märzblümchen 176. 180.
Märzveilchen 179.
Masbeere 250.
Maserbirke 198.
Maßeller 249.
Maßholder 249.
Maßliebchen 171.
Maßliebe 414.
Maßsüßel 311.
Mastixbaum 224.
Mastkraut 26. 297.
Matronale 278.
Matthiole 193.
Mauergerste 448.
Mauerkraut **34.**
Mauerkresse 436.
Mauerlattich **5.**
Mauerpfeffer 452.
Mauerschierling **36.**
Maulbeerbaum 97.
Maulbeerbäume 120.
Maulwurfskraut **70.**
Mäusebrot 177.
Mäusedarm 171.
Mäusedorn 106.
Mäusegerste 448.
Mäusegras 215.
Mäusehafer 462. 472.
Mäuseholz 430.
Mäusekraut **68.**
Mäuseöhrchen 474.
Mäuseohr 426.
Mäusepfeffer **1.**
Mäuseschwänzchen 63.
Mäuseschwanzgras 20.
Mausweizen 448.
Meerbinse **261.**
Meergries 284.
Meerkohl 71.
Meerlinse 380.
Meerrettig 436.
Meersenf 71.
Meersenfgewächse 155.
Meersträubel 105.
Meerstrandsbeifuß **476.**
Meerstrandserbse **282.**
Meerstrandswinde **280.**
Meerträubchen 105.
Meerzwiebel 46.
Mehlbeere 250. 268.
Mehlbirnbaum 268.
Mehlfäßchen 250.
Mehlgras 247.
Mehlhalm 247.
Meier 297.
Meierkraut 408.
Meiran **429.**
Meisterwurz 35. 538.
Meisterwurzel 420.
Melde 98.
Meldengewächse 123.
Melilotengras 319.
Melilotenklee **40.**
Melisse 64.
Melissen 130.
Melkkraut **152.**
Melone **286.**
Menderle
Menschenblümchen 338.
Merk 38.
Merkurblut 453.
Merkurkraut 445.
Michaelsblume **466.**
Michelwurz **466**
Miere 55.
Mikromerie **504.**
Milchblume 196. 203.
Milchblume 262.
Milchdieb 202.
Milchdistel **52.**
Milchdisteln 138.
Milche 414.
Milchglöckchen 450.
Milchkraut 27. **68.**
Milchkräuter 121.
Milchlattich 81.
Milchsaft-Korbblütler 136.
Milchwurz 280.
Milchstern 46.
Milenz 19.
Milzkraut 50.
Minze 66.
Mirikarie 578.
Mirrhenkerbel 267.
Mirte 58.
Mirtenbäume 164.
Mispelbaum 392.
Mistel 102.
Mistelpflanzen 142.
Mistmelde 445.
Mohn 61.
Molinie 21.
Möhringie 54.
Mönchie 26.
Mönchskappe 538.
Mönchskrone **67.**
Mönchspfeffer **121.**
Mönchswurz 540.
Möre 41. 451.
Mohngewächse 152.
Mohnpflanzen 152.
Mohrenhirse **500.**
Mohrrübe 451.
Möhre 41. 451.
Molinie 21. **15.**
Moltebeere 336.
Monatsklee 456.
Mondveil 256.
Mondviole 70.

Montie 16.
Moraſtbirke 198.
Moraſtweide 256.
Morbeere 353.
Morbinſe 356. **256.**
Mordwurz **60.**
Morgenröschen 286.
Morgenſtern 363. 459. **64.**
Morbirſe **500.**
Morkönig 366.
Morſchmellen 439.
Morſimſe 353. 376.
Morveilchen 177.
Mosbeere 49. 615. **241.**
Moſchusbirke 198.
Mosroſe 434.
Moſchuskraut 176.
Moſchuskräuter 142.
Moſchusmalve 515.
Mottenblume 239. **108.**
Mottenkraut 377. 449.
Mottenſafran **466.**
Mückenbaum 180.
Mückenbein 472.
Mückenfang 286.
Mückenwürger **250.**
Müllen 68.
Müllerbrot 250.
Müllerkraut 8.
Mummel 631. **275.**
Mummelkrone 631.
Münzkraut 391.
Muskathiazinte 45.
Muttergotteskirſche 615. **241.**
Mutteri 536.
Mutterkraut 87. 382. 479. 608. **38. 39. 42. 53.**
Mutterwurz 36.
Mutterwurzel **399.**
Mutwillen 463.

N.

Nabelkraut 28.
Nachtkerze 49.
Nachtkerzen 162.
Nachtkraut **34.**
Nachtſchatten 38. 128. 252. 260. **1.**
Nachtviole 71. 278.
Nacktdrüſenſtändel 93. 367.
Nackte Jungfer **466.**
Nacktorche 367.
Nadelkerbel 40. 302.
Nägelein 207.
Nägeleinkraut 403.
Nagelkraut 23. 426.
Nagelkräuter 160.
Nahtnarbe **34.**
Najade 639. **270.**
Najaden 110.
Nardengras 361.
Narde 179.
Nardosmie 86. 174.
Narrenkappe 425. **27.**
Narrenkolben 619.
Narrenſtändel 356.
Narziſſe 45. 188.
Narziſſen 115.
Naſenblümler **127.**
Natterblümchen 262.
Natterkopf 27.
Natterkraut 265.
Natterngold 391.
Natterwurz 416.
Nebelbeere 236. 258. 353.
Negerbohne 484.
Negerkorn **500.**
Negerkraut 248.
Nelke 51.
Nelkenblütler 158.
Nelkengras 180. **104.**
Nelkenhafer 309.
Nelkenſchmele 309.
Nelkenwurz 60.
Neogaye 39.
Neslee 487.
Neſſel **12.**
Neſſelgewächſe 119.
Neſſelkönig 202.
Neſtwurz 94.
Neunhemderwurz **246.**
Neunkraft 191. 193. 223. 261. **12.**
Neunſpitzen **48.**
Nidelbrot **250.**
Nießgarbe **258.**
Nießkraut **224.**
Nießwurz 64. 219.
Nimfenblume 631.
Nimfenkräuter 116.
Niſſel 212.
Niſſengras 18.
Niſſolie 479.
Nixblume 631. **275.**
Nixknoten 440.
Nixkraut 639. **270.**
Nixenkräuter 116.
Nonnee 28.
Nonnenblume 204.
Nonnenkleppel 448.
Nußdotter 487.

O.

Ochſenauge 88. 414. **358.**
Ochſenaugen 140.
Ochſenbrech 456.
Ochſenhorn 77. 457.
Ochſenkraut 476.
Ochſenzunge 28. 285. **55.**
Odenskopf **42.**
Odenskopp **224. 239.**
Odermennig 57.
Oelbaum 14. 372. 518.
Oelrettich 649.
Oelſenich **30.**
Oelweide 372.
Ohmkraut 297.
Ohnblatt 52. 653.
Ohnblattgewächſe 134.
Ohnhorn 338.
Ohnhornſtändel 338.
Ohrlöffelkraut 261. **240.**
Ohrringlein 342.
Oleaſter 25. 372.
Olivenbaum 518.
Orange **288.**
Orangen-Agrume **288.**
Orant 405.
Orlaje 41.
Oſeille **61.**
Oſterblume 185. 202. 204.
Oſterglocke 220.
Oſterkerze **14.**
Oſterkraut **14.**
Oſterluzei 95.
Oſterluzeien 121.
Oſyris 102.
Otterwurz 416.

P.

Päderote 14.
Palmweide 177.
Päoniazeen 147.
Papierblume **221.**
Pappel 104. **224.**
Pappelkräuter 149.
Pappelroſen 149.
Papſtweide 200.
Paradiesapfel **287.**
Paradiesbaum 372.
Parfümirkirſche 204.
Parnaſſie 43.
Paronychie 27. 33.
Paronychien 160.
Parzenkraut 606.
Paſtinak 36.
Patſcherben 200.
Pechnelke 55.
Pechtanne 274.
Perlbohne 484.
Perlgras 19. 255.
Perlhirſe 284.

Perlkraut 284.
Perlzwiebel 648.
Perückenbaum 645.
Perückenſumach 645.
Peſtilenzwurz 193.
Peſtwurz 87. 191. 223. **150.**
Peſtwurze 140.
Pettel 43.
Peterſilie 37.
Peterskappe 538.
Petersſchlüſſel 195.
Pfaffenbütchen 33. 248.
Pfaffenkäppchen 248.
Pfaffenröhrlein 181.
Pfauengerſte 481.
Pfauenkrautſpiegel **16.**
Pfauennelke 392.
Pfauenſpiegel **409.**
Pfefferkraut **285.**
Pfefferminze **266.**
Pfeffertännel 626.
Pfefferwurz **35.**
Pfeifengras **15.**
Pfeifenrohr **261.**
Pfeifenſtrauch 58.
Pfeilkraut 99.
Pfennigkraut 211. 391.
Pferdebinſe 372.
Pferdebohne 483.
Pferdegras 247. 414. 472.
Pferdehuf 200.
Pferdekümmel **250.**
Pferdeſamen **250.**
Pferdeſat 606. **250.**
Pferdeſchwanz **259.**
Pferdeſchweif **419.**
Pferdeſeſel **115.**
Pferdewicke 197. 300.
Pferdezahn 484.
Pfingſtblume 251.
Pfingſtnelke 257. **114.**
Pfingſtroſe 61. 197. 277.
Pfingſtweigel 278.
Pfirſich 58. 159.
Pfirſichmandel 195.
Pflanzenſeide 134. **291.**
Pflaume 58. 246.
Pflückkohl 194.
Pfriemen 76.
Pfriemengras 18.
Pfriemenkreſſe 70.
Pfriemenkreſſen 154.
Pfützenblume 617.
Pillenneſſel 445.
Pimpernuß 42. 268.
Pimpinelle 284. **29.**
Pinie 656.
Piniole 656.
Pirámidenpappel 133.
Piſtazie 103.
Piſtazeen 110.
Platane 99.
Plataneen 119.
Platterbſe 79.
Plumbagineen 125.
Podagramskraut 391.
Polei 65. **224.**
Poleiminze **224.**
Polemoniazeen 132.
Polniſcher Weizen 481.
Polterjahn 389.
Pomeranze **288.**
Pomeſinen **288.**
Pomponroſe 434.
Porree 647. **284.**
Porrei 647.
Porſt 52.
Portulak 57.
Porzellanblümchen 541.
Prachtnelke 392.
Prachtprimeln 126.
Preiſelbeere 272.
Preiſeln 134.
Preſterling 277.
Prieſterkragen 414.
Primelgewächſe 29.
Prunelle 65. **62.**
Prunkroſe 434.
Pulſatille 185.
Pulverholz 248.
Punniſche Kicher 302.
Purgirkraut **224.**
Purgirwinde 431.
Purpurweide 189.
Purpurweide 189.
Puttagmaden 353.
Putzroſe 434.

Q.

Quecke 447.
Queckentreſpe 447.
Quendel 648.
Quendelfilzkraut 653.
Quendelſeide 653.
Quendelwolle 653.
Quitſche 250.
Quitſchbeere 250.
Quitte 59.
Quittenbaum 385.
Quittenniſpel 59.

R.

Rabsgras 439.
Rachenblütler 126.
Rade 56.
Radieschen 648.
Rädchenblüte **499.**
Räuber **68.**
Ragwurz 93. 356.
Rainfarn 86.
Rainkohl 80. 414.
Rampe 454.
Ramſel 262.
Range **291.**
Rankenroſe 393.
Rapontika **55.**
Raps 215.
Rapsdotte 71. 476.
Rapunzel 450.
Rapünzchen 16.
Raſenſchmede 439.
Raſenſimſe 356.
Rattenkraut 449.
Rattenpfeffer **1.**
Rattenſchwanz **23.**
Rauchwurz 402.
Raubbirke 198.
Raukenſenf 73. 464.
Raukengewächſe 153.
Rauſchbeere 102. 226. 353.
Räuſchler 150.
Raute 52.
Rauten 148.
Rautengewächſe 148.
Rebendolde 39. 606.
Rebhühnerkraut **34.**
Regenblume 431.
Rehbinden 277. **29.**
Rehheide 252. 257. 402. **162.**
Reihergras 502.
Reiherſchnabel 74.
Reisdinkel 480.
Reisgerſte 481.
Releke **12.**
Rempe 454.
Reps 215.
Repsdotter 454.
Reſede 57.
Rettich 71.
Rettichgewächſe 156.
Rheindorn 188.
Ribiſſeln 163.
Ribſel 201.
Ribſeln 163.
Riechbirke 198.
Riedgräſer 111.
Riemenblume 41. 247.
Riemenſtändel 269. 610.
Riemenzunge 269.
Rieſenamſer **251.**
Rieſenklee **40.**
Rieſenkürbis 649.
Rieſenſchwingel 389.

Riesentrespe 389.
Rindsauge 460. **358.**
Ringblume 88.
Ringelblume 91. **43.**
Ringelblumen 139.
Ringelranke 437.
Rippelkraut **12.**
Rippensame **161.**
Rispengras 21.
Rittersporn 62.
Robinie 78. 395.
Rockambolle 648.
Rodtrotten 475.
Röhrenbeutelige 135.
Roggen 22. 481.
Roggentrespe **81.**
Rohr **261.**
Rohrglanz 18. 627.
Rohrglanzgras 627.
Rohrkolben 96. 111.
Rollkistel **60.**
Rollgerste 300.
Rollzagn 558.
Rollzunge 93.
Rose 60.
Rosen 165.
Rosenäpfelstrauch 502.
Rosenbinse 631.
Rosengewächse 164.
Rosenklee 417.
Rosenkönigin 434.
Rosenkohl 194.
Rosenpappel **64.**
Rosenwurz 101.
Rosmarin 377.
Rosmarinheide 338.
Rostrose 411.
Roßbalsam **252.**
Roßbibernell **35.**
Roßfenchel **250.**
Roßhuf 173.
Roßkastanie 48.
Roßkastanien 151.
Roßkerbel **250.**
Roßklette **41.**
Roßkopfsstaude **115. 353.**
Roßkümmel 110. **19.**
Roßlattich 173.
Roßminze **45.**
Roßnagel 227.
Roßnessel 453.
Roßpappel 437.
Roßrippe 442.
Roßschweif **259.**
Roßsteert 360.
Rotbindholz 430.
Röte **34.**
Rötsch **36.**
Rotbuche 253.
Roteibe 224.
Roter Bock **42.**
Roterbe 192.
Roter Spinat **57.**
Rotfichte 274.
Roter Aurin 391.
Roter Hafer 480.
Rotkehlchenbrot 248.
Rotklee 395.
Rotkraut 194.
Rottanne 274.
Rotwurz 60. 401. 404.
Rudbeckie **506.**
Rübe **89.**
Rübenkerbel 408.
Rübenkohl 301.
Rübenrettich 649.
Rübsen 301.
Rührmichnichtan **15.**
Ruchgras 15. 18.
Ruchnelken 158.
Ruhrlöhkraut **224.**
Ruhrkraut 86. 445.
Ruhrkräuter 139.
Runkelrübe **89.**
Runzelnüßchen 302.
Ruppie 13.
Ruprechtskraut 256.
Russische Kamille 396.
Rüster 196.
Rüstern 120.
Rüttig **36. 236.**

S.

Sadebaum 228.
Säumchen 301.
Saflor 84.
Safran 16. **447.**
Sagine 297.
Salat **285.**
Salbei 13.
Salbeiweide 256.
Salepknabenkraut 337.
Salomonssiegel 254.
Salweide 177.
Salzbinse 625. **235.**
Salzbunge **242.**
Salzgras 625. **235.**
Salzkraut 34.
Salzmelden 124.
Salzprimeln 126.
Salzmiere 643.
Samendistel **115. 353.**
Sammtbürste 619.
Sammtgras 17. 255.
Sammtpappel **44.**
Sandbeere 51. 221. 273.
Sandblumen 159.
Sanddistel **115. 353.**
Sanddorn 102. 188.
Sandfeder 502.
Sandfleischblume 451.
Sandhafer 472.
Sandhalm **108.**
Sandimmerschön **108.**
Sandklee **494.**
Sandkochie **334.**
Sandkraut 54.
Sandlische 500.
Sandmohn 302.
Sandmohngewächse 152.
Sandnelke 451. 496.
Sandnelken 159.
Sandrohr **108.**
St. Antoniuskraut 8.
St. Antonskraut 398.
St. Bernhardskraut **91.**
St. Christofskraut 300.
St. Georgenkraut 270.
St. Georgenwurz 195.
St. Gregorsholz 204.
St. Johanniskraut **5.**
St. Katarinenrädchen **90.**
St. Konradskraut **5.**
St. Ladislaikraut **147.**
St. Lorenzkraut 427. **35.**
St. Luzienholz 204.
St. Luziuskraut 540.
St. Luzienweide 200.
St. Odilienkraut 298.
St. Peterskorn 480.
St. Peterskraut **34. 398.**
St. Petersstab **6.**
St. Quirinskraut 173.
St. Stefanskraut **18.**
St. Zäzilienkraut **5.**
Sanikel 35.
Sassaparille 236.
Satenjungfer **90.**
Sathafer 480.
Satklee 395
Satlein 482.
Satlinse 484.
Saturin **285.**
Saubalg 450.
Saubeere 442.
Saubohne 483.
Saubrot 226.
Saudistel 444.
Sauerach 261.
Sauerampfer 402.
Sauerdorn 45. 248. **261.**
Sauerkirsche 232.
Sauerklee 56. 196.
Sauerkleegewächse 148.
Sauerzitrone **287.**
Saufenchel **116.**

Saugras **58.**
Saukartoffel **447.**
Saukastanie **41.**
Saukirsche **1.**
Saukraut 479. **2. 15.**
Saumelk 444.
Säumling 47.
Saurohr **58.**
Sauranken 401.
Saurebe 438.
Saurüssel **58.**
Sausamen **270.**
Sauschnabel **58.**
Sautod **49.**
Sävenbaum 228.
Saussurie 84.
Sauwurz 582.
Schabenkraut 449. 463.
Schabziegerkraut 599.
Schachblume 190.
Schachtkohl 180.
Schäfertännel 626. **251.**
Schäzchenkraut **55.**
Schafgarbe 87.
Schafkerbel 402.
Schafklee 289.
Schaflinse 458.
Schaflinsen 437.
Schafmäulchen 213.
Schafranzel **91.**
Schafrippe **12.**
Schafszunge **58.**
Schafweizen 448.
Schalotte 648.
Scharbock 63. 177.
Scharbocksheil 350.
Scharfe Dürrwurz **354.**
Scharfkraut 28.
Scharlachskraut 407.
Scharlei 64.
Scharnpipe **36.**
Scharte 83.
Schartendisteln 137.
Schattenblume 25. 269.
Schattenzauke 269.
Schaumkraut 73.
Schebecken 249.
Scheibenkraut 71.
Scheiberich **235.**
Scheidenblütgras **261.**
Scheidengras 18.
Scheinnelken 158.
Scheißbeere 248. 429.
Schellenblume **28.**
Schellenkräuter 146.
Schellkräuter 152.
Schellkraut 61.
Schelmenkraut **398.**
Schelmwurz 181.
Scherte 606.
Scheuchzerie 353.
Schierling 38.
Schierlingsfilje 36.
Schildkraut 71. 216. 453. **17.**
Schildkresse 69. 227.
Schildträger **17.**
Schilf 18. **261.**
Schilfrohr 20. **33. 261.**
Schimmelkraut **68.**
Schißmelde **49.**
Schißmelden 123.
Schlafbeere **1.**
Schlafkraut 258.
Schlagkraut 494.
Schlammling 68.
Schlammlinge 127.
Schlangenäuglein 275.
Schlangenbeere 254.
Schlangengras **60.**
Schlangengurke **91.**
Schlangenkopf 409.
Schlangenkraut 95. 418. **429.**
Schlangenlauch 648.
Schlangenrose 393.
Schlangenwurz 416.
Schlehe 178.
Schlehenpflaume 178.
Schleichkräuter 160.
Schleifenblume 70.
Schließlein 482.
Schlinge 249.
Schlotterhose 195.
Schlottenlauch 384.
Schlüsselblume 29. 195.
Schlüsselblümler 125.
Schlüsselkraut **37.**
Schlutte 430.
Schmalhofen 456.
Schmalstern 390.
Schmalstral **53.**
Schmalzblume 239. 337.
Schmalzblumen 147.
Schmalztaschen 336.
Schmeele **28.**
Schmeerkraut 336.
Schmeerwurz 103. 450. 653.
Schmeerwurzel 438.
Schmele 471.
Schmerbel 33. 450.
Schmerzen **16.**
Schmiele 19. 471.
Schminkbeere 56. **90.**
Schminkbohne 484. 649.
Schminkpflanzen 124.
Schminkwurz 466.
Schnabelgewächse 148.
Schnabelheide 174.
Schnabelriet **256.**
Schnabelschötchen 70.
Schnabelsenf 482.
Schnabelsimse 15.
Schnabelwurz **116.**
Schnalzblume 298.
Schneckenklee 76.
Schneeball 42. 249.
Schneeblume 330.
Schneeenzian **186.**
Schneeglöckchen 45. 173. 180. 342.
Schneehändel 330.
Schneekraut 187.
Schneerose 568.
Schneetropfen 180.
Schneeveilchen 180.
Schneide 15. **248.**
Schneider 304.
Schnittlauch 545.
Schnittzwiebel 384.
Schoberie **425.**
Schönblümchen 63. 147. 187.
Schöne Dame **1.**
Schöne Grete 482.
Schönmädchen **2.**
Schörl 284.
Schopfvergißmeinnicht 280.
Schote 301.
Schotendotter 299.
Schotenerbse 301.
Schotengewächse 153.
Schotenklee 77. 439. 461.
Schotenweiderich 49.
Schotschke 249.
Schuhblume 541.
Schuppenniere 486.
Schuppenschlündler 131.
Schuppenwurz 167. 195.
Schuttkresse 436.
Schwaden 21. 628.
Schwadengras 628.
Schwalbenkraut 277. **35.**
Schwalbenwurz 35. 505.
Schwalbenzagel **132.**
Schwanenblume 631.
Schwanenhals **250.**
Schwanzsame **497.**
Schwarzbeere 249.
Schwarzdorn 178.
Schwarzerle 192.
Schwarzföre 273.
Schwarzkiefer 273.
Schwarzkümmel 62. **90.**
Schwarzkümmeler 147.

Schwarznessel 435.
Schwarzpappel 179.
Schwarzsenf 73. **93.**
Schwarzständel 93.
Schwarztanne 273. 274.
Schwarzwinde 443.
Schwarzwurz 280.
Schwarzwurzgewächse 136.
Schwedische Luzerne 456.
Schwefelwurz **116.**
Schweinebrot 459.
Schweinkraut 418.
Schweinsauge 254.
Schweinsblagde 402.
Schweinsbrechwurz 582.
Schweinsbrot **41.**
Schweinsbrot 226.
Schweinskresse **56.**
Schweinssalat 479.
Schweinstod 442.
Schweizerhose 425.
Schweizerthee **189.**
Schwerhafer 480.
Schwertbohne 484.
Schwertel 291.
Schwertlilie 16.
Schwindelbeere **1.**
Schwindelkraut **182.**
Schwindelwurz 313.
Schwindsuchtswurz 251.
Schwingel 21.
Schwingelschilf **261.**
Seebinse 372.
Seeblume 631.
Seedorn 188.
Seegras 95. 644.
Seekanne 617.
Seelilie 631.
Seemannagras **279.**
Seenelke 451.
Seerose 61. 631.
Seestrandslein **403.**
Segge 96.
Seidelbast 49. 172.
Seideln 122.
Seidenblümchen 365.
Seidenfrüchtler 132.
Seidenpflanzen 133.
Seifenkraut 53. **37.**
Seifenquendel 53.
Seifenwurz **37.**
Selbstheil **62.**
Sellerie 37.
Semeden 113.
Senebiere **56.**
Senebieren 155.
Senf 73.
Serradella 483.
Sesel 39.
Seslerie 21. 187.
Sevenbaum 228.
Sherardie 24.
Sibbaldie 44.
Sibirische Wucherblume 396.
Sicheldolde **55.**
Sichelerbse 484.
Sichelklee 456.
Sichelkraut **12. 55.**
Sichelmerk **55.**
Sichelmöre 38. **55.**
Siebenfingerkraut 262.
Siebengezeit 482. 599.
Siebenstern 48. 249.
Siebenzeiten 482. 599.
Siedau **240.**
Siegmundwurzel **64.**
Siegwurz 26. **246.**
Sieversie 60.
Siggel 621.
Sigmarskraut
Sigmarswurz **64.**
Silau 39.
Silberbart 406.
Silberblatt 230.
Silberdistel **52.**
Silbergras 499.
Silberhafer **169.**
Silberkraut 262. 286.
Silberpappel 177.
Silbertanne 273.
Silene **157.**
Silge 36.
Simeonswurz **64.**
Simse 15.
Sinau 254.
Sinngrün 31. 392.
Sirenie 72.
Sison 38.
Skabiose 23.
Skopolie 30. 199.
Skorpionpfriemen 184.
Skorpionskraut 206. **494. 263.**
Skorpionsschwanz **96.**
Skorpionswicke 232.
Skorputkraut 350.
Skorselkraut 401.
Skrofelkräuter 127.
Smyrnium 41.
Sockenblume 24. 226.
Soda **280. 425.**
Sofienkraut 288. **240.**
Sofienrauke 288.
Sohl 242.
Sohn vor dem Vater **466.**
Sommerbirke 198.
Sommerblume **73.**
Sommereiche 199.
Sommerkohl 215.
Sommerlauch **284.**
Sommerlinde 393.
Sommerlocken **236.**
Sommerraps 215.
Sommerreps 287.
Sommerrettich 648.
Sommerrübsen 301.
Sommerweizen 480.
Sommerwurz 67.
Sonnenblume 90. **73.**
Sonnenblumen 140.
Sonnenbraut **240.**
Sonnengold **108.**
Sonnengünsel 412.
Sonnenhirse 284.
Sonnenkraut **240.**
Sonnenkrone **73.**
Sonnenröschen 61. 412.
Sonnenröslein 156.
Sonnenrose **73. 447.**
Sonnenthau 43.
Sonnenwand **43.**
Sonnenwende 28. 212.
Sonnenwenden 131.
Sonnenwendgürtel **42.**
Sonnenwirbel 459. **11.**
Sorge 173.
Sorgho **500.**
Sossürre 84. **181.**
Spätlinde **3.**
Spanischer Kerbel 267.
Spanischer Klee 301. 395.
Spanische Linse 302.
Sparfaden **254.**
Spargel 46.
Spargelbohne 461.
Spargelerbse 77. 461.
Spargelgewächse 114.
Spargelkohl 194.
Spark 56.
Spatzenkraut **37.**
Spatzenzunge 49. 490.
Spazierrohr 20. **407.**
Spechtwurz 418.
Speckblume 181.
Speckbohne 484. 649.
Speckhülsengewächse 166.
Specklilie 259. 260.
Specknelde 445.
Speerenstrich 513.
Speichelwurz 302.
Speik **194.**
Spelt 480.
Spelz 480.
Sperlingszunge 490.
Sperk 56.

Sperlingsſchnabel 472.
Sperrkraut 431. **39. 265.**
Speierling 250.
Speik 229. 567.
Sperbenkraut 546.
Spierlingsvogelbeere 250.
Spierſtauden 165.
Spierſtrauch 60.
Spießmelden 123.
Spike **140.**
Spilling 246.
Spinat 103.
Spindelbaum 248.
Spinnblume **466.**
Spinneleblümchen **83.**
Spinnenblümchen 265. 338.
Spinnenblume 338.
Spinnendiſtel **91.**
Spinnenklette **41.**
Spiräe 60.
Spirtenholz 350.
Spitzahorn 196.
Spitzkiel 515.
Spitzklee 266.
Spitzklette 98.
Spitzkletten 140.
Spörgel 475.
Sporker 248.
Spornblatt 83. 84.
Spornblume 12.
Spornloſe 338.
Spottrohr 619.
Sprenblume 86.
Sprenblütige 124.
Springfrüchtler 149.
Springkraut 32. **15. 70.**
Springlein 482.
Springwurzel 418.
Spurre 23. 180.
Stabwurz **350.**
Stachelähre 17.
Stachelbeere 33. 176.
Stachelbiſtel 438.
Stachelgras 17. 19.
Stachelhar **280.**
Stachelmohn 302.
Stachelnuß 637.
Stachelſame 449.
Stärkekraut 452.
Staffelblume **149.**
Stalkraut **51.**
Stallkraut 456.
Staphyleazeen 168.
Ständelgewächſe 115.
Stangenbohne 484.
Staudenbirke 198.
Stechapfel 30.
Stechäpfel 128.
Stechdiſtel **60.**
Stechdorn 32.
Stecheiche 267.
Stecheichen 129.
Stechginſter 184. 252. 257.
Stechhülſe 26.
Stechkraut **52.**
Stechpalme 267.
Stechpfriemen 257.
Stechwinde 103.
Steckenkraut 35
Steckrübe 216.
Stefanskörner **502.**
Stefanskraut 400.
Steigbohne 484.
Steinapfelbaum 220.
Steinbeere 254. 272.
Steinbirke 198.
Steinbrech 53. 606.
Steinbrechgewächſe 161.
Steinbuche 199.
Steineiche 253.
Steingeisl 529.
Steinkirſche 204.
Steinklee 77. 289.
Steinkraut 69.
Steinkrautgewächſe 153.
Steinlinde 14. **3.**
Steinmeliſſe **120.**
Steinmiſpel 220.
Steinnelke **100.**
Steinobſt 164.
Steinpeterlein 37.
Steinpfeffer 452.
Steinpolei **94.**
Steinſame 27.
Steinſalat 81.
Steinſchmückel 70.
Steintäſchel 70.
Steinwicke 290.
Steinwurz 410.
Stengelprimeln 126.
Sternblümchen 208.
Sternblümelein 249.
Sternblume 89. **342.**
Sternblumen 140.
Sternbuſch 267.
Sternhiazinte 45. 199. 208.
Sternköpfchen 88.
Sternkopf **7. 395.**
Sternkraut 54. 171. 248. 408.
Sternleberkraut 248.
Sternliebe 332.
Sternnelken 159.
Stichling **503.**
Stickwurz 540.
Stiefmütterchen 275.
Stieleiche 199.
Stielrüſter 176.
Stielſame 82.
Stierauge **342.**
Stinkblume **43.**
Stinkkreſſe 436. **56. 77.**
Stinkſalat 80. 267.
Stockerbſe 301.
Stockgerſte 300.
Stolzer Heinrich 409.
Stoppelrübe 301.
Stoppelſprung 301.
Storchenbrot **466.**
Storchſchnabel 74.
Storchſchnäbler 149.
Stotternheimer Klee 456.
Strändling **253.**
Strageln 166.
Straublütler 139.
Straldiſteln 138.
Siralklee 76. **85.**
Stralkraut **106.**
Stralſternblumen 140.
Strandaſter **425.**
Strandhafer **262.**
Strandling 42. 97. 461.
Strandnelke 43.
Strauchbirke 371.
Strauchbohne 484.
Straußfeder 502.
Straußgras 502.
Straußlattich 191.
Straußſtändel 93.
Strenze 420.
Strenzel 391.
Striemenſame 39.
Strobili **12.**
Strockenbrot **466.**
Strohblume **108.**
Student 236.
Studentenblume **64.**
Studentenröschen **144.**
Studentenröslein 156.
Studentenroſe **64.**
Studentenblume **64.**
Stundkraut **5.**
Sturmhut 422. 538.
Suäde 34.
Sumach 42.
Sumpfampfer **235.**
Sumpfbeere 353.
Sumpfbinſe 603.
Sumpfdaun 608.
Sumpfdreizack **235.**
Sumpfenzian **162.**
Sumpffingerkraut 440.
Sumpfgarbe **268.**
Sumpfglöckchen **258.**

Sumpfhartheu **241**.
Sumpfheide **162**.
Sumpfbottonie 630.
Sumpfklee 365.
Sumpfkraut **258**.
Sumpfmeisterwurz **399**.
Sumpfmutterwurz **399**.
Sumpfporst 377.
Sumpfprimel 29. 630.
Sumpfprimeln 126.
Sumpfriet 603.
Sumpfrodel 366.
Sumpfrose 29.
Sumpfschirm 38. **235**.
Sumpfschmele **407**.
Sumpfschmirgel 239.
Sumpfskabiose **395**.
Sumpfwurz 94.
Sumpfzieste 608.
Suppenkerbel 260.
Süßgras 628. **262**.
Süßholz 78. 395. **90**.
Süßklee 79. 166.
Süßkirsche 178.
Süßling 459.
Süßzitrone **287**.
Susannenkraut 429.
Sweertie 34.

T.

Tabak 30.
Tabakkräuter 128.
Tagblume 46. 607.
Tagkraut **34**.
Taglilie 607.
Tag und Nacht **9**.
Tag- und Nachtgleich **34**.
Tamarisken 163.
Tanne 96. 273.
Tännel 50.
Tännelkräuter 160.
Täschelkraut 69.
Tannenspargel 654.
Tannenwedel 612.
Tannenwedelpflanzen 162.
Tarchonantheen 140.
Taubenfuß 262. 304.
Taubenkropf 54. 283. **37**.
Taubenschnabel 304.
Taubenskabiose **7**.
Taubenweizen **9**.
Taubhafer 472.
Taubnessel 66.
Taumelkräuter 128.
Tausendblatt 99. 509. 620. 630. **12**.
Tausendgüldenkraut 30. 460.
Tausendknoten **55**.
Tausendkorn 490.
Taxbaum 105. 224.
Tazette **494**.
Teichbinse 372.
Teichfaden 282.
Teichfenchel 277.
Teichlinse 380.
Teichnuß 637.
Teichrohr **261**.
Teichrose 61.
Telekie 88.
Telephie 42.
Terpentinbaum 224.
Terepintazeen 167.
Teufelsabbiß **395**. **508**.
Teufelsapfel 442.
Teufelsauge 63. 219. 263. 430. 440. 453.
Teufelsband **77**.
Teufelsbart 330.
Teufelsbeere **1**.
Teufelsbiß 251. **7**. **395**.
Teufelsdarm 443.
Teufelsband 644.
Teufelskirsche **1**.
Teufelsklauen 367.
Teufelskolben 398.
Teufelskrallen 32.
Teufelswurz 538.
Teufelszwirn 277. 432. **29**. **291**
Thallilie 249.
Thalstern 420.
Thaubeere 336. 353.
Thaumantel 254.
Theekötken 431.
Theriakwurzel 389.
Thimian 64.
Thimoteusgras 441.
Thoreugerste 481.
Thurmkraut 72.
Thymian 64.
Tiläe 26.
Timian 64.
Timotigras 441.
Timseide 653.
Tintenbeere 248.
Todesbaum 224.
Todtenbaum 268.
Todtenbein 418.
Todtenbeutel 258.
Todtenblume 82. **43**.
Todtenkopf **77**.
Todtenmirte 195.
Töberich **81**.
Toffeln 128.
Tofieldie 47.
Tollbeere **1**.
Tolldocke 63.
Tollkirsche 31.
Tollkraut 430. 442. **36**.
Tollkräuter 128.
Tollrübe 606.
Topinambur **447**.
Torfbeere 336.
Torfbinse 603.
Torfblume 244.
Torfgränke 244.
Torflilie **186**.
Torfveilchen 348.
Tormentill 404.
Tormentillwurzel 404.
Tozzie 67.
Tragant 78. 395. 458.
Traubeneiche 253.
Traubenerbse 301.
Traubengamander **102**.
Traubenholunder 204.
Traubenkirsche 200.
Traubenmispel 219.
Traubenschmergel 463.
Traueresche 195.
Trauerkräuter 127.
Trauerweide 387.
Treussamen **426**.
Tremse 304.
Trespe 20.
Treuedistel **353**.
Trinie 37.
Tripmadam **50**.
Trixago **494**.
Trolle 337.
Trollblume 63. 337.
Tropfkraut **34**.
Tropfwurzel 606.
Trost 67. **71**.
Trunkelbeere 353.
Tubaspeck **37**.
Türkenbund 320.
Türkenbundlilie 391.
Türkenkorn 484.
Türkischer Weizen 484.
Tugendblume **238**.
Tulpe 46.
Tupfenenzian **171**.
Turbankürbis 520
Turbith 39.
Turgenie 10.
Twalch 499.

U.

Uchtblume **466**.
Udore 102. 640.
Ufermelde **254**.
Uferschwingel 604.
Ufertamariske 74. 578.

Ulme 34. 196.
Ungarischer Eibisch **10.**
Ungeduld **15.**
Unholdenkerze **14.**
Unnütze Sorge 275.
Unruhe **60.**
Unserer Frauen Bettstroh 408.
Unserer lieben Frauen Waschbecken **34.**
Unserer lieben Frauen Weißranch **476.**
Unseres Herrgotts Wundkraut **5.**
Unsporn 93.
Unstätkraut 608.
Unterkohlrabi 216.
Unverleid **55.**
Urle 192.

V.

Valentdistel **60.**
Valentinspeltschen 437.
Vallisnerie **507.**
Vehdistel **52.**
Veil 292.
Veilchen 32.
Veilchengewächse 158.
Venuskanne 302.
Venuskirsche 632.
Venusnabel **22.**
Venusschuh 541.
Venusspiegel 32. 485.
Venusthränen 453.
Venuswagen 538.
Verfluchte Jungfer 459.
Vergehblatt **58.**
Vergißmeinnicht 28. 203.
Vexirnelke 56. 656.
Vierling 297.
Virgil's Aster **342.**
Vipergras 265.
Visetholz 647.
Vitsbohne 77. 79. 484.
Vögelspeck **37.**
Vogelauge 229.
Vogelbeerbaum 250.
Vogelbeere 250.
Vogelbrot 452.
Vogelerbse 206. 437
Vogelfuß 79. 273.
Vogelgarbe **58.**
Vogelgras 437.
Vogelheu 437.
Vogelhirse 284.
Vogelkirsche 178. 200.
Vogelklaue 273.
Vogelknöterich **55.**
Vogelkopf 490.
Vogelkralle 273.
Vogelkraut 171. 211.
Vogelnest 402. 451.
Vogelnestwurz 402.
Vogeltod **36.**
Vogelwicke 437. 439.
Vogelwurz 402.
Vorwitzchen 257.

W.

Wachholder 105. 177.
Wachsblume 28. 68.
Wachtelweizen 67.
Wätbeere **1.**
Wahlenbergie 31.
Wahlenbergieen 135.
Wahrer Genip **189.**
Waid 70.
Waidgewächse 155.
Walch 22.
Waldahorn 203.
Waldangelika **15.**
Waldbart 630.
Waldbeere 249.
Waldbinse 247. **16.**
Waldbrustwurz **16.**
Walddaun 439.
Walddistel **5.**
Waldeibisch 437.
Walderbse 197.
Waldfichte 273.
Waldfistelkraut 361.
Waldflachs **39.**
Waldhähnchen 202. 204.
Waldhirse 255.
Waldkarde **34.**
Waldkerbel 260.
Waldkirsche 178.
Waldklee 404.
Waldklette 400.
Waldknautie **23.**
Waldlack 492.
Waldmalve 437.
Waldmangold 392.
Waldmeister 24. 248.
Waldminze **45.**
Waldnelke **8.**
Waldnessel 197. 394.
Waldranunkel 251.
Waldrapunzel 402.
Waldrapwurz 398.
Waldrebe 62.
Waldreben 146.
Waldrodel 361.
Waldrohr 418.
Waldrose 393.
Waldrübe 226.
Waldrohrkraut **389.**
Waldsalbei **30.**
Waldschmirgel 201.
Waldschwaden **499.**
Waldsegge 198.
Waldskabiose **23.**
Waldstroh 408.
Waldtulpe 201.
Waldvöglein 405.
Waldwurz 37. 643. **15.**
Waldziest 394.
Waldzwenke 390.
Walkerbeere **1.**
Walljantie 24.
Wallnuß 99.
Wallnüsse 167.
Wallwurz 280.
Walpurgiskraut 197.
Wandkraut **34.**
Wanzengesicht **408.**
Wanzenkraut 62. 537. **3.**
Wanzenlaussame **408.**
Wanzenrose 433.
Wanzensame 34.
Wanzentod **3.**
Wanzentödter **3.**
Warzenkraut 414. **38.**
Warzenkrautgewächse 127.
Waschkraut **37.**
Wasseralant **239. 254.**
Wasseraloë 105. 621.
Wasserampfer **236.**
Wasserandorn **254.**
Wasseravon 418.
Wasserbalsam **252.**
Wasserbeere 440.
Wasserbetonie **267.**
Wasserblüte 380.
Wasserblut **16.**
Wasserbraunwurz **267.**
Wasserdost 85.
Wasserdoste 140.
Wasserefeu 380.
Wasserepf 608.
Wassereppich 380. 608.
Wassereppig **235.**
Wasserfeder 630. **277.**
Wasserfedergras **261.**
Wasserfenchel 626. 630. 632. **250.**
Wasserfilipendel 606.
Wassergarbe 626. 630. **277.**
Wassergarn **277.**
Wassergauchheil 626.
Wasserhähnchen 632.
Wasserhähnlein 632.
Wasserhanf **238. 409.**
Wasserhelm 626. 630.

Wasserholder 249.
Wasserhornkraut 440.
Wasserklee 365.
Wasserklette 191.
Wasserknöterich **236.**
Wasserkresse 70.
Wasserlattich **409.**
Wasserlieſch 631.
Wasserlinſe 13.
Wasserlobelie **250.**
Wassermännchen 631.
Wassermaid 639. 640. **270.**
Wassermeier 440.
Wassermerk **235.**
Wasserminze **252.**
Wassernabel 35. **22.**
Wassernelken 159.
Wassernuß 637.
Wassernüſſe 162.
Wasserraſtinak **235.**
Wasserpeſt 382.
Wasserpeterlein **235.**
Wasserpfeffer 418. 626. **16. 251.**
Wasserpfriemen 639.
Wasserpolei **252.**
Wasserriemen 644.
Wasserriſpengras **262.**
Wasserrübe 606.
Waſſerſäge 621.
Waſſerſchere 621.
Waſſerſchierling 37. 606.
Waſſerſchlauch 14. **248.**
Waſſerſchüſſel **22.**
Waſſerſchwanz **259.**
Waſſerſenf **238.**
Waſſerſichel 621.
Waſſerſtern 96. 630.
Waſſerſterne 118.
Waſſertännel **259.**
Waſſertauſendblatt **277.**
Waſſerveilchen 631.
Waſſerviole 51.630.631.**8.**
Waſſerwegerich 630.
Waſſerweichling 440.
Wau 452.
Waue 156.
Weberkarde **58.**
Weberſtral **58.**
Wechſelkreſſe 634.
Weckbröſele **43.**
Wegblatt **58.**
Wegbreit **58.**
Wegdiſtel 438. **11. 41.**
Wegdorn 32. 248.
Wegdörner 168.
Wegebreit 442.
Wegerich 23. 442.
Wegeriche 125.
Wegetritt 442. **55.**
Wegwarte 459. **58.**
Weiberkraut **42.**
Weiberkrieg 456.
Weichborſt **14.**
Weichkraut 56. 95. 440.
Weichmeier 440.
Weichſel 204. 232.
Weichſtändel 417.
Weichſelkirſche 204.
Weide 101.
Weide der Juno 387.
Weiden 118.
Weidendorn 188.
Weidenlattich **66.**
Weidenröschen **18.**
Weiderich 57.
Weideriche 163.
Weimutskiefer 397.
Weinbergslauch 474.
Weinraute **164.**
Weinrebe 32.
Weinroſe 410.
Weinſtock 32.
Weinzäpfchen 261.
Weißbirke 198.
Weißbuche 199.
Weißdorn 58.
Weißebern 249.
Weiße Leuchte **39.**
Weiße Pappel **44.**
Weißer Dorant **268.**
Weißer Genip **189.**
Weißer Kukuk 252.
Weißerle 227.
Weißer Speik **189.**
Weiße Rübe 301.
Weißes Waldſtroh 390.
Weißklee 289.
Weißkohl 194.
Weißpappel 177.
Weißrauch **189.**
Weißſtändel 94. **257.**
Weißtanne 273.
Weißwurz 254.
Weizen 22.
Welſchkohl 194.
Welſchkorn 484.
Wendelorche **356.**
Werftweide 192. 238.
Wermut **73.**
Wetterbaum 274.
Wetterdiſtel **115. 353.**
Wetterhahn 196. 444.
Wetterklee **238.**
Wetterröslein **64.**
Wetterroſe **64.**
Wicke 78.
Wicken 167.
Widerbart **13.**
Widerſtoß 54. 256. 410. 451.
Wielandsbeere 172. 347.
Wier 644.
Wieſenabbiß **395.**
Wieſenalant **239.**
Wieſenampfer 433.
Wieſenangelika **399.**
Wieſenbertram **268.**
Wieſendiſtel **238.**
Wieſenenzian **398.**
Wieſengold 391.
Wieſengoldröschen 337.
Wieſenhafer 20. 423.
Wieſenkerbel 260.
Wieſenklee 318. 395.
Wieſenknopf 25. 284. 546.
Wieſenkohl **238.**
Wieſenkreſſe 200.
Wieſenmangold 365. 403.
Wieſennelke 469.
Wieſenranunkel 251.
Wieſenraute 62.
Wieſenſafran **466.**
Wieſenſalbei 407.
Wieſenſchwertel 269.
Wieſenwolf 366.
Wilde Balſamine **15.**
Wilde Engelwurz **16.**
Wilde Karde **34.**
Wilde Piſtazie 268.
Wilder Aurin **224.**
Wilder Dragun **268.**
Wilder Iſop **285.**
Wilder Lack 492.
Wilder Meiran **8.**
Wilder Reis **294.**
Wilder Rosmarin 377.
Wilder Saflor 460.
Wilder Spinat 450. **57.**
Wilder Wein **35.**
Wilder Wermut **42.**
Wildes Rüblein 398.
Wildes Süßholz 395.
Wildhafer 472.
Willemetie 81.
Willſamen 288.
Windbeere **1.**
Winde 30.
Winden 131.
Windengewächſe 131.
Windfahne 471.
Windgras 471. **28.**
Windhafer 472.
Windhähnchen 202.
Windhalm 18. 471.
Windhalmgräſer 112.

Windröschen 63. 146.
Windsbock 458. 476.
Wingertswinde 443.
Winterbirke 198.
Wintereiche 253.
Wintererbse 301.
Winterflachs 482.
Wintergrün 52. 392. 424. **433.**
Winterkohl 194.
Winterkresse 280.
Winterlauch 647. **284.**
Winterlieb 401.
Winterlinde **3.**
Winterling 64. 172.
Winterlocke 632.
Wintermangold 392.
Winternieswurz 172.
Winterperle 401.
Winterrettich 649.
Winterrübsen 301.
Wintersaturei **129.**
Winterstern 172.
Winterweizen 480.
Winterzwiebel 384.
Wirbelborst **14.**
Wirbeldost **14.**
Wirsing 194.
Wittwenblume 448.
Wodanskraut 445.
Wodendung 606.
Wohlgemut **8. 266.**
Wohlstand 538.
Wohlverleih 90.
Wolf 361.
Wolfsapfel **43.**
Wolfsauge **2.**
Wolfsbeere 254. 273.
Wolfsbein **254.**
Wolfsblume 174.
Wolfsbohne **496.**
Wolfsdistel **11.**
Wolfseisenhut **27.**
Wolfsfuß 427. **254.**
Wolfsgerste 448.
Wolfsgift **27.**
Wolfskirsche 254.
Wolfskraut **15. 27.**
Wolfsmilch 100.
Wolfsschote 395.
Wolfssturmhut **27.**
Wolfstod **27.**
Wolfstrapp 13. **254.**
Wolfstraube 254. 443.
Wolfswurz 251. **27.**
Wolfswut **1.**
Wolkenbeere 336.
Wollblume 318.
Wolldistel **41. 67.**
Wollenbaum 180.
Wollgras 15.
Wollkraut 30. 412. **14.**
Wollriet 239.
Wollweide 210.
Wucherblume 87.
Würfelerve 487.
Wüterich 606. **36.**
Würzkräuter 130.
Wulffenie 14.
Wunderbar **50.**
Wunderklee **40.**
Wunderveilchen 203.
Wundklee 75. 77.
Wundkraut 251. 388. 401.
Wurmkraut 82. 399. 438. **68.**
Wurmmelden 124.
Wurmsalat 438.
Wurmwurz 402.
Wurstkraut **429.**
Wurzelkastanie 485.
Wutkirsche **1.**
Wutschierling **36.**

Y.

Ysop 65.
Ysope 130.

Z.

Zachänsöl 372.
Zachariaskraut 304.
Zackenschötchen 71.
Zackenschote 445.
Zackenschoten 155.
Zahlbruckner 53.
Zahnlose 131.
Zahnlosenkraut 435.
Zahntrost **71.**
Zahnwurz 72. 302.
Zannichellie 96.
Zapfenfrüchtler 117.
Zartriet **233.**
Zauberkraut 202.
Zauberkräuter 122.
Zauberwurz **354.**
Zauke 249.
Zaunglocke 431.
Zaunlattich **66.**
Zaunlilie 46. 405.
Zaunreis **28.**
Zaunrübe 101.
Zaunwicke 206.
Zaunwinde 431. **433.**
Zedrat **287.**
Zehrwurz 255.
Zeiland 172.
Zeisigkraut **93.**
Zeitlose 47.
Zelastrineen 168.
Zellblume **41.**
Zentifolie 431.
Zerealen 112.
Zerreiche 269.
Ziane 304.
Zichorie 80. 459.
Zichorienpflanzen 137.
Ziegenbein 304.
Ziegendill **36.**
Ziegenkraut 461.
Ziegenraute 461.
Ziesern 483.
Ziest 66.
Zieste 130.
Zigeunerapfel 442.
Zigeunerkraut 430. **36. 254.**
Zilleen 155.
Zimbelkraut 405. 464.
Zimmeterdbeere 176.
Zimmetrose 277.
Zinken 207. **419.**
Zipergras 620.
Zipperginggis **285.**
Zipfelkraut **224.**
Zipolle 648.
Zipresse 100. 174.
Zipperleinkraut 391.
Zirmet 36.
Ziströschen 61. 412.
Zitrone **287.**
Zitronelle **350.**
Zitronenbaum 79.
Zitronenkraut **350.**
Zitronenmelisse **38.**
Zittergras 21.
Zitterlinse 137.
Zitterpappel 177.
Zöpfli **140.**
Zottenblume 365.
Zuckerahorn 196. 204.
Zuckererbse 301. 483.
Zuckerhutkraut 194.
Zuckermelde **57.**
Zuckermerk **89.**
Zuckerrose 434.
Zuckerwurz 363.
Zuckerwurzel **89.**
Zürbelkiefer 567.
Zürgelbaum 226.
Zürgelbäume 120.
Zungenbahnenfuß **265.**
Zweckenbaum 248.
Zweiblatt 94. 269.
Zweikorn 480.
Zweizahn 85. 90. **408. 409.**
Zwenke **6.**

Zwergbinse **273.**
Zwergbirke 336.
Zwergbohne 484.
Zwergenzian **185.**
Zwergevax **502.**
Zwergflachs 26.
Zwerggarbe **192.**
Zwerggras 17. 189.
Zwerghahnenfuß **379.**
Zwergbimbeere 336.
Zwergholunder **7.**
Zwergkiefer 350.
Zwergkirsche 201.
Zwerglein **106.**
Zwergmaulbeere 336.
Zwergmispel 58. 220. 536.
Zwergrose 513.
Zwergständel 93.
Zwergweichsel 201.
Zwetsche 246.
Zwiebel 648.
Zwiebelkraut 421.
Zwiebellauch 648.
Zwiebelporrei 647.
Zwieselbeere 178.
Zygophylleen 148.
Zypergras 15.
Zypergräser 111.
Zyrgelbaum 34. 226.

QK314 .B47 v.2
Beiche, W. Eduard/Vollstandiger Blutenka
3 5185 00088 0722